



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.


About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

LIBRARY OF THE
Stanford Junior University
—
DO NOT TAKE OUT OF THE LIBRARY







**CASSII FELICIS
DE MEDICINA**

**EX GRAECIS LOGICAE SECTAE AUCTORIBUS
LIBER TRANSLATUS**

SUB ARTABURE ET CALEPIO CONSULIBUS

(ANNO 447)

NUNC PRIMUM EDITUS


A

VALENTINO ROSE.



**LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.
MDCCCLXXIX.**

710.11
Q341.2



A7070

Medicorum Latinorum qui supersunt aetate novissimus ultimusque idem qui typis impressus oblivioni fatisque eripitur, nunc primum prodit Cassius Felix, cuius Medicinae „ex graecis logicae sectae auctoribus“ (et praecipue Galeno — vid. ind. font.) conscriptum vel „translatum“ breviliquium editum fuit, sicut codicis Parisiensis testatur inscriptio, „sub ardebre et asclepio consulibus“ i. e. Galepio et Artabure (Mömmesen, Zeitzer Ostertafel v. J. 447 Berl. Akad. 1863 p. 551) anno 447. auctor Latinus est („nos vero latino sermone“ c. 25 etc. cf. ind. gr.), non Graecus, neque ulli eorum qui idem nomen gerunt (de Cassiis medicis v. Fabric. Bibl. Gr. III, 322 Harl.) putandus idem, patria quidem incertus, scilicet si recenti codicis Parisiensis scriptori fides „Artensis“ (Astensis? Cirtensis? nam pro Ambracia antiqua quando ab Arattho vel Arachtho fluvio appellata sit Arta — cf. Leake Trav. in N. Gr. I, 208 — non constat), sed aetate suppar Theodoro Prisciano „Vindiciani*) Afri“ discipulo, cuius uti Graeci aequalis Philagrii (Epirotae, cf. E. Rhode Rhein. Mus. N. F. 32, 336) paulo maioris auctoritatem infert, fortasse „Afer“ et ipse, utpote qui citet herbam putidam „quam Punice aturbis dicunt“ (c. 20, cf. ind. lat. s. cortizonas, gelela), simillimus dicendi genere Caelio Aureliano eiusdem saeculi quinti medico Siccensi.

Utitur quidem Cassius, ex Galeni libris, celeberrimis praecipue illis „ad Glauconem“, sed ut indicat praefatiuncula etiam falsi Galeni novisse videtur Euporiston librum, qui quum genuinum Galeni opus (quod citat ipse Galenus X, 955) desideraretur iam ab Oribasio in ipsius Euporiston praefatione (Orib. V, 559 Dar.), sub Galeni nomine editus fuit Oribasii causa post Oribasium (et mortis Iuliani

*) de quo cf. Anecd. II, 177. Hermes VIII, 42.

annum 363) c. a. 400: hunc enim — primum scilicet ex tribus quos coniungunt editiones nostrae olim in codicibus manu scriptis separatos*) atque inter se diversissimos — ante oculos habuit transtulitque in sua („medicinae praesentaneae“) iam Theodorus Priscianus (ut unum exemplum afferam, legas de parotidibus I, 8 ed. Argent. cum Gal. eup. XIV, 334—36), proprio deinde titulo appellavit auctor anonymus (s. VI vel VII) qui ficto nomine (Anecd. II, 168) dicitur sive „Scolapius“ sive „Galienus“ (c. 21 de stomachi causis „potio magna et probata a galieno in euporiston libro suo“ i. e. Gal. eup. XIV, 370, ubi auctoris nomen quod praebent codices mei omnes (s. IX—XI) omittitur in editione Argent. 1533 p. XXX v. 9).

Cassium noverat Isidorus (cf. 4, 8, 4 = Cass. c. 24 de igne sacro), noverunt veterum auctorum compilatores Salernitani (Petroncellus cod. S. Germ. 1146 apud Renzi Coll. Salern. IV, 185 sqq. qui nunc est lat. 14025 s. XIV Delisle p. 125. cf. cod. Par. 11219 s. IX f. 42 sqq. cod. Lond. Harl. 4977 s. XI. Sloan. 2839 s. XII. Arundel. 166 s. IX), sed ipso nomine testem citat (locis quidem circiter ducentis) unus c. a. 1300 Simon Januensis in lexico medico (recentioribus Mathei Silvatici editionibus inserto, de qua re E. Meyer Gesch. d. Bot. IV, 173), qui in praefatione auctores recensens „quorum ad huiusmodi robur sepe revolve volumina“ sic ait „deinde ex Cassio Felice, qui et ipse a Cornelio (Celso) multum extollitur, qui continet tractatus duos de practica“. post quem, si de Matheo taceas — is enim Simonem reddit —, oblivione conditus iacet in bibliothecis usque ad haec nostra tempora, tribus tantum codicibus manuscriptis quod sciam

*) exemplo utor quod praefationibus est codicis Ambrosiani Q. 94 sup. (s. XV) ubi *Ἐνεστι μὲν τῇδε τῇ βιβλίῳ γαληνοῦ θηραπειτικῇ διαφόρων νόσων διὰ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων πρὸς σόλωνα τὸν ἀρχιγυρὸν*: — (praecedat epistola inc. *Ἐπιζητήσαντός μου*...). ceterum cf. Ackermann in hist. litt. Gal. I p. CLIV ed. Kühn.

conservatus, uno vetere quidem et fido sed imperfecte sine titulo ac nomine scripto (in Germania) ad exemplar quod recto capitulorum foliorumque ordine destitutum erat mutilumque et lacunosum, recentibus duobus integris sed arbitrio scriptoris Itali textum obscurum corrigentis corrupto altero Parisiensi s. XIII, altero Cantabrigiensi s. XV propter insignem litterarum obsoletarum ex vetere quodam bonoque exemplari depictarum inscitiam monstruosissimo. Parisiensem (tunc no. 1125) primus monstravit Philippus Labbeus in Nova bibl. mss. librorum s. Specimine antiq. lect. Par. 1653 p. 49, Cantabrigiensem et ipsum in Italia scriptum (v. Cat. of the mss. of the univ. of Cambridge III p. 82), qui olim fuit Joannis Mori episcopi Norvicensis (no. 53), exhibet Catalogus librorum mstorum Angliae in unum collect. Ox. 1697 t. II p. 363 tunc „pulcherrime descriptum“ nunc madore fere deletum ut vix legas nec nisi reliquorum codicum ope litteras saepe evanescente discernas. utrumque testimonium notavit Fabricius (B. Gr. III, 322), attamen ipsum textum (utpote „translatum“) nemo inspexit, auctorem Felicem confundunt cum Cassio iatrosophista Graeco problematum scriptore plane alieno. cautius „Bibliothecae medicae“ conditor vetustissimus Paschasius Gallus (Bas. 1590 p. 56, unde sua J. G. Schenckius a Gravenberg, Biblia iatrica s. Bibl. med. macta. Frf. 1609 s. v.) „Cassius Felix quidam aliquoties citatur in pandectis medicis Matthæi Sylvatici. manu illius scripta adhuc exstare alicubi conicitur“*)

Ego Cassium edere constitui inde ab a. 1856. hoc enim anno postquam iter Parisinum moliens ex Catalogo impresso (bibl. reg. Par. 1744 III, 204) notitiam habui

*) pro Gallo male Gesneri Bibliothecam citavit Le Clerc hist. de la méd. 1729 I, 423 — Gesnerus enim qui in Bibl. inter eos ex quibus hauserit Matth. Sylvaticus Cassii Felicis simpliciter nomen posuit, sic habet in notis ad Cassii problem. Tig. 1562 p. 55 „sed et Cassii Felicis medici Latini nomen alicubi legi, nec memini“.

codicis Parisiensis lat. 6114, ipsum codicem inspexi quem olim viderat Labbeus atque loca quaedam cum initio ex eo excerpta mecum abstuli.*) deinde a. 1865 eundem auctorem licet anonymum et confusum et dimidia fere sui parte truncatum extare vidi in codice S. Galli 105 atque ex hoc exemplari tamquam ex certo quodam fundamento edi posse intellexi. hunc iterum in Helvetia commoratus descripsi a. 1869 (12—18. Aug.), descripsi etiam Parisiensem ad me transmissum Berolinum a. 1870, denique ad utrumque contuli Cantabrigiensem (de quo uno verba fecit Daremberg in ed. Oribasii t. I p. XL) quem et ipsum per tres fere menses penes me habui Berolini a. 1873. ex tribus his codicibus quos solos novi veterem hunc medicinae auctorem restitui a 1875/76, relegi a. 1878. quem nunc edo, labore quidem privatis vitae curis sollicitudinibusque saepe interrupto atque in Felice ut fateor satis infelici.

Berolini 30. Oct. 1878.

Valentinus Rose.

*) propterea Cassii mentionem feci ut iam in Aristotele Pseudepigrapho p. 388 sic et in Anecdotis II, 115. 167, unde qui primus Cassium historiae litterarum Latinarum restituit, notitiam habuit S. Teuffel (Gesch. der Röm. Litt. 3. A. Lpz. 1875 p. 1088 sq.) cum Cassio illo cuius apud Celsum mentio fit hunc nostrum male confundens (utpote „translatum“), eodem errore quo iam lapsum vidimus Simonem Januensem.

CASSIUS FELIX.

Codicum signis utor his:

- g* = *cod. S. Galli 105* membr. saec. XI, qui habet folia 21 (et scriptore Germano et correctore, cf. c. 38 wormo, spat etc.) compacta cum praecedente Sulpicii Severi codice s. IX. lacunae sunt septem, quarum septima alterius libri partis c. 43—82. inscriptio nulla neque subscriptio, nisi quod sub ultima linea folii ultimi quae adscripta fuerunt (nullius ut credo momenti) nunc erasa sunt.
- c* = *cod. Cantabrig. Gg. III. 32* chart. saec. XV (de quo vid. Catalogum codd. Cantabr. supra cit.), ubi f. 94^a „Explicit casius felix“. ad initium, ubi index capp. 81 (in textu 82), inscriptio nulla.
- p* = *cod. Paris. lat. 6114* sc. altera pars membr. s. XIII, quae cum alio quodam codice praeced. compacta est argumenti historici s. XI—XII (quo continetur „Breviarium Rufi Festi“, de quo v. ed. W. Foerster Vind. 1874, et „Liber de ordine temporum“ i. e. Annales Hildesheimenses quos a. 1641 ex hoc codice edidit Du Chesne t. III. p. 504—539. cf. Pertz Script. III p. 19 sq. et nunc Waitz in praef. novae ed. min. Hann. 1878) in hac altera parte medicinali f. 70—90 manu Italica litterisque minutis in binis columnis scripta habetur:

Cassii felicii artensis medicine loice
secte de greco in latinum liber trans-
latus. sub ardebre et asclepio consullibus.
Incipiunt capitula huius libri. I. II. III.

sequuntur quae infra leguntur capitula 80 (revera 82) cum ultimo (f. 85^a) c. 81 „De unguentis“, id est adnexo Antidotario ex variis libris consuto, quale habuit etiam codex Simonis. desinit f. 90^b „Expleto libro referamus gratias christo“. deinde sequuntur manu alia scripta variisque aliarum manuum additamentis interpolata Medica excerpta varia f. 90—100 (ubi in fine „Curia de golagmano promisit . . X. f. amadio usque ad festum sancti don . . | ad iussit gl'a filh^o bona gl'oe d' galegnano“. Galignano prope Anconam?).

Incipiunt capitula huius libri
(sec. codd. pc).

- | | |
|--|--|
| I Ad capitis dolorem (cephaleam cp). | XXXV Ad tumorem faucium. |
| II Ad tineas capitis. | XXXVI Ad ulcerationem faucium. |
| III Ad pediculos. | XXXVII Ad sinancicos. |
| IIII Ad capillorum defluxionem. | XXXVIII Ad tetanicos. |
| V Ad alopeciam. | XXXVIII Ad emoptoicos. |
| VI Ad cantabriem capitis. | XL Ad pthisicos. |
| VII Ad fontus i. papillas quae in vultu nascuntur. | XLI Ad astmaticos. |
| VIII Ad maculas albas. | XLII Ad stomachi passiones. |
| VIII Ad maculas nigras. | XLIII Ad splenicam passionem. |
| X Ad perniones. | XLIII Ad epaticam passionem. |
| XI Ad impetigines i. zernas. | XLV Ad renum dolorem. |
| XII Ad verrucas. | XLVI Ad vesicae passiones. |
| XIII Ad stigmata. | XLVII Ad colericam passionem et defluxionem. |
| XIII Ad labia hiantia. | XLVIII Ad disenteriam. |
| XV Ad scabiem. | XLVIII Ad ictericos. |
| XVI Ad pruriginem. | L Ad ventris et intestinorum reumatismum. |
| XVII Ad parotidas. | LI Ad colicam et iliacam. |
| XVIII Ad collectiones. | LII Ad podagram et arthriticam. |
| XVIII Ad pendigines. | LIII Ad isciadicam et psiadicam. |
| XX Ad fistulas. | LIII Ad paralisis. |
| XXI Ad empiemata. | LV Ad quartanam. |
| XXII Ad carbunculos. | LVI Ad emitritaeum. |
| XXIII Ad reuma. | LVII Ad tipum tertianum manifestum. |
| XXIII Ad ignem sacrum. | LVIII Ad tipum tertianum non manifestum. |
| XXV Ad araneas. | LVIII Ad tipum cotidianum. |
| XXVI Ad scrofas. | LX Ad efemeris. |
| XXVII Ad steatomata. | LXI Ad causon. |
| XXVIII Ad aurium dolorem. | LXII Ad freneticos. |
| XXVIII Ad oculorum passiones. | LXIII Ad litargicos. |
| XXX Ad fluxum sanguinis ex naribus. | LXIII Ad cardiacos. |
| XXXI Ad polipum et ozenas. | LXV Ad apoplexiam. |
| XXXII Ad dentium dolorem. | |
| XXXIII Ad tussim humidam. | |
| XXXIII Ad tussim aridam. | |

LXVI Ad pleureticos.	LXXVII Ad praefocationem matricis.
LXVII Ad canis rabidi morsum.	LXXVIII Ad procidentem ma- tricem.
LXVIII Ad falangionis morsum.	LXXVIII Ad metromaniam.
LXVIII Ad scorpionis ictum.	LXXX Ad aperiendam ma- tricem.
LXX Ad fugandos serpentes.	LXXXI Ad accelerandum par- tum.
LXXI Ad epilepsiam.	LXXXII Ad emorragiam ma- tricis.
LXXII Ad lumbricos.	
LXXIII Ad elephantiasim.	
LXXIII Ad ragadas.	
LXXV Ad idema.	
LXXVI Ad hydropicos.	

Ordo capitulorum XXXI codicis S. Galli hic est:

1 = cp 1 (<i>exc. fin.</i>)	16 = cp 36
2 = 40	17 = 37
3 = 39	18 = 38
4 = 18	19 = 41
5 = 2	20 = 42
6 = 3	21 = 19
7 = 4	22 = 20
8 = 5 (<i>exc. fin.</i>)	23 = 21
9 = 10 (<i>praecedit finis</i> c. 9)	24 = 22
10 = 11	25 = 23
11 = 12	26 = 24
12 = 13	27 = 25
13 = 34	28 = 26
14 = 33	29 = 27
15 = 35	30 = 28
	31 = 29

desunt igitur	I) c. 1 fin.	} quae ex recentibus (cp) solis supplenda fuerunt.
	II) 5 fin. — 9 (<i>exc. fin. c. 9</i>)	
	III) 14 — 17	
	IV) 28 fin. — 29 in.	
	V) 29 fin. — 32	
	VI) particula c. 42.	
	VII) 43 — 82.	

Cum diuturno tempore sedulus mecum volvendo, carissime fili, de medicina tractassem, omnipotentis dei nutu monito placuit mihi ut ex graecis logicae sectae auctoribus omnium causarum dogmata in breviliquio latino sermone conscriberem. quae cum perlegeris et usus fueris, ad curam omnium corporum humanorum cuncta experta reperies. unde admoneo, fili dulcissime, ne quid forte huic scripturae addendum vel minuendum existimes. et ideo a principio passionis capitis inchoantes scripsimus, quoniam summa civitas corporis a veteribus dicitur caput, et honorabile et necessarium sensus hominis domicilium.

2 *k̄mē p.* 3 *nutu gp: tuitu c.* monito: monitus *g*, amonitus *pc* (*Petr.*). 4 *dogma g*, domata (*i. e. dogmata ut habet Petr.*) *p* (*sed p^c domata vel dotnata = doctrinata*), documenta *c.* brevi loquio *g* (*breviloquium Petr. p. 190 R.*): brevi eloquio *pc* (*et Petr. codd. hs.*). 6 *o.* humanorum corporum *p* (*ad c. omnium corporis humani vel corporum humanorum Petr. hs.*). 7 *Un* (*Unde Petr.*) amoneo *p* (*un̄ amoneo c.*), Unum admoneo *g*. 8 *vel: aut c.* 9 *a: in c.* passionis *gp: — nes c.* 10 *haec ex Ps. Galeno (praef. in Euporista t. XIV p. 313 Lips.): . . . ἀπὸ κεφαλῆς ἀρξάμενοι· αὕτη γὰρ καθάπερ τις ἀκρόπολις ἐστὶ τοῦ σώματος καὶ τῶν τιμιωτάτων καὶ ἀναγκαιοτάτων ἀνθρώποις αἰσθήσεων οἰκητήριον (Plato Tim. p. 45—46). cf. Veget. mulomed. III (II), 1, 1 p. 89 Schn. Cael. Aurel. resp. med. II, 56 p. 219. ox. I, 56. chr. I, 60. ceterum in inferiore margine codicis Paris. ipsius scriptoris manu haec adnotantur: Alexander d. c. V. iter cap̄ summam civitatem corporis dici cap̄ honorabile domicilium sensus hominis esse.* 11 *sensuum c.*

I. Ad tardum sive inveteratum capitis dolorem quem Graeci cephalaeam appellant, et ad eius medietatis quem emicranion vocant, et ad vertiginosos quos ilingiontas appellant, et ad tenebrosos quos scotomaticos dicunt.

Universa haec in capite efficiuntur. et est cephalaea ex omni parte capitis inveterata passio, quas Graeci chronias diathesis vocant, vel totius membranae quae ossa capitis desuper circumvestit superposita ossibus subposita cuti, et appellatur a Graecis pericranios, aut ipsius membranae partis, quam consue-
 10 emicranion dicunt. si vero cum consensu radicum oculorum bulborum ipsorum fuerit dolor, manifestum in cerebro fieri ostenditur.

contingit frequentius ex perfrictione aut contrario
 15 adustione aut vinolentia aut percussu aut ventositate causatio nervositatis membranae pericranion supra dictae. solet etiam et austrinus aer iniurias capitis nutrire, cum

1 Ad om. p, qui nominativos posuit sic: Tardus . . inveteratus . . dolor . . et eius m. pars (pas) . . et vertiginosi . . et tenebrosi. in rubrica Ad cephalaeam pc, De cephalaea g. 3 medietatis partem (pars p) quam gpc (ubi medietatis = mediae partis, unde quod omisi partem). emicranion c, emicranion gp. cf. Cael. Aur. p. 269 (de emigraneo dolore Alex. I, 45). 4 ilicunntas g, <ili add. al. m.> | giuntas p, illignntas c. 5 dixerunt c. 6 cephalaea (ut supra) gpc. 7 quas: quam gpc. cronias diathesi p. 8 totius om. p. 9 circumvestit c et (circum inter lin. add.) g° (Sim.): vestit gp. superposita vestibus. ossibus subp. cuti (sic) c. superposita (iterum) cuti p. 10 appellatur: dicitur c. perigranion gc (pericranion p, ο περι- κρανιος ὑμῖν Gal.) 11 partis p: pars gc. quam (sc. passio- nem) gp: quod c. consue- consuetio nomine C. A. p. 269 (cf. de hemiscr. Gal. 12, 593). emigranion gp, emicranion c. 12 cum sensu c. aut (ā) bulborum p. ad rem cf. Gal. 12, 563. 13 manifestus p, —tus c. 14 Contingit autem (ā) fr. p. perfrictione (cum correctoris g° gl. interl. frigore) gc: perfrictione (vitio apud recentiores solemni) p. contraria c. 15 percussu gc: percussura p. ventositatis causatione. nervositatis gpc. 16 perigranion g (—cranion p, —ctanion c).

ere deducendus erit ex decoctione coloquintidis et
i centauria addito modico melle et oleo anetino. dan- 10
etiam ieiunis tribus diebus inter diem antidotum
eni quod picra appellatur. et si adiutoria localia,
topica appellant, oportuerit adhibere, turgentes ma-
s venarum media in fronte incides, aut certe si
me apparuerint, sanguisugis totam operies frontem 15
cucurbitam occipitio conglutinabis addita | scilicet scari- p. 168
ne. et si forte ex plena habitudine totius corporis
t impleri senseris, quod quidem ex frequenti tinnitu
um aut vertigine aut ante oculos subiecta tenebratione
is agnoscitur, Galeni cathartico dia tes aloes appellato 20
ores per ventrem erogabis, si tamen senilis aetas

1 dicta membra *gc*, dicta membrana *p*. aquoso et fri-
flegmate *pc*: aquosum et frigidum (flegma *inter lin. g*).
ocrates *gpc*. 3 aforismis *g*, aforismis *p* (*Hipp.* III, 720
). austrini *p*. auditui *c*: iuditui (*sic*) *g*, auditu*(i*
corr. rec.) p. 4 capitis (*sic*) *gpc*. 5 egrum *c*. 6
tomare *g*, flebothomari (—e *p*^o et *c*) *p*. si . . . fuerit
si non etate iuventutis (et sec. nat. etc.) *c*. 7 plenus *p*.
ston *gpc*. cf. *Gal.* 12, 505. et si venter *g*: fuerit in-
is (abst.) *p*. 9 ex *pc*: et *g*. colloqui(a *ante corr.*)
g (—d' *pc*). 11 ieiunis *in marg. suppl. g*^o. 12 gal-

minime impediērit. quod catharticum conficies sic: aloes
2 II, dacrydii 2 II, coloquintidis interioris carnis 2 I, ab-
sinthii pontici 2 I. cum coliculi suco colliges et catapotia
in modum ciceris informabis. ex quibus ad vesperam
5 cubaturis in ova sorbilia competenter dabis, aut certe illud
purgatorium quod conficitur ex dacrydio: obolos III cum
aloes duplo conteres et cum mulsa calida ieiunis sereno
aere dabis. transacto autem purgationis tempore si ex
encauseos fuerit dolor id est ex ustione aeris, maxime
10 tempore aestatis, oxyrodino id est aceto et rosaceo frigido
caput embrocabis. quod si ad praesens non fuerit rosa-
ceum, omfacinum oleum mittes. etiam et frontem cum
temporibus cataplasmabis pane ex posca frigida et modico
oleo rosaceo, admixto et folio plantaginis. si vero ex fri-
15 gore fuerit dolor, anetino oleo aut amygdalino aut rutaceo
calefacto uteris, sive illo quod recipit herpyllum peuce-
danum castoreum cyperum samsucum hederæ corymbos.

1 quod conficitur sicut p. conficies gc. aloen g(c):
aloes p. 2 diagridium gc (—dii p). colloqua (i g^opc) ntide
(—d' p, —de c) g. interiores (—is p) carnes (—is p) g:
carnes interiores c. absinthium ponticum gc. 3 cum cauli-
culi pc, c^aul<culi> g (in ras., cū add. g^o). colligis gpc.
catapotias g, —pocias c, —pudias p. 5 cubatoris dormitum
euntibus g (cubaturis om. pc, qui glossam solam ponunt). 6
ex diagridio obolos. III. cum aloen d. g, ex diagridii obolis
tribus cum aloes d. p, ex diagridiū obolis tribus cum aloen d. c.
8 si ex encauseos g et p^o (iū ex labore add. g^o), si exencauseas c:
siēsē cāseos ante corr. p. 9 ex ustione gc: ex adustione p.
10 oxyrodinon g (—nū p), exicodion c cf. Gal. 14, 315.
11 appresens p. 12 omfacinum (Gal., Or.): omfacium g,
—ceum c, —cum p. mittes p: mittis gc. etiam et
gc: om. p (frontem suppl. corr. in marg.). 13 temporibus
gpc. panī (panē g^o) ex posca g, pane ex posca c: panī pusca
(om. ex) p. 14 folio: folia gc, foliis p. cf. Gal. 14, 316.
15 anetinū . . . amygdalinū . . . rutaceūz calefactūz c. 16 illo
p: illud gc. erpillum gp: serpillum g^op^o (cf. Cael. Aur.
p. 285), & pilum c. 17 ciperum gpc (i. e. cypirum). cf.
Cels. V, 11 (ubi male etiam Daremberg sampsuchus Cyprius pro
sampsuchus, cypirus). cf. Gal. 12, 503. edere corimbos gp.

his in uno simul cum aceto et rosaceo oleo aut spano
concoctis caput embrocabis et post fomentationem tenui
lana cooperies et ligabis. post haec et frontem cataplas-
mabis amygdalis amaris tritis aut molli rosa sive arida
infusa et puleio admixto. aliquando ex pane et aceto 5
mentae foliis aut persici admixto. haec omnia erunt fre-
quenter mutanda. item aliud quod adhibendum probatur
dispari temporum dolori, nam Graeci eterocraniam vocant,
ut est: erucae semen et nucleum de persicis aequali modo
conteres, ex aceto oblinies. aliud. aloen et ammoniacum 10
et masticen cum aceto teres et illines.

ad emicranion vero aloes et crocomagmatis partes
binas, euforbii partem unam cum aceto teres, tempus ob-
linies. sed si nimius fuerit dolor, sacculo calida aqua
infuso et expresso, tunc torrido sale repleto, primo va- 15
porabis et post vaporationem sudorem deterges et sic
medicamentum supra dictum appones. etiam et per nares

1 his ... concoctis *p*: haec ... concocta (cū cocta *c*) *gc*.
spano *gcp* (*i. e.* hispano, ex graeco *σπάρων* cf. *Gal.* 12, 513.
g^o inter *lin.* add. purū = puro): ispano *p*^o. et fenugreco
add. *p*^o post spano. 2 embrocabis: unguas supra scr. *g*^o.
3 cooperies *p*: co[c]loperis *g*, cooperis *c*. et (fr.) *gc*: om. *p*.
5 pulegio amixta *c*. aliquantulo panis et aceto et mente
foliis aut persici. hec etc. *p* (suo quidem errore, nam dativus
est foliis). ex *g*: et *c*. 6 admixto hic om. *p* (solus). Haec
g (h *p*): Nec *c*. 8 temporum (cf. *Sim.*): tempore *gcp*. do-
loris *gc*, et dolore *p*. Nam *gc*: quod (*q*) *p*. etherocraniam
gc, etherocania (sic) *p*. 9 de persicis ego (*Plin.* 23, 132 item
Plin. iun., *Gargil.*): desuper (sic) *gpc*. sub ante equali add.
c. ex *c*: et *g*, ē (cum) *p*. 10 oblinies *gc*: oblines *p*.
aloe *p*. amoniacum *gp* (aloen rameniaceum *c*). 11 et *p*:
om. *gc*. masticen *c*: mastice *g*, mastiē (-cum) *p*. teres
c: teris *gp*. illinis *g* (ilinus *c*), ilinis *p*. 12 emigranion
gp, emicranon *c*. aloes et crocomagmatis *p*: aloen et cro-
comagma *gc*. 13 euforbi *g*, —bii *g*^o*p*, —biū *c*. ad rem cf.
Gal. 12, 595. partem: pars (*ps*) *c*. unam om. *c*, qui habet
c. aceto una teris. teres et t. *p*. tempus *c*: timpus *gp*.
oblinies *g*: —niens *c*, —nes *p*. 14 fuerit: super est *c*.
saculo *gc*. 15 tunc om. *p*. 17 per om. *p*.

apoflegmatizabis hoc modo. cyclaminis herbae radice
 p. 169 sucum et radice betae sucum | in unum commiscebis et
 tepidum sedenti resupinato capite naribus infundes. sed
 oportet primum calidam mulsam in ore inferre vel gar-
 5 garizare, ne descensu medicamenti ad inferiores partes
 per nares accepti plurimum fauces adurant. tunc inclinato
 capite per os aut nares humorem decurrere dimittes. si
 vero totum caput doluerit, cavendum a cataplasmate vel
 diversarum rerum vaporationibus, maxime in is qui ex
 10 plenitudine capitis laborant. observandum etiam et a
 comestione lactis vel ab eis quae similiter implere caput
 noscuntur et omni nervositati contraria probantur, ut sunt
 nuges palmulae lenticula oryza carduus olivae nigellae et
 his similia.

15 si vero dolor minime fuerit exclusus, cyclica curatione
 erit depellendus hoc modo. in primis capillaturam capitis
 detondes et rades, et si ieiunium minime ferre potuerint,
 a solito minus cibum accipiant, inhibito vino aqua calida
 potabis. tunc secunda vel tertia die anagargarismatis con-
 20 fectione dia ysopu appellata per palatum purgabis, quod

1 apoflegmatizabis: *supra scr. g^c id flegma iactare facias*
 (apof'eatizabis *p*, apoflemanzabis *c*). 2 bete (id plantago
 maior *supra scr. g^c) g(c)*: bace *p* et *supra* nete *p^c*. unum
gc: *om. p.* commiscebis *gcp*. 3 infundes *g*, —des *p*: —dis
c. 4 in ore inferre *g*, in hore ferre *p*, in ore fere *c* (*qui om.*
vel). 5 descendendi *c*. 6 adurat *p*, —ret *c*. 7 per hos
p. humores *c*. dimittis *gp*, permittas *c*. 8 cataplas-
 mate *g*: —tū *g^{pc}*. 9 is: his *gpc*. 10 et *om. pc*. a
 cōm(est)ione *g*, a comestione *c*, a commixtione *p*. 11 im-
 plere *om. c*. 12 noscunt et omnem (om?) nervositatē gtrariā
 (?) probant *c*. omni *om. g*. 13 lenticule *p*. oriza *c*:
 orizia *gp*. cardū *gpc*. 15 ciclica *gpc*. cf. *C. A. p. 275 sqq.*
 17 ferre minime *p*. 18 a *om. p*. cibum: cibo *g*, cibos
p (*c?*). inhibito *c*: inibito *g*, innibito *p*. aquam calidam
 potent *p*. 19 vel *gc*: aut *p*. die *om. p*. ana *om. p*.
 anagargarismate *c*. confectione (—oē) *p*: confectio *gc*. 20
 ysopū *g*, isopuz *c*, ysopi *p*. appellatū *gc*: —ti *p*. appellati
 — 3 X *om. p*. (sed *suppl. p^c in marg.*).

Graeci dia tes yperoas dicunt, hoc est ysopi 2 X, thymi 2 VI, origani et staphisagriae dīr quaternas, passi optimi eminam I, aceti dimidiam partem: herbas ante diem infundes et diligenter fervere facies, liquabis et dabis gargarizandum potione una tribus diebus, in sole ita ut orario velato capite dorsum ad solem ponat, et per singulos dies postquam purgaverit tepefacto oleo caput tangat, et refectionem accipiat simplicem, ut sunt ova sorbilia et holera malva beta atriplices cucurbita blitum ex iure pul- lino et parvo sale et aneto, et piscem tenerum ut est 10 turdus gobio aut asellus vel scorpius aut scarus, aut pullos gallinaceos aut columbinos vel cerebrum haedinum assum aut certe porcinum, et vinum aquatissimum potet. transactis vero tribus purgationis diebus propungentes capillos medicinali psilotro in balneo facies, id est 15 auripigmenti laminae ÷ IS, sandaracae S, pumicis tusi et in novo cacabo assati et cimoliae cretae torrefactae, ambarum specierum scripulos senos, calcis vivae ÷ VIII.

1 diathesy peroas *g*, diathes ypereas *p^c* (*idem adscr.* fī ēt dia tes yperoas), dia tes ypereos *c*. tymi *g*, tīmi *p*, thimi *c*. 2 staph(isagriae *g(p^c)*. dīr quaternas *g* (3 quaternas *c*): añ (ana) 3 IIII. *p*. 3 emina . . . dimidia pars *p*, emina et aceti dimedia pars *c*. 4 facies *p^c*: facis *g*. liquas *gp*, liqua *c*. 5 potionem unam (potione una *c*) in sole diebus tribus *p^c*. 6 deorsum *c*. 8—13 cf. *Cael. Aur. p. 276*. accipiant *p*, —piet *c*. 9 olera *p^c*. bleta *p*. a<ct>riplices in *ras. g*. cucurbitas *p*. blitū *p*: blattum *g*. cucurbita — piscem *om. c.* (*ubi atriplices teneros*). 10 aneto cocta *add. p*. 11 gabio *p*. assellus *gp*. scarū *g*. 12 vel pullos gallinaceus aut columbinus *p*, vel pullis galinaciis aut columbinus *c*. 13 assum *g*: assatum *p^c*. potent *p^c*. 14 purgationum *c*. 15 psylotro *g*, spilotro *c*. in balneo facis (*sic gpc* (*ubi deest quod facis, sc. expoliari vel tale quid. cf. Cael. chr. 1, 36*). i<ā> *g*: h. ē *p*, hec est *c* (*sc. iam describitur psilotri confectio*). 16 lamina ē IS *c*. quimolia et creta (alba terra *suprascr. g^c*) torrefacta *g*, quimolie et crete torrefacte *p* (*sed cimolia, —e g^cp^c*), quimolea et creatore facta *c*. 18 scripulos senos *g*: 3 VI *p*, ē senos *c*.

tundes supra dictas species et cernes, et primo calcem cum aqua competenti coques in novo cacabo testeo ut non durius sed liquidum videatur, et sic supra dictas species superasperges, et leviter coques et penna gallinacea probabis quae non fuerit oleo | polluta. tunc paululum tepescere sines et sic caput contra capillaturam lines cautius ne oculos contingat, et cum sufficienter cutem constringi senserint in vaporem mittes, et cum sudare coeperint, oculis clausis vel supra linteolo ligatis totum
 10 caput catafricabis et adiecta aqua calida lavabis, et postquam laveris, asperso cantabro manibus moderate fricabis et iterum lavabis. tunc oleo perungues et in solio descendere dimittes et post unum diem in sole totum caput ad scapulas per dies numero quinque dropace induces. cuius
 15 dropacis confectio talis est. cerae, picis siccae, resinae pituinae, nitri libras singulas, resinae frixae ÷ VI, pyretri, bituminis iudaici, sulphuris vivi, ellebori albi, adarces, stafisagriae, omnium specierum VI uncias binas, piperis et olei sicyonii uncias quaternas. peractis vero dropacis quin-
 20 que diebus in lavacro sympasmate uteris quod conficies

1 tundēs *p.* 3 du2 . . . liquid' *p.* 4 aspercis *p.* aspergis *c.* leniter *c.* coquis *c.* 6 t. sinis *gp.* tepefacies *c.* linis *gpc.* 7 contigat *ante corr. g.* cutem sufficienter stringi *s. c.* 8 vapore *c.* 9 ceperint *g:* ceperit *pc.* vel linteolo supra *p.* 10 catafricabis (!) *gc:* cataplasma (cata-pl'ab') *p.* lavaveris *p.* 11 cantabro: *g^c suprascr.* chlia. frigabis *p.* 12 perunges *p.* —gis *c.* in solio (solium): solio (*supra scr. g^c balneū sudoris*) *gcp (om. in).* 13 dimittis *gpc (dimittis descendere c).* post *c:* per *gp.* ad *g:* usque ad *pc.* 14 numero *gc: om. p.* tropacem *c.* inducis *gpc.* 15 dropacis *om. c.* est talis *c.* 16 pituine — resine *om. c.* abhinc nisi plane nos deficit *cod. g.* quae exempli causa adscripsi vitia codicum *cp, ut sunt innumerabilia neglexi.* 17 adarces *gpc (ursini testiculi supra scr. g^c).* 18 omnium — uncias *om. p.* qui habet agrie añ ÷ <VI add. *p^c*>. VI *c:* septem *g.* 19 sicionii: ex cucumeris agrestibus fit *suprascr. g^c.* 20 i lavacro *pc:* bilavacro (*sic*) *g.* sim-pasma *gc:* sinplasmate *p.* quod *p (c?):* quam *g.* conficies *gc,* —citur *p.*

sic: nitri libram I, salis torrefacti ÷ VI, feclae, bacarum lauri, cyperi, stafisagriae uncias singulas, samsuci et squinanthi scripulos VI tundes in uno et tenuissime cernes et uteris diebus tribus. post haec vomitu ex radicibus uteris, quod graeci dia rafanidon vocant, hoc est 5 radices purgatas et lotas libra una concisas et pridie in oxymelle infusas ex duabus mellis partibus et una aceti comedendas dabis. et cum mordicationem [stomachi vel ^{suppl. I} thoracis senserit, calidam aquam superbibendam dabis et immissis pennis ori vel faucibus vomitum provocabis et 10 vario cibo nutries ex diversis volatilibus vel quadrupedibus silvestribus, ut sunt capreae lepores perdices fassae et his similia. et etiam conditum ex melle vel passo dare permittes. post haec et sinapismo uteris hoc modo. sinapis libras II et S, caricas numero XV, panis ex aceto infusi 15 ÷ VIII, haec omnia singillatim trita et in uno commixta panno induces et totum corpus illines, si omne corpus curare voluerit, vel si ipsum caput solum curare voluerit, panno ut supra dixi induces et totum caput operies. et

1 fecla (*ante corr. feda, ut c*) *gp.* id feces vini vel aceti. Id est et feclis *suprascr. g^o.* baccas *gc* (baee *p.*). 2 cyperi *gc*: piperi *p.* uncias singulas *gc*: añ ÷ I *p.* 3 squinanti *g*: squinanti *p*, —tis *c.* Id *g* (scrup *g^o*): 3 *p*, *om. c.* ~~in~~ *munda* immo *g*, in vino *c* et *p^o.* 4 vero *add. p* (*post* *hec*). vomitu *p*: —to *g*, —tu3 *c.* 5 quod *g*: quē *c*, qñ *p.* dia- rafanidon *g* (—fanidon *cp.*). 6 libram unam *gc*, t. I. *p.* in oximelle: sic *gpc.* 8 et cum mordicatione. Sic *g*, ubi reliqua huius cap. *desunt, sequitur* Ad ptisicos II. cap. 10 ori *p^oc*: horis *ante corr. p.* faucis *c.* 11 varios cibos *c.* nutris *cp.* 12 capree *c*: capre *p.* fassae *c*: *om. p.* 13 similibus *cp.* vel *c*: aut *p.* 14 permittis *cp.* cf. *de sinapismo Archigenes apud Aetium III, 181.* sinapi libras duas 2 *c.* 15 carecas nūo XV *c*: caricarum XV *p.* 16 ÷ VIII *p*: ÷ VIII *c.* singulatim *c*, singula *p.* uno *p*: vinū *c.* 17 inducis *cp.* inlinis *p*, illius *c.* 18 volueris *p*, —runt *c.* vel ipsum (*sic*) *p*, aut sine alio vel ipsum *c* (*pro* aut si <al. vel> ipsum?) caput solum *c*: solum caput *p.* curare voluerit (*c*): *om. p.* 19 inducis et totum *p^mc*: tidt (*sic*) *p.* operis *p*, aperis *c.*

dimittes ut operetur usque ad ruborem cutis quem Graeci finigmon vocant. tunc in balneum mittes, et cum sudaverit, caput in solio ut mergat imperabis, et omnem cycli curationem terminabis.]

(p. 176)

II. Ad tineas capitis.

Tineas capitis Graeci achoras vocaverunt. emergunt frequenter in corio capitis ex viscoso quodam ac tenacissimo humore mellis simili, ut etiam et ulcera corticosa ostendat.

- 10 in curationibus autem ob nimietatem humoris oportet in principio purgatorium dare, ut sunt catapotia Galeni quae superius in passione capitis scripta sunt. sin vero fuerit parva hoc est modica ulceratio, sufficiat topica adiutoria adhibere quae nos localia dicimus, ut est psoricon
15 medicamentum ad scabiem totius corporis inferius scriptum: per dies quinque praetonso pressius capite in sole bis in die fricabis, et cum videris loca nimium humectari, ptygmate fovebis id est calida aqua in qua decocta sunt rosa,
p. 177 murta sicca, cupressus, | rubi virides turiones, siliquae
20 graecae aridi rami. et postquam fomentaveris, cataplasmate uteris, hoc est lenticulas et cortices de malo granato coques simul in aqua et teres separatim, tunc

1 dimittis *cp.* 2 finigmo *p.* finigmon *c.* in balneum mittis *c.* in balneo dimittis *p.* 3 *c.* ut in solio *m. c.* mergant *cp.* 7 *cf. Gal. cata top. XII, 464 (eupor. XIV, 323 = Oribas. eupor. IV, 12).* quodam *p.* quondam *gc.* 8 et *om. p.* 9 ostendant *pc.* 11 catapotie *g.* — putie *pc.* gallieni *g.* galieni *pc.* 12 scriptae *gpc.* 13 hoc est modica *gc.* *om. p.* sufficiant *gpc.* 14 sporicon *ante corr. p.* 16 *V p.* VI *c.* praetonso *gp.* precioso *c.* 17 frigabis *p.* tigmate *gpc.* 19 murta *g.* mirta *pc.* rubi *item* siliquae — uteris *om. c.* rubi viridis (*sic et cp.*) in *ras. g.* turiones (*id est cimae g.*) siliquae (*id est prunae silvestres g.*) silice *p.* 20 aridos ramos *g* (— *i pc.*) 21 Lenticula *gpc.* de ipsa arbore de malo granato (*id est de ipso arbore supra g. qui delet idem in textu*) *g* (de mala granata *ante corr. g.*) mali granati *pc.*

commiscebis ex aequali modo et addito melle et aceto lin-
teolo inductum appones. et cum videris loca bene fuisse
desiccata, cerotario uteris quod conficies sic. sulphur vivum,
bacas lauri, herbam perdicion id est parietariam, omnia
singillatim teres ita ut sulphuris plurimum mittas. tunc
ceram cum oleo myrtino sufficienti resolves et cum in-
frigidaverit rades et supra dictas species admiscebis et in-
ductum appones. etiam et in lavacro caput ex sapone
fricabis in quo prius fuerit sulphur admixtum. et si forte
canosi capilli fuerint nati, frequenter psilotro emendabis
caput.

III. Ad pediculos.

In cachecticis corporibus id est mala habitudine affectis
pediculosa passio generatur quam Graeci pthiriasin vocant.
curationis autem tempore tali medicamento uteris,
hoc est staphisagriae partes duas, sandaracae et nitri partes
singulas cum aceto et oleo diligenter teres et caput per-
ungues, sed oportet antea aqua calida salsa lavare et
detergere et sic unguere. |

III. Ad capillorum defluxionem.

p. 178

Defluxio capillorum contingit ex debilitate corporis

1 commiscebis *gc*, miscebis *p*. ex . . . (modo) et *om. p*.
2 fuisse *gc*: *om. p*. 3 cerotarium *g* (—rio *pc*). conficies *g*
(—ceis *p*), —citur *c*. 4 baccas *gc* (bacas *p*). 4 *περδίκιον*
adhibet Soranus (Gal. XII, 494). id est paritaria (sic) *g*:
om. pc. omnia *om. p*. 5 singillatim *g*: singulatim
(sigl'atī) *pc*. 7 admiscebis *gpc*. 8 etiam et *gc*: et *p*. 9
frigabis *p*. 10 frequenti *pc*. 11 caput *g*: *om. pc*. 13
cachecticis *g*: cateticis *p*, cactecticis *c*. 14 pediculosa *g*.
pthiasin *g* (ri supra *g*°), pthiriasī *p*, pthinasī *c*. 15 curatio est
Archigenis ap. Gal. XII, 463 = XIV, 323. 16 sandaraca
gc (—ce *p*). nitrum *g* (nitri *pc*). 17 teris *gpc* (sed
perungues *g*, —ges *pc*). 18 seoportet ante corr. *g*. salsa
caput lavare *c*. 19 unguere *g*: —gere *pc*. 20 Ad fluxum
capillorum *p*. 21 debilitatione *c*.

aut macronosia laborantibus id est longa aegritudine, aut laborioso in feminis partu.

ob diligentiam vero curationis ladanum cum vino nigello conteres donec mellis sumat crassitudinem et illines. adiantou herbae, rosmarini, myrtae nigellae viridis, omnium trium manipulos singulos, aluminis lipari 2 III, olei spani et aquae et vini nigelli, omnium trium eminas singulas, coques ut ad oleum redeant, ita ut remaneat modicum humoris ne oleum ardeat. tunc liquabis et caput perungues.

V. Ad alopiciam.

Omnibus capillis in locis veluti rotundo schemate desertio efficitur capillorum. sed nomen alopiciae accepit, si quidem postquam fuerint curati tenues canosos et veluti flavos capillos ostendant, sicut animalis vulpeculae quam Graeci alopeca vocant.

curatio autem eiusdem passionis talis est. minutas vel densas scarificationis laceraturas dabis quas Graeci amychas vocant, et super acriorem cepam quassatam fricabis,

1 macronosiam *g*, —nosia *c*, —noxia *p*. i. longam egritudinem *g*. 4 conteris *gc*, teris *p*. 5 illinis *gp* (illius *c*). adianton *g*, —tū *p*, addiaton *c* (id est barba iovis. id est &azon quę vulgo semperviva dicitur *supra g*^o). myrtae *g*: mira *c*, et mirte *p*. 6 omnium trium *gc*: om. *p* (item *v*. 7). 2. (libras) *g*: 3 *p*, 3 *c* (*λίτρας γ* Gal. XII, 431. XIV, 322 in alio ad idem med.). lipari (id est rotundi *supra g*^o). 7 yspani *g*, spani *pc*. 8 coques *gc*: coquas *p*. redeant *g*: reddeat (*sic*) *p*, redat *c*. ita — ardeat om. *c*. 9 liquas *gcp*. 10 perungues *g*, —ges *pc*. 11 alopiciam *gp*, allopiciam *c*. 12 scemate *gp* (stomate *c*). 13 alopicia *gp* (alopicia — flavos om. *c*). accipit *p*. 14 fuerit curata *p*. tenuos (*sic*) *g*. canosos: *sic gp*. 15 sicut animalis vulpeculae (vulpicula *c*) *gc*: sicut vulpecula *p*. 16 alopecan *g* (—ca *p*), vulpiciam (*sic*) *c*. 17 Curatio — est *gc* (ita est *c*): Curatio eius talis est *p*. minutas vel *gc*: om. *p*. 18 scarificationes *gp* (scarificationes *c*). laceratis (*sic*, —tas *c*) dabis *g*: in locis illis (!) facere iubeo *p* („laceraturas“ *servat Petr. c. 3*). amichas (*sic*) *gpc*. 19 frigabis *p*.

aut nasturcii semen cum sinape et aceto teres et illines,
aut catti stercoris partes duas sinapis partem unam ^{finitur}
cum aceto teres et illines. | [aliud. avellanas combustas ^{p. 178.}
conteres cum axungia aut adipe ursino et oleo de lu- ^{suppl. II.}
cerna et illines, ante vero ipsam alopiciam nitro trito cum 5
panno fricabis et illines. aliud. adipem ursinum euforbio
mixtum cum oleo de lucerna illines. aliud. stercus muris
cum aceto tritum et illinitum capillos educit.

VI. Ad cantabriem capitis.

Cantabriem Graeci pityriasin vocant. emergit fre- 10
quenter ex humore acri vel intemperantia corporis quam
Graeci acrasian vocant. nascitur quidem pruritus in super-
ficie cutis capillosis in locis, ut etiam tenuissimas squa-
millas albi coloris emittant cantabro similes, unde nomen
pityriasin accepit. 15

in curationibus vero lac ovillum seu bubulum vel
caprinum cum melle potui dabis pro comparatione pruri-
tus. etenim acredinem humoris adducat vel obtundit et
non curiose sed simplici inductione ventrem depurgat.
nec non etiam flebotomia ex brachio erit adhibenda, 20
maxime si aetate iuvenes fuerint patientes et secundum
naturam plurimo sanguine abundaverint, quos Graeci

1 synape g, sinape p, —pi c. et (ex c, in p) aceto g.
illinis gpc. 2 catti (gati c) stercus gc, siccati. s. coris
(supra deleta gatti ster corr.) p. synapis g, sinapis p, —pi
c. 3 illinis gc, —nies p. 5 illinis pc (item v. 6. 7).
et p: aut c. vero om. c. ipsa alopicia p (—am c). 6
panno p: pane c (ἐνυτρώσας καὶ ὀθονίῳ ἐκμάξας Gal. XII,
406). frigabis p. euforbie p, cū forbio c. 7 lucernis c.
hoc frequens rem. v. Gal. XII, 240. 329. 418. Marc. p. 45.
9 illinitum (sic) pc. 10 petiriasin p, ptinasin c. 11 acro c.
12 acrasia p, —sia c. quidem c (Petr.): quidam p. 13
squamas c (Petr.). 15 pruriasi p, pitinasin c. 16 ovillum
c: ovinum p (Petr.). bubulum c: bubulinum p (Petr.). 17
comparatione c (Petr.): acredine p. fort. comp(1)acatione.
18 aducat pc (adducat ips. corr. c). 19 nō c: ū (pro n) p.
22 plurimum sanguinis c.

polyemos vocant. aliud. betam cantabrum nitrum faenum
 graecum in uno simul decoques, ex ipsa decoctione caput
 lavabis. etiam et sympasmate tali uti oportet. murra aloë
 afronitrum sulphur vivum elleborum album ptisana sicca
 5 pari pondere contusa atque cribellata in balneo aspergenda.

VII. Ad papillas vultus.

Tempore pubertatis et mediae aetatis ionthi saepius
 in vultu nascuntur parvulas extantias ostendentes, per
 quas cum cortex unguibus fuerit abstractus, humor se-
 10 quitur virosus vel muculentus. aliquibus vero longo tem-
 pore fundati solidantur et occallati indecentem faciunt
 vultum.

curationis vero tempore accipies dragantum aqua in-
 fusum et cum molybdaena trita commiscebis et simul
 15 teres donec mellis sumat crassitudinem, et ad vesperam
 illines vultum et dimittes tota nocte. tunc lucente die
 cantabro lacte consperso faciem fricabis et tepida aqua
 lavabis, etiam et sympasmate blando in balneo uteris. sed
 oportet primo unguibus leviter cortices abstrahere et hu-

1 polimos *p.*, poliēms *c.* 2 in uno *p.*: *om. c.* deco-
 ques *p.* decoctione *p.* 3 et *om. c.* simplasma tale (—li
c) oportet *pc* (uti *addidi ex Petr.*). mira *c* (*Petr.*): mirte *p.*
 aloen *c*, aloes *p.* 4 afronitri. sulphuris vivi. ellebori albi.
 ptisane sicce *p* (*nomin. ubique c*). 5 pari pondere *c* (*Petr.*):
 paria pondera *p.* concussa *c.* atque *c* (*Petr.*): et *p.*
 aspergenda *p.*, —do *c.* 6 tit. (*ex c*) abest *p* (Ad hiantes
Petroc. c. 23), Ad chiantus (hianthus *c*) i. papillas (papelas *c*)
 que in vultu nascuntur *ind. p* (*et c*). 7 medie *c* (*Petr.*):
 medio *p.* hionti *p.*, bruti *c* (hiantes *Petr.*). 8 extangias *p.*
 9 abstractus *p.*: —ta *c.* 10 virtuosus *pc.* 11 occallati *p.*
 occalanti *c.* indecenter *c.* 13 tempore *om. c.* accipies
c (—pies *Petr.*), *om. p.* dragantum (*sic*) *pc* (tragantum
Petr.). 14 molibdena *c.*, molibdena *p.* trita *c* (*Petr.*):
 tritum *p.* commiscebis (*Petr.*): —ces *pc.* 15 sumat *c.*
 sentiat vel sumat *p.* 16 illinis *pc.* dimitte *c.* totam
 noctem *p.* 17 consparso *c* (*Petr.*): compresso *p.* frigabis *p.*
 18 et *om. p.* 19 et humorem (*Petr.*): et tumorem *pc.*

morem exprimere, et sic medicamentum supra dictum linire.

VIII. Ad maculas albas.

Maculas albas Graeci alphas leucas vocaverunt. nascuntur aliquando in vultu aliquando in toto corpore ex flegmatico nimis acri vel salso humore.

quas quidem sic probabis si ex parte curari poterunt aut certe omnino incurabiles ostenduntur. superficiem cutis, id est maculam candidam acu vel acuto flebotomo modicum pungen ut non nimis penetres, et si lacteus humor fuerit exclusus, omnino incurabilis demonstratur. si vero pro humore sanguis exierit, ex parte curari ostenditur. propterea oportet flegmagogum purgatorium dare quod dicitur elaterium. conficitur sic. accipies cucumeres amaros agrestes maturos et secabis et in vas aeneum mittes. alia die manu exprimes et ipsum sucum sub ferventi sole siccabis, et postquam siccatus fuerit, addes iterum ex ipso suco modicum ut bene crassescat. et fac trociscos drachmarum singularum, ex quibus dabis unum cum mulsa ieiuno. hoc purgabis humorem frigidum id est flegmaticum, maxime a capite vel a fundo cerebri, unde omnis nervositas infunditur. et post purgationem

1 medicamento . . . dicto *p* (*Petr.*, ubi illinire). 4 alphas *c* (alphas *Petr.*): alfos *p*. 6 vel nimis *Petr.* acro *c*. 7 poterint *p*, potuerunt *c*. 8 aut certe: sic *pc* (*l.* aut contra?). ostendit superficies cutis *pc* (*Petr.*). 9 id est: idem *c*, om. *p*. macula candida *c* (*cf. Petr.*), maculas albas vel candidas *p*. 10 modici *c*: —co *p*. et non minus *p*. *c*. et *p*: sed *c*. 11 incurabiles demonstrantur *p*. 12 ostenduntur *p*. 14 elacterium *p*, darium (*sic*) *c* (*ἐλατήριον sec. Gal. XII, 122 est sucus fructus cucumeris agrestis*). 15 et secabis (*cf. Plin. 20, 3*): et stipticos *p*, et siccatos *c* (*excitalla Petr.*). 16 ex-primis *p*. sub *c*: om. *p* (ad solem *Petr.*). 17 siccati *c*, siccati *p*. 19 dragmarum (*ut semper et g*) *cp*. unum (*Petr.*): .i. *pc*. 20 cum om. *c*. ieiuno (*Petr.*): —nus *c*, —nis *p*. h purgabit *p*: depurgatum (*hūōre*) *c*. frigidum *c* (*Petr.*): om. *p*. id est: .i. *p*, idem (*sic*) *c* (*item p. 16, 2*).

factam biduo vel triduo lacte caprino nutries, et post haec adhibebis adiutoria metasyncritica id est quae renovare valeant temperiem corporis naturalem, ut sunt desiccatoria sympasmata vel cetera quae de cyclo superius in passione capitis scripsimus.

VIII. Ad maculas nigras.

Maculas nigras Graeci alphas melaenas vocant. nascuntur aliquando in vultu aliquando in brachiis aliquando in toto corpore, aliquando fuscae aliquando nigrae aliquando asperae veluti zernosae, quas Graeci lichenodes appellant. ex melancholico humore efficiuntur id est ex nigri fellis redundantia.

propterea in principio curationis cathartico melancholicum non solum semel sed frequenter purgabis. quod catharticum conficies sic. epithimum optimum id est non vetustissimum et ex locis maritimis sumptum quantitate semunciae I decoques in aquae calices latiores numero III usque ad tertiam partem, tunc diligenter liquabis et in ipsa decoctione miscebis oxymellis coclearia III et ieiunis dabis. et post dies purgationis alio medicamento uteris] ad maculas nigras et zernosas et ad maculas nigras in vultu feminis ex abortione praecedenti factas vel adustione

1 nutris *pc.* 2 adhibebis *c* (*Petr.*): adhibita *p.* metas incritica *p*: metasin cretica *c.* 4 simplasmata *pc.* deciclo *p*, decito (*sic*) *c.* 7 alfas melanas *c*, alfos melenas *p* (alphos meletos *Petr.* *c.* 25). 10 zenose *c.* licedoes *p*, licedone *c.* 11 efficiuntur (*Petr.*): efficitur *c*, *om.* *p.* 13 catarticum melancolicum *p*, catartico melancolico *c.* 15 conficis *c* (*Petr.*), conficitur *p.* Epithimū . . . semuncie . I. *c.* Epithi novi non veteris ex l. m. collecti ÷ S. *p* (*brevius Petr.*). 17 decoquas *p.* aqua calices. III. *p*, aqua calices laciore (sic) nūo. III. *c.* 18 partem *c*: *om.* *p.* liquabis (*Petr.*): ligabis *pc.* 19 decatione (*ut supra*) *p.* miscebis *p*: *om.* *c* (addes *Petr.*). oximellis *c*, examl' *p.* 21 cernosas *g.* et ad m. nigras *om.* *p* (*non gc*). in vultu. in feminis *g*, (nigras) feminarum *c*, in vultu viri seu femine *p* (in vultu femine *Petr.*). 22 facta *g.*

solis quas Graeci ephelidas vocant. etiam et cicatrices
nigras ubicumque evenerint haec confectio ad unitatem
coloris cogit, et conficitur sic. cumini drachmam I, guttae
ammoniaci et amygdalarum amararum decoriatarum drach-
mas senas, ellebori nigri drachmam I, nitri drachmas II, 5
cucumeris agrestis suci ex radicibus expressi ÷ II, mellis
÷ VIII conficies et maculas supra dictas fricabis. etiam
et in lavacro sympasmate uteris quod conficies sic. sulphur
vivum et nitrum et herbae draconteae radices et ibisci
radices siccas, omnium quattuor ÷ singulas, myrtae ni- 10
gellae siccae ÷ II, ellebori nigri et chamaeleontis nigri
radicis id est sefra [nigra], ambarum specierum ÷ qua-
ternas. quae tundenda sunt tunduntur et quae terenda
sunt teruntur, et simul commixta iterum in uno usque
ad ultimam tenuitatem teruntur. | 15

1 ephelidas *g*: effilidas *p*, ofelidas *c*. 2 evenerint: ve-
nerit *g*, —rint *p*, fuerint *c*. haec confectio *g*: *om. pc*. 3
cumini *g*: cimini *pc*. guttae *p*: gutta *g* (guta *c*). 4 am-
moniaci *gp*: —ce *c*. et *gc*: *om. p*. amigdulas (*sic*) amaras
decoriatas *g*, amygdalarum amararum decoctarum *c*, amygdalarum
ama. et decoriatarum *p*. dragmas senas *gc*: 3. VI. *p*. 5
Elleborum nigrum. nitrum dragmam. I. *g*. ellebori nigri 3.
I. nitri (miri *c*) 3. II. *cp* (*Petr.*). 6 expressi *gc*: et prassii *p*.
7 conficies *gcp*, terendo confice *Petr.* supra dictas *gc*: *om. p*.
8 sy(i)mpasma *gc*: sinapismate *p*. quod *pc*: quam *g*. con-
ficies *g*, —citur *pc*. sulphur . . . nitrum *g*: sulphuris vivi et
nitri *c* (sulphuris vivi tatri rad'. dragondee. rad' hibisci sicce.
÷ I *sic p*). 9 et i[n]visci *g* (& misci *c*). 10 omnium
quattuor *g*: *om. p*. omnium — siccae *om. c*. myte (*sic*) *g*
(mirte *p*). 11 et *g*: *om. pc*. cameleontae *g* (—te *pc*) et
supra *gc*: „id hederā nigra (*glossam sequitur Petr.*) idem est
et cameleā atque scissa“. nigrae *g*, nigre *cp*. 12 radices
g (rad' *p*), *om. c*. id. se fra nigra *g*, i. sefra nigra *c*, i. sefra
nigre *p* (*in textu omnes*). añ 3. IIII (*om. specierum*) *p*.
13 quae — teruntur *gc*: quae sunt terenda terantur et quae tun-
denda tundantur *p*. 14 sunt hic *om. c* (*ut p*). iterum *om. p*.
in uno *p*: in vino *g* (Nunc *c*, ubi male distinguitur). 15
terantur *p*.

X. Ad perniones.

Latini perniones a perniciē patientium locorum partium nomen accepisse dixerunt. Graeci vero chimetla dicunt ab hiemis tempore quod chimona vocant, siquidem ipso in tempore supra dicta passio nascatur, cum tenera corpora glaciali frigore fuerint adusta. sequitur patientes circa articulorum loca pruritus quidam et inflatio.

oportet in ipso initio ex decoctione rutae et murtae admixto modico aceto et sale loca quae patiuntur fovere et diligenter detergere. tunc alumen liparum cum oleo conteres usque ad crassitudinem mellis, oblinies. aliud. adipem vitulinam liquefacies et admiscebis turis mannae, et similiter ut supra oblinies. aliud. coques in oleo scillam contritam et perungues. aliud medicamentum ulceratis pernionibus conveniens. aluminis lipari et murrae et calcis vivae et turis masculi, omnium quattuor ÷ ternas, picis durae 2 IIII, cerae ÷ II, olei ÷ III. quae sunt sicca cum vino modico teruntur, et sic crassum cerotarium miscetur. facit et ad universa ulcera vel vulnera.

1 Ad perniones morbos *p* (i. ad tumores digitorum hyemali tempore contingentes *add. p*⁶). 2 Latine *ante corr. g.* pernetie *g* (—nitie *p*, —nicie *c*). locorum *om. p.* 3 cy(i)-methla *gp*, cimecla *c.* 4 dixerunt *c.* 5 in *om. p.* nascatur *g*: nascitur *pc* (*Petr.*). 7 loca *g* (*Petr.*): locos *pc*. 8 ex *pc*: et *g.* murtae *g*: (mirte *p*?) mire *c* (mirre *Petr.*). 11 et (*ante obl.*) *add. p* (*Petr.*). 12 vitulinam *g(p)*: —num *c.* liquefacies et admisces *gcp.* turis mane *c*: turis manna *g*, thus *Ma*² (*sic*) *p.* 13 oblinies *gc*: —nes *p.* Al'. in oleo coquas *p.* 14 scillam contritam *ego* (*Diosc., Prisc. p. 27^a*): cilla citria *g*, stilla citrina *c*, squillā citrinā *p.* medicamentum *gp*: *om. c* (*ubi* Aliud quod u. *p.* convenit). ulceratis *pc*: *om. g.* 15 lipari *g.* et *om. p.* murrae *g*, mire *p*, mire *c.* 16 et *it. om. p.* thus masculi *p.* omnium quattuor *gc*: *om. p.* ÷ ternas *g*: *Dr. tnas c*, 3 III *p.* 17 2 a: 3 *p*, 3 *c.* olei ÷ III *ante* picis . . . in *p.* 18 ternun-: —rantur *p.* 19 miscetur *g*: misceatur *p*, misce *c.* *p.* ad diversa u. *p.*

XI. Ad impetigines id est zernas.

Impetigines quas Graeci lichenas vocant, Latini vulgo zernas appellant. | nascuntur ex melancholico humore, ro- p. 191.
tundo schemate, in superficie cutis, cum ingenti pruritu
et asperitate, et curantur similiter ut maculae nigrae ⁵
superius scriptae.

aliud. trociscus appellatus a Graecis lichenicos id
est medens impetigines. recipit aluminis scissi et rotundi,
chalciteos, melanteriae qua sutores utuntur, chalcanthi,
lepidos aeraminis, omnium specierum sex drachmas qua-
ternas, sulphuris vivi 2 II, alcyonii 2 XIII, cantharidum
2 I, aeruginis 2 VIII, foliorum caprifici 2 VI, cumini 2 III,
aceti quod sufficiat. conficies et in usu aceto mulso salito
resolves et inlines. ante vero panno laneo aspero zernam
fricabis et sic medicamentum illines. 15

XII. Ad verrucas.

Secundum Graecos tres differentias habere verrucae
ostenduntur. nam dicuntur acrochordones, quae sunt

1 i. zernas gc: om. p (de vulgari vocabulo cf. Isid. IV,
8, 6). 2 quas: quod g, om. pc. 7 acrecis g. lichenicos
gc: — cis p. id est (i.) addidi: om. gcp. medens gc: Mederis p.
8 Recipit g: R̄ pc. R̄ autem (āt) a. c. 9 calciten
(ante ips. corr. caltiten g) gcp. melantera g, —teria c, me-
lāthenē p. qua s. u. g: quaternas & inter sutores utuntur c,
quas sunt et revertuntur (comp. scr.) p. calcanti gp: cilanti c.
10 lepida gc: lapide p. supra verba lep. aer. p^c scripsit i.
vitriolum. aeraminis gp, et āis c. omnium — quaternas gc
(nisi quod 3 VI c): añ (i. e. ana) 3 VI p. dracmas g. 11
sulphur vivum g (etc., ubi genitivos scripsit p et partim c).
Alquionium gc, alquionii p. Cantaridas g, candaridarum p
(cantandarum c). 12 erugini g, —nis pc. folia gc, —iorum p.
cumini g, cimini pc. 13 acoeti (sic) g, acoti p, aceti c.
sufficit gcp. conficis gc, et conficis p. usū p. acoeto g.
& mulso c. sallito g. 14 resolvis et inlinis gcp. asperso
et z. p. zernam: enas c. 15 medicamentum gc: —to p.
illinis gp, fricabis iterum c. 19 acrocordonas g, —dines p,
—tines c.

fundatae et immobiles vel callosae sine dolore. aliae vero mobiles et radice debiles et modicum circa radicem haerentes. in infantibus saepius nascuntur et aliquando sua sponte cadunt. quae cum digito fuerint impressae, dolorem
5 faciunt similem morsibus formicarum, unde graecum nomen myrmeciae acceperunt. sunt aliae asperae et crispulae in similitudinem summitatis thymi, unde a Graecis thymoe appellantur.

sed omnibus supra dictis una est curatio. hoc est
10 tithymali lacrima, quae est in similitudinem lactis, frequenter ipsas verrucas illines, et putrefactae cadunt radicibus. aliud. ad myrmecias infantum coriandri viridis folia cum sale trita apponuntur.

XIII. Ad stigmata.

15 Stigmata dicuntur characteres nominati, quos militum manus vel feminarum malarum vultus ostendit. tolluntur vero periculose medicamento discoriatorio quod Graeci ecdorion vocant. est enim causticae et septicæ virtutis id est incensoriae et putrificatoriae. cuius

1 vel *gc*: et *p*. 2 et radice mobiles et radice debiles (sic ex duplici lect.) *c*, et radicis debilis *p*. modicum *gc*: —ce *p*. *c*. radicem. in infantibus etc. *gp*, *c*. radicem serenes (sic). In infantibus *c* (unde serpentes scripserim, sed parum radice adherentes Simon s. acrocordines). 4 cum *gc*: om. *p*. 5 greco nomine myrmetias nomen a. *g*, nomine greco mirmecias n. a. *c*, n̄ *gco* mirmice n̄ acceperunt *p* (myrmecias graece gen. sg.?) 6 S. et alie *p*. cr pulae (litt. post r incerta a? e?) *g*, crepule *c*, cripule (epule) *p* (crispule Simon). 7 tymi *g*, thymi *pc*. tymos *g*, thimos *c*, thomos *p*. 10 titimali *gc*, —mali *p*. lacrimo *gpc*. q̄ est *c*: hoc est *g*, om. *p* (ubi t. lacrimo. i. lacte frequenter). illinis *gpc*. *p*. radicitus cadunt *pc*. 12 mirmecias *gpc*. infantum *gp*: —tium *c*. 14 tit. De caracteribus *p*. 17 descoriatorio *gc*, de(d)coriatorio *p*. 18 ecdorion *g*, exdorion *c*, ecdoria ante corr. (qui hec doria et id. in marg. eccidoria!) *p*. Est enim: Etenim *g*. et septicæ *g* (et stiptice *c*): om. *p*. 19 incensorio et putrificatorio (sic) *g* (—e *pc*). cuius — est (medicamenti om. *c*) *gc*: quod conficitur sic *p*.

medicamenti confectio talis est. cantharidum, sulphuris vivi, oleae bacarum purgatarum, chalcanti 2 quaternas, | *p. 182.*
picias liquidae 2 II conficies et uteris. facit et ad rizonychias id est radices unguium excludendas.

[XIII. Ad labia hiantia.

suppl.
III.

Labia hiantia sive crispata Graeci chile caterrogata vocant. et curantur hoc modo. ovi interiorem membranam appones, aut adipis anserini cerae resinae terebintinae omnium trium paria pondera in uno lento vapore commiscebis et in membrana de canna illinitum appones. 10 membrana de canna dicitur illud rotundum quod intra cannam invenitur. aliud ad ragadia et ad ulcera in labiis. gallam et masticen aequali modo conteres et cum isypo et melle attico aut adipe anserino uteris.

XV. Ad scabiem.

15

Scabies a veteribus duae esse probantur. una est squamea fusci coloris, quam scabiem squamosam dicimus, siquidem corticosas squamulas in cute ostendunt quas

cantaridas *g*, —darum *pc*. sulphur vivum *g* (*gen. pc*).
2 oleae: alei *gc*, olei *p*. baccas (baccas *sic p*) purgatas *gcp*.
calcanti (calanti *c*) *gpc* (i. vitriola *sic supra g*, *cf. p ad c. XI*).
quaternas *gc*: IIII *p*. 3 conficies *gcp*. rizonichia *gp* (carizorichia *c*). 4 exducendas *p*. 5 *tit*. Albia macia *p*. 6
Labia macia *p* (*et in marg. corr. i. iantia*). crispata *p*:
crepl'a *c*. catrogata *p*, caterogata *c* (*Gal. XIV, 424. Orib. eup. 4, 57*). 7 Cui interiorē m. *p*, Omni teris m. *c* (*sic*).
scripsi ovi ex Plin. 29, 46. 8 adipem anserinum cere etc. *pc*.
9 omnium trium *c*: om. *p*. uno *p*, uio (vino) *c*.
lento om. *c*. 10 commisces *c(p)*. et membrana de cā | na
dicitur (*sic med. om., quae tamen suppl. corr. in marg.*) *p*.
12 ragada et ulcera *p*. 13 masticē ex equali modo conteres *c*: masticē equo canteres (*sic*) *p*. cum suco isopi attici
aut adipe *c*, cum isopo atico (*ubi atico ex corr.*) aut adipe *p*.
isypo *id est* oesypo *scripsi cum Orib. (cf. Plin. 30, 27)*. 15
tit. Ad *c*: Contra *p*. 16 due *p*, II *c*. 17 scamea *p*, scāmea *c*.
scamosam *cp*. 18 scamulas *c*. ostendit *p*
(—dūt *c*).

Graeci lepidas vocant. unde nomen a Graecis lepra accepit. creatur ex melancholico humore, et est curationis difficilis.

alia vero nascitur simplex veniens ex humore acri
5 vel salso. et curatur medicamento scabioso quod psoricon dicitur, et conficitur sic. sulphuris vivi ÷ I et S, picis siccae ÷ II, cerae ÷ III, squillae medii ÷ II et olei libram I: minutatim incidēs squillam et friges in oleo et liquabis oleum et supermittes, et resolves quae solvenda
10 sunt, et postquam fuerint resoluta ab igne tolles et sulphur ad ultimam tenuitatem tritum superasperges, et movebis donec coaguletur.

aliud psoricon emplastrum faciens ad scabiem et lepram. salicis corticis combusti et olei rosacei ÷ binas,
15 cerae et aeruginis rasae ÷ singulas: solves ceram cum oleo rosaceo, cerotarium siccis praetritis admiscebis et induces in linteolum et appones, et post tertium diem resolves et medicamentum auferes et appones polentam ex aceto coctam et diligenter tritam, et ipsa uteris diebus
20 tribus, et iterum post polentam supradictum inductum appones. et haec facies usque ad perfectam sanitatem.

2 et est curationis difficilis c: et cum (c) curatione difficili p. 4 acro c. 5 sporicon pc. cet. cf. Cels. V, 28, 16. 6 ÷ : $\frac{7}{7}$ c, ÷ p. picis — (7) et om. p. 9 liquas pc. oleum c: om. p. resolves c: solvis p. 10 resoluta p: soluta c. 11 aspergis p. 12 moves pc. coaguletur c: coagolentur p. 13 sporicon pc (sed p^o psoricon). emplastrum p. cf. empl. ad lepram apud Ps. Plin. f. 79^b. 14 combusti: — te cp. et (bis) om. p. ro. p, rosei c. $\frac{7}{7}$ binas c: añ. ÷ II p. 15 añ. ÷ I p. 16 ro. p, roseo c. siccis c: facis p. preteritis (pt'itis) pc. admisces pc. inducis pc. 17 lintheolum c: lacteolo p. et resolves c. 18 auferes c: afferes p. et appones c: quod (q) pones p. polentam (farinam hordeaceam ex aceto Scrib. Larg. c. 252): pulentum c, $\frac{7}{7}$ oppulentum p. ex c: in p. 19 coctum... tritum... ipso pc. 20 et iterum polentum p, caterū post pulentum c. inductum om. p. 21 facies c: facis (fcis = factis ante corr.) p.

XVI. Ad pruriginem.

Pruriginem omnem Graeci cnesmonen vocant. nascitur ex acredine humorum. propterea lac asininum seu ovillum ieiuno potui dabis cum melle. etiam et sapone in balneo uteris, cuius confectio talis est. nitri, sulphuris vivi, nucum aridarum, adipis porcini, saponis gallici, apii viridis foliorum paria pondera: facies saponem et uteris in lavacro ferventi.

aliud ad pruritus totius corporis. cepae sardae, cretae cimoliae, faecum vini exustarum, myrobalani pie-smatos id est expressionis, omnium specierum quattuor paria pondera commiscebis et uteris.

aliud ad universos pruritus. si vero ferventes papulae prorumpunt, fabae pollinis, [ptisanae], polygoni herbae radices siccae tusae, cretae cimoliae torrefactae, omnium specierum IIII ÷ binas, afronitri turis masculi singulas ÷ conficies et uteris in balneo. accipies ex ipso pulvere sufficientem modum et ex ovi albore conspersum corpori

tit. Ad c: Contra p. 2 omnem: omnes c, om. p. cnesmonen: henesmoncam c, henesionem p (fort. ex knesmonen). 3 seu c: sive p. 4 ovillum c: ovinum p. ieiuno potabis (sic) cum melle c: cum melle ieiuno potandum dabis p. et om. p. 6 nuces rancidas dicit (ubi idem) Ps. Plin. f. 78^d Bas. saponis g. (cf. Act. p. 821 inf. ed. Lugd. 1549). 7 facis cp. 9 cepae (cf. Plin. 19, 101 cum 20, 41): Cere c, terre p. 10 cretae: tere c, terre p. quimolie c, quimulie p. fecum . . exustarum c: fecis . . exuste p. mirobalani c, mirob' p. 11 omnium c: harum p. 12 commiscebis p, -cis c. 14—16 fabae pollines poligomi herbae radices siccae et tuse et cretae et tere quimolie tere facte omni (omnium) specierum IIII ÷ binas c, si pollines faue (faiue) et ptisane siccae. et tunde secreto et tere quimolie torrefactae. horum omnium ÷ II. p. 16 affoetri p, aforacii c. singulas c: añ. ÷ I. p. 17 conficies cp. pulverem sufficientem modicum p. 18 ovi om. p. conspersum corpori linis c, et sparsum (7 spfu) corpus illinis p.

illines. post haec cum sudare coeperit confricabis, et post balneum rosaceo aut myrtino oleo perungues.

XVII. Ad parotidas.

Nascuntur parotides circa aurium partes, unde nomine graeco sic vocantur. et eveniunt frequenter in aegritudinibus malignis quas Graeci cacoethes appellant. maxime illis fieri solent qui ab aegritudinibus frigidam potionem praesumpserint. et sunt bonae quae subito inchoantes cum extantia in superficie cutis apparuerint et cum competenti dolore et rubore competenti, neque transvorandi officium negent neque somnos impediant. sunt aliae malignae quae contrarietate supra dictarum intelleguntur. contingunt iterum parotides mox apparentes mox recedentes: nullis precedentibus adiutoriis, salutis periculum referunt, ad altiores pulmonum partes fugientes.

curationis tempore ad inchoantes parotidas medicamentum diaforeticum sic facies. cretae argentariae partes

1 ceperit *p*: —rint *c*. con(9)fricabis *c*: 7 fricabis *p*.
2 rosaceo *p*: roseo *c*. perunges *cp*. 3 *tit*. Ad parotidas *c*:
Contra parotides *p*. 4 parotide *c*. aurū *c*: anū *p*. 5
sic *c*: *om*. *p*. 6 malignis *c*: *om*. *p*. quas — appellant:
a grecis cachoetes appellant *c*, a grecis chachohetes appellatis *p*.
et maxime *p*. 7 fieri solent *c*: contingunt *p*. qui ab egritudinibus frigida potione presumpserint *c* (*cf. Petr. c. 17*), qui egritudinem a frigida potione sumpserunt *p*. 8 bone *p*^o (*in marg.*): bene (*bē p*) *cp*. 9 apparuerint *c*, apparent *p*.
et q cū petenti dolore et rubore gpetenti *c*, et cum gpetenti rubore et dolore *p*. 10 neque *p*: et neque *c*. 11 negant *cp*.
sompnos ipediunt *p*, sompno ipediant *c*. 12 contrarietate supra dictarum *c*: contrarie supradictis *p* (*Petr.*). intelliguntur *cp*. 13 iterum (*ifm p*) *cp*: iste *Petr.*. 13 parotide *c*. 14 nullis *c*: nulli (*ull'i*) *p* (*ullis Petr.*). adiutoriis *c* (*Petr.*): adiueros (*sic*) *p*. precedentibus *cp* (*Petr.*). *cf. Cels. 6*, 16. *Th. Prisc. p. 8*. 15 ad: ut *c*, et *p* (et altiores *p. p.* irruentes *Petr.*). *fort.* ut ad. 16 ad *om. c*. 17 diaforeticum *c*, —tecum (*sic*) *p*. argentalis *c*, —les *p*.

duas, cimoliae et sulphuris vivi partes singulas, salis modicum cum aceto simul teres et illines. aliud. butyrum cum sale tritum illines et super lanam succidam impones et ligabis. aliud. plantaginis folia ante solis ortum collecta cum pane posca salsa infuso cataplasma bīs: sanat 5 et dirumpit.

aliud cataplasma ad maturandas parotidas. in aqua mulsa adipem porcinum mittes et resinam terebintinam sufficienti modo, et in uno consolves, et cum coeperit bullire mittes pollines tritici superaspergendo, et inductum 10 praevaporatis partibus ex spongia sic appones. et cum bene maturaverint, in schemate foliorum lauri aut myrtae chirurgia uteris et post sectionem communiter ut cetera apostemata curabis, etiam et super tiltario tali emplastro uteris, hoc est diachylon ÷ II, cerae ÷ III, olei spani 15 quod suffecerit. sed si forte cerotarium supra scriptum ad praesens minime fuerit inventum, psittacio emplastro uteris.]

XVIII. Ad collectiones.

(p. 175)

Collectiones Graeci apostemata vocant. nascuntur in 20

1 duas p, II. c. quimolie c, pmolie (sic p pro q) p.
et om. p. singule p. 2 cum . . . illines: cum aceto simul
tritīs illiniunt c, simul teris. et cum aceto illinis p. 3
illinis . . . in(1)ponis pc. 5 c. p. in pusca salsa infusa et
cataplasmata c (Petr.), c. p. in paulca faula infuso et cataplas-
mate facto p. sanat et di(s c)rumpit: sic cp (Petr.). 8
resinā terebentinā i sufficiētī mō c, resine terbentine sufficientem
modum p. 9 consolves (sic) cp. et cum ceperit bulire c:
fac bullire. et cum bullire ceperit p. 10 mittes c: om. p.
et . . . appones sic (nisi quod inductum prevaporabis . . . ex-
pongia) c: et prevaporatis partibus exporgia inductum appones p.
12 maturaverint c: —rit p. folia p. 13 et post . . . cetera p:
et pfectionē cōit' uttretera (sic) c. 14 curabis — (15) est c:
om. p. cera p. ispani p. 16 sufficit cp. 17 apprensens p.
psittacio (cf. infra c. 21): sitacio p, sutacio c (cf. septaticon
Petr.). emplastro uteris p: emplastaueris c. 19 tit. Cap. III.
ad collectionis g, Ad collectiones 18 c, De apostematibus p (Ad
collectiones ind. p). 20 supra apostemata scripsit eruptiones g^c.

toto corpore. et illae magis quae proxime cuti fuerint natae, facile et visu et tactu cognoscuntur, cum se extantia et durities veluti circumscripta cum rubore et dolore ostenderit, et cum coeperit supra dicta durities in
5 saniolam converti. his signis cognoscitur maxime si maius fuerit apostema. dolor quidem per membra discurrit, tensio etiam eiusdem loci patientis efficitur cum gravedine, dolores increscunt et febres nocturnae oriuntur, et dimissionis tempore circa collum vel thoracis partes
10 modica humectatio sudoris sentitur.

et propterea curationis tempore in ipso initio erit festinandum, et si fieri potuerit spargantur frigida, et diaforeticis cataplasmatibus fervorem extinguentibus curemus. hoc est coriandrum tritum cum pane posca infuso
15 cataplasmais, et frequenter mutabis. aut plantaginis folia cum infuso pane, nec non etiam et scarificationis competentes laceraturas dabis quas Graeci amychas vocant. aliud. si forte musculosis in locis aut glandulosis vel in mammis fuerit tumor aut durities, pulicinum semen quod
20 Graeci psyllion vocant calida infundes, et cum infrigidaverit et inviscaverit induces et appones.

1 ille *gc* (illę *g*^o): illa *p*. magis *gc*: *om. p*. proxime
c: —mo *g*, —ma *g*^p. cuti *cp*: cute *g*. 2 natae *g*, nate
c: nata *p*. et (post facile) *cp*: *om. g*. 3 durities *p*: duri-
tiores (*sic*) *g*, duritias *c*. circumscripta *gc*: —te *p*. cum
om. p. rubore et dolore *gp* (*cf. c. 17*): dolore et rubore *c*.
4 ostenderit *p*: —rint *g*, se (*iterum*) ostenderūt *c*. supra
dicta *om.* (cum durities ceperit) *p*. 5 saniolam *gc*: saniam *p*.
maxime *gc*: *om. p*. si maius *c*: si maior *g*, Si vero maius *p*.
6 quidem *gc*: *om. p*. 7 eiusdem *gc*: *om. p*. 10 su-
doris *gc*: *om. p*. 11 Et propterea *gc*: *om. p*. in ipso
initio *gp*: *om. c*. 12 potuerit *g*: poterit *p*, potest *c*. fri-
gidā: —dis *gcp*. 14 cum panis posca infusi *g*, cum pane
pasta infusa *c*, cum pane pusca infusū *p*. 15 folia *cp*: *om. g*.
16 cum *addidi*: *om. gcp*. scarificationis (*cf. c. 24*): scarificationes *g*,
scarificantes *c*, scarificationes *p*. 17 laceraturas *gc*: *om. p* (*ubi*
sic sc. competentes facies). dabis *g*: *om. cp*. amicas *gp*
(uodas *c*). 19 pulicinum *gcp*. 20 psyllion *g*, psillion *p*, psillon *c*.
21 et inviscaverit *gc*: *om. p*. inducis *gcp*. apponis *gcp*.

si vero videris minime posse spargi, sed magis ad nutriendam saniem declinare, cataplasmate uteris ex triticeo polline et resina terebintina, quod superius ad maturandas parotidas memoravimus. et postquam videris collectionem bene fuisse maturatam et sicut Hippocrates⁵ in prognostico dicit in acutum deductam, chirurgia uteris hoc modo. pridie chirurgia curandum a cena et vino abstinebis, et lucente die simplici consectione divisuram dabis: nam Graeci aplen dieresin vocant. et cum saniolam effuderis, ex utraque sectionis parte sufficientes particulas¹⁰ auferes, ut in similitudinem folii lauri aut myrtae artificii manus designes sectionem. ubi vero membra complicari videris, ut exempli causa post aurem vel sub ala, incisuram facies, hoc est rotundam quam Graeci strongylo-
tomial vocant. tunc siccis et tenuissimis lemniscis et¹⁵ tiltario locum calcabis, et desuper duplici pygmate aqua frigida vel posca infuso cooperies et addita spongia humectata ligabis. sed si forte causa aliqua vena sectioni incurrerit et sanguis abstineri minime potuerit, chalciten crudum et tritum appones et tilto locum calcabis et li-²⁰

1 vero om. c. 2 cataplasma g (—mate cp). triticeo
gp: —co c. 3 terebentina gc, terbentina p. quod cp:
quam (cf. ad v. 2) g. maturanda g (—das cp). 5 ypo-
crates gc, ypcras p. 6 prognostico g: pronosticis c, pro-
nostic p. deducta (sic) gc, ductū p. 6 (etc.) chirurgia g:
cirurgia cp. 8 consectione ego: correctione g, corectione c,
correctione p. 9 Nam gc: quam p. aplen dieresin gp,
apellandi cresim c (ἀπλοτομία Gal. XIV, 781). 11 arti-
ficio: artificū g^c (—ciū gcp). m. designes sectione g, m.
sectione designes c, m. ifricē designes p. 14 facis gp,
facit c. strongilodomial g, strongilotomial p^c (sed ante
corr. strongilalotomial p), scrogdamia c. 15 Tunc gp:
Nunc c. 16 tigma (t in ras. corr.) g, tigmatē p, stigma c.
17 infusa gcp. cooperies p: cooperis g, operis c. addita
om. p. humectabis et ligabis c. 18 causa g: casu cp (sed
aliqua gcp). sectioni: sectione gc, om. p. 19 abstineri cp:
—re g. poterit p. calciten gcp. 20 tiltus g, tiltū c,
tūtū p.

gabis et tertia die solves et mixto calido vino locum fomentabis. aestate vero secunda die solves et linteolis mulsa calida infusis diligenter curabis, quinotetarum scilicet regulam intuens, id est ut si videris ulcus sive
 5 vulnus putre vel sordidum, contrariis medicamentis depurges, si concavum, suppleas, ac si super carnosum, depurges, si aequale, in cicatricem inducas. |
 (p. 176)

(p. 196)

XVIII. Ad pendigines.

Pendigines sive sinus Graeci colpus vocaverunt. contingunt frequenter quotiens ulcera vel apostemata inerti
 10 chirurgia fuerint secta vel mala positione sanata. et cum sua sponte rursum eruperint minimeque per inferiores partes humorem vel saniolam excluserint, pendigines vel
 p. 199 sinus | faciunt.

15 propterea curationis tempore diachartu vino mulso admixto per auliscum fysarium sive aeneum sive osseum vesicae porcinae aptatum inicies, et postquam inieceris moto tilto vel strictorio ori vulneris immisso ligabis, ita

1 et 2 solves c: —vis gp. 1 locum om. p. 2 secunda om. p. 1. in mulsa gcp. 3 infusis g (ifais p): infundis c. qui nothe taurum (quinothetarum c cf. Cael. Aur. p. 234) scilicet regula (—lam c) intuentes gc: et hanc regulam semper observabis p (cf. Thess. ap. Gal. X, 285). 4 i. (= id est) g: om. cp. 5 putre gc: putridum p. contrariis (ētrīs) ego: cē(e)teris (sic) gcp. 6 supple. ac si g, suppleas ac si c, suppleas. si p. d. ac si c. 7 ē(e)qualem gcp. 8 sequitur in g Ad tineas capitis. cap. V. tit. De lentiginibus p. 9 Tentigines (cum rubr. T) p. colfus g, calsus c, colfos p. 10 ulcera: vulnera gcp. inerti rurgia g, inerti (inerti p) chirurgia gcp. 11 secta — positione om. g (add. g^c). positione g^c: pocione c, compotoe p. sanata ego: nata gcp. 12 minime per gcp (addidi que). 13 saniolam gc: saniam p. pendigines hic p. 15 Propterea om. p. diacartū gp (cf. Gal. ad Gl. XI, 125 καὶ τὸ γὰρ διὰ χάριτος κεκαυμένον συντιθέμενον ἡμέτερον φάρμακον), diacatarum c. 16 admixtum (mixtum c) gcp. fisarium gcp (ἐφ' ὁδότηρον Gal.). 17 vesicie g. 18 molli tilto (molitilto c) gcp (μοτῶ τιλτῶ Gal. l. c.). strictorio: stectario g, strectario c, trictorio p.

ut ligatura a fundo pendiginis incipiat, ut orificium libere habeat quo possit humor decurrere. etiam et schema iacendi patientibus tale esse oportet, ut semper orificium pendiginis iusum meatum habeat, quod Graeci cata yporrysin vocant. tunc alia die solves et mulsa calida delavabis, 5 et iterum medicamentum supra scriptum diachartu incies aut certe chloran emmoton appellatam ex veteri oleo liquidius solutam. et postquam videris pendiginem a sordibus purgatam fuisse, cephalico medicamento melli despumato admixto et e moto tilto appposito, sive collyriis 10 ex eodem cephalico cum melle pastillato sub hora formati competenter carnificabis. etiam et diaiteon emplastrum superimpones, latius inductum ut etiam vicinas partes colpi ipsius cooperiat, ita ut ad os vulneris forpice emplastrum aperias et sic superimponas. etiam et super 15 emplastrum plenarium ex linteolis duplicatis appones et ligabis. et cum coeperit pendigo saniem candidam et crassam emittere et secundum quantitatem minus a solito excludere, collesin futuram significat id est glutinationem. tunc ea quae inciebas paulatim deducendo ad os vulneris 20

3 tale *p*: talis *gc*. semper *ego*: super *gp*, sui *c*. 4
iosum *g*, sed supra al'. iusū *g*^o = *p*, uisum *c*. catayporrusin *g*,
catayporusin *c*, cataphyporisin *p* (εἰς ὑπόρρυσιν *Gal. XI*,
128). 5 delavabis *g*, delanabis *c*, lavabis *p*. 6 diacartū *p*:
diacatarrum (*hic*) *g*, diacatartū *c*. 7 cloranem motos.
appellata. et v. o. *g*, doranen motas exapellata olei veteri *c*,
dorām motos app. ex v. oleo *p* (cf. *Gal. XIII*, 484 sqq.).
8 soluta *gcp*. 9 caephalico (et 11 ceph.) *g*. mellī *g*:
melle *cp*. 10 et emmo totulto *g*, 7 in motulto *c*, ē mototulto *p*.
colliriis factis ex etc. *gcp*, ubi delevi factis. cf. infra *c*. 20.
diaitheon (διὰ ἱεῶν) *g*, diahitheon *cp*. 13 imponis *gcp*.
14 colfi *gcp*. cum seqq. cf. *Actius XIV*, 53. forpice *g*:
forfice (—cem *p*) *cp*. 16 post plenarium de callositate
vitanda haec praebet solus *c*: lositas minime fuerit secuta etiam
(et) ex artomae colositate int'gera careat [ex pulteolis dupl.
etc. quae infra *c*. 20 locum habent. 16 apponīs *gcp*. 18
grassam *g* (cr. *p*). a (á *g*) solito *gcp*. 19 colles. in fu-
turam *g* (collesin f. *p*).

tantum apponas, ne conglutinationem factam dissipes. et iterum cum videris saniolam tractuosam vel viscosam exire, tiltum ex linteolo tenui appones et super emplastro uteris et sanabis.

5

XX. Ad fistulas.

Fistulas Graeci syringas appellant. et sunt ulcera pendiginosa et intrinsecus callosa neque in cicatricem venientia. et si venerint iterum resolvuntur et in orificio
p. 200 aliquando | cortizones ostendunt quos Graeci efelcidas
 10 vocant.

in curationibus vero si membri vel loci qualitas exegerit, melius est fistulam ferro nudare, id est ex flebotomo vel syringotomo appellato, et omnem callositatem occultam artificio manus visibus pandere et secun-
 15 dum rationem curare, quod Graeci cata logon appellant. sin vero loci vel membri ipsius qualitas usum chirurgiae prohibuerit, hoc modo curabis. in primis angustas cavernulas de aprina vel porcina saeta inspicias et papyro patefacies. quod papyrum sic praeparabis. papyrum vitriari-
 20 orum eliges carnosum, id est quod non fuerit fragile vel flacidum, et pridie in aceto salso infundes, quod Graeci oxalmen vocant. tunc alia die spatha tenui circulatim

2 tractuosam *gc: om. p.* 3 tiltum *g: ulcus cp.* 5 tit.
 Ad fistulas (20 *c*) *gc: De fistulis p.* 6 syringas *g* (—ga *p*,
 —guas *c*). sunt *cp: sicut g.* 9 certidiones *gp*, —diores *c*
 (fort. corticiones = *hisp.* cortezones *i. e.* crustas). efelcidas *g*,
 efelcidas *p* (excleidas *c*). 12 exegerit *cp et ante corr. g.*
 12 ex *gc: om. p.* 13 fleuotomo *g.* syringotomo *g.* 14
 occulta (oculta *c*) *gc, occultantem p.* artificii manu *gcp* (*cf.*
c. 18). 15 catalogon *gc, catalagō p.* 18 de aprina: de-
 pirina *gp*, di priō *c.* seta *g* (seta *cp*). inspicias *g* (insputis *p*,
 respice *c*). 18 (etc.) papiro *gcp.* 18 patefacis *g* (patefcis *p*,
 parsatis *c*). 20 elegis *g*, eligis *c* (eliges *p*). carnosum *g:*
 callosum *cp.* 21 flacidum *gp* (fracidum *c*). 22 oxasmin *gc*,
 oxomiō *p.* alia *gc: alio p.* spaco (—to *p*) tenui *gcp.*
 circulati mendissime (*sic*) *g*, circulatim et densissime *c*, circu-
 latim d'esīē *p.*

densissime constringes quod attenuari possit, et cum diligenter siccaveris solves et eius asperitatem scalpello rades, et ad modum foraminis fistulae sive longitudinis sive roboris incidēs et inicies, et super emplastrum tenacissimum appones et ligabis, et sines die et nocte. et iterum alio papyro paulo robustiore mutabis, quod papyrum ante medicamento ectylo¹tico id est excallatorio infra scripto cum modico aceto et ad horam trito lines, et sic inicies. sed si forte tumor fuerit excitatus, cataplasma superimpones ex aqua mulsa et modico rosaceo confectum. et quomodo accedit patefactio, subinde per singulos dies robora crassiora papyri innovabis, donec sufficienter fistula patefiat et callositate interiecta careat. sed si forte callositas minime fuerit secuta, etiam et xantou medicamenti partes duas mittes et ammoniaci partem unam cum aceto teres, donec mellis crassitudinem sumat. tunc illitum scisso linteolo lemniscum inicies et eum calcabis, donec repleas fistulae cavernam. et postquam videris bene fuisse purgatam, collyriis ad horam factis ex melle pastillato admixto cephalico medicamento diligentissime carnificabis. sed si forte nuditate ossi vel ex putredine ipsius ossi superinducta lepide, quam nos squamulam dicimus, curam impediri senseris, ex melotide ferrea leviter radendo purgabis et sic supra dicto collyrio carnificabis.

1 constringis *gcp.* 2 siccaveris: —rit *gcp.* 5 die et nocte *g:* diem ac noctem *c,* diem et noctem *p.* alium (aliud *c*) papirum (bapirum *p,* pabirium *c*) paulo robustiorem *gcp.* 7 et cilotico *g,* ectillotico *c,* et tilotpeo² *p.* excalla (excala *c*) torio *cp:* escallatorio *g.* 8 linis *gcp.* 9 inponis *gcp.* 11 accedit *g:* accidit *cp.* 14 et xantou (xanti *cf. Hippocr. Galeni XIII, 520*): ex anton (exantō *c,* exacton *p*) medicamentum *gcp* (*cf. supra c ad c. 19*). *cf. ξηράφιον Actii 14, 45 (de fistulis).* 15 mittis *g* (—tes *cp*). amoniaci *g.* 16 Tūc *c:* vel t̄ (*sic*) *g,* t̄c *p.* illitum *gp:* illinitum *c.* scissum lint(h *c*)eolum *gcp.* 17 calcas *gcp.* 18 cavernam *g:* —nas *cp.* 20 cephalico *g.* 21 nuditas ossi *gp* (temidites ossi *sic c*). ossi *gc:* om. *p.* 22 lepida *g,* lepida *cp.* squamulam *gp,* scāmilla *c.* 23 melotida *gcp.*

confectio collyrii syringiaci ectylofici: chalcanti partes duas, guttae ammoniaci partem unam cum aceto modico simul teres et facies collyria, longitudine ac robore differentiae ut est ipsa fistularum caverna.

5 aliud ad universas fistulas brevissimas: corii granatae
p. 201 siccae tunsae et cretae 2 I, lenticulae | alexandrinae pol-
linis 2 I. mittes in fistula ex pulvere granatae modicum
et ex polline lenticulae. hoc facies diebus tribus aut
quinque. cottidie curabis ter in die, hora tertia, hora
10 sexta et nona.

aliud ad universas fistulas vel ante oculum aegilopas.
herbam putidam quam punice aturbis dicunt, et lac herbae
tithymali et lac caprifici et piperis grana XV, sucum de
lana, lenticula dura, haec omnia tundes in se et appones
15 ad locum cautius ne oculum contingat, propter virtutem
quam continet causticam.

XXI. Ad empyemata.

Empyemata dicuntur collectiones sive apostemata
occulta atque visu carentia vel absconsa et in altioribus
20 viscerum partibus nata: nam Graeci en catacalypsi vocant.

1 syringiaci . ectilogici *g*, siriagi. 2 tilogici *p*, sirmigiaci
3 silogici *c*. calcanti *gcp*. partes duas *gc*: parte due *p*.
pars I (una *p*) *cp*. 3 facies *gcp*. 4 differentie (*id est* eius
d.) *g*: differentia *cp*. est ipsa *g*: sunt ipse *c*, ipse sint *p*.
caverna *g*: —ne *cp*. 5 Corium *g(p)*, Co2 *c*. 6 . 2I. *g*:
. 3. I. *c*, . 3. I. *p*. pollinis *cp*: apollinis (*sic*) *g*. 7 mittis
gcp. fistula *g* (—ā *c*). et ex: ex *gp*, et *c*. 8 facies *c*:
facis *gp*. tribus diebus *cp*. 9 hora tertia sexta et nona
c, hora tertia hora sexta hora nona *p*. 11 egilopas (*cp*)
om. g. 12 herba (her *c*) putida *gcp*. 12 punicea turbis
(*sic*) *g*, punice atbus *c*, puniceatrpis *p*. 13 titimali *gc*,
—mali *p*. de lana lenticula dura (*sic*) *gcp*. 14 tundis
gc, —de *p*. et *c*: vel *gp*. apponis *gcp*. 17 tit. Ad
im(em *c*)piemata *gc*, De collectionibus *p*. 18 Impiemata *g*,
Empiemata *cp*. 19 visu carentia: *sic gcp* (*etiam Simon s.*
empima). 20 nam *gc* (*Simon*): quam *p*. encataly(i *p*)psin
gp, encaalipsin (*sic*) *c* (est —*pro* en = ē —catalipsim *Simon*).

quae autem cum nasci coeperint his signis cognoscuntur. in primis dolores sentiunt aegrotantes cum obripilatione, et post aliquot dies veluti lentiores anomali iterum efficiuntur cum dolore et obripilatione. et cum coeperint saniem nutrire, etiam febres inordinatae secuntur cum fastidio ciborum. et cum supra ventrem iacuerint laborantes vel in alterum se verterint latus id est sanum quod fuerit patienti lateri contrarium, veluti gravedinem pendentem in interioribus sentiunt, et aliquando ipsius loci patientis exaltatio efficitur. tunc cum nimie creverint apostemata eruptionisque appropinquaverint dies, vomitus fellis flavi efficitur. aliquando in similitudinem coloris foliorum viridium porri choleram vomunt quam prasoiden vocant, cum ingenti animi defectu quem lipothymian vocant, cum levi sudore in capite et circa superiores partes thoracis. et si sursum aut in lateris summa regione eruperint et per vomitum depurgentur et post ruptionem si febribus minime caruerint aegrotantes, mortem futuram denuntiat, maxime si grande fuerit apostema. si vero in renibus eruperit, urina purulenta sive saniosa excluditur et ulceratio periculosa in renibus significatur. si vero in inferiori parte

1 autem *gc*: *om. p.* 2 (item 4) oripilatione *p.* 3
veluti leniores *an. gc*, leniores veluti *an. p* (*qui* leniores *vitiosum esse sensit, fort. pro* lentiores. *cf. Cael. chr. 5, 94*).
4 ceperint *g*: —rit *cp.* 5 secuntur (*secū sic c*) *gcp.* 8
pendentem *g*, pendent[ibus] *c*: pcedētē *p.* 10 exaltatio *gc*:
exaltatio (*i. e. exhalatio g^o*) *g.* creverint apostemata *gc*:
creverit apostema *p.* 11 que *p*: *om. gc* (eruptionis appropinquaverint *g*, eruptionis q̄ appropinquaver *p*, *er. propinqua propinquaverint sic c*). 12 efficitur *gc*: efficiuntur *p.* 13
colera *g*, collera *c*, coleram *p.* quod *g*, quos *c*, q̄ (que) *p.*
prasohide *g*, parochidie *c*, p̄lloida *p.* 14 quem *g*: quam *cp.*
lipotomian *g*, linpothomiā *c*, lipotumiā *p.* levi *gc*: leni *p.*
15 toracis *gcp.* 16 in l. sua regione ruperit (*sic*) *gc*, in lateris sumā regionem eruperint *p.* et: aut *p*, *om gc.* 17
depurgentur *gc*, purgaverint *p.* si *g*: *om. cp.* febris minime *c. c*, febres non dimiserint *p.* 18 egrotantes *gc*: egrotantibus *p.* denuntiat: —ant *gcp.* 19 grande *p*: grandis *gc.* 21 inferiori (*sic*) *gcp.*

eruperit in ventre vel intestinis et cum egestionem ventris sanies fuerit exclusa, ex parte curari ostenditur, si tamen febrium discesserit molestia post eruptionem facta.

propter ea curationis tempore in ipso initio si in
 5 uno loco fuerit confixus dolor, erit festinandum ut ante
 quam saniet apostema diaforeticis adiutoriis de altitudine
 10 levatum ad superficiem cutis spargatur. | id est in primis
 patienti loco sanguisugas appones hoc modo. intra cucur-
 bitam medicinale latum linteolum mittes usque ad sca-
 15 pulas cucurbitae, ita ut labia ipsius cucurbitae operias.
 in quo linteolo sanguisugas quam plures proicies, et loco
 dolenti cucurbitam supervertes, et leviter ac sufficienter
 in circuitu linteolum trahes, quo possint sanguisugae corio
 vel cuti applicari. hoc vero moderate facies, ne iterum
 20 nimia angustia opprimantur. et cum morsibus adhaeserint,
 cucurbitam cum linteolo auferes, et sines donec supra
 dicta animalia sanguine repleantur. tunc asperso sale trito
 sanguisugas removebis et locum perungues et in eodem
 loco cucurbitam adiecta flamma figes, et sanguinem de-
 25 trahes quantum causae sufficere fueris arbitratus. et post.
 detractorem sanguinis butyrum tritum cum nitro inlines
 et lana sucida cooperies et ligabis. sed si forte temporis
 ratio vel loci qualitas fecerint ut inveniri minime sangui-

1 ruperit *gcp.* inventrem *g*, —tre *cp* (i. = id est ante
 inventre *inserit p*). 3 molestia *cp*: modestia (*sic*) *g*. facta:
 factam *gcp.* 4 Propt(er)^{ca} > *g*^c, Propterea *c*: om. *p.* 7 le-
 vatū *p*: —ta *g*^c (*cf. supra p. 33, 19*). i. *g*(*cp*). 8 sanguisucas
 ante corr. *g* (item *v. 11 g* et ante corr. *v. 13 et 23 g*),
 sanguisugas (*ut semper*) *p.* 11 proicias *gcp*^c (proficis
 ante corr. *p*). 12 supervertes *gc*: appones *p.* leviter *g*:
 leniter *cp*. 13 quo *g*: quod (*q*) *p*, in quo *c*. 14 facis *gcp*.
 16 sinis *gcp*. 18 removebis *g*: removes *p*, moves *c*. per-
 unges *gc*, —gis *p*. 20 cause *c*: causa *g*, om. *p*. 21 bu-
 ty(i) *cp*rum *g*. inlinis *g*, illinis *c*, linis *p*. 22 cooperis *gcp*.
 23 fecerunt (fecer) *g*, fecerit *c*, abfuerit *p*. ut *p*: et *gc*.
 inveniri *cp*: iuvenili (*sic*) *g*. s. minime possunt *c*, s. non
 possint *p*.

sugae possint, levibus plagis scarifabis, et duobus vel tribus interpositis diebus diaforetico cataplasmate uteris, id est hordei pollinis partes duas lini seminis partem I et faeni graeci dimidiam partem adiecto modico oleo coques in aqua salsa et cataplasmas, praevaporatis partibus spongiis ex aqua calida salsa expressis: cottidie aliquantis diebus inmutabis. nec non etiam et dialon emplastrum inferius suo loco conscriptum post cataplasma impones. cavendae praeter ea inter ipsa initia vehementes saccellorum vaporationes. etenim nimietas vaporis locum dolentem et tumentem in saniolam converti cogit. observare etiam oportet aegrotum a vino et ab omnibus carnibus, quadrupedibus et volatilibus. holera tantum accipiat quae sint digestionis aptissima. sed si a vino non potuerit abstinere, propter imbecillitatem stomachi nimie aquatissimum concedes. sin vero loci patientis dolor minime quieverit et ad nutriendam saniam apostema declinaverit, tunc empyoticis adiutoriis uti oportet id est quae saniolam nutrire valeant, ut est cataplasma ex resina terebintina et polline triticeo superius ad maturandas parotidas conscriptum. sed melius fit cum decoctione caricarum pinguium. coque etiam et psittacium emplastrum uti oportet. aliud certe meline Vespasiani appellatum: novit enim non

1 lenibus c. scarifabis g: scarificabis cp. 4 feni g, fenu c. 6 et cotidie p. 7 et om. p (non gc). dialon (δὲ ἀλῶν) gc: dialoen p. 9 iponis gcp. Cavend gc, Cavendo p. a vehementi s. vaporatione p. 10 l. tumentem (tumentem c) et dolentem cp 13 q. et v. g: quadrupedibus volatilibus c, quadrupedium volatiliu p. 13 olera gcp. tantum g: tamen (tū) p, om. c. 14 potuerint c, poterint p. 15 abstinere g: —re cp. 17 declinaverit gc: inclinaverit p. 18 empy(i cp)oticis gcp (Sim.). saniolam gc: saniam p. 20 conscriptum est (— g) gcp (inde antea quod superius p et ut superius c). 22 psy(i c)tacium gc, psittaton p. 23 meline g, meliē c, mll'ne p. vespasiani g: vespasiam c, vaspasiani p. m. vesp. appellatum c: m. app. vesp. gp.

solum in corio verum etiam in altitudine occultas solvere collectiones.

sed si forte tardius rumpere senseris apostema, oportet eius adiuuare celeritatem electuario <meta>syncritico
 5 id est quod valeat occultam collectionem rumpere, ne sanies inclusa plurimo tempore tardando interiora membra corrumpat quae Graeci moria vocant. conficitur sic. fici pinguis, origani, marrubii, rutae, thymi, absinthii, centaureae radicum et seminis, sinapis, cardamomi, squillae
 p. 203 medii paria pondera: omnes herbas decoques | in aqua, et mittes ex ipsa decoctione partes II et mellis partem I, et coques donec mellis sumat crassitudinem, et dabis ieiunis secundum vires aliquibus coclearium I aliquibus coclearia II.

aliud. si forte in pulmone fuerit collectio, suffumi-
 15 gatorius trosciscus quem Graeci ypocapniston vocant ordine qui ad tussim humidam conscriptus est adhibitus eruptionem accelerat.

et postquam eruptio fuerit facta, oportet adhibere quae valeant ulcera sordida purgare, hoc est suco ptisanæ

1 in corio *gp*: exterius *c*. 3 oportet *etc. cf. eadem verba apud Cael. Aur. chr. 5, 116.* 4 i. (id est) electuario *g* (i. *om. cp*). electuario *gc*, elictario *p*. syncritico *gc* (sinctico *p*). addidi *meta*. 5 $\frac{1}{2}$ (*sic*) *g*, qui *c* (*q* = quod *p*). 7 morian *g*, moriā *cp*. 7 et 8 singularum specierum (ex archetypo compendiose scripto) genitivos habent *cp*, accusativos *sic g*: ficus (fiō *c*) pinguis. origanum (origaō. *c*). marrubium. rutam. timum. absentium (absinthii *cp*). centauream (—ree *p*, —centarie *c*). radices et semina (radiciū semis *c*, seminis radicum *p cf. Cael. Aur. l. c. 118*). sinapem (—pi *c*, —pis *p*). cardamomum. squille medium paria *p*. 10 Omnes herbas *om. p*. 11 et coques — (13) vires *om. c*. coq̄s *p*, coq̄ *g*. 13 aliquibus *gc*: quibusdam (*bis*) *p*. cocleare (—pi *c*, cocl'r *c* (ccl' *p*). coclearia *g*: *om. c*, cocl'r. *p*. 14 suf(sub *c*)fumatorius *gcp*. 15 quos *c*. ypocapnistos *g*, —tō *p*, ypocras ulcos *c*. 16 qui ad *g*: quo ad *c*, coad (*sic*) *p*. tussim *g*: —sem *cp* (ad t. hum. i. c. 33). zscripti sunt (*et mox accelerant*) *c*. adhibitus *p*: —tō *g*, —ti *c*. 19 suco *p*: —cum *g*, —cū *c*.

aut alicae cum modico melle despumato ieiunos potabis,
aut lac caprinum tepefactum cum sufficienti melle dabis,
aut butyri recentis partes II mellis despumati partem I
in uno commiscebis et exinde ieiunis coclearium unum
dabis, aut ervi rubri pollinis coclearium I cum mulsa calida 5
ieiunis dabis, et vario cibo nutries.

si vero in epate vel renibus fuerit ruptio facta,
diureticas saepe memoratas potiones dabis id est quae
per urinam purgare noverunt. et postquam bene fuerint
ulcera depurgata, trigono trocisco in cicatricem duces. 10
sin vero in renibus vel in vesica fuerit ulcerationis cau-
satio, dia fysalidon trociscum dabis quem inferius in ne-
fretica passione conscripsimus.

XXII. Ad carbunculos.

Carbunculi quos Graeci anthraces vocant efficiuntur 15
ex influxione sanguinis calidissimi et nigri et crassioris
substantiae. etenim membrum in quo validus talis in-
fluxerit sanguis, inuritur et ulceratum scaram facit. na-
scuntur in toto corpore, frequenter tamen musculosis in
locis et membranosis. aliquando et appellatur a Graecis 20
anthracion singulari genere nominatum, si quidem in ipso

1 ieiunus (ieiuno p) potabis gcp. 3 buty(i cp)ri g. 4
in uno (uño c) commiscet gcp. 4 et 6 ieiunus (—n?) g,
—nū c, —no p. cocleare unum g, coel'r. I. c (p). 5
ervi: heř c, herbe g, herbi p. coclear. I. (hic) g, coel'r. I. cp.
6 nutris gcp. 7 ruptio fuerit facta cp. 8 sepe memoratas
pociones c, sepe poscens (in marg. corr. potōes) memoratas p:
om. g. 9 nover g. fuerint ulcera bene depurgata (pur-
gata p) cp. 10 ducis gcp. 11 sin g: si cp. vessica g
(vesica cp). 12 diafisalidon g: dia fasildidon c, diafisaldcō p.
nefretica g: frenetica (—cam p) cp. 13 passionē cp. 14
tit. Ad c. gc: De carbunculis p. 15 Carbunculos ante corr. g.
antraches g, antrahes c, antaces p. efficiuntur: cf. Galen.
(therap. ad Gl.) XI, 76. 17 in quo (sic) gcp. 18 ulcera-
tur . . . faciens c, ulceratus . . . facis p. scaram gp, icarā c.
21 antrachion gp, antrahion c. nominatum carbunculum gc,
—tus —lus p (delevi carbunculum).

initio suae nativitatis veluti ex genere exanthematum in superficie cutis feratur. et in medio suae regionis nigri ut carbones efficiuntur, unde ipso nomine carbunculi vocantur. et cum augmento dierum creverint, quemadmodum intra formam suam basis, tamquam ex similitudine cauteris acuti calidi variolati, scaram ostendunt, et cum putredine ut saepe dixi efficiuntur.

curatio autem optima ab initio cibi abstinencia sive ieiunio et requie corporis vel silentio incipere debet. et si grandes fuerint carbunculi, erunt aegroti in brachio flebotomandi, si tamen aetas aut tempus vel virium qualitas permiserit. et si ventrem non fecerit, clystere acriore evacuan-
15 aut certe chloran quam appellant emmoton, et super len-

1 gūre *g*, gūe *cp*. exantema<tum in *in ras.*> *g*. 2 feratur *gc*: (in superficiem *c*.) ferantur *p*. niger ut carbo efficitur *c* (*non gp*). 3 carbunculas (*sic*) vocatur *c* (*item mox creverit ... ostendit*). 4 qđ(ū *p*) admodum *gp*, quodam modo *c*. 5 intra forma sua basis *g*, nitra formā suā basis *c*, in forma subbasis (*sic*) *p*. *cf. Gal. XI, 76 (VII, 719 ὡςπερ ἐν τοῖς πυρεξαύστοις)*. 6 calva | riolati. scara ostendunt *g*, calvariolatas charas (*in marg. i ā chartas!*) ost. *p*, calvano latis thara ondit *c*. variolati quod scripsi respondet Galeni phlyctænis (*XI, 76*). et est variola apud Marium Aventicensem (*Chron. vet. lat. ed. Roncalli II, 413 cum profluvio ventris et variola*). cauteris calidi dicuntur ut cauteris aut tepidi aut ignei vel igniti Caelio *chr. 5, 16. 19*. 8 optima (*sic gc, pā p*). Ab . . . *g*. ab initio . . . incipere *sic gcp* (*cf. c. 28 ex praedictis . . . superius scripta*). abstinentiam (*—tia cp*) sive ieiunium (*—nio c, sive i. om. p*). et requiem (*—ē gp, —e c*) vel (*gc, et p*) silentium (*—tio c*) *g*. 11 aut *gc*: vel *p*. 12 ventrem *gc*: venter (*vēt p*). acriore *g*: —ri *cp*. 13 evacuandus *g*. parvi: parvo *gcp*. salis *c*: sale *g*, —li *p*. diacartu *g* (*—tū p, —ticum c*). 14 emmotilto *g*, ē mototilto *p*, emmoto cillo *c*. adpones *g*. 15 chloran. quem a. emotos *g*, doran q; a. emmotos *c*, clorā q (*quod aīnofos (corr. mg. ēmotos) p*).

tacula cum ramis murtae siccae elixata et diligenter trita cum modico melle et pane infuso cataplasma bis, quod Graeci artofagon appellant. sin vero erysipelatodes fuerint carbunculi id est cum rubore ut in vicina parte sibi veluti ignis sacer ostendatur, plantagine aut coriandro aut intibo cum pane cataplasma bis in die et semel in nocte. tunc cum bene ulcus videris depurgatum, Musa trocisco uteris in vino mulso resoluto.

XXIII. Ad reuma.

Intellegitur reuma quotiens valida influxione humoris nullis praecedentibus causis subito intumuerit membrum. et appellatur a Graecis reumatice diathesis id est reumatica passio. contingit frequenter, maxime tamen in articulis locis, ut exempli causa in genu aut in cubito aut iugulo aut maxilla cum aure usque ad tempora, aliquando etiam simul et faciem, ut etiam ingenti tumore subito oculi claudantur. aliquando usque ad guttur supra dictus tumor dilatatur, ut etiam thoracis partes invadat.

in curationibus vero abstinencia cibi vel ieiunio et a vino abstinencia et sanguinis detractio per flebotomiam et ventris purgatione cathartico dato sive clistere eva-

1 murte *g*: mirte *cp.* exlixata *g*, elixate *c*, et (*τ*) lixate *p.*
trita *g*: —te *cp.* 3 artofagion *g* (*p*), artopagion *c* (*cf. c. 32*).
Sin *g*: Si *cp.* heresipelatodes *g*, casipilatodes *c*, erisipilatodes *p.* 4 in vicinas partes sibi *gc et (om. sibi) p.* 5
ignis acer ostendant *g*, ignis acer ostenditur *c*, ignem sacrum ostendant *p.* 7 musa *gc*: mulsa *p.* 8 trociscum . . . resolutum *g* (—co . . . —to *cp*). in *p*: *om. gc.* 9 tit. Ad reumam *g* (—ma *c*), 9 (contra) de reum^ā *p.* 12 *cf. Gal. XI, 79.* 13 tamen *g*: *om. cp.* 15 iugulo *p*: ungulo *g*, in iugulo *c.* in maxilla *cp.* aure *gc*: ore *p.* tempora *g*, tempus (*tps p, tpus c*) *cp.* 16 faciem (*i. e. usque ad f.*) *g*, facie *c*: faciem occupat *p.* 20 avino *c*: vino *g* (abstinencia cibi et vini *p*). sang detractio^{nē} *g.* fleuotomiam (*ut semper*) *g.* 21 clistere *g* (distere *p*), clisteriis *c.* evacuatione *p*: vacuatione (—tio *g*) *gc (ut supra g).*

tione facta curabis, considerata primo ipsius laborantis aetate et tempore et regione, et ipsius reumatismi qualitate vel quantitate. ipsa vero loca quae patiuntur pane posca infuso et trito cataplasma babis et sanabis.

5

XXIII. Ad ignem sacrum.

Ignis sacer ab invadendo a Graecis erysipelas appellatur, si quidem vicina sibi loca invadendo possideat. et efficitur sub ingenti calore sanguinis ex commixtione fellis flavi, quam Graeci xanthen cholen vocant. et est rubor
15 flammeus in superficie cutis cum dolore et tumore. sin vero circa gulae partes fuerit natus, praefocationis periculum affert, cum in toto vultu inflaverit et a cervice usque ad thoracis partes fuerit dilatatus.

in curationibus autem si grandis fuerit erysipelas,
15 flebotomare oportet et secundam detractationem facere quam epafaresin vocant, et si vires aegrotantis patiuntur ieiunium diurnis diebus imperare et a vino et omnibus carnibus abstinere. si autem flebotomiam minime adhibere potueris, acriore clystere ventrem evacuabis, aut catharticum quod flavum fel deponat dabis, ut sunt catapotia
20 Galeni superius in passione capitis scripta. post haec et

1 considerata *cp*: —to *g*. 2 reumatismi *gp*: reumatis *c*.
5 *tit*. Ad ignem acrum (sacrum *c*) *gc*, De igne sacro *p*. 6
sacer *cp*: acer *g*. erisi(ensi *c*)pilas *gcp*. 7 possideat *gc*:
—det *p*. 8 ex *cp*: et *g*. 9 quam *gcp*. exante cholen
g, exante colen *c*, exante celeti *p*. his utitur *Isidorus*
IV, 8, 4. et: ut (est) *gcp*. 10 superficiē *g*. Sin *g*:
Si *cp*. 11 gulę *g*: guille *c*, vulve *p*. *p*^c in marg. pre-
vocationis (!). 12 in toto vultu *gc*, totum vultum (*om*. in) *p*.
a *om*. *cp*. 14 erisipilas *g*, —pila *cp*. 15 fleotomare *g*.
secundam *gc* („i. prosperam bonam“ in marg. *g*): secundum
vires *p*. 16 epafaresin *g(p)*, epafares (*sic*) *c*. 17 diurnis:
diuturnis *gcp*. 19 potuerit *gc* et (fl'tomia . . adhiberi) *p*.
acriori (*hic*) *g* (—re *cp*). 20 flavum mll' (*sic*) *p*, favum
melle (!) *c*. catapocias gallieni *g*, catapucias gallieni *c*, cata-
putie gallieni *p*.

loca patientia plantaginis aut uvae lupinae suco inlines, aut lenticulatam herbam de stagnis virentibus colliges et cum modico aceto tritam impones, aut glaucium cum aqua solutum inlines, aut coriandro aut plantagine trito cum pane posca infuso bis in die et semel in nocte cataplas- 5 mabis: in hiberno autem viridi apio aut coliculi foliis similiter cum pane uteris, maxime si in articulosis locis fuerit erysipelas. novit enim tale cataplasma imminem putredinem prohibere.

aliud ad ignem sacrum. cimoliae 2 III, glaucii 2 II, 10 spumae argenti 2 I, croci 2 III, turis masculi 2 I cicutae suco colliges et trociscum informabis et in usum in posca frigida teres et inlines. aliquando etiam, ut loci qualitas vel ipsius membri postulaverit, aqua calida primo fomentabis et diligenter deterges, tunc paulo sursum a 15 patiente loco carpodesmo ligabis et ubi nimius rubor fuerit, scarificationis levissimas laceraturas dabis, quas Graeci amychas vocant. et postquam videris cutem bene fuisse purgatam, spongia frigida posca expressa deterges et trocisco supra scripto lines. alia vero die emplastrum 20 dia strychnu appellatum impones: et conficitur sic. cereae

1 patientia c: patientis gp. uvae lupinae: i. e. strychni (Simon Jan. s. v.) cf. infra et Diosc. l. c. in(l c)linis gcp (item mox colligis . . . imponis). 2 lenticulam p (—latam gc). 3 glatium g, gladium cp (γλάδιον ad erysip. Gal. XI, 857). 4 illinis gcp. 5 posca g: in pusca cp. 6 post autem in marg. add. p^c: eplaustizando. co(au cp)liculi g. 8 erisipilas gcp. tale p^c: talis gc. imminem g(cp). 10 acrum g, acgrum c. quimolia g, —lie cp. glauciū g, —cū p (—cū c). item mox spuma . . . croci (ubi cē = cere p) g. colligis gcp. 13 in(l cp)linis gcp. 14 postulaver g (—verit cp). 15 a patiente loco cp: patientem locum g. 17 scarificationis g, —nes c (scarificationes facis p, qui om. lev. lac.). levissimas c: lenissimas g. 18 amychas gp, amicha c. 20 trociscum (—cū c) supra scriptū linis gc, trocisco supra dicto lenis p. 21 diastriagnum gp, diastriği c (cf. Diosc. IV, 71). im-
ponis gcp. cera (cēra g) . . . spuma . . . cerussa gc (gen. p).

2. VI, spumae argenti 2. IIII, cerussae 2. II, olei rosacei lib. I, uvae lupinae 2. VIII. hoc medicamentum facit et ad herpetas hoc est serpusculos.

XXV. Ad araneas.

5 Araneas Graeci a serpendo quod herpin dicunt herpetas dicunt, nos vero similiter latino sermone sicut supra
p. 205 diximus a serpendo serpusculos nominamus. | et efficitur sub ingenti acredine ac calore fellis cum pustularum superinsurrectione. est et aliud genus herpetis, quem
10 Graeci cenchrias vocant, si quidem in superficie cutis pustulas minutas milio similes ostendit: quam Latini vulgo araneam verrinam vocant.

in curationibus autem similiter ut erysipelata superius curabis.

XXVI. Ad scrofas.

Scrofas Graeci chiradas vocant duritias rotundo schemate natas et nervis atque arteriis venis et musculosis membranis connaturatione infixas, quod Graeci cata synfysin vocant. et cum glandulosis in locis in utraque
20 gutturis parte fuerint natae, sicuti suis feminae turgida colla cum dolore ostendunt, unde ipso nomine scrofae

1 oleo roso (sic) g, olei rosei (ro. p) cp. 2 lib. I. g, libr. I c, l'. I. p. 3 erpetas p: herbenas g, hertenas c. 5 herpen g, herpin c (q. h. d. om. p, erpem Sim. s. araneae) herpenas g, herpepeticos p (om. c, herpetas Simon s. v.). 7 serpiginem Simon s. herpetas (cf. Isidor IV, 8, 5 serpedo). nom. g (i. e. nominamus p), nominavimus c. 8 ac g: et cp. c. p. extantia Isid. 9 herpentis gp, erpetis c. 10 cenchrias g, tēcrias c, ceucas p. 12 aranea verrina (raneae vermia c) g, —ā p (tineas verinas Sim.). 13 erisipelata gc, —pilā p. 15 tit. Ad scroph(f)cas gc, De scrofulis p (mox Scrofas gcp). 16 chiradas gp, hiradas c. 18 cōnaturatione g: cū maturatione c, cōatū p. catasinfisin gp, catasimisin c. 20 suis: sues gc, uos p. 21 ostend g.

vocantur. et sunt curationis difficilis. nascuntur in cacochymis corporibus id est malo humore possessis.

est iterum aliud genus scrofarum minime adhaerens sed magis sub cute natans et plurima natione pullulans sicut genus porcorum, unde iterum scrofae nomen ac-⁵ ceperunt. nascuntur ut supra dictum est glandulosis in locis, ut in gutture vel sub ala aut in inguine, et sunt sive chirurgia sive medicamentis curatione faciles.

propter ea curationis tempore dialon medicamentum inferius suo loco conscriptum appones. novit enim scrofas¹⁰ solvere et in humore purulento conversas per poros cutis desiccare. aut certe meline Vespasiani appellatum appones, et cum videris supra dictas scrofas in saniolam converti, chirurgia uteris et secundum rationem curabis, quod Graeci cata logon vocant.¹⁵

XXVII. Ad steatomata.

Steatomata dicuntur durities in similitudinem scrofarum emergentes paulo potiores et molliores, quae cum digito fuerint impressae cedunt ac resurgunt, adipis callosi qualitatem intra se continentes. unde ipso nomine²⁰

1 curationes diffict *g* (curaide[m] difficiles *c*), curatione difficiles *p*. cacochymis *g*, cacozimis *c*, cacocismis (—cisini ante corr.) *p*. 3 Est iterum (Ē iterū *g*, ubi e ex i corr. qui vult Ceterū) *gcp*. minime: nole (nomine) *c*. adherentes . . . natantes . . . pululantes (pululacione pullulantes *c*!) *gc*, —tium semper *p*. 4 natione *gc*: variatione *p*. 5 scrof nomen *g*, nomen scrofas *c*, nomen scrofe *p*. 7 in inguine *c* (in om. *gp*). 8 curationes *p* (—ne *gc*). 9 dialoon *gc*, dialeō *p* (cf. *c*. 21). 10 scrof *g*. 11 z et in h. *g*. in humore purulento conversas (conversos *c*, converso *p*) *gcp*. 12 meline *gc* (moline *p*). 13 saniolam *gc*, —las *p*. 14 cirurrgia (sic) *g*. 15 cata-logon *gc*, catalōgo *p*. vocant *g*: appellant *cp*. 16 tit. Ad steathomata (steātomata *c*) *gc*, De duritie simili duritei scrofularum *p* (in ind. *capp*. Ad steatomas). 17 Steathomata *g*, Scearthomata *c* (item infra *p*. 44, 1). durities *g(cp)*. 19 impresse *g(p)*: expresse *c*.

steatomata vocantur. nam Graeci adipem stear dicunt. nascuntur frequenter in articularibus et nervosis locis vel muscularibus et cartilaginosis. et similiter ut scrofae curantur.

XXVIII. Ad aurium dolorem.

5 Aurium dolores efficiuntur ex antecedenti perfrictione ex frigido vento flante aut ex lavacris frigidis aut aqua in ipsa caverna auditoria irrudenti. aut ex tumore membranae supra dictae auditoriae cavernae aut sordiculae aut ventositate inclusa tumorem faciente aut sordiculae
10 vel purgamentorum obtrusione facta, cum exitum minime habuerit supra dicta ventositas, dolores efficiuntur.

curationis autem tempore in ipso initio doloris aliqua ex praedictis ad dolorem capitis superius scripta extrinsecus adhiberi sumenda mandamus, ea vero quae proprie in ipsis cavernis instillantur nunc dicemus.

ad dolorem aurium. gesentera id est vermiculos de arrugia aut araneas aut asellos quos Graeci oniscos dicunt — nascuntur in humectis locis hominum tactum

1 scear c. 3 cartilagiosis g. 4 tit. Ad aurium dolorem (doī g) gc, De dolore aurium p. 5—11 *dolorum causae* = Gal. (κατὰ τόπον) XII, 599 (unde *Pseudo-Gal. euporist* XIV, 330 cf. *Th. Prisc.* I, 7), 5 perfricatione p. 7 in ipsa caverna etc. (abl.) gcp. irrudenti g (—ti etiam cp). 8 fluenti gc, —te p. 9 sordida (pro —cla?) g, sorde c, sordides p (ex sordibus Petr.). 10 obtrusione g, —trusione p, ostrusione c (obstrusione Petr.). 12 aliqua cp: aliquam g. 13 scripta: scriptam g, dicta vel scripta (sic) c, scriptis p. 14 adhiberi sumenda (—dam g) sic gc (sumenda om. p). 15 in ipsis cavernis: sic gcp. dicimus cp. 16 ad (Ad c) d. aurium gc: om. p. *θηρόν δ γῆς ἐντέρον καλεῖται ex Apollonio Gal. XII, 649.* vermiculas g (—los cp). 17 arrugia gp (cf. *Plin.*): auringia c. oniscos g: aniscos p, oniscon c. 18 de oniscis in eodem argumento sic ex *Asclepiade Galenus* (XII, 634): *ζῶον δὲ ἐστὶ πολύπορον ἐν τοῖς ὑδατοῦσι ἀγγείοις* (cf. XII, 641 et 623 ex *Archigene* τοὺς ἐπὶ ταῖς ὑδρίαις ὄνους) καὶ ἐν ταῖς κοιλίαις γεννώμενον, κατὰ δὲ τὰς τῶν δακτύλων ἐπαφάς ἐσθαιρούμενον. 18 humidum tantum f. c (ut *Simon s. oniscute* humidum tamen f.).

fugientes ita ut se in spaerulas plicando convertant — in oleo coques et auribus infundes, et super vaporabis marsupio id est sacco torrido sale repleto, et iterum tepefactum medicamentum infundes, et lana munda ac molli⁵ ipsas cavernas blande obrudes.

aliud tumoribus conveniens. adipis anserini aut galinacei partes II, olei amygdalini ex amaris amygdalis expressi partem I in uno commiscebis et tepefactum instillabis, prae vaporatis partibus spongiis calidissimis ex aqua¹⁰ calida expressis atque alterna mutatione appositis. et postquam stillaveris, iterum super competenter vaporabis et molli lana sicuti supra diximus patientia loca tutabis. | *Anitur p. 205*
[oportet aegrotum inani masticatione os commovere et sic^{*suppl. I V} medicamentum in auribus accipere. ¹⁵

item aliud dia tessoron appellatum faciens ad tumores aurium, quos Graeci flegmones vocant: mel optimum, ysopi attici sucum, nardinum unguentum et amygdalinum pari pondere. uteris sicut supra. si vero incendiosus fuerit doloris sensus, et magis tempore aestatis et in²⁰ aetate ferventi, acetum rosaceo admixtum infundes.

1 sperulas (perulas c) gcp (Sim.). plicando g et Sim.
(politando c, aplicando p). 2 coq g. marsupio g: marsupis p, marsippia c (marsipū ex Cassio memorat Sim.). 3
et iterum ipso sacco (sic, om. tep.) med. inf. c. 7 adipē g,
— pes c. 9 commiscebis gcp. 10 ex cp: et g. 11 calida—
postquam in textu om. sed in inf. margine supplet g, notata
signo ~). 12 stillaver g (—veris cp). 13 sicut (sicuti c)
— tubabis (sic p, ut semper, mutabis c) cp: sic supra ipsas
cavernas blande obrudes g (qui eadem etiam quae supra verba
errare respiciens scripsit). deest in g finis cap. cum initio
sequentis. 14 (oportet) autem add. p. masticatione: mani-
festatione c, masticatione p. 15 movere (sic) p. 16
diatesaron cp. appellatum om. p. tumores: —rem cp.
17 quod (q) cp. flegmona c, fleimonas p. mel c: vel
(l) p. optimum p: aptum c. 18 atici cp. nardini . . .
amygdalini p. 19 paripondere c: paria pondera (—ris ante
ipsa corr.) p. 21 etate p: estate c. acetum (—to c)
rosaceo amixtum (amirto c) cp.

aliud ad tinnitus et ad obtrusiones, quas Graeci enfraxis vocant, et ad difficiles auditus et ad initia surditatis. nitrum et afronitrum aequali modo commiscebis et cum aceto acri et oleo veteri tepefactis infundes.

5 item ad vermiculos aurium forinsecus educendos. centauriae viridis aut marrubii aut absinthii viridis sucus infusus excludit vermiculos.

ad sordes aurium. nitrum aceto resolutum cum calida aqua per auliscum oticum inicies et deterges et sic
10 iterum instillabis.

ad aures saniola fluentes et humecta quoque universa trociscus Herae appellatus. recipit autem murrae croci 3 singulas, aluminis scissi 3 XII. colliges et uteris aliquando ex aceto aliquando vino austero.

15 ad tinnitus aurium et difficiles auditus. oleum rananinum cum aceto et nitro in uno commiscebis et fervefactis uteris.

aliud ad difficiles auditus et surditati conveniens. ellebori albi 3 I, afronitri 3 IS, castorei 3 IS, aceti
20 acrioris quod suffecerit.

1 et ad obtrusiones *p*: et obstrusiones (*om. ad*) *c*. q, *c*,
qs *p* (qs *p*^o). 2 anfraxis *c*, εἰσῆσι *p*. et *om. p*. et ad
initia surdita inicio nitri nitri et cofonitri *etc. c*. 3 afor-
nitrum (*sic*) *p*. commiscebis *cp*. 4 acro *c*. et (*ante* oleo)
om. p. 5 pmiclos (*sic*) *c* (vermes *Petr.*). 6 Centauree *cp*
(—rie *Petr.*). aut marubii (*p et Petr.*) *om. c*. 7 infusos
excludunt *p*. 9 pauliscū octiciū *p*, parauliscū octiciū *c*. et
deterges *om. c*. 11 saniolam *c*, saniem *p*. q, *cp*. uni-
versa *c*: *om. p*. 12 here *p*, (Trocisci) uere *c*. R (aūt
add. c) mirte (mre *p*) *cp* (myrrae = μυρρῆς *legendum esse*
collatus Galenus docet XII, 610. 628 sqq.). 13 3 singulas *c*:
aū . 3 . I . *p*. 3 VII *c*, 3 XII *p*. colligi (—gī = gitor *p*^o)
vino austino (—trino). vel aceto. et uteris *p*, colligis vino
austero (er *in ras.*) et uteris aliquando ex aceto aliquando
vino austero *c*. 16 (et *p*) in uno (cō — *c*) miscebis *cp*. 18
et surditati *om. c*. 19 3 I . S . *p*: II 3 | (*in fine versus*) *c*.
20 acenoris (*sic*) q. s. *c*. sufficit *c*, sufficit (cerit) *p*.

ad difficiles auditus ex aegritudine natos. leporis fel et lac mulieris et mel optimum, omnia tria in uno consolves et tepefacta instillabis.

aliud dia tessaron appellatum, id est de quattuor, adversus tumores et dolores et ulcerationi conveniens. resinae terebintinae, butyri, adipis gallinacei, olei amygdalini, omnium quattuor paria pondera in uno consolves et uteris.

alia auricularis sive ut Graeci otice adversus dolores et ulcera et veteres aurium passiones. recipit opii, castorei, aloes 3 singulas, croci 3 II, murrae, lycii indici 3 singulas semis. bene conteres et melle colliges, et in usu accipies ex ipso medicamento modicum resolutum passo. ex oleo rosaceo stillabis et lana muricea vel purpurea loca tutabis. aliqui lacte resolvunt muliebri. ad difficiles vero auditus et tinnitus multi temporis cum aceto salito infundes, quod Graeci oxalmen vocant. et cum oleo rasanino et aceto uteris.

XXVIII. Ad oculorum passiones.

Hippocrates in aforismis sic ait: oculorum passiones

2 et (bis) om. p. omnia tria c: hec ita p. unū c, uno p. 3 tepefactis stillabis cp. 4 i. de III. (sic) c: om. p. adversus c: ad p. 5 resina terebentina. butirum. adipē gallinaciū. oleū amigdalīnū c. 7 omī quatuor c: om. p. uno cp. 8 aliud auriculare p. ut greci p: grece (om. ut) c. oticen (otacē, sed ante corr. otoč p) cp. adversus c: ad p. 9 recipit: R cp. opii (cf. Gal. XII, 626 sqq.): apii p, om. c. 10 aloes c: aloē (ante corr. aloen) p. 11 3 singulas semis | lenius et melle colligis (sic mediis om.) c. 3 singulas c: añ. 3 I. p. č. 3. II. mrei alitii. indicii (cf. Gal. XII, 636 etc.). añ. 3 I. S. bene conteres. et melle colligis p. 12 usum c. ex: et cp. 13 roseo c. muricea?: marina (marīa p) cp. de purpura c, aut purpura p. 14 tutabis: tudabis c, tubabis p (cf. Gal. XII, 632 ἐπὶ δὲ τῆς χορήσεως μετὰ ῥοδίνου ἐνσταξε καὶ κρονύδα ἐντίθει πορφυρεῶν). resolvunt muliebri c: mulieris resolvunt p. 16 sallito p. greci c: om. p. oxalmē p: examel c. 18 tit. De doloribus oculorum p (Ad oculorum dolorem ind. p). 19 ypocrates cp (Hipp. III, 753 Lips.). amforismis c.

meracae potiones aut lavacrum aut vaporatio aut flebotomia aut catharticum datum quod farmacian appellant solvit. sed omnia haec quinque secundum expositionem Magni iatrosophistae supra memoratus senior Hippocrates cum discretione adhibere praecepit, et si fuerit dolor ex plenitudine sanguinis, flebotomia aut cathartico detractatione facta curare, sin vero ex siccitate fuerit dolor, lavacro et vaporatione humectatos sanare, sin vero ex perfrictione et humectatione fuerit dolor, meraca potione calefactos mederi. vinum namque calefacit et desiccatur. secundum varia tempora passionum omnia adhiberi praecepta sunt. in ipsis initiiis abstinentiam cibi vel ieiunium oportet imperare, in augmento vero tertia vel quarta die flebotomia vel cathartico operari, declinatione vero facta, lavacro uti. haec sunt quae secundum aforismos id est definitionis eloquentiam oculorum doloribus posita esse noscuntur.

nunc vero qualiter proprie ipsis oculis passiones contingant scribamus. aliquando cum ingenti fervore dolores efficiuntur, aliquando cum perfrictione et torpore sensus,]

1 merate passiones *c*, meri potiones *p*. lava² *c*, lavacri *p*. aut — solvet (*sic*) *c*: aut farmacia solvit (*cet. om.*) *p*.
2 farmacia *c*. 3 V. *cp*. 4 magni hyatro sophiste *c*, magni (mag¹) hiatus sophiste *p*. supra *om.* *c*. memorato *c*.
hypo¹ *c*, ypocras *p*. 5 cum *om.* *c*. adhiberi *c* (—re *p*).
ut si *cp*. 7 detractatione *p*. factam *c*. Sin *c*: Si *p*.
ex *om.* *cp*. 8 humectatis *c*. Sin *c*: Si *p*. 9 perfricatione
cp (i. frigore *add. p*, non *c*). meraca *c* (menta *Petr. c. 19*):
meri *p*. 10 vinum — adhiberi *p*: *om.* *c*. namque: nāz *p*.
12 abstinentia *c*. vel ieiunium *c*: *om.* *p*. 13 flebotomiam *p*.
14 vel *c*: aut *p*. catartica (*sic*) *p*, —cum *c*. operari *p*:
—re *c*. in decl. *p* (in *om.* *c*). facta *om.* *p*. 15 diffinitionis *p*.
16 nascuntur *cp*. 18 passionis contingat *c*,
passiones contingunt *p*. 19 Aliquando *etc.* (*nisi quod perfricatione et corpore*) *c*: Dolores efficiuntur (*hic corr. marg.*
aliquando) cum ingenti fervere (*sic*). aliquando cum fricatione et torpore.

quem Graeci narcen tes esteseos vocant, aliquando cum ^{inc.} tumore et aliquando sine tumore, aliquando cum largo ^{p. 206} reumatis incurso et aliquando cum gravedine et dolore, aliquando autem praeter ipsa.

in curationibus vero si modicum fervida fuerit oculorum perturbatio, posca tepida fomentabis. si vero ex perfrictione fuerit perturbatio, penicillis prius calidis ex vino mixto albo alterna mutatione vaporabis. sin vero maior fuerit dolor cum ingenti tumore et gravedine, et si in fronte plenae ac distentae apparuerint venae, de-¹⁰ tractio sanguinis per flebotomiam fieri oportet, si tamen alii humores non impederint augmento facto per aliquam obtrusionem interioris membri. quod si hoc contigerit, cathartico dato ventrem purgabis. utendum etiam in ipsis oculis liquidis infusionibus ex faeni graeci suco lenius con-¹⁵ fectis. bene autem fit si faenum graecum aqua dulci primo lavetur, ut terrosa careat qualitate. et postquam fuerit lotum modicum coques, ut omnem acredinem ex se dimittat, et secunda aqua iterum coques defusa priori. et cum videris sucum venire in similitudinem vini, liqua-²⁰

1 *Hic cum initio p. 206 rursus incipit g, sic (rubr.)* Ad oculorum dof. Oculorum dolor est quem greci narcodes esteseos vocant. et fit aliquando cum tumore etc. quem: q (quod) cp. narcodes esteseos p, narcodes esteseos c. 2 et c: om. gp. 3 reumatis incurso c: reumatismi cursu g, reumatismi vel (l') cursu sensu (sic) p (reumatismum recepit etiam Petr.). et gc: om. p. 4 autem g: om. cp. ipsam p. 5 modicum fervida: modica ifervida c, modica et f. gp. 6 tepida gc: fetida p (sed in marg. idem: frigida credo!). 7 perfrictione gc: — catione p. 8 Sin gc: Si p. 10 appuer (sic) g (apparuerint cp). detractio cp. 13 contiger g (— rit cp). 14 in addidi. ipsis oculis (om. in) gc: ad oculos p. 15 levius c. 16 fenigrecum (sic g, fenu— p) aqua gp, fenug' cu aliqua c. 17 ut — qualitate g (cu cerosa careat calitate c); ut omnino terra careat p. 18 (et 19) coq g (coques c, coqs p). 19 dimittat gc: deponat p. priori: sic gcp. 20 vider g (— ris cp).

bis et uteris. etenim tumores digerit et sordida quaeque depurgat et humorem asperum lenificat. utile est etiam et ovi album et tenue tepefactum iugiter infundere, et lac muliebre. est namque bonus humor lac quod Graeci
 5 euchymon vocant, <et> valet e contrario acredinem mali humoris obdulcare: sic omnia contraria contrariis sibi rebus curantur. sed oportet primo sine ulla oppressione egestionem sive pituitas oculorum, quas Graeci lemas
 vocant, molli penicillo detrahare ex aqua calida expresso
 10 et diligenter vaporare. et si cum omnibus fuerit capitis gravedo, cucurbitam occipitio praeraso figens addita scarificatione competentem sanguinem detrahes.

cataplasma faciens ad tumorem oculorum et chemosis et proptosis. appellatur autem chemosis quotiens in ipsa
 15 ceratoide tunica apparuerit rubicundus et carnosus tumor, proptosis vero est oculorum ex nimio tumore prominens casus, ut etiam difficile palpebris contegantur. recipit autem castorei et croci dr singulas, opii obolum unum aut II, ovorum assorum vitella V, panis mundi micarum
 20 2. III. cum dulcore et modico rosaceo colliges et cataplasmas.

1 diger (-rit cp) . . . depurgant (-gat cp) . . . lenific (-cat cp) g. 3 infund g (-dere cp). 4 muliebre (vel asine add. corr. marg. p). bonus humor (sic, cf. Sim.) gc (et lac m. quod boni humoris est quod Gr. etc.) p. 5 euchymon g, eupinō c, euximo p. et addidi. 6 Sic omnia g: Sic enim omnia c, Sicut enim omnia p. 8 lemas g: lenas c, lēnas p (cf. Simon Jan. s. lēma, lemi, lēnas). 10 sicū om(1a) g (si cum omnibus cp). 11 occipito g. figens: figes gp, fige c. et addita p. scarificatione g: -ficatione cp. 13 fac g: facies cp. tumorem g: -res cp. chemosis g: temosis c, themosin p. 14 proptosis g, proptosis c, protosin p. chemosis gp, themosis c. 15 cerato id unica (= ceratoidestunica) g, cerato .i. tunica c (chemosciscerato i. tunica appar. p). 16 Proptosis g, proptosis c, protosys p. Rec autem g: R hec c, R p. 18 castorei cc añ. 3 I p. 20 L III g: 3 III cp. collig g (-ge c, -gis p).

utendum etiam et fomento ex decoctione meliloti et rosae siccae: partes singulas mittes et faeni graeci dimidiam partem, decoques in aqua et fomentabis. facit ad reumatismum et ad minorem lippitudinem. aliquando ex ipsa calida penicillo expresso vaporabis. 5

nec non etiam et collyrio libiano uteris. facit ad tumorem oculorum et chemosis et proptosis, et minutis vesiculis, et sordida ulcera bene purgat et concava supplet aquatius infusum. convenit et doloribus et superadustionibus et diruptionibus et stafylomatibus. bothria etiam 10 ulcera id est fossulas et hypopyos oculos sanat. ulcera etiam difficile in cicatricem venientia, quae dysapulota vocant, optime in cicatricem ducit, et minores cicatrices cum aqua inunctum detergit. et facit aliquando cum ovo et lacte, aliquando cum ovo et faeni graeci suco, aliquando cum aqua ut supra diximus inungitur. recipit 15 autem cadmiae combustae et lotae, cerussae tritae et in testa nova assatae et diligenter lotae dr̄ octonas, amyli

1 fomentū *g* (—tum *c*, —to *p*). 2 mittes *gcp*. 3 decoq̄ *g* (—ques *cp*). 6 libiano *gc*, libano *p*. 7 tumores *cp*. chemosis *gc*: —sin *p*. proptosis *g* (prothosis *c*): protosin *p*. 8 vessiculis *g*. purḡ *g*. suppleta. q̄tius (*sic*) *g* (suplet aquacius *c*, suplet q̄tius *p*). 10 Botria *gcp*. cf. Simon Jan. s. botrion et s. ulcus. 11 hi(y)popios *g(p)*, ippopios *c* (ἵππο-πύπος ὀφθαλμούς Gal. XII, 758). 12 desapiolita *g*, dis(s)apoluta *cp* (δυσσάπλυτα). 14 deterget *gc*, —ges *p* (—ḡ *p*^e). aliquando — (15) lacte (*cp*) om. *g*. 16 inungitur *c*, —gitar *gp*. inungitur. S. rec̄. añ. (*sic*) *g* (R̄ autem *c*). sic autem *p*: R̄ collirium libanum quod reperitur. Idem reperitur infra hoc eodem capitulo infra hoc eodem capitulo (iterata linea subducta deletit corr.) libanum cat(hmie) combuste et lote. ceruse trite et in testa nova etc. (cum aliis notulis duobus ad v. cadmie et ceruse). ceterum hoc idem Libianum (Livianum) graece legitur apud Galenum XII, 762. 17 accusativos (*specierum*) habet *g* (non *cp*): cāmā . . . cerussam . . . amilū (*sic*) recens. stibeum . . . plumbum etc. 18 dr̄ VIII. *g*, dr̄ ortenas (*sic*) *c*, añ. 3 VIII *p*.

recentis, stibeos combusti d̄r senas, plumbi combusti et loti, pomfolygis lotae, draganti, ges asteros tritae assatae et lotae, cummi candidi, omnium specierum quinque d̄r quaternas, murrae bonae, opii d̄r singulas. aqua imbrili
5 id est caelesti colligitur.

collyrium apocrusticum Hermolaou staticon appellatum faciens inter initia ad reumata repellenda et desiccanda et ad alia multa. cadmiaē crudae et lotae, murrae, aloes, croci, omnium IIII d̄r octonas, aeris usti et opii d̄r quaternas, | acaciae rufae et cummi d̄r vicenas, aquae caelestis
p. 207 quod suffecerit.

collyrium dia rodon de septuaginta duabus, quod Graeci diebdomecontadyo appellant, si quidem in ponderibus ut supra dictum est sive in rosa seu in aliis
15 speciebus LXX et II drachmis concludatur. facit ad xer-

1 stibeos: stibeum *g*, iscubii *c*, itube *p*. d̄r senas *g* (*om. c*). añ. ÷ VI *p*. 2 pōfoliga lota *g*, pāpoligi lote *c*, pōpolige lote *p*. dragantū. gesasterā (Geres tere *c*, gess astere *p*) tritā etc. *g*. ges asteros: *i. e. terrae samiae cf. Diosc. 5, 171.* 3 lotam. 3/4. cuminum . . . sic *g* (signum illud *om. cp*). cummi: cuminum *g*, cimini *p*, Cīrū (sic) *c*. o. sp. quinque *c*, V *g* (*om. p*). d̄rg — quaternas *g* (*om. c*): añ. 3 IIII. *p*. 4 Myrrē *g*, Mirre *p*. d̄rg (d̄r *c*) singulas *gc*: añ. 3 I. *p*. imbrili (umbrili *p*): *cf. ὕδωρ ὑμβρίων Gal.* 5 i. celesti (*g* et corrupte *c*, ubi i bribile cede fucolli colligitur) *om. p*. 6 apocrusticum hermolaon staticon (sic) *gc* (hēmola honstaticō *p*). habet Aetius 7, 102. 7 ad int̄ inicia *gc* (*om. p*). *cf. πρὸς ἀρχὰς Gal.* reuma *gcp*. 8 Cāmia etc. *g* (*genit. habent cp*). Myrra *g*, mirre *p*, mirte *c*. aloen (sic) *gcp*. 9 omnium IIII *g*: *om. cp*. d̄rg (d̄r *c*) octe(o *g*^o)nas *gc*, añ. 3 VIII. *p*. esustum . et opium *g* (*genit. cp*). añ. 3 IIII. *p*. 10 Agaciē *g*, Acatie *cp*. cumini *g*, cimini *p* (erui *c*). bīenas *g* (añ. 3. XX. *p*). aqua celesti *gc* (aque celestis *p*). 11 sufficit *c* (*cf. c. 28*). 12 *cf. διὰ ῥόδων Galeni XII, 767 et Aetii 7, 108.* duabus *cp*: II. *g*. quod: quas *gcp*. 13 diebtomē ctadio *g*, dielepdonie cantadio *c*, die hedome contadio *p*. si quidem sive i. *p. gp*, siquidem paciatur i. *p. c* (sive *omiss*). imponderibus (sic) *g*. 15 septuaginta et duobus *c*, s. duabus *p*. dragmis *cp*, d̄rg *g*. ad exero obtal-
mia *g*, ad exoro optalinam *c*, ad obtalmias *p*.

ophthalmiam id est siccam lippitudinem et ad pruritus
maiorum angulorum, etiam et cicatrices blande detergit.
recipit autem cadmiae crudae et cummi dr quaternas,
croci dr VI, murrae et spicae indicae dr quaternas,
stibeos et opii dr quaternas, rosae viridis foliorum dr 5
LXXII. aqua imbrili colligitur.

collyrium dia libanu faciens ad supplenda in oculis
ulcera concava. recipit turis masculi et cadmiae dr qua-
ternas, opii dr VI, draganti dr II, cummi dr octo, aquae
imbrilis quod suffecerit. 10

aliqui vero in hac collyrii confectione colorem album
affectantes cerussam minime comburunt, ignorantes quia
si igne caruerit, lanuginositatem quam in se detinet
habens, sordidat ulcera potius quam depurget.

collyrium Zoili nardinum a Graecis appellatum, con- 15
veniens vetustissimis oculorum passionibus. facit ad reuma
tenue diuturni temporis et debilitatem oculorum mirifice
confortat. recipit cadmiae botryitidis lotae et aeris usti

2 deterget *g* (—gat *c*, —gt *p*). 3 Reç *g* (Rç *cp*). autem
gc: om. p. cadmiam . . . ciminū (sic cimini *p*, etemi *c*) . . .
croci . . . mirra . . . spica . . . stibeos et opiū . . . rosę *g* (geni-
tivos semper habent *cp*). drę (sic *g*, dr *c*, ut supra 52, 9. 10
et in v. seqq.) quaternas *gc: an. 3 VIII. p.* 5 drę IIII (pro
ternas
IIII, ut supra v. 4) *g*, dr quaternas *c: an. 3. IIII p.* 6 um-
brili (item infra semper) *p.* 7 dia(o *cp*)libanum *gcp* (cf. Gal.
XII, 770). in oculi sic *g* (—lis *cp*). 8 reç *g*, Rç *cp*.
turis . . . cadmia . . . opiū . . . draganti . . . ciminū *g.* dr
quaternas *c*, drę IIII. *g: an. 3 IIII p.* 9 cummi: ciminū *g*,
cimini *c*, cimini *p.* octo *g*, VIII *c*, III (sic) *p.* aqua
im(n *c*)brili *gc* (aque umbril' *p*). 10 suffecerit *p: sufficę gc.*
11 hac *gp: huius c* (sed cf. supra p. 51, 17). colorem etc.
cf. Gal. XIII, 409. 12 minute commiscent *p* (minime
cōmīrūt sic *c*). 13 caruerit *cp*, —runt *g.* d. nō habens *c.*
14 s. potius ulcera *cp.* depurget (sic) *g(cp)*. 15 cf. Zoili
coll. ap. Gal. XII, 771. appellatur (sic) *gcp.* 16 reumam
tenuem *g.* 18 Reç *g*, Rç *cp* (et sic semper). cadmiam
botriden (botriten *c*, —te *p* cf. Gal. XII, 220). lotę et exustum
(eris usti *cp*) lotum drę. *g.*

loti d̄r denas senas, cummi albi, acaciae, stibeos d̄r quadragenas, murrae, croci folii, castorii, opii, chalciteos semiassae d̄r binas, aloes et spicae indicae d̄r singulas, cerussae torrefactae et lotae d̄r VIII, aquae imbrilis quod

suffecerit.

cataplasma conveniens oculis ulceratis et tumentibus et proptosi periclitantibus et iugiter dolentibus. melilotum atticum tunsum et in passo coctum teres diligenter et supermittes ovi assi vitellum I et acaciae nigellae modicum, et cataplasma leviter. aliqui et opium.

anacollemma ad reuma. crocomagma, opium, rosam siccam, acaciam ex aequali modo acri aceto teres. cum inpinguaverit, inlines frontem.

collyrium cyncos a Graecis appellatum. facit ad
15 ulcera universa et bothrion dolores etiam mitigat et hypopya sanat. recipit cadmia combustae et lotae d̄r XXXII, cerussae combustae et lotae d̄r XVI, amyli recentis, opii, draganti, omnium trium d̄r octonas, acaciae suci et cummi d̄r quaternas, aquae imbrilis quod suffecerit.

1 añ. 3. LX. p. cummi: cimini gp, comini c. acacia g. añ. 3. XL. p (quaternas c). 2 mirrē. crocū (cc cp). castoreū (—rii c, —rei p). foliū (—ii cp, cf. Gal.). opiū (—ii cp). calciten g. 3 añ. 3 II. d̄r singulas c: om. g, añ. 3. I. p. 4 aqua (atque p) imbrili gc. 5 suffecerit gp: sufficit c. *sequitur in p(c)* Confectio collirii libani prima et simplicissima. catmie combustae (et c) lote. ci(o c)mini ambarum specierum d̄r quinas (añ. 3. V p). ges astereos torrefacte et lote d̄r. VI. ceruse torrefacte et lote. stibeos combusti (et c) loti d̄r. quaternas (añ. 3. III. p). opii (3. p) I. aqua(e p) i(u p)imbrili(s p) quod sufficit. cf. *supra not. cod. p ad p. 51, 16.* 7 proptosis g, prothosi cp. 9 acacia nigella p. 11 anacolina c, ana colli ema (sic) p. crocum (—co c) magma g. rosa sicca. acacia g. 12 acro g. 13 inpinguaver g (—verit c). 14 eygnos g (cignos c, cigues p) cf. *κύνος Gal. XII, 759.* 15 botrion g (p^o, om. c) = *βοθρίων*. hipopia g (ippopia c, ypopia p, *ὑπόπια Gal.*) 17 amili gcp. 18 tracanti c. d̄r octenas c, d̄r VIII g: añ. 3. VIII (om. omnium trium) p. cimini gp, cumi c. 19 añ 3 IIII. aqua (aque cp) im- q(c, umbril' p). sufficit (sufficē) gcp.

Ad trachomata id est asperitates palpebrarum et ad sycosin, quam nos ficitatem dicimus, siquidem similis granis fici in palpebris versatis asperitas reperiatur. in curationibus vero pumice aut osso sepieae molli hoc est detracto cortice, et diligenter formato versatoque palpebro, 5 easdem asperitates sufficienter fricabis donec sanguinentur, tunc penicillo posca frigida expresso diligenter deterges vel desiccabis. post haec et collyrio trachomatico uteris, quod appellant paedicon id est puerile, siquidem et infantibus conveniat. ad reumata et trachomata bene facit, 10 si cum aqua resolves et crassius sub palpebro inungues sive sub ciliis, quod Graeci ex hypoboles vocant. miraberis hoc factum. recipit autem cadmiae purgatae dr̄ XXIII, chalciteos combustae donec rubea efficiatur dr̄ XII, opii et aeris usti dr̄ IIII, cummi dr̄ X, aquae caelestis 15 quod suffecerit.

ad eos quibus calx viva in oculis ceciderit. quoniam si aqua foveas magis incenduntur, ideo oleum rosaceum cum ovi albo et tenui commiscebis et oculis iugiter infundes. dehinc post unum vel duos | dies libiano collyrio, p. 208

1 trachomata (*sic*) *gc* (draconata *p*). 2 ficitatem *g*: sicitatem *c*, siccitatem *p*. 3 fici *gp*: sici *c*. reperiatur *gc*: —ritur *p*. 4 pomice *g*. osso *gc*: osse *p*. 5 palpebro *gp* (versatisque celebris palpebris *c*). 6 sanguinetur *cp*. 9 pedicon *gc* (pēdicō *p*). *cf. παιδῖκόν al. ap. Gal. XII, 770.* puerilem *gc* (—le *p*). 10 conveniat *gc*: —nit *p*. reuma *gcp*. 11 resolves *gp* (*om. c*). palpebro *g*, —bris *c*, —bra *p*. inungues sive subciliis *c*: inunge assidue subciliis *g*, inungas sive(suū) subtiles *p*. 12 quod *cp*: quos *g*. exhipoboles *g*, exi pō bolos *c*, exipobolos *p*. mirab *g* (mirabil' *p*). *item infra p. 56, 2.* 13 cadmiam purgatam *g*. 14 calciten cōbustū *g*, calcideos cū usu *c*, calcitē cōbusti *p*. rubea *c*: rubeum *g*, subrubeum *p*. 15 opium et esustum *g*. cimum *g*, cumini *c*, cimini *p*. aqua celesti *g*. 16 suffecer *g*, sufficē *c*, sufficit *p*. 17 in oculis *gcp*. quoniam si . . . Ideoque oleum *gcp* (*omisi* que). 19 albumine *c*. tenue *gc* (—i *p*). commisceas *gcp*. infund *g*.

si forte aliquid laesum erit, in cicatricem duces, et miraberis hoc facto.

collyrium dia leucoiu appellatum, id est de viola, confectione facillima facit ad albore et cicatrices extenuandas. recipit violae hortinae florum viridium, cummi albi dr̄ octonas, ammoniaci dr̄ IIII. teres cummi, et ammoniacum prae manibus habebis, tunc flores virides pensabis et teres diligenter, et supermittes supradictas species, et iterum simul teres ut sibi bene counentur, et facies collyria. in usu autem ad minores cicatrices admixto libiano inungues.

collyrium dia ceratos elafiu appellatum, id est de cornu cervino, ad albore et cicatrices extenuandas. recipit cornu cervini combusti et loti 2 I, aeruginis 2 I, ammoniaci 2 I, sepiarum testae mollis detracto cortice 2 II, plumbi mundissimi 2 VI, opii 2 III, murræ 2 IIII, cummi dr̄ IIII. vino veteri optimo colligitur.

xerocollyrium acuens visum, quod Graeci oxydercicon vocant. facit et ad amblyopiam id est obtunsionem visus et ad xerophthalmiam id est siccam lippitudinem, et

1 leseŕ g, leserit c, lesit p. duĉ g, —cis p (dulĉ c).
mirab g (mirabeis c, mirabil' p). 2 facto: factum (fctm c) gcp.
3 dialeuco | hui (hia corr.) g, dialeuco hui c, dialĉto hui | p.
viole g, viole c, viol' p. 4 facillime g(cp). extenuand g
(—das cp). 5 reĉ g, R cp. ortine g: ortice cp. flor
virid g (—ris —dis p, —ris —de c). cimini gp, et cumini c.
6 dr̄g VIII g, dr̄ octenas c: aũ. 3 VIII p. amoniaci gc (ar-
moniaci p). ciminum gp, et cumini c. 7 pensas gcp.
8 pre(p)dictas c. 9 cohonentur g: coadunantur p (ut bene
commisceantur c). facis (faĉ c) gcp. 10 inunges gp
(unges c). 11 elafu: helafu g, ellafui c, elephiĩ p (de tali-
bus cf. Gal. XII, 762). 12 f g, R cp. 13 cornu cervinum
(—ni p) gcp. 14 a(r p)moniaci gc (sic semper). a. dragma
una c. teste mollis c: testa mollia g, testarum mollium p.
15 2 III. g: om. p, dr̄ 3 VI c. mirra g (mire c, mirre p).
16 cumi (hic primum) g: cimini cp. 17 oxidorcicon g,
exhdorcicon c, exidocicon p. 18 ambliopia g, āpliopiā c,
ambliopica p. 19 xerotalmia g, yerotalmia c, serotalma p.
i. (id est) p: 7 (et) c, om. g.

oculis lacrimosis, et pterygia mitiora et rubicunda attenuat. cadmia crude et lotae dr̄ XX, salis ammoniaci dr̄ X, aloes dr̄ II S, piperis albi, faecis vini 2 quinas, sandaracae 2 II, folii ὧ I S, nitri siliquas quattuor semis. tundes, cernes et diligenter teres usque ad ultimam lenitatem.

hygrocollyrium acuens obtusum visum. convenit maxime illis quibus suffusio imminere monstratur praeter dolorem capitis. sin vero ex antecedenti dolore totius capitis vel emicranii nata fuerit suffusio, omnino incurabilis nuntiatur. et nominatur talis suffusio platycoriosis id est dilatatio pupulae. ergo confectio medicamenti talis est. mellis attici, fellis beluae, radicum feniculi corticis suci, olei veteris paria pondera. si vero mel atticum non inveneris, stillaticium mittes et uteris.

fomentum oculis acuens visum, quod Graeci oxy-

1 ptorrigia g, ptorigi c, prorigiā p. mitiora g: minora c, mora p. adtenuat g. 2 Cadmia g (R cadmia c), camie (corr. catimie) p. 3 aloen gc, aloe p. Piper album g. feces gc (—cis p). añ. 3 V p. Sandaraca... foliū... nitri. siliquas g. 4 foliū g: folii p, follei c (cf. Gal. XII,

734 φύλλον). ὧ. I. S. gp, scrip. I. S. c. III semis g, IIII. S. cp. 7 Igro collirium gcp. 8 quibus fusio imminere g, quibus sususia minuere c, q. suffusio imminuere (corr. imminere) p. 9 antecedenti gp (Sin — capitis om. c). 10 emigranei g (—nii cp). 11 platyc(g p)oriosis (—sin c) gc. 12 papulę g, papule c, "1' pupille. "papule (ubi signa invertendi v. ordinis add. corr.) p (id est papule vel pupille ex gloss.). Ergo gc: om. p. 13 mel atticum g, mel atticum c, melatici (mel attici corr.) p. item v. 14. fel belue(g) gc, fel belue i. mustele (pr. m.) p. nimirum abesse videtur beluae nomen, cf. Med. Plin. (Rom.) I, 18. sed cf. Th. Prisc. I, 10 p. 12°... obscuritates expellimus. hoc belue fel mixtum melli facit. hoc succus rutae etc. radicem g, —cum c, —c p (cf. Gal. XII, 738 παραδρον χυλοῦ τῆς ἐλῆνης). sucum g, sucus c, suci p. 14 olei veteris cp. paria pondera gcp. 15 stillaticum gc, stillati p. mittis gcp. 16 oculis (ocul' c) gc, ad oculos p. oxidorcion g, oxidericon c, oxidoricon p.

dercicon vocant. feniculi hortini radices et centauriae partes binas, faeni graeci et meliloti partes singulas decoques et uteris.

anacollema ad reuma. acaciam nigellam teres et cernes, dehinc in usu cum ovi albo et tenui conteres et cum acri aceto temporibus oblinies. hieme vero addes murrae et mannae turis modicum et uteris sicut supra.

tricocollema capillis oculorum ligandis. picis siccae, cerae, mastices, resinae frixae, omnium IIII paria pondera in uno consolves ad vaporem et facies collyria oblonga.

ad hyposfagmata id est suffusionem sanguinis ex antecedenti percussu in oculis factam. convenit inter ipsa initia aqua salsa diligenter confecta ex infusione salis candidi. tenui linteolo subiecta lana vel moto tilto ligabis. novit enim talis suffusionis sanguinem ex percussu spargere.

aliud ad tumores et dolores et spargendum sanguinem. ovi album et tenue in ampulla minore adicies et super stillabis columbinum sufficientem sanguinem ex vena sub ala incisa, et commixtis ac leviter tepefactis infundes.

1 ortini *gp* (*om. c*). radices *gc*, rad' *p*. centauree(e) *gcp*. 4 anacollema *g* (*—colema cp*). acacia nigella *gc*. teris *gcp*. 5 in usum *gcp*. cum ovi albumine cont. *c*. conteris *g* (*—res cp*). et *p*: aut (aũ *g*) *gc*. 6 oblinies *gc* (*—nes p*). 8 Trico collima *g(c)*, t' (tri) collima *p* (*et in marg.*). Intelligo depilatorium cum siserepiis in circa instanti cum colofonio *i. e. in libro Platearii* Circa instans appellato). pice sicca cera. mastice (*—ce c*, *—c p*). resina frixa *g*. 10 uno *g*, unũ *c*, vino *p*. fač *gcp*. 11 hiposfaumata *g*, hiposcrumata *c*, yposfaũta *p*. 12 percussura *p*. 14 vel moto tilto ligabis (*cf. c. 19. 22*): et molli ligabis (*sic*) *gcp*. 15 talis suffusio sanguinis ex *p*. sp. *g*, talis suffusio ex *p*. sanguinem sp. *c*, talem infusionem sanguinis ex percussura sp. *p*. 17 tumor et dol' *g* (*—res cp*). 18 alb et ten' *g*. adicies *gp*, adicis *c*. 19 columbinum *g*: columbi *cp*. suffic' *g* (*—cientem cp*). 20 tepefa' *g* (*—factis cp*). infund' *g* (*—des cp*).

similiter facit singulariter et ovi columbini album et tenue in oculis infusum.

collyrium superinunctorium quod Graeci yperenchriston vocant. facit ad hypopia id est livores palpebrarum. | [ci-^{Anitur} cutae herbae suci dī VII, acaciae dī VI, croci dī II, ab-^{p. 208} sinthii suci et murrae dī singulas, opii scrip. II, cummi^{suppl. V.} dī III, aquae quod suffecerit.

XXX. Ad fluxum sanguinis ex naribus.

Sanguinis vero fluor parva destillatione per nares

1 singl g (singulariter cp). columb g (—bini p, —bi-
naciai c). 2 oculis gcp. 3 superinunctor g (—riū p).
quē g (q cp). ypere christon g, hypere(i p)eriston c(p). 4
fac gc (faciens p). ipopia gp (ipā c). hic finitur textus
simulque qualis per se olim fuit codicis Sangallensis (g) folium
ultimum in ultima pag. (208) usu detritum, vacuo quidem re-
lictio non nisi trium unius ultimae lineae quartarum spatio.
sequuntur duo folia (p. 209—12) formae paulo maioris ab ipso
Cassii codice non minus aliena quam qui ante Cassium (s. XI)
nunc habetur compactus Sulpicius Severus et forma et aetate
maior (s. IX). post palpebrarum sequuntur in Cantabrigiano
quae a Cassio videntur aliena esse sine interpunctione haec:
cicute . . . sufficit (huc usque etiam in Parisino). Ad oculorum
sanguinem. sucum rute cimini pulverem albumen ovi tem-
pera et superpone ad idem masticen fenugreci rose sicce ci-
marum rubi licii equalia pondera distempera cum aqua de
rosa fac magdaliones et sicca sub umbra postea tere et ipa
(ipopia) cum pulvere pel'e. Iterum guttis cerne tempera cum
melle et oleo et superpone. Ad oculorum maculis stercus
corvi aut fel miscum cum melle et sine fumo et in oculis
superpositum maculas citius sanat. Ad oculos qui non vident
pullos hyrundinis cum acu ciprina (cipna) in nidum suis cecabis
signabisque eos ut cognoscas et post quatuor dies cum vide-
rint | (f. 71) precidas eorum capita cum fici cultello quem re-
pones in ficu capita vero incedis et pulvere facto in oculis
stillabis protinus visum restituit. (Seq. cap. 30.) 5 cē c,
cē (i. e. cere pro cē = croci) p. 6 mire cp. añ. 3 I. p.
opii $\frac{3}{5}$ I (sic) p. cimini p, cimi c. 7 aqua c. suffic cp.
8 ex naribus c: om p (Ad narium sanguinis fluxum ind. p).
9 distillatione c (Petr.): destinationem p.

factus si forte in aegritudine acuta id est celeri motu
nata contigerit III. vel IIII. die, pessimam aegritudinem
et prolixam ostendit, quam Graeci macronosiam vocant,
aliquando vero et freneticam passionem denuntiat. si vero
5 in ipso initio aegritudinis supradictus sanguinis fluor
fuerit factus in iuvenibus vel plurimo sanguine naturaliter
abundantibus, quos polyemos vocant, et cum largo cursu
frequenter, bonam discussionem ostendit.

curationis autem tempore si ex proximis narium locis
10 et non de altitudine fuerit sanguinis fluxus, oportet in
principio simpliciter molli penicillo frigida aqua madefacto
circa maiores angulos oculorum exprimere. si vero de
altitudine manaverit sanguis, erit infrigidanda facies ex
aqua nimis frigida aut posca frigida. etiam et penicillos
15 frigidos posca leviter expressos fronti et naribus super-
proicies, et manuum ac pedum acra, id est summitates,
ligabis et narium cavernas molli linteolo diligenter ob-
trudes. quod si minime abstinerit sanguis, cubiculum in
quo immobiliter iaceant frigidum et planipedum et ob-
20 scurum procurabis. etiam manus et pedes frigida aqua
vel posca fomentabis et in ore similiter ut contineant
dabis. et si fuerit tempus veris vel aestatis, et ipsius
patientis aetas fuerit iuvenilis et febricula modicissima,

1 i. celeri acuto motu nata *p*, i. celeri mutata *c* (vel celeri
motu *Petr.*). 2 III. aut IIII. dies pessimas egritudines et
prolixas *c*. 3 macronosiam *c*, magnosiam *p*. 4 ali-
quando . . . denunciat *c* (cf. *Petr.*): *om. p*. 5 subditus *s*.
fl. *c*. f. factus fuerit *p* (*Petr.*). 6 in iuvenibus (in iuē-
tibus *c*) *Petr.*: iuvenibus (in *om.*) *p*. vel primum sanguinis
n. abundantis simus *c*. 7 pollienos *p*, poliemtas *c* (poliemos
Petr.). 9 proximis (*p*xis) *c* (*Petr.*): primis *p*. 10 sanguis
fuerit *f. p*, fuerit sanguis *f. c* (fuerit sanguinis fluor *Petr.*).
11 madefacta (*sic*) *c* (*Petr.*): infuso *p*. 12 m. oculorum an-
gulos *p* (*Petr.*). exprimere *p* (*Petr.*): *om. c*. 13 infrigi-
data *c*. 14 nimis (*n*is *c*) *Petr.*: urtas (*sic*) *p*. *p. n*is
frigida iterum *c*. 15 leniter *c*. super proicies *cp* (*p*icies
sic p). 17 obstrudes *c* (*Petr.*). 18 abstinerit *c*: restite-
rit *p*. 22 vel *p*, verni *c*.

etiam et caput frigida fomentabis, et lines frontem et nares et sub oculis gypso posca resoluta aut luto figulino, aut cocleas minutas cum sua testa et aloen aridam aut gluten taurinum aut ges entera id est vermiculos de arrugia admixta turis manna cum ovi albo et tenqi conteres et fronti et naribus superinduces. si vero permanserit sanguinis fluor, cucurbitam praeraso capite conglutinandam occipitio appones cum ingenti flamma et plurimo horarum tempore immorandam. quod si nec sic abstinerit, etiam et scarifabis. sic enim faciens sanguinis detractioe facta narium fluxum mederis.

aliud quod appellatur a Graecis dia sfongon ischemon id est ex spongia confectum retinens sanguinem, et conficitur sic. spongiam novam liquida pice infusam cacabo novo in furno combures addito cooperculo ex argilla. dehinc diligenter teres et naribus calamo insufflabis. sed oportet primo glebular sanguinis, quas Graeci thrombos appellant, per os depurgari ex melotide molli lana involuta et posca infusa, et sic medicamentum insufflare.

1 frigide c, —dis (frr^a) p. linis cp. 2 et sub oculis c: sub oculos (om. et) p. et resoluta c. 3 arida p, con(9)-tritas c. 4 gesenteria p, gescentero c. id — arrugia p: om. c. 6 inducis cp. 7 conglutinanda (sic) c (—do Petr.): om. p. 8 oppones c (Petr.). et cum c. flama c, flama (sic) p (flamine Petr.). et p (Petr.): in c. 9 horarum c (Petr.): om. p. Imoranda p: —da c, —do Petr. sic c: om. p (Petr.). 10 et c: om. p (Petr.). scarificabis cp. deinde sic c (cf. Petr.): Sic enim patientes sanguinis detractioe facta n. fl. mederi. p autem (om. primis verbis) sic: (scarificabis). facta narium (sic) detractioe fluxum narium mederis. ego ex Petr. scripsi faciens, ex p mederis. 12 diaffrōgos diemo i. expongia confectio c, diaffōgō thefmō (vel thefinō) confecto p. ubi sdiemo non est pro έβαινον (ut Gal. XII, 376) sed schemon, ut infra c. 38 et Sim. s. v. (diasfongos chemon). 14 sic om. c. cacabo — argilla (sic) c: cacabo infusam (sic iterum) et addita coperculo argilla circum linies. et in furno combures. (dehinc etc.) p. 17 trobos c, tumbos p (trumbos p^o). 18 os c: hos p. ex: et ex cp. melotida cp.

aliud optimum. ipsum sanguinem accipe et combure et facto pulvere nescienti naribus inice, si de dextra dextrae si de sinistra manet sinistrae.

aliud quod Galenus in sua therapeutice hoc est 5 libris curationum fieri praecepit. si de sinistra nare sanguis decurrerit, cucurbitam tenacissimam multa cum flamma spleni conglutinabis. si de dextra, epati similiter appones.

aliud si chronia fuerit passio id est longi temporis 10 et nimis aquosum et tenuem videris fieri sanguinem, si tamen solutio spontanea ventris minime obstiterit, catapotia Galeni superius in passione capitis scripta dabis, et humorem per ventrem purgabis, et sanabitur.

XXXI. Ad polypum et ozaenas.

15 Utrasque passiones, id est polypum et ozaenas quas nos fetores narium dicimus, communiter medicamentis de-

1 optimum *p*: om. *c* (cf. *Petr.* optime facis si . . . excipias). ipsum s. combure et facto pulvere naribus inice si dextra dextre si sinistra maneat sinistre *c*, ipsum s. accipere et comburere et ipsum pulverem naulcēta (*sic*, nesciente *Petr.*) naribus insuffla. si de sigistro (*sic*) in sigistro. si de dextro in dextro *p* (*similiter Petr.*). cf. *Th. Prisc. I*, 12. 4 (item 12) galieni *cp* (*Gal. X*, 316. cf. *XIV*, 338). in sua pedice tra *p*, in sua puericia therapeutice *c*. hoc est *c*: i. (id est) *p*. 5 sinistro *c*, sigistro *p*. 6 decurrerit (*sic*) *c*: cucurrerit *p*. 7 spleni *c*: spiē *p* (spl'ē *p*^o). dextro *c*, dextro *p*. similiter appones epati *p*. 9 Aliud si cronica *c*: Si cā *p* (*in marg.* Aliud si cā *p*^o). 10 nimis *p*: nimium *c*. aq. sanguinem et t. videris (om. fieri) *p*. Sit nō (*pro* si tm *p*) *c*. 11 inīē *p* (*in marg. p*^o: al. mīme = *c*). obstiterit *p*: abstinuerit *c*. cataputias . . . scriptas *cp* (dabis scriptas *c*). 13 humorem *p*: —res *c*. sanabitur *c*: sanabis *p*. 14 Ad polipum et ozernas *c*^m 31 *c* (*in ind. capp.* Ad pulippum et ozernas *p*): om. *p* (*qui prima textus verba* Utrasque — zernas rubricae. instar repetit) cf. *Gal. (eup.) XIV*, 336. *Th. Prisc. I*, 11. 15 uterque *c*. pulipum et zernas *p*, pulipis et ozerne *c*. 16 fetores *p*: fenrē (feterē) *c*.

siccatoriis capiti praeraso impositis curabis, ut est dia
iteon emplastrum, aut barbara, aut illud quod appellant
dia coclion id est ex cocleis et conficitur sic. murræ et
turis masculi uncias singulas, cocleas integras cum sua
testa numero V, ovorum albugines II: in girba contusis et
diligenter simul commixtis capiti ut supra dixi raso in-
lines et super linteolum impones, et sines medicamentum
manere diebus novem. et sic topicis medicamentis id est
localibus proprie ipsis in locis uteris. hoc est quod a
Graecis ozaenicon dicitur: recipit aluminis scissi murræ 10
sandaracæ, omnium trium dr̄ quaternas, aeris usti et
gallæ dr̄ singulas: diligenter tritis per calamum insufflabis,
prælotis vino bono naribus.

XXXII. Ad dentium dolorem.

Efficiantur dentium dolores sub aquoso et frigido 15
flegmate reumatizantibus gingivis, ut etiam ipsi dentes
cavernentur, maxime illi maiores vel molares qui quattuor
radicibus fixi esse noscuntur, quos Graeci tetrazizus vo-
cant, et putrefacti lividi et nigri et in parva frusta com-
minuti relictis radicibus expuantur aut certe ex ipsis 20
gingivis quibus continentur laxatis radicibus cadant.

1 ut est *p*: utere *c*. dia chiteon *c*, dialitcon *p*. 2
aut barbara — (3) cocleis et *om. c* (*qui deinde habet* Aliter
sic mirre . . .). 3 diacodion *p*. 4 untias *p*: $\frac{7}{8}$ *c*. 5
nũo *c*: *om. p*. in girba (guba *c*) contusis (—cussis *p*):
ὀλμονοπήσας Oribas. *exp.* 4, 46 = *Ps. Gal. XIV*, 336. 6
simul *om. c*. capiti *c*: apī *p* (*p*^o in marg. capī).
in(l)linis . . . Iponis . . . sinis *cp*. 8 novem *p*: IX *c*. 9
in *c*: *om. p* (*Petr.*). uteris. hoc est: sic *cp* (*et Petr. p.* 207
sup.). quod appellatur a gr. ozenicon *p*. 10 $\frac{1}{2}$ *cp*. et
mirre. et s. añ. 3. IIII. eris . . . *p*. 11 et *om. p*. 12
teres et per . . . *p*. 15 et frigido *p* (*Petr.*): *om.* (sub aquoso
ex flegmate) *c*. 17 cavernentur *c*, cavernantur (*sic*) *p* (*cf. Petr.*).
maiores (malores *ante corr. p*) vel *om. c*. 18 esse fixi n. *p*.
tetrazizus *c*, —zos *p*^o (tetricos *ante corr. p*). 19 et (putr.) *c*:
cum *p*. *p*. et lividi *p*. nigri in *p*. 20 expuantur *p*:
despuantur *c*. 21 cadunt *p*.

in curationibus vero si nimius fuerit dolor praeter putredinem gingivarum, oportet sacculis salis torrefacti loca quae dolores patiuntur extrinsecus vaporare. etiam et apoplegmatisimum masticatorium oportet adhibere, quem
5 Graeci masomenon vocant, et conficitur sic: stafisagriae et mastices et pyretri, omnium trium paria pondera in uno diligenter contundes, cerae modicum admiscebis et rotulas fines, quas Graeci trociscos vocant. ex quibus masticandos dabis, et inclinato capite humorem decurrere
10 dimittes.

aliud ad dentis dolores, enchyma id est infusio in nares. betae, et melius agrestis, radicis suco in naribus ipsius partis dolentis infuso dolores dentium solves. observandum praeterea ab omnibus frigidis. nam Hippo-
15 crates in aforismis sic ait, omne frigidum dentibus esse hostile sive inimicum, quod autem calidum amicum et delectabile.

fysicum ad dolorem malae, de Vindiciani Afri.

2 saculos (*sic*) salis *c*: solis (*sic*) sacculis *p*. 4 apopleg-
matissimum *p*. quem: quod *cp* (*cf. Th. Prisc. 1, 14*). 5
masomenon *p*, masum *c*. 6 et *om. p* (*bis*). mastice *c*, —ē *p*.
pyretri *cp*. omnium trium *c*: *om. p*. pondera cere *m*.
admiscebis et in vino diligenter contusis (*sic c*, commiscis *p*).
rotulas frigis (*sic p*, singulas *c*) quas. (*qs p*, *qs p*^o) *cp*. quae
crdine inverso correxi. 8 rotulas *cp*: —los *Petr*. ex *q*.
masticandum *c*, —dus (*d*^o) *p* (ad masticandum *Petr*). 10
dimittis *cp*. 11 aliud (*πρός ὀδονταλγίαν*): hoc Apollonii est
(*ex eupor. ap. Gal. XII, 865. cf. XIV, 356*). Aliud
dentis dolore endima *c*, Aliud ad dentium vel dentis dolores
onclima *p*. 12 nares: naris *c*, naribus *p* (*Simon s. v.*).
betae: Beta *c*, bece *p*. sucum (*ū*) . . . infusum *cp*. nari-
bus *c*: nares *p*. 13 solves (*λύσεις*): solvet *c*, —vit *p*. ob-
servandum *cp*: —do ante *corr. p*. 14 ypocrates in
aphorismis (*II add. p*) *cp*. citatur similiter a *Th. Prisc. 1, 14*.
15 esse dentibus *p*. 16 hostile sive *c*: *om. p*. et de-
lectabile *c*: *om. p*. 18 fisticum *cp* (*item infra*). mole *cp*.
deundiciani afri
d'undiciā . afri *p*, demiciā afri *c*.

salis grana mediocria numero III matutino tempore ante solis ortum dabis laboranti in ore continenda in ipsa parte in qua dolore pulsatur, donec paulatim defluant et cum defluerint humorem proiciant. etenim hoc adiuvamenti genus si frequenter fiat limositatem excludit et humores superfluos qui dolorem praestant depurgat.

aliud fysicum ad dolorem malae. caricam et sinapi teres et induces in panno et cubito alterius partis superimpones, id est si forte sinistra fuerit mala dextro, si dextra impones sinistro. 10

collutio, quam Graeci diaclysma vocant, faciens ad dentium dolores. gallas quassatas, taedae pinguis astellas minutatim incisas, iusquiami semen, alumen liparum simul decoques in vino veteri. iugiter dabis ut colluant, cautius vero ne quid ex isto liquore transvorandum existiment. 15 hoc autem non solum dolorem mitigat verum etiam agitantes dentes statuit vel confirmat. si vero taedam non inveneris, picis siccae modicum mittes et uteris.

aliud ad dentes agitantes ut statuas vel confirmes.

1 numero *c*: *om. p.* ante — parte *p*: *om. c* (*ubi tpr* in quo d. *p*). 3 in quo dolore *c*, in qua dolor *p*. defluat *p*. 4 proiciunt *p*. adiumenti *c*. 5 si *p*: *om. c*. liniositatem *c*. 6 humorem superfluum . . . prestat (*prat*) *p*. 7 ad *om. c*. mole iterum *cp* (*sed infra* 9 mala *cp*). caricac *c*. sinapi *p*, senapi *c*. 8 teres *p*: tres *c*. inducis in panno *cp*. alterius *p*: alicuius *c*. superinponis *p*, superponis *c*. 9 i. si *c*: i. n (ut) si *p*. s. mala fuerit *p*. dextro — sinistro *c*: dextro impones. si dextra in sinistro cubito ipones. 10 iponis *c*. 11 dialisma *c*, diaclima *p*. 12 dolore *c*. cassatas *c*. tede pinguis astellas minutas *p*, tedas pingues minutatim incisas *c*. 14 s. coques *p*. et iugiter colluant, cautius ne . . . *p*. 15 isto *p*: hoc *c*. transvorandum *c*: *transluciad* (*pro transglutendum?*) *p*. 16 autem *c*: enim (*è*, ante corr. *è*) *p*. h. e. dolorem non solum *m. p*. agitates *cp*. 17 statuet vel *c*, statuit et *p*. redam *p*. 18 pice sicce *c*, picis sicci *p*. mittis *p* (—tes *c*). 19 agitates *c*: agittatas *p* (—tatas *p*^o). statues vel *c*, statuas et *p*.

oleum myrtinum dabis colluendum et postquam dederis alumen scissum cum limatura corali tritum appones.

aliud ad dentes agitantes stringendos et gingivis implendos. gallae et acanthae aegyptiae ÷ singulas, corali
5 3 II in uno diligenter tundes et tenuissime tritis uteris.

aliud ad dentes ex percussu agitantes. lac asininum aut caprinum in collutione oris datum dentes agitantes statuit vel solidat, et ulceratas gingivas et oris vitia ex acredine humoris nata medetur.

10 dentifricium, quod Graeci odontotrimma vocant. gingivas turgidas sive sanguinolentas sine ulla vexatione desiccant, nigros dentes incandidat et ori fetido bonum odorem facit, dentes mobiles vel agitantes confirmat. recipit cornu cervini combusti et specularis assi uncias
15 binas, salis ammoniaci 3 I, mastices 3 I, aluminis lipari sicci et folii dr̄ quaternas. tundes et cernes, et uteris.

si vero cancerosa ulceratio fuerit gingivarum, quam Graeci carcinoden vocant, dentium nigredo vel livor ostenditur cum ulceratione putrida gingivarum ex supradictorum
20 dentium agitatione et oris putore, adiuncta corporis mala habitudine quam Graeci cachexian vocant. ob diligentiam

1 oleum — dederis a. c: oleo mirtino collues et collutis dentibus a. p. 2 (item 4) corali c, coralli p. 3 agitates c: agitata (sic) ante corr. p (—tātās p^o). stringendum et gingivas implendum c, et stringere et gingivis replere p. 4 agate cp. 5 i uio (vino) c. 6 percussura p. 7 in om. cp. collucōe horis c: collutionis oris p. 8 statuet vel c, statuit et p. 10 quod greci om. c. odōdotrina c, adōt mīta p. et ging. p. 11 sanguinosas p. d'latōe (vesatione corr.) p. 12 nigras c, ni. (sic) p. incandidat c: candidat p. 13 et dentes cp. 14 R cp. specularis assi (cf. c. 39): spedanasi c, spelā(-lar, spelā p^o pro splena?) assum p. 15 mastice c, —c p. alumen liparum sicco et folium 3 I (corr. III) p. 16 utere c. 17 Si cancerosa vero u. c. quod (q) c. 18 carcinode c, —don p. 20 pudore c, —rē p. adiecta p. 21 cacexiam cp.

vero curationis oportet leptospathio ferramento licinio involuto et moto tilto blande desecta detergere, et postquam deteriseris, vinum calefactum colluendum dabis, in quo ante fuerit decocta myrta sicca lenticula rosa rubi turiones virides, et in ipsa decoctione modicum mellis⁵ despumati admixtum, quod possit putredinem plurimum invadentem non solum tenere verum etiam purgare. et post collutionem adhibitam dia chartu siccum medicamentum appones diebus aliquantis, donec putredo gingivarum purgetur. et cum se humor in ore collegerit, blande erit¹⁰ despuendus. et cum videris gingivas bene purgatas, cephalico medicamento ad carnositatem uteris si forte minutam inveneris. dehinc etiam novissime in cicatricem duces sicco medicamento diostreon appellato.

est item aliud cancri dentis genus aetatibus brevissimis eveniens. emergit autem inter ipsa initia tumor quidam totius maxillae cum ingenti pallore ictericum morbum simulante, nam Graeci icteroden vocant, qui etiam et veluti venarum livorem in cute ostendat et

1 tempore post curationis *add. cp, quod omisi.* lecto
spacio *c*, lecto spatō *p.* lucinio (*sic*) *cp.* 2 moto tilto:
meli tincto *c*, molli moto (*corr. in marg. i. ticto*) *p.* de-
secta: desegtare (*sic*) *c*, *om. p.* 3 v. calidum *p.* ad ante
colluendum *add. p.* 4 decocta *p*: cocta *c.* mirta *p*:
mirra *c.* 6 dispumati *cp.* admisce *c*, amisce *p.* quo
p. c, q̄ ex *p. p.* plurimū (*sic adv.*) *cp.* 7 invadentem:
invadere (*sic*) *c*, *om. p.* purgari *c.* 8 collutiem *c*, col-
lutionem (*sic*) *p.* adhibita (*sic*) *c*: *om. p.* diacartum
(—tū) *cp.* 11 despuendas *c*, —d' (—dum) *p.* cephalico *p*:
foeliciū *c.* 12 ad *om. cp.* si fortē (*sic*) inveneris *c*, si
forte minuta fuerit *p* (*cf. Gal. X, 446*). 13 dehinc *c*: hinc *p.*
novissimo *cp.* in *om. c.* ducis *cp.* 14 sicco *om. p.*
diostren *c*, diostēon *p.* 15 est *om. p.* dentis *om. p.*
genus etatibus brevissimis eveniens *c*, genus et. in caes. fatū
(et infantium *corr.*) brevis etatis veniens *p.* 16 tumor *c*:
rumor *p* (*cf. p. 65, 17*). 17 pauore *c.* hictico (morbo) *c*,
hicti⁸ ē (hictiscum pro hictericum) *p.* 19 etiam et *c*: ex *p.*
ostendit *p.*

ipsam buccam perforet, quod Graeci teredona vocant. et est omnino curationis difficilis. sed oportet ea adhibere quae saepissime curandae putredini gingivarum superius scripsimus, id est dia chartu medicamentum admixto modico pipere. vel illud medicamentum appones ex fimo canis combusto inferius ad omnes putredines et scaras suo loco conscriptum, et extrinsecus cataplasma ex lenticula et pane adiecto modico melle confectum, quod artofagon vocant, et cetera simili virtute medentia.]

p. 184
sup.

XXXIII. Ad tussim humidam.

Humida intellegitur tussis, quam Graeci ygrobecha vocant, quotiens cum plurimo flegmate apparuerit, id est cum abundanti excreatione aut humectatione et narium pruritu et sternutatione. et aliquando iacentibus quodam
15 modo resonum sibilatum ostendit. haec passio est communis reumatismus arteriae et thoracis. quae si multo tempore permanserit ut dies numero XL excedat, efficitur et pulmonis et in pthisicam vergit passionem.

curationis vero tempore oportet in ipso initio duobus vel tribus diebus si vires permiserint ieiunium laboranti-

1 ipsam buccam perforet quod p: ipa3 buccā ipa bucca21 pforē | rep (vel rup — haec enim in charta fere elota dispici non potuerunt — rumpit?) fortit' quod c. tridona c, thēdeā p. 2 curatione difficili (—cil' c) cp. 3 saepissime c: superius (hie) p, quod infra omittitur. s. putredini g. curande p. 4 diacartum p, diacar c. 5 illud p: om. c. fimo p: fūo (fumo) c. 6 ad omnes (omīs) c: om. p. putredinē et scaras c, putredinis (—dīs) et ascaras p. suo loco i. c. 36. 9 medencia c: medicamenta p. 10 Humidae in g tussis arida praepositur capitulo quod numero caret post (I—) XII Ad stigmata. 10 tussim cp: tussem g (et ind. p). igrobecha g: drobecade c, ydropica p. 14 pruritum externutatione g. 15 communi p (—nis gc). 16 reumatismo gcp. cf. Orib. V, 550. toraci g (—cis cp). que g: quod (q) c, om. p. 17 ut g: aut c, i. si p. XL (sic) g. excedat c: —dit gp. efficitur ut (sic) pulmonis g: inficit pulmonem c, efficitur in pulmone p. 18 pthisicam g, tipsicam c. 19 et in i. c.

bus imperare, ita ut se circa horam decimam reficiant et a solito minus potum accipiant. interea ciborum ipsorum qualitas semper oportet esse sicca vel solida aut corporulenta, quam Graeci sterea vocant. sic enim omnia quaeque humida desiccantur, cum e contrario contrariis sanatio adhibetur. et si ventrem minime fecerit, acriore clystere deducendus erit. dehinc iugulos et thoracem et a tergo inter scapulas usque ad cervicem oxyrodino id est aceto et rosaceo oleo ex lanis sucidis embrocabis, in hieme calide aestate frigide, et oportuno tempore loca scilicet supradicta ex palmulis et murtae siccae tenuissimis pollinibus et hordei polline cum sufficiente melle et aceto concoctis cataplasmaabis. nec non etiam cucurbitas stalticas id est constrictorias thoraci et dorso multa cum flamma conglutinabis. etiam et gutturis partem sub mento, quam Graeci antereona vocant, novacula rades, et carnibus palmarum et amomo et hypoquistidis suco et mastice adiuncto modico melle concoctis pyriama confectum appones, <aut melle concocto> et herpyllo herba admixta aloe similiter appones. aut dia iteon medicamentum

p. 185

1 ut se . . . reficiant g: ut . . . reficiantur cp. decimam gc: XI p. 2 a gc: om. p. ipsorum ciborum q. cp. 3 oportet esse g: sit cp. 4 sterea gp, st^ena c. quaeque g: q₃ q̄ c, q̄₃ que (quecunque) p. 5 cum — adhibetur gp: om. c. 8 Oxyrodinon g (—no cp). 9 ex c: et g, cum (c) p. 10 calide gc: —dis p. frigide g: —da c, —dis p. loca scilicet ex supradictis gc, loca supra dicta p. 11 ex (sic) murte sicce g, et mirta sicca cp. pollinibus tenuissimis p, pollinis tenuis c. 12 pollinē g. sufficiente g: —ti cp. 15 et torso g (cf. ^qōlo p id est et orso p pro et dorso p^e). 15 mento g, mentu (sic) cp. 16 antereona g: antereon c, the-redam p (cf. Cael. Aur. p. 388. 383). 17 ypoquistidis: sic gcp. masticae (= ce) g (—c p). 18 concocto gcp. em(om p)pirisma gcp. 20 aut melle concocto: aut (ā) mellis concocte (cotē ante corr. qui scr. ὁκότῃ deletis lineolis suprascriptis) p, om. g (ubi appones et herpyllo) et (cum seqq. usque ad v. 20 appones) c. et herpyllo (—la p) — 20 appones om. c. amixte p. 20 aloen g. dia¹theon g (thahitheon c).

linteolo densum inductum appones. aut certe dielectru
trosciscum aut trigonum admixtis palmulis calcatis, patetoe
a Graecis appellatur, similiter appones. dandum etiam et
dia codyon singulariter aut suco polentae aut oryzae ad-
5 mixtum. vel catapotia tussicularia quae Graeci bechica
vocant vespertino tempore cubaturis id est euntibus dor-
mitum dabis. aut trigonum trosciscum similiter vespertino
tempore cum calida aqua dabis, si tamen ventris con-
strictio aut in infantibus aetas minime impedierit. oportet
10 etiam calenti anagargarismate uti ex decoctione palmularum
et lenticulae et rosae vel ficorum siccarum: aut siliquas
graeas dulciores mittes et uteris.

trosciscus a Graecis ypocapnistos appellatus id est
suffumigatorius, conveniens maxime hiberno tussientibus
15 ad desiccationem humorum, maxime ad longi temporis
tussiculas, quas Graeci chronias bechas vocant. recipit
autem sandaracae et turis partes binas, medullae cervinae
et murræ partes singulas. tundes sandaracam et cernes,
murræ vero et tus separatim teres et cernes. dehinc
20 simul omnia cum cervina medulla in girba mittes et in

1 linteolo *gc et ante corr.* (—lū) *p.* densum *gp*:
denso *c.* dielectrum *gp*, dieleti *c.* 2 admixtum *gp*, —to *c.*
calcaticis *g*, —ticus *c et (u ex corr.) p.* pateton . . . appel-
latum (—tur *p*) *gcp.* 4 dicacodion (*sic*) *g*, diacodion *cp.*
orizae (—ze) *gcp.* 5 catapotias singulares (*sic*) quas *g*,
catapotia singularia quae (q *c*, q̄ *p*) *cp.* 6 cubaturis
(—toris *sic g*) id est *om. p.* cubaturis — (v. 8) tempore
om. c. 9 in *om. gcp.* 10 calentiano (*sic*) garg. *g*, calenti
garg. *p et garg.* calenti *c.* 11 πιδῑ fιδῑ *g*, πιᾱrum siccarum
(πιᾱζ fιδῑζ *c*) *cp.* siliquas graecas *c*: siliquae graecae *g*,
filicas graecas *p.* 12 mittis *gcp.* 13 γ(i c)ypocapnistus *gc*,
ypoconicus *p.* 13 appellatur *g* (—tus *cp*). 14 suffumigatorius.
Conveniens *g*, subfumigationibus conveniens *c*, suffumigatori
(*sic*) conveniens *p.* yberno *g*, i(ī *p*)berno *cp.* 16 chronias
bæccas *g*, trozenas bacas *c*, cronias becas *p.* B̄ *cp.* 17
partes *cp*: *om. g.* 18 mirrae *g*, mirte *cp.* 19 mirram *gp*,
miram *c.* 20 in girba (girua *c*) mittis *gcp.*

unitatem ut sibi bene misceantur tundendo coges, et
 exinde in magnitudinem lupini troiscos fines. et prima
 die cacabo novo septem troiscos carbonibus superimpones
 et operies ita ut operculum modicum foramen habeat
 quod minorem calamum habeat, et per eum fumum in 5
 ore is qui curabitur excipiat, tam diu quam talem co-
 lorem habeat flegma qualis est medicaminis. et observa
 ne ex aliqua parte cacabi fumus exeat nisi in os. hoc
 facies per septem dies, et post fumum exceptum dabis
 conditi tepefacti potionem unam, ita ut his diebus holera 10
 olivas caseum impensas recentes legumina et balneas non
 tangant. carbones etiam de gulfione vitis facies. sed si
 forte | raucedo aut asperitas fuerit arteriae, vespertino p. 186.
 tempore arteriacam euntibus dormitum sub lingua con-
 tinendam dabis, et cum defluerit paulatim sub ipsa esu- 15
 catione transvorandam mandabis, et sanabis. cuius vero
 arteriacae confectio talis est. croci scr̄ VI, gliquiritiae
 scr̄ XVIII, draganti scr̄ XII, piperis scr̄ III, spicae in-

1 cogis gcp. et cp: ut g. 2 fingis g (p, fing'is =
 singulis c). et — troiscos om. c. 3 septem g, VII p.
 —ponis gcp. 4 operis gcp. 6 is (≡if g) gp: hiis c (ut his
 ante corr. g). curabitur gc: —ratur p. tam diu quam
 <diu add. g^c> g: donec c, tam diu donec p. 7 flegma c:
 flegma g (fl'a p). qualis et medicaminis g, qualem (—le p)
 et medicamen (—m) cp. 8 nisinos g. facis gcp. hoc
 g: hoc autem c, et hoc p. 9 septem g: VI c, VII p.
 10 ti(e corr.)pifacti g. holera g: olera cp. 11 impensas g:
 ipenfan c, epēfa p (cf. *Anthimus* 36). legumen gcp. bal-
 neas g: balneum c, balnā p. 12 degulfione g: degulfione cp.
 vitus ante corr. g. facis gcp. 14 arteriaca g (—cā cp).
 14 sub lingua cp: oblinguam g. 15 sub (cf. c. 34 fin.):
 subinde gcp. ipsam esucationem g, i. exutationem c, i. effu-
 sionem p. 16 transvorandam (gp^c) — sanabis om. c.
 vero gc: om. p. 17 scrpt (deinde scr) g, scr̄p c, 3 (3 quin-
 quies supra scr. corr.) p. croci g: cc (et c) cp. Gliqui-
 ritiae g, Elincie (sic) c, hqr p. 18 XVIII gp: XV in c.
 draganti gp: tracanti c. piperi g.

dicae scr̄ II coliculi suco colliges et facies collyria in modum fabae aegyptiae et in sole siccabis. |

p. 182
sup. (post
exolu-
dendas).

XXXIII. Ad tussim aridam.

Tussis arida a Graecis xerobeches appellatur, et
5 agnoscitur quotiens cum parvo flegmate et faucium tensione et gravedine et nimia thoracis constrictione ex viscosi flegmatis infusione nata, quam Graeci catarrhan sive catarrhun vocant. aliquando et a tergo dolorem inter scapulas sentiunt, quod Graeci metafrēnon dicunt. contingit frequenter ex antecedenti perfrictione aut e contrario adustione.
10 etenim omnis frigus cerebro humorem flegmaticum nutrit, identidem nimius calor ex calefacto cerebro humorem supradictum ad inferiores partes liquefactum dimittit.
in curationibus vero oportet in ipso initio penicillis
15 calidis id est calida aqua expressis sub mento gutturis partes, quas Graeci antereona vocant, alterna vaporazione mutare. etiam et ori patenti et naribus penicillos supradictos calidos congruit laborantibus applicare, et eos admonere ut ad semet ipsos spiritum vaporis rapiant, quo
20 possint interiora corporis membra, quae Graeci moria vocant, relaxationis indulgentia relevari. post haec et anagargarismata erunt offerenda ex aqua mulsa calida et decoctione fici et ysopi aut ex decoctione origani et thymi et gliquiritiae et his similia.

1 co(au cp)liculi g. colligis et facis gcp. colliria gcp.
2 aegyptiae g, egyptie p: egipciae c. sequitur in g cap.
Ad tumorem faucium (XXXV). 3 Ad tussim aridam g
(et ind. p): Ad tussim siccam cp. 4 arida c: sicca p,
om. g. xerobeches (pl.) g: xerobetas p, yerobeches c. 6
ex: et gc, fit ex p. 7 catereon (catereo c, catareon p) sive
catarrhum gcp. 9 q (quod) cp: quem g. 10 perfricatione p.
11 frigidior cp. nutrit. Identidem (sic) g (p, sine interp. c).
13 dimittit gcp: deponit Petr. 15 mentum (sic) gcp. 16
anthereona p, antrema c. 18 ammonere (immunere c) sic gcp.
20 morian g. 22 et (dec. f.): ex gc, et ex p. 23 ficus c.
ex om. c. 24 gliquiriciae g: gliricie c, hqr p. similia g:
—libus cp.

sin vero glutinosum flegma, quod Graeci collodes vocant, ingenti conatu de thorace ferri senseris, oxymel ieiunis dabis. et conficitur sic. mellis optimi duas partes, aceti acrioris albi partem unam cum puleio et radicibus apii viridis pridie infusis lento igne simul coques, donec 5 mellis crassitudinem mediocrem sumat. tunc ab igne tolles et per linteolum mundum expressum liquabis et exinde coclearium aut duo singulariter vel cum apiata calida dabis.

sin vero aspero vel mordaci humore | cum strictura *p. 183.* tussis fuerit commota, faeni graeci sucum dari oportet. est enim lenificae virtutis, qui valeat humoris asperimi lenire qualitatem et stricturae querelam relaxando mitigare. et conficitur hoc modo. accipies faenum graecum purgatum et aqua dulci lavabis ut terrosa careat qualitate. 15 tunc supra tenuissimos carbonem leviter coques, ut omnem acredinem deponat, et secunda aqua mutabis defusa priori, et iterum coques ita ut ipsa decoctio glutinosa in similitudinem coloris vini redigatur. tunc ab igne tolles et per linteolum mundum liquabis, et dabis ieiunis ex ipso 20 suco calicem unum mediocrem admixto mellis despumati cocleario uno. et si forte adhuc minime fuerit soluta thoracis constrictio, inter scapulas circa spondyli locum praeavaporatis partibus scarificabis et per cucurbitae raptum competentem sanguinis quod relaxationi faciendae sufficiat 25

1 sin *gc*: si *p.* coliode (—dē *p*) *gcp.* 2 oximel *g*,
ex melle *c* (huius oximellis confectionem *p.*) 3 et *g*: quod *c.*
duas partes *g*: partes II *cp.* 4 aceti *g.* radicibus *a.*
viridis (viridibus *c*) *p.* infusis *cp*: radices *a.* virides *p.* infusas *g.*
7 expressum *cp*: et pressum *g.* 10 sin *gc*: si *p.* stictura
g (ut supra *p. 72*, 6 constictione). 11 foeni *g* (fenu *cp*).
12 qui (*q c*) *gc*: que (*q̄*) *p.* 14 foenu (—ni *g^c*) grecum *g*,
fenugrecum *c*, fenugreci *p.* 16 leviter *g*: leniter *cp.* 17
secunda aqua (*sic*) *gcp.* defusa — (20) liquabis *om. c.*
priori (*sic*) *gp.* 23 spondili (—lii *c*) *gc*: spondiliorum (loca) *p.*
24 scarificabis *cp.* cucurbitem *g* (—te *cp*). 25 com-
petenter *c.* sanguinis: sanguinem *gcp.* quod *gc*: qui *p.*
rel. faciendi sufficiendae sufficiat (*sic*) *g*, rel. sufficiat (*med. om.*) *p.*

detrahes. etiam et ventris egestionem si non fuerit blando clystere provocabis. dehinc transactis tribus post scarificationem diebus si forte aliqua praecordiorum tensio digitis palpatibus occurrerit, tribus seminibus cataplasma-
 5 mabis, nam Graeci trispermon vocant, id est ex lini semine contuso partes duas et hordei et faeni graeci pollinibus partes singulas, mellis et olei dulcis et aquae quod suffecerit in uno coques, et cataplasma-
 10 quam tuleris cataplasma, maxime hiemis tempore molli lana loca tutabis et fasciabis. post haec omnia et postquam cataplasmatibus dies expleveris, epithima dia spermaton appones, aestate vero dia melilotu epithimate uteris.

aliud ad siccam tussim. irin illyricam decoques in aqua dulci usque ad tertiam partem, et in ipsa decoctione
 15 ad modum calicis minoris addes mellis despumati quod suffecerit, et ieiunis potui dabis.

confectio electuarii tussiculis aridis et ad raucedinem
 20 conveniens. recipit autem lini seminis torrefacti et amygdalae | amarae desquamatae et leviter torrefactae et gl-
 20 quiritiae suci omnium quattuor paria pondera. singillatim

1 et *cp*: om. *g*. blando i. leni clystere *p*. 2 Dehinc *g*:
 Deinde *cp*. scari(cari— sic *g*)ficationem hic etiam, *g*. 6
 semine contuso *p*: seminis contusi (—sis *g*) *gc*. duas: II *p*.
 et ordeï — singulas om. *c*. foeni *g* (feñ *p*). 8 sufficerit
cp et ante corr. *g*. 10 tutabis *gc*: tūbabis *p* (cf. supra c. 28).
 et fasciabis om. *c*. post haec omnia: om. *cp*. Post haec
 omnia et cataplasmatibus d. *g*, et postquam (omnes add. *p*) cata-
 plasmatis d. *cp*. 11 epithima *gcp*. 12 diamel(II *p*)ilotum
gp (melliloto c om. dia). epithima *gc* (epith'ate *p*). 13
 tussim *cp*: tussem *g*. I(u *c*)risil(II *cp*)iricam *gcp* (cf. Th. Prisc.
p. 94^d). 14 in ipsa decoctione *gp* (—am —em *c*). 15 a.
 m. unius calicis *c*. despumati *cp*. 16 sufficerit *p* et ante
 corr. *g*, sufficit *c*. ieiunū (i. e. —no) *c*. 17 et raucedini *p*
 (et ad r. *gc*). 18 recipit *g*: R̄ *cp*. amigdalae amarae
 decemate *g*, amigdal' ama. desquamati *p*, amigdalarum ama-
 rarum descamarum *c*. 19 leviter *g*: leniter *g* (cf. supra
p. 73, 16). torrefactę *g*: —ti *p*, —tarum *c*. glyquiriciae *g*,
 glyquiricie *c*, liq̄r *p*. 20 omnium quattuor *gc*: om. *p*. sin-
 gillatim *g* (singilatim *c*): singula *p*.

teres et sic in uno commiscebis et addito melle cocto in unitatem coges, et exinde in modum unius avellanæ dabis ut in ore contineant aegrotantes et paulatim exundo transvorent. sin vero gliquiritiae sucum non inveneris, ipsam gliquiritiam mittes et uteris. |

5

XXXV. Ad tumorem faucium.

p. 186.

Secundum veteres medicos quattuor distantias cum suis vocabulis habere uva ostenditur. nam si fuerit rotunda in similitudinem acinae, stafyle a Graecis appellatur, quam nos uvam dicimus. item si fuerit longa et tenuis 10 et in folliculi sui summitate plurimum humoris habuerit, cionis appellatur. identidem si grossa vel vastior fuerit ut robustitate sua faucium impleat partes, gargareon appellatur. nam Hippocrates senior in suo prognostico sic ait „gargareones periculosae ad incidendum vel exsecan- 15 dum, quanto magis fuerint rubriores et grandes. etenim tumor eisdem locis nascitur et sanguinis incessabilis fluxus efficitur. sed oportet in eodem tempore non solum ipsam uvam appositione medicamenti attenuare, verum etiam quibuslibet modis subinanire ventrem. sic enim innoxie 20 chirurgia adhibetur et metus praefocationis praeteritus est“. item alia dicephalos appellata vel bicapita, quae rarius nascitur et innoxia esse probatur, si quidem hu-

1 commiscebis gcp. 2 cogis gcp. unius om. p. 3
exudando (sic) g, exsuccando p: gluciendo c. 4 sin gc: si p.
gliquiritiae g, glicirize c, hqr p. 5 gliquiriciam g, hqritia
p: om. c. 9 stafyle gp (scafile c). cf. Gal. XII, 972 (960.
971 sq.). 10 si cp: om. g. 12 cyonis g (ciols p, tionis c).
vel astior (sic) g (vastior cp). 14 hypocrates g (ypocr. cp).
v. Hipp. I, 115 Lips. (citatur etiam Galenus XII, 971). 16
lubriores g, rubiores c: rubicundiores p. 17 eisdem g: in
hisdem p, in (locis) c (in isdem Petr.). 19 appositione
medicamenti p (ex corr.): appositionis (—one c) medicamento
g(c). 21 preterit² ~ g (ptit² p): preteritur c. 22 dia
coe(ce cp)phales g(cp). apud Petroncellum c. 31 p. 209 (si
robusta et vehemens extiterit piclosis dicitur) sic quarta in-
ducitur επιγλωσσός. vel g: i. (id est) cp.

morem ex se dimittens in utrasque partes faucium spargat et non per medium destillando pulmonis altitudinem laedat, sicut ceterae uvae faciunt. propter ea chirurgia prohibetur.

curationis vero tempore in ipso initio ad uvas tumentes et summissas, quas Graeci cechalasmenas vocant, et tumentibus faucibus uti oportet dia pityrou anagargarismate, id est ex cantabro. et conficitur sic. cantabrum non nimis calcitius tenui linteolo illigatum mittes in cacabo fictili et novo aut certe aeneo stagnato et adiecta
 p. 187. dulci aqua addes | siccam rosam et palmulas pingues <et> lenticula admixta sales alexandrinus. omnia ad modum mittes, et coques donec lenticula coquatur. post haec ipsum sucum liquabis. bene temperatum et non viscosum nec iterum nimis aquatum efficias, et addito modico melle
 15 despumato gargarizandum patientibus dabis non nimis calidum neque iterum frigidum. etenim si frigidum fuerit, tumentibus partibus manifestatur esse contrarium. iterum si nimis calidum fuerit, loca fervore accensa inurit. sed sufficit tantum ut secundum tactum teporem habeat lactis,
 20 quod Graeci galactodes vocant.

diachrisma stomaticon id est inlinimentum ori con-

2 destillandum *g*, distillando *cp*. 5 thaias menas *g* (taias meās *p*), thalasmenas *c* (i. e. *κεχалаσμένας Gal. XII, 944 etc.*). 6 Diapitirona gargarismate *g*, diapitiron garg. *c*, diapetiron anagarg. *p*. 8 calcitius *gc*: calcatum *p*. illi(ili *c*)gatum *gc*: ligatum *p*. mittis *gcp*. in cacabo . . . stagnato: sic *gcp*. 9 certe aeneo (eneo *c*) stagnato *cp*: certe plumbeo vel stagneo vel eneo *p*. 10 dulcia quae *g* (dulci aqua *c*, aqua dulci *p*). siccam rosam *g*: rosam siccam *cp*. et *om. c et mox gcp*. pingues (*om. c*). lenticula et mixtas (mixas *c*, mītas *p*) *gcp* (l. admixta *Petr.*). 15 ut gargarizandum *g* (gargarizato *c*, —zando *p om. ut*). n. n. dabis (iterum) calidum *c*. 16 frigidum . . . contrarium (*sc. anagargarisma*) sic *gcp*. 19 sufficit tantum (tū *c*) ut *gc*: *om. p*. 20 galactodes *g*, galatodes *c*, colotodes *p* (*cf. Aurel. c. 14*). 21 diacrisime *g*, diacrisma *p* (*cf. διάκριστοι στοματικά vel διάκρινά Galeni XII, 938 sqq.*). stomatice (tomacie hoc Galeni fuit a Galeno primo traditum (XII,

veniens. et appellatur e dia ton carion, faciens ad digerendos tumores et praefocaciones antiadum. et recipit nucum viridium corticis sucum per linteolum mundum liquatum. quem molli igne coques usque ad tertiam partem et tolles ab igne et dimittes ut infrigidet. dehinc in mortarium marmoreum refundes et admiscebis mellis leviter despumati similem quantitatem, et addes croci et murrae et hypoquistidis suci quod suffecerit, ita ut murrae et croci singulas partes mittas et hypoquistidis suci dimidiam partem, et uteris.

10

confectio crocati faciens ad faucium fervidos sive rubicundos tumores. accipit autem rosae floris et croci scripulos binos, nucleos pini septem, uvae passae enucleatae numero novem. teres cum melle despumato et modico passo, et inlines.

15

905) πάντων ἔμεινον (905 et χρησιμώτατον XIV, 360). illimentum (illimētū) *p* ante corr. (ni) *gp*, inlinimētū *c*. 1 ediaton

carion *g(p)*, ediaton|netron *c*. digerendos *cp*, dirigendos (i. e. dirigendos) *g*. 2 antiadum *g*: antea datum *c*, ἀττία (arteriarum) *p*. et recipit *g*: ῥ aut *c*, ῥ *p*. 3 linteolum mundum. molli igne etc. *g*, l. m. i quātū quē moli igne *c*, mādū

līteolū ^ colatnīdū (i. e. l. m. colatum) m. i. *p*^o. 5 et *gp*: postea *c*. et dimittes (—tis *g*^o) *c*: om. *p*. infrigidet *g* (infrīdet *c*): frigescat *p*. 6 admiscebis *gp*, adungues *c*. 7 despumati *cp* (item *infra*). similem (ptem pro parem *c*) *q. gc*: tātūd' *p*. et *gp*: post *c* (cf. v. 5). murrae *g*: mirre *p*, mirā *c*. 8 ypoquistidē *g*, —des *c*, —dos *p* (supra scripsit *g*^o i. rosę h̄ est sentica). 8 quod — (9) suci om. *p*. sufficerit ante corr. *g*. mirrae *g*, mirre *c*. 9 ypoquistidē *g*, postquistidē (sic) *c*. 11 crocati: cf. similia apud Gal. XII, 945. 12 Accipit autem *g*: ῥ autem *c*, ῥ *p*. floris *gp*: —res *c* (florum Petr.). et croci *g*: ῥ cc *p*, ecce *c* (et cere male ed. Petr.). 13 scrīp *g* (scrīpl'os *c*): 3 *p* (3 supra scr. *p*^o, ut antea). pini *cp*: pinos (sic) *g*. septem *g*: VIII *c*, VII *p*. uvae passe enucleatę *g(c)*, uvae passas et nucleatas *p* (uve passe nucleorum Petr.). 14 numero *gc*: om. *p*. novem *gc*: VIII *p* (Petr.). 15 inlinis ante corr. *g*, illinis *g*^o*cp*.

confectio anthera a Graecis appellata, optima ad uvam desiccandam et ad omnia quae in ore nascuntur. recipit croci murræ crocomagmatis aluminis scissi gallarum rosae floris omnium specierum sex drachmas singulas, sandaracae iris illyricae cyperi omnium trium drachmas binas. tundes cernes et teres diligenter, et uteris aliquando sicco aliquando admixto melle.

XXXVI. Ad ulcerationem faucium.

Ulceratio faucium si cum febre acuta in aegritudine
 10 contigerit, pessima et exitialis ostenditur, maxime si
 p. 188 grandis | et scara fuerit nata. est iterum alia ulceratio
 praeter febrem acutam, quae inter acra oris spatia efficitur
 alba vel nigra aut certe cinericio colore fuscata, quam
 tefroden vocant. et appellatur a Graecis consueae aptha,
 15 quam nos oris coctionem dicimus. et est deterior vel
 mortifera in infantibus brevissimis lactantibus ob teneri-
 tudinem aetatis illa quae fuerit alba in similitudinem

1 anthera g (ā't'ra c, ā'therā⁹ p^o). cf. Gal. XIII, 839 (ex Andromacho). eandem antheran „quae omnibus nota est“ habent Theod. Prisc. 1, 15 p. 16 et ex Sorano Galenus XII, 957. 4 omnium specierum sex dragmas (VI dicit^r pro dr ut saepius c) singulas gc: añ. 3. I. p. 5 irisiliricae g, in̄s (om. ill.) c, yrisill' p. cy(i)peri g(c): quiperi (qpi) p. omnium trium drag (dr c) binas gc: añ. 3 II. p. 6 tundes. cernes. et teres diligenter et uteris g: tundes et cernes et uteris c, teres et cernes et uteris p. 7 sicco: ξηρῶ Sor. ap. Gal. admixto (d in ras. g^o) 8 rubr. mai. (quasi novi capituli) in g De ulceratione faucium, sine rubr. p. Ad ulcera faucium 36 c (Ad ulcerationem f. ind. p, om. ind. c). 10 exic(t p)ialis gp: exciabilis c. 11 et (&) scara gp (et supra g^o i. coadunatio): ex scara c (cum scara Petr. cf. infra p. 79, 4). nata est. Iterum gp (sine interp. c). 12 inter acra: inhacra g, intra | c, in interiora p. 14 tefrode (tefrode c) gcp. consueae a grecis cp. apthes g, abthes c, aptes p. 15 et est g: ut est c, et p. 16 brevissimis gc: parvulis p. teneri-
 tudinem gc: teneritatem p.

granorum minutorum siliginis, maxime si et caput linguae obtinuerit.

in curationibus vero si grandis fuerit ut supra diximus faucium ulceratio cum scara, ut etiam cum rubore sub mento in gutturis parte ostendatur, quam antereona⁵ vocant, et si fuerit is qui curabitur aetate perfectus, flebotomiam adhibere oportet ita ut secundam detractorem facias, quam epaferesin vocant. et si ventrem non fecerit acriori clystere deducendus erit, in infantibus vero balano uteris. dehinc ipsis locis patientibus dia chartu medi-¹⁰ camentum admixto modico melle inlines. et sinendum ut sibi saniando scaras cadant, ne abstractione violenti emeat¹⁰us emorroidis sequatur.

alia confectio oralis, quam Graeci stomatice¹⁵ vocant, faciens ad putredines et scaras. caninum finum album¹⁵ colliges et siccabis. fit autem hoc, si ossa bubula sola ante diem vel biduum canes manducantes custodias. ipsum

1 granorum minutorum c: grandiarum minutiarum g, grandium (Petr.) minutarum p. filiginis (sic) g. post siliginis add. p: quod germatum (sic ante corr. gremiatum p^o) dicimus. 3 fuerit — diximus om. p. 4 ulceratio ulchararet etiam c. r. c. c. r. sub mentom (sic) gutturis partes ostendat g, c. r. sub mentum (m^{tu}) in gutturis partes ostendatur c, (ut etiam) ruborem sub mento in g. partes ostendat p. 5 quam g: quas cp. 6 is g: his cp. 8 epaferesin g, apoforasim c, epafarasin p. 9 acriori (sic) gcp. balan^u (sic) g, —no c: balneo p. dia cartum g, —to p, dicatarum c. 11 amixto g (amixto p), adm. c. in(l g^oc)linis gp(c). 12 saniando gp: sanando c. abstractione violentie metus. emamorroid^e (sic, et supra g^o ema sanguis dr) g, abstractione violentie meatus hemoroide c, adtractione violenti humoris metus emō|id' p. 13 sequantur c. 14 quam greci om. g (greci om. p). stomaticeⁿ (—cē p) gp, stomatice c. haec Musae primi fuit sec. Gal. XII, 955. 956. 16 colliges c: —gis gp. hoc gp: hec c. bubula c, —le g: bubulina p. 17 ante — custodias g et (ubi) c: ante diem comedet (—derit p^o) et custoditus fuerit p.

vero fimum combures et exinde mittes dr̄ II, croci et costi dr̄ singulas, mellis quod suffecerit.

levissimae autem ulcerationi sufficit, si et antheran cum melle inlinies. sin vero aptha fuerit in ore id est oris coctio, lac asinum singulariter aut certe caprinum admixto modico passo frequenter dabis coluendum, et magis si nigra fuerit aptha. sed si forte nimis sordida cum putredine apparuerit, ervi pollinibus tenuissimis admixto melle deterges ex leptospathio ferramento licinio involuto, et postquam deteriseris, vinum tepefactum coluendum dabis, in quo ante fuerit decocta rosa sicca et murta sicca et olivae folia viridia. post haec medicamentum siccum appones, cuius medicamenti confectio talis est. facit enim ad universas apthas nigras et albas et ad uni-
p. 189 versa quae | in ore nascuntur. accipit autem balaustii et corticis de granata sicca dr̄ octonas, gallarum et folii optimi dr̄ quaternas, aluminis scissi et mastices dr̄ singulas. quae sunt tundenda tundes et quae terenda terun-

1 vero g: ergo (go c, ^o p) cp. mittes c: —tis gp. draḡ (dr̄ c). II. gc: 3. II. p. 2 draḡ (dr̄ c) singulas gc: añ 3. I. p. sufficerit g, suffic̄ c. 3 ulcerationis g. anthera cp, anthera g (et supra g^o i. savina brateus). cf. ad p. 77, 8. 4 inlinies g: illinire c et (om. si et) p. sin gc: si p. asthes g, anthes c, athes p. 6 ammixto g, amixto cp. 7 asthes g, apthes cp. 8 ervi: herbi gcp. ammixto gc. 9 ex lecto spatio ferramenti involuto g, ex lecto spatio ferramento liniciū inv. c, ex lecto spatō ferramento licinio inv. p. 11 et mirta sicca p, & murta sicca g^o: om. gc. 12 viridis g, —da c (oliva florida viridis c). 14 asthes g, apthes cp. 15 Accipit autem g: R̄ autem c, R̄ p. balaustium (supra g^o C. folia) g, balaustie cp. et om. cp. 16 cortice de granata sicca g, corticis granati sicci c, cortic̄ grana^o p. draḡ (dr̄ c) octenas gc: añ 3. VIII. p. gallarum: supra g^o saluncos. 17 draḡ (dr̄ c) quaternas gc: añ 3. III. p. mastices g, —c cp. draḡ (dr̄ c) singulas gc: añ 3. I. p. 18 quae — reservantur (q. tundenda sunt tundis . . . teres . . . in vino . . . reservatur etc. sic c) gc: tunde et tenuissime cerne et in vino commixta usui reservetur p.

tur, et sic tenuissime creta et in uno commixta usui reservantur.

XXXVII. Ad synanchicos.

Synanchica igitur passio nomen accepit ab eo quod nimio tumore summitatis gulæ vel faucium sive locorum quibus nutrimenta transvorantur, interius atque exterius, cum difficultate transvorandi prae-focationem faciat acutam et iugiter spirationem patientibus neget — nam Graeci continuam vel iugem syneci appellant, et similiter ut laqueo strangulatos interficiat laborantes, cuius laquei suspensia Graeci anchonas vocant, unde iterum synanchica passio nominatur. et sunt differentiae passionis duae. una est quae cum ingenti tumore supra dictorum locorum visibus manifestatur, alia vero quae sine ullo tumore efficitur, sensibus cognoscitur tantum cum minime et difficulter transvorare coeperint aegrotantes. ipsam denique veteres passionem petiorem atque noxiam adseverant, siquidem ad pulmonem faciat decursum et tertia vel quarta die prae-focationis ingerat necem. contingit autem medio aetatis tempore corporibus frequenti catarro temptatis, item ex vino-lentia vel nivatis potionibus aut si quis post perfrictionem conceptam derepente calidis nimis usus fuerit lavacris.

3 De sinancicis *g*, Ad sinanticos *ca*^m 37 *c* (Ad sinanchicos *ind. p*), De disinteria *sic p* (sinantica *ad v. 4 p^o in marg.*).
4 igitur *g*: autem *c*, *om. p*. 5 nimium tumores *g*, nimio tumore *c*, cum *n. t. p*. faucium locorum. sive (sine *c*) quibus *gc*, faucium vel locorum quibus *p*. 7 facit (fac *c*) *gc*, faciat *p*. 8 iugiter *sp. cp*: iugiter sive continuam *sp. g*.
9 sinecim *gp*, sinetis *c*. laqueos strangulatos *g*, laqueos strangulatos *c*. 10 interficiat *c*: —cit *gp*. 11 anchonas *gc*, anchonas *p*. iterum *gc*: *om. p*. sinanchica *gp*, —thica *c*.
14 s. tantum cognoscitur *cp*. 18 faciat *g*: fac *cp*. III. vel. IIII. *cp*. 19 inferat *c*. 20 catarru *g*, catarro *c*.
temptatis *g* (tentatis *c*). violentia *gcp*. 21 perfrictionem (i. dot. *supra g^o*) *g*: perfrictionem *p*, frigidonem *c*. 22 derepenti *gp^o*, —te *g^oc* (—ta ante *corr. p*). calido ... lavacro *c* (lavacra *p*).

curationis autem tempore oportet in principio, si una pars faucium tumuerit, ex ipsa parte, quod Graeci catixin vocant, in brachio flebotomare et sufficientem sanguinem detrudere. sin vero in utrasque partes faucium
 5 uberior se tumor infuderit cum rubore igni sacro simulante, quod Graeci erysipelatodes vocant, in ambobus brachiis venas incides, si nimis plenae apparuerint, quo
 p. 190 possit proximis | locis sanguinis detractioe facta relaxatio tumentibus ministrari partibus. sin vero senilis aetas aut
 10 infantilis aetas, quod equidem rarius in ipsa infantili aetate contingit, flebotomi usum prohibuerit, a tergo inter scapulas circa spondyli locum cucurbitam conglutinabis et addita scarificatione competentem sanguinem detrahes. et si ventrem non fecerit, acriori clystere deducendus erit.
 15 dabis etiam et mulsam gargarizandam ex decoctione puleii confectam vel illud quod dia pityrou vocant id est ex cantabro, cuius confectionem superius ad tumores faucium scripsimus.

diachrisma, hoc est inlinimentum, quod appellant
 20 dia ton chelidonon, id est ex hirundinibus, faciens ad synanchen et ad universos tumores faucium, et sordida ulcera in ore bene depurgat. recipit autem hirundinum

2 quod p: quam gc. 3 cat ixin (καθ' ἱξιν vel κατ' ἱξιν Gal. XI, 92): atexin gp, antearin c (cubiti venam Aetius 8, 47). 4 Sin g: si cp. 4 faucium partes (utraque f. parte p) cp. 5 igni acro g, ignis aquā c, igne (sic) sacrum p. 6 herisipelatodes g, erisipi(pa c)latodes cp. 8 possint gc (—sit p). 9 t. partibus ministrari cp. Sin gc: Si p. 1 etas (alterum, ut mox etate) om. p (non gc). equidem g: quidem cp. 12 spondilorum ante corr. g (spondili l. g^{cc}, spondiliorum loca p). 13 scarificatione cp. 15 gargarizandum (sic) gc, ad gargarizandum p. 16 diapitiron gc (diapēidō ante corr. p, diapitiricō p^o). 19 Diachisma g, Diadisma c, Diachlima p. hoc est inl. (illimentum p) om. c. 20 diaton(to p) cae(ce— cp)lidonon gcp. cf. Gal. XII, 359 et Asclepiad. ap. Gal. XII, 942. 21 sy(i p)nances gp (asmances c). faucium tumores cp. 22 R (om. autem) cp.

agrestium exustarum 2 I, croci dr̄ II, spicae indicae et murrae dr̄ singulas, mellis despumati partes duas, passi cretici partem unam. oportet autem pullos hirundinum parvo sale aspergere et in olla fictili crudos mittere et sic opertos exurere.

etiam et penicillos calida aqua expressos ori patientis et naribus alterna mutatione oportet iugiter applicare, cum admonitione ut ad semet ipsum aegrotus spiritum vaporis rapiat, quo possint interiora membra a Graecis moria appellata relaxationis medelam percipere. et sub 10 mento gutturis partes, quas Graeci antereona vocant, tribus seminibus in aqua mulsa concoctis cataplasmas, id est ex faeni graeci polline et tritici et lini semine. dehinc et cerotarium confectum visceribus vel ventri ap- 15 pones. recipit autem ceram et butyrum et adipem tauri- num, vel porcinum si taurinum non inveneris, omnium trium paria pondera, et galbani quod suffecerit. conficies et uteris.

XXXVIII. Ad tetanicos.

Tetanica passio tres distantias cum vocabulis suis 20 habere manifestatur. ex quibus una dicitur tetanos, alia emprostotonos, tertia vero opisthotonos. et est tetanos, quam primam diximus, secundum cervicem rectam atque

1 2. g, dr̄ c, 5 p. croci drag g: cū dr̄ (5 p) cp. 2
 mirrae (i. e. mirrae g = cp, vel murrae g^e). drag (dr̄ c)
 singulas gc: añ 5. I. p. duas . . . unam gc: II . . . I p. 3
 autem c: om. gp. 4 in olla fictili (fictili p) gp: olla fictilia
 (om. in) c. 8 ammoni(amonī— cp)tione g. eger cp. 11
 mento gp: mentum c. anthereona p, intēonā c. 13 ex
 gp: om. c. foeni g (fenu c, feñ p). seminis gcp. cf. p.
 74, 6. 15 R cp. cere . . . butiri c (sed mox idem adipem).
 16 omnium (omī c) cp: omnia (omā) g. 17 galbani quod
 cp: quod galbani g. sufficit g (—c cp). conficis (—c p)
 gcp. 20 vocabulis suis g: suis vocabulis cp. 21 mani-
 festatur: manifestum est gcp (cf. p. ad 39). 22 emprostoto-
 nos . . . opisthotonos gcp (item infra).

- 191 inflexibilem nervorum et musculorum tensio cum ingenti |
dolore. emprostotonos autem in anteriore parte muscu-
lorum cervicis et nervorum efficitur contractio, ut etiam
mentum fixum pectori videatur, cum ingenti dolore.
- 5 opisthotonos autem ad posteriorem partem musculorum et
nervorum cervicis, quos tenontas vocant, efficitur con-
tractio cum vehementi dolore. contingit frequenter ex
antecedenti nimia perfrictione, quotiens plus frigoris quam
possit natura corporis ferre, sustinuerint laborantes, et
- 10 dorsalis medulla perfrixerit, quam Graeci noticon myelon
vocant. nam Hippocrates in aforismis sic ait, omne fri-
gidum dorsali medullae et nervis esse hostile sive ini-
micum, quod autem calidum amicum.
- in curationibus vero oportet omnes in brachio flebo-
- 15 tomare ob nimietatem doloris vel relaxationis faciendae
causa, maxime si et plethoricum corpus habuerint aegro-
tantes, quod nos latino sermone abundabile dicimus sive
multitudine suci plenum. post haec chalastico lysiponio
uteris. et conficitur sic. resinae terebintinae, ysopi attici
- 20 suci, cerae albae, omnium trium uncias quaternas, gal-
bani et opopanacis uncias singulas, olei veteris Z III.
diligenter conficies. si forte durior fuerit, cyprino oleo

2 emprostotonos — (7) dolore *om. c.* in anteriore
(—ri *p*) parte *gp.* 6 tenontas (*cf. Simon Jan. s. v.*): te-
tanos *gcp.* 7 Contigit *g.* 8 perfricatione *p.* quam *c*:
quod *g*, quam quod *p.* 9 possit *c*: potest *g*, p̄t *p.*
sub(s)b'stinuerint *cp.* 10 nauticon myelon *g*, noti cōmelon *c*,
n̄ gmyelō *p* (*sed supra* noticon *p^o*). 11 ypocrates *gp* (iposcus
c). *vid. Hipp. III, 741 Lips.* aforismis *gc* (āphoris *p*).
ait . . . esse . . . inimicum testatur *c.* 13 quod — amicum
om. c. 16 causam (*sic*) *g.* plectoricum *gcp.* 17 abun-
dabile: habile *gp* (*Petr.*), decabile *c.* 18 calastico lisiponio
g, *c.* hysopomo *c*, calastiel'is opoi^o *p.* 20 caere *g*, cere *c*,
cē *p.* omnium — (uncias *g*, 7 *c*) quaternas *gc*: añ. 3 (÷
p^o) III. *p.* 21 opopanacis. 7 unc (*sic*) singulas *g* (7 *s. c.*)
Z (*sic*) III *g*, 7 tres. *c.* 22 conficis . . . resolves . . . moves
gcp. cypriino *cp*, capriino *g.*

molli pruna resolves et movebis donec coaguletur. tunc manu calefacta perungues, et post perunctionem molli lana tutabis loca et fasciabis. sed oportet primo loca dolentia simul cum spina sacculo calido vaporare ex cantabro vel tritici farina confecto et sudorem excitatum 5 tenui et calefacto linteolo detergere, et sic supra dicto medicamento perungere. dandum etiam in potione et castoreum rutae foliis admixtum aut opopanacis obellis duobus id est scripulo uno, vel ceteris potionibus ex castoreo confectis diurnis diebus uti oportet. declinationis 10 tempore etiam et cerotarium ex diaquilon confectum appones. et conficitur sic. cerae, adipis porcini sine sale, diaquilon medicamenti, omnium trium paria pondera in uno consolves lento vapore, et ab igne | tolles et move- p. 102 bis donec coaguletur. dehinc rades et uteris. || 15

XXXVIII. Ad emoptyicos.

(p. 171)

Emoptyicos Latini sanguinem spuantes appellant. quos autem in passione constitutos, si forte ex respiratorio interaneorum membro, quod Graeci anapneusticon morion vocant, sanguinis fuerit fluor, sequitur tussicula vehe- 20

1 pruna g (ad prunas Petr.): prima cp. coaguletur gcp.
3 tutabis gc: tubabis p. 5 sudore excitato c. 6 calido
(marg. 1 à calefacto) p. detergere gp: exsticare (i. e. exsiccare) c.
8 o' a cp, popanacis: sic gcp. obolos duos g, obol' II c, obuli duo p.
9 id est g: vel c, et p. scrip g, scrip c, 3 p. uno (sic):
omnium g, I cp. ceteris potionibus . . . confectis p: ceteras
potiones . . . confectas gc. 10 diurnis gc: diuturnis p (Petr.).
11 et om. cp. diaquilon g: diachilon c, diacililon p (item
infra). 12 caere g, cete c, cē p. adipidis (sic) g. 13
omnium trium om. p. 14 uno (sic) gcp. moves gcp.
15 coaguletur gcp. rades: trades c. 15 seq. Ad amaticos
in g. 16 Cap III ad emoptoicos g, Ad emoptoicos nō (i. e.
nota, 39 c, Ad eos qui spuunt sanguinem p (ad emotoyicos
ad p. 17 Emoptoicos gc, Emotoicos p. quos autem gc:
sic vero p' qui non constitutis pro — tos gc). 19 intraneorum
membrani c, interiorum membrorum p. quod (g) c: que g(p).
21 sequitur: 34 g.

mens, aliquando parva, cum sanguinis supernae educationis reiactione, quam Graeci ematos anagogen vocant. sin vero ex faucibus et uva contigerit, praeter tussiculam sicut ex ore cum excreatione despuitur. et secundum co-
 5 lorem vel substantiam supra dictus sanguis ostenditur locis ex quibus feratur. quod si fuerit nigellus cum mediocri quantitate, ex minutis venis significatur. si vero flavus fuerit et cum ingenti impetu et abundans fuerit, exclusus ex arteriis venis esse manifestatur. si vero ni-
 10 gellus fuerit et veluti glebosus, quem Graeci thrombumenon vocant, cum modico dolore, de thoracis parte ferri ostenditur. si autem sine ullo dolore cum ingenti tussicula et anhelitu rubens et tenuis scatens et spumosos sanguis fuerit emissus, manifestissime de pulmone ferri
 15 cognoscitur. aliquibus vero, si forte aetate iuvenes fuerint patientes, etiam malarum modicus rubor in vultu ostenditur. et sicut Galenus in diagnostice ait, ex stomacho
 173 vero et ventre si fuerit, evomitur, si ex renibus | et vesica, mingitur, si ex intestinis, egeritur. et sunt differentiae fluoris sanguinis numero quattuor quibus fieri solet. aliquando secundum disruptionem venarum efficitur, aliquando secundum esudationem ipsarum venarum, ali-

1 superne educationis *g*, superne ductionis *c*, superne educationis *p*. 2 ematos *g*: amathos *c*, cinatos *p*. 3 Sin *gc*: Si *p*. 4 despuitur *g*: dispuitur *p*, disponitur *c*. 6 locis ex quibus *g*: locus quibus *c*, ex quibus locis *p*. quod si — (9) manifestatur *gp*: *om. c*. 9 venis *om. p* (ubi fuerit. ex arteriis esse manifestum est). 10 globosus *male p*. tom-
 bumenon (*sic*) *g*: tronitenon *c*, trūbumeū *p*. 11 parte *g*: partes *c*, partibus *p*. 16 malarum *cp*: melarum *g* (*sed e in ras. scr. g^o*). 17 gallienus *g*, galienus *cp* (*in diagnostice h. c. in libris περί των κενωθόντων τόπων VIII, 264. cf. 261 Lips.*). 18 et *cp*: ex *g*. si fuerit *c*: *om. g* (*in p sic: Si et ventre fuerit*). vesica est (*e*) *m. c*. 20 quattuor *c*, ~~namque~~ esse Galenus VII, 234. cf. 79. X, 311. 21 *p*. disruptionem *c*. 22 effudationē *g*: resudationem *p*.

quando secundum osculationem, quam Graeci anastomosin vocant, siquidem perforatione facta veluti ex orificio sanguinem emittant, aliquando secundum putredinem. et contingit frequentius ex percussu aut nimia exclamatione aut ingentis altitudinis casu aut ulceratione facta aut 5 colligatione gutturis violenter ingesta aut nimia plenitudine sanguinis.

curationis vero tempore si ex plenitudine sanguinis vena fuerit rupta, et ipse qui patitur naturam sive temperantiam corporis, quam Graeci crasin appellant, calidam 10 habuerit, quam Galenus libris peri craseon appellatis, in quibus de temperantia corporis scribit, hoc modo intellegi docuit. ait enim ex Hippocratis sententia corpora quae vastiores venas habuerint calidioris esse naturae et quae angustiores frigidioris. ergo calidum corpus si signis 15 supra memoratis aegrotus ostenderit, in brachio flebotomandus erit. sic enim poterit vena extrinsecus relevata adhibitis potionibus colleticis intrinsecus conglutinari. apponendum etiam et dia iteon emplastrum aut finicine Galeni quam dia chalciteos dicit, aut certe illa quae a 20 Graecis ebarbaros appellatur in duabus alutis inducta, una in pectore et lateribus et altera a tergo inter scapulas, quod metafrenon dicunt. dehinc refectionem dabis panem posca frigida infusum. aut oryzam elixatam cum modico

1 osculationem *g*: obscultationem *p*, ulcerationem *c*. anastomosin *gcp*. 3 et contingit etc. cf. *Gal. VII*, 232. 4 percussu *gc*: —sura *p*. 11 gallienus *g*, galienus *cp* (item *max v. 20*). 13 ait *sc. t. I*, 605 *Lips*. ypocratis *gcp*. 14 calidiores *e*. naturae *g* (calidioris *e*. nature *p*). 15 si *g*: hic *om. cp* (Ergo si calidum etc. *p*, Ergo calidum ... egrotum si se ost. *c*). 17 relevata *ego* (cf. *Gal. X*, 314. 316. 328): repleta *gcp*. 18 collecticiis *g*, —tavis *c*, —tavis (sic) *p*^o (i. e. κολλητικαῖς). cf. *infra*. 19 diatheon *g* (diatheon *c*, diachiteon *p*). finicene (e) *g(p)*, fenicene *c* (ἡν φοινικίνην ἐνομάζω *Gal. XIII*, 375. cf. *X*, 405). 20 dia calcitheos *g* (—teos *p*, diachiteos *c*). 21 ebarbaros *g*, ebarbores *c*, 7 (et) barbaros *p* (ἡ βάεβαρος *v. Gal. XIII*, 551 *sqg.*). 23 quam *g(cp)*. 24 orizem lixatam (sic) *g*.

aceto dabis frigidam. hieme vero tepidam cum vino styptico dabis, et cetera quae similiter constringere vel conglutinare possint.

- etiam et potiones aptissimas dabis quae valeant venas
 5 conglutinare, ut est polygoni herbae radices: decoques in aqua usque ad tertiam partem et addes cummi diligenter tritum sufficienti modo, et potui dabis hieme tepidum aestate frigidum. aliud. pumicem leviozem aut run syriacum in vino | austero decoques in cacabo novo et exinde
 10 ieiunis potionem unam et alteram ad vesperam dabis, similiter aestate frigidam hieme tepidam. aliud. gesaster et amyllum cum posca propinatur. aliud. ptisana cum adipe caprino recente. <aliud> symfyti herbae radices siccae partes duas, gesasteros et amyli partes singulas:
 15 dabis coclearium unum cum aqua frigida, hieme tepida. aliud picis siccae partes duas, specularis assati partem unam teres et exinde ieiuno dabis coclearium unum sive hieme sive aestate cum posca frigida. aliud. diasfongon ad narium sanguinis fluxum similiter scriptum superius

1 vino stiptico *cp*: stiptico <vino *add. corr. inter lin.*> *g*.
 3 possunt *ante corr. g*. 5 ut est (ē) *gc*, ut sunt (ē) *p*.
cf. Petr. p. 226, 22. polygonis (*supra g° id corrigiolae*)
 herbae radices *g* (poligomi her radix *c*, poligoie herbe radices *p*).
eandem potionem habet Ps. Gal. XIV, 365 (eupor). 6 cummi:
 cuminum *g*, ciminum *p*, —ni *c*. 7 sufficientem modum *c*.
 8 pūmicem *g*. ros sy(i)riacum *gcp*. 11 frigidum . . . tepidum *gcp*. Gesastere *g* (*supra unormo g°*), gesastera *cp*, —terea *p°*. 12 amilum: *supra similago g°*. propinatur *c*: —natur *gp*. 13 aliud: et *gcp. cf. mox.* simfity (—fisti *c*) *gcp*, simphiti *p°*. radices *ante corr. g. haec ita distinguit p*: Ptisana. *c. ad. c.* et simphiti *h. rad'*. contrita comedenda datur. Al'. simphiti herbe rad' siccae partes II *etc.* *cf. Petr. p. 226.* 14 gesasteros *gcp*, —astereos *p° (ut supra)*.
 17) cocl. unum *om. c*. 16 specular assati *gp de laude speculari cf. Gal. XIII, 663.*
c. diasfongō p. 19 similiter post

dabis. aliud. cummi in ore retentum et cum paulatim defluerit transvoratum sanguinem abstinet. aliud. bulbi aut cocleae elixae cum modico aceto comestae mirifice operantur. habent enim colleticam virtutem id est glutinatoriam.

aliud. emptyicis trociscos [dabis] dielectru id est ex sucino cum decoctione myrtae aut rosae siccae aut plantaginis suco admixta posca potui dabis. sin vero cum ingenti tussicula fuerit sanguinis emissio, vespertino tempore trociscum trigonum cum posca dabis, et sanabis.

trociscus dia symphytu faciens ad sanguinis supernae educationis relictationem, quam Graeci ematos anagogen vocant. recipit autem gesasteros, balaustii, cummi, hypoquistidis suci dr̄ quaternas, turis masculi dr̄ octo, lemnias sfragitidos et symphyti herbae radices siccae dr̄ duodenas. plantaginis suco colligitur, et trocisci informantur drachmarum singularum. ex quibus unum dabis cum decoctione rosae ac myrtae siccae aut plantaginis suco cum posca.

1 cuminum *g*, cominum *c*, ciminum *p*. retentum *cp*: recens *g*. 2 abstinēt *gc*: retinet *p*. bulbos (bullos *g*, bulbos *cp*, sed *b* ex corr. *p*) . . . cocleas elixas . . . comestas *gcp* (sed ita *p* ut pro operantur scripserit *lnties*). 4 operantur — (7) mirtae *om. c*. collecticam *gp* (—*lica p^o*). 6 Emoptoicis *gp*. dabis *g*: *om. p* (cf. v. 8 et 17). dialectrum *g*, dialectos *p*. id est *om. gp*. 7 mirtae *g*, mire (mirre) *p*. 8 sucū *c*. 10 trigonum (trigonium *c*): cf. *Gal. XIII, 93*. 11 diasimphitum *g* (diasinfitus *c*, simphitus *p*). superne educationis *g*: superne eductionis *cp*. 12 cinatos *c* (ut supra). 13 R (*om. autem*) *cp*. Gesasteros *gc* (gesastereos *p*). balaustinum *g* (balaustice *c*, —*tii p*). cuminum *g*, cimini *cp*. hypoquistidis *g*, ipoquistidis *c*, ypoquistidos *p*. 14 suci *cp*: sucum *g*. dr̄. ($\frac{7}{7}$ *c*) quaternas *gc*: añ. 5. IIII. *p*. dr̄. octo (sic) *g*, dr̄. VIII *c*, 5 VIII *p*. lemnias *g* (leminas *c*, lemnias *p*). 15 frangitidos *g*, fragitidos *c*, fragitidos *p^o*. simphiti *gp*, simfici *c*. añ. 5. XII *p*. 16 cum (pl. suco) *add. p* (non *gc*). 17 dragmarum *gp*, dr̄ *c*. 18 myrrtae (sic) *g*: mirre *c*, mirte (mte) *p*. suco *cp*, sucum *g*.

aliud. anagargarisma ischemon appellatum id est retinens sanguinem, si forte de faucibus aut uva contigerit. rosam siccam, senticem viridem, myrtam nigellam siccam, gallas omfacitidas leviter quassatas, simul omnia decoques
 5 in posca et dabis gargarizandum, aestate frigidum hiberno tepidum. ||

p. 170)

XL. Ad pthisicos.

Est autem pthisica passio ulceratio pulmonis et thoracis cum defluxione corporis. sed illam veteres peior
 10 rem atque insanabilem dicunt quae fuerit pulmonis et secundum aetatem iuvenibus magis quam senibus creatam, siquidem iuvenilis aetas sui fervorem erigens in tumorem putrefaciat et sordidet ulcera supra dicta. efficitur ex antecedenti sanguinis reiactione, quam Graeci ematos
 15 anagogen dicunt, aut per longam tussiculam reumatizato pulmone aut thorace, aut interna collectione quam empyema dicunt, cum forte sursum eruperit et minime per inferiores partes fuerit desiccata. sequitur autem laborantes totius corporis defluxio vel cum nimia macie virium consumptio,
 20 febricula tenuis aliquando iugis aliquando intercapedinata, quam Graeci dialiponta vocant, tussicula etiam et flegmatis reiactione. dehinc peiorante passione putidum et
 p. 171 purulentum supra dictum flegma excluditur. capilli etiam

1 schemon gc, chesmon p. 3 senticem viridis g, siticē viridē c, sitice viridis p. myrta (miratā c, mīrā p) nigella sicca gc (—am p). 5 hiberno g (sed hyeme p, yeme c, ut supra semper in hoc cap.). 7 Ad ptisicos. II. cap. g, Ad ptisicos 40 c (sine rubr. p, sed ind. p Ad ptisicos). 8 ptisica gcp. 9 veteres: veterem gcp (pro veteres fort. quod iterum sequitur). 10 ins. dicunt: ins. veteres dicunt gcp. 11 creatam g: creata c, nata p. 14 amatos c. 15 anagogen gp, —gē c. reumatizato gc, reumatizante p. 16 empyema gc, empuma p. 17 sursum c: rursum g, om. p. 18 Sg g (ut supra). 19 cū nimia matie c: nimia macies (om. cum) gp. 20 intercapedinata g, inter capinata c, interpolata p. 22 putidum gc: putridum p.

capitis defluunt et si in pulmone fuerit ulceratio malarum rubor in vultu ostenditur, et digitorum capita robusta efficiuntur cum obuncatione unguum, quam Graeci gryposin vocant.

in curationibus vero oportet in principio adhibere 5 quae valeant sordida ulcera depurgare et ipsorum locorum patientium tumorem mitigare. hoc est faenum graecum coques eodem modo quo superius ad tussiculam aridam conscripsimus, et cum modico melle despumato dabis ieiunis et ad vesperam. sed si plus eundem sucum operari volueris, 10 in secunda aqua addes irin illyricam et ysopi cymam sufficiente modo, et admixto modico melle similiter dabis. aliqui vero pro melle caricas pingues supra dictis speciebus adiungunt et in uno coquant.

alia potio diorobu appellata id est de ervo. et con- 15 ficitur sic. ervum rubrum pridie aqua infundes, alia vero die testa ignita torrefacies moderate ut non ardeat, et diligenter siccabis et moles manuali mola, nam Graeci chiromylon vocant, et ipsum pollinem tenui cribello traicies, et ex ipso pulvere dabis coclearium unum cum 20 mulsa calida ieiunis et ad vesperam. aliquando vero in tribus partibus pollinis adduntur ysopi et iris illyricae partes singulae, et similiter ut supra datur.

1 melarum *g* (ut supra). 3 obuncatione *g^op*, obuncatione ante corr. *g*, mitacione *c*. griposim (—si *p*) *gp*, possunt (sic) *c*. 6 valeant *cp*, valent *g*. 7 hoc est (sic) *gc*, i. (id est) *p*. foenum *g* (feñ *p*, fenu *c*). 11 irisi liricam *g*, infill'icā *p*, infill'haricam *c* (id est irisilliricam *gcp*). i(y *p*)sopi comam *gcp*. 12 sufficiente modo *g*, sufficientem modum *cp*. 15 diorobum *g*, diārobo *c*, diorubū *p*. i. de erbo *c*: id est herbum *g* (supra *g^o* genus leguminis), i. h'bū *p*. 16 herbum *g*, hef' *cp*. rubrum: cf. Gal. XIII, 846 ὀρόβων κρεῖων. infundis *gc* (—des *p*). 17 torrefacies *gcp*. 18 Nam *g*: quod (q) *c*, quam *p*. 19 chy(i *cp*)romilon *gcp*. tenui cribellata (cribello *c*) trahicis (traicis *c*) *gc*: subtiliter cribas (sic) *p*. 20 cocl'r. I. *c*, cocl'ar. I. *p*. 22 additur . . . partes singulas (—le *c*) *gc* (adduntur . . . *p*. singule *p*). ysopi. et illirice *g*. ipi i illirice *c* (ysopi et yrisill' *p*). 23 datur *gc*: dantur *f*

aliud diorobu electuarium. murrae croci dr̄ singulas, amygdali amari ÷ I, ervi rubri pollinis ÷ V, mellis despumati quod suffecerit.

aliud pthisicis et maxime de thorace. butyri recentis
5 partes duas, mellis despumati partem unam in uno com-
miscbis et exinde dabis coclearium unum ieiunis.

aliud pthisicis conveniens. lac asininum seu capri-
num vel ovillum tepefactum cum modico melle ieiunis
potui dabis. et cum similia liquidius coctum in pulmento
10 dabis. aut ptisanæ cum capitibus porrorum vel butyro
concoctum similiter dabis. aliquando admiscbis et mo-
dicum mellis et sic dabis.

aliud. agnina vel haedina capita, vel pedes quos
appellant cephalopodas et ipsa corda concocta et comesta
15 mirifice operantur. vires enim depositas plurimum erigunt.

aliud ad tussiculam medicamentum quod appellant
dia prassiū, id est ex marrubio, pthisicis conveniens. et
conficitur sic. marrubii herbae viridis et ysopi et puleii
sicci, omnium trium ÷ binas, iris illyricæ ÷ I, stro-
p. 172 bilos virides II, aquae sextarios sex, | mellis sextarium I,
passi dimidium sextarium, caricas pingues numero quin-

1 dio(a c)robū *gcp.* Mirrae *g*, mire *c*, m̄re *p.* croci
g, cere (*sic*) *c*, cē *p.* dr̄g (dicif *c*) singulas *gc:* añ. 3. I. *p.*
2 amigdale amare dr̄. I *c*, amigdal. ama. ÷ I. *p.* Erbi *g*,
hef *c*, herbi *p.* ÷ V *g:* dr̄. V *c*, 3 V *p.* 4 tpsicis *ante*
corr. g. 5 cōmiscis *gcp.* 6 coel'r. I. *cp.* 7 ptisicis
gp(c), *ut semper.* 8 ieiunos (—nū *c*) potabis *gc*, dabis (*om.*
iei.) *p.* 9 cōcoctum (*i. e.* concoctum) *c*, coctum *gp.* 10
ptisana (*sic*) *gc*, —nā *p.* cum capita (*sic*) *g.* butirum *gcp.*
11 admisces *gcp.* 13 vel pedes (*sic*) *gcp* (*sc.* pedes eorum
quos . . .). 14 Cæ(Ce *cp*)phalopodas (—de *p*) *gcp.* cōmesta *g.*
15 depositus *g* (—tos *g*^o). 17 diaprassium *g* (diaprassum *p*,
diopiassium *c*). marubio *cp* (*item v. 18*). 18 pulegii *gc*
(pulē *p*). 19 O. tr. ÷ (2/ *c*) binas *gc:* añ. ÷ II. *p.* yris
illiricę *g*, yreos illirice *c*, yrihll' *p*^o. exstrobilos *g*, scopillos *c*,
<ex pineos *add. corr. marg.*> stobilos (*b et suprascr. i ex*
corr.) *p.* 20 sex *g:* VI *cp.* 20 et 21 sextar' *g* (*om. cp*).
21 XV *cp* (nuū *om. p*).

decim, omnia praeter irin illyricam ante biduum infundes in aqua et tertia die coques usque ad tertiam partem et post haec ab igne tolles. herbas expressas proicies et sucum diligenter liquabis et exinde accipies sextarios II et ei adiunges mel et passum et lento igne coques et ⁵ electuarium facies in similitudinem mellis mediocriter crassioris et tunc tolles ab igne et superasperges irin illyricam contusam et tenuissime cretam et movebis donec infrigidet et repones in vitreo vase et exinde laborantibus dabis ieiunis et ad vesperam coclearia singula. ¹⁰

et postquam ex sputis limpidioribus vel certe non male redolentibus agnoveris ulcera fuisse purgata, trigono trocisco vel alio quolibet simillimae virtutis in potione dato cicatricem induces. etiam extrinsecus medicamentum epuloticon appones, id est quod valeat in cicatricem ducere, ¹⁵ ut est finicine duabus alutis inducta. unam in pectore et lateribus et alteram a tergo inter scapulas, ut supra dixi, appones et sanabis. ||

XLI. Ad asthmaticos.

(p. 192)

Asthmatici dicuntur latino sermone anhelosi vel suspi- 20

1 iris illiricā (—ca corr.) gp, illiriā c. añ biduū c, ana. biduū in ras. g^c, añ biduū p^c. ^{anā} 2 aqua cp: aquam g. 3 proicis gc, prohicis p. 4 et exinde accipies g: om. p (l. cum sextariis duobus adiunges m. sic c). 5 ei g: om. cp. mel passum g. 6 facis gcp. similitudine g (—nem cp). 7 crassioris gc: crassi p. i(y p)risilliricam gcp. 8 moves gp. 9 infrigidet g. in vitreum vas c. 10 coclearios singulos g, cocl'r. singulos c, cocl'r. I. p. 14 inducis gcp. 15 epule (ē c)ticum gcp. 16 finicene gcp (id dactilos supra g^c). una (unā p) . . . altera gp. inducta (—tum gp) — sanabis om. c, qui eorum loco addit haec: Item (quod solet scribere pro Aliud gp) elac tp (elacterium) R apii ciperii pulegii acapin marubii semen lactuce sem urticae mente sicce lumpi (juniperi) assorum bacce lauri. piperis seminis rute et fabe in oleo frigite añ 7 I. 19 Ad asmaticos gc (ind. p), De asma- ticis p. 20 Asmatici gcp. aēllosi c.

riosi. nam et dyspnia a Graecis dicitur id est difficultas
respirationis, et orthopnia aliter dicitur, si quidem recto
schemate iacentes praefocentur aegroti. et est passio reu-
matismus ab arteria defluens in pulmonem, unde subito
5 ad digestionem ciborum laborantes gravati malfiunt ut
etiam nimia thoracis oppressione frigidum aerem haurire
cupiant. et fit vel nascitur ex antecedenti profunda per-
frictione et ex multo cibo accepto et indigestione frequenti
et plurimo concubitu.

10 curationis tempore si grandis impetus fuerit pas-
sionis et plethoricum corpus aegrotus ostenderit id est
multitudine suci plenum, in brachio flebotomabis. sed si
forte virium imbecillitas vel aetatis aut temporis qualitas
flebotomi usum prohibuerit, inter scapulas circa spondyli
15 locum scarifabis et per cucurbitae raptum sufficientem
sanguinem detrahes. et si ex nimio frigore contigerit
hiemis tempore faciente, sacco calefacto ex tritici farina
et ervi in decoctione marrubii concocta diligentissime
vaporabis circa stomachum, et totum pectus subter per-
20 ungues chalastico superius in passione tetanica memorato
cyprino oleo resoluto, et post vaporationem lanis mundis
operies et fasciabis.

electuarium dia tu silfiu a Graecis appellatum dys-
pnoicis conveniens. recipit autem squillae medii et ysopi
25 ÷ binas, urticae seminis et polii cretici ÷ singulas, silfii

1 dipsnia (*sic*) *gc*, disnia *p*. id est: .I. *gc*, i. *p*. 2
ortopnia *g*, orthonia *c*, ortoia (-tomia) *p*. 3 praefocentur *g*:
—cantur *cp*. reumatismus *gc*, —mo *p*. 5 gravatim alfiunt
(*sic*) *g*. 7 perfrigatione *p*. 11 plectoricum *cp* et ante corr. *g*.
14 spondili *g*, —lia *c*, —liorum *p*. 15 scarificabis *cp*. 17
saculo *c*. 18 herbi in d. *gp* (herbarum decoctione *c*). ma-
rubii *p*. concocta *g*: decocta *c*, z cocta *p*. 19 subtus *c*.
20 calastico *gcp*. commemorato *c*. 21 ciprino *gcp*. 22
operis *gcp*. 23 Elactuarium *c*, elacterium *p*. diatusilfiū
(—fium *c*) *gcp*. 24 $\frac{1}{2}$ (*om.* autem) *cp*. medium *gc* (medii *p*).
ysopum *g* (—pi *cp*). 25 ÷ ($\frac{1}{2}$ *c*) binas *gc*: añ. 3. li.
semen *gc*. polium creticum *g* (polii cretici *cp*). s. semen *gc*
(haec sic dedit *p*: urticae seminis polii silfii seminis añ. ÷ l.).

seminis 2 I, caricas pingues decem, strobilos virides II, aquae sextarios sex, mellis despumati sextarium unum. conficies sicut dia prassiu superius in pthisica passione conscriptum et exinde dabis mane ieiunis coclearium unum et alium ad vesperam.

5

aliud dyspnoicis. abrotanum uvam passam rutam simul in aqua decoques, liquabis et potui dabis.

p. 193

aliud. si forte nimietas redundantis humoris fuerit, trocisco hypocapnisto uteris id est suffumigatorio, quem superius ad desiccationem humorum ad tussim humidam scripsimus.

antidotum Antipatri ex catatopon, quo usus est Galenus ad universas tusses et dyspnias. recipit autem storacis isaurici dr̄ VI, resinae terebintinae dr̄ IIII, opopanacis et galbani et iris illyricae dr̄ quaternas, murrae dr̄ II S, iusquiami seminis albi obolos quattuor. melle despumato colligitur et post sex menses exinde datur in potione fabae aegyptiae magnitudo vel quantitas. alii vero pro resina sulphuris vivi mittunt dr̄ I diligenter facientes, quia non solum plus operatur cum sulphure, verum etiam 20

1 2. I. c (cf. p): ÷ I. g. decem g: x cp. strobiles (sic) g, strobillos p (—bilios p^o), scobili c. 2 VI. et I cp. 3 conficies gcp. diaprassium gp, dioprassium c. ptisica gp, tipsica c. 4 cocl'r. I. cp. 5 alium vespere c. 6 dyspnoicis g^cc (dispnoicis ante corr. g!) Aurotanum g, apro- tanum cp. 7 dequoques g. 8 niētatas (sic) g. 9 hypo(ipo c)capniston gc, ypocanipston p. subfimagatorio c, subfumigatorio p: suffumatorio g. 10 ad tussem h. g: tussis humide c, in tussi humide (—d') p. 12 ex catatopi (i. e. ex Gal. de comp. med. τῶν κατὰ τὸν οὐδόν XIII, 66 Ἀντι- πάτρον ὃ χρῶμαι) sic solus p: om. gc. 13 gallienus g, galienus c (Gal' p). dipsnias g(c), disnias p. R (om. autem) cp. 14 (etc.) drag g, dr̄ c. isautici c, isauricu c, isauricae g. aū. 3 IIII p. 15 mirrae g (μύρρης Gal.): mire c, mirte p. 16 II. S: sic g^ccp. cum melle p. 17 sex: VI cp. datur potio in aeg. fabae magnitudinem c, dabis in potione ad f. eg. magnitudinem p. 18 Aliqui c. 19 sulphur (—ure c) vivum gcp. 20 quia cp^c: qua g.

et cum in aqua resolvitur ut detur, resina faciente glutinosum efficitur ut minime solvatur.

si vero in capite originem passionis senseris, certo tempore cyclico modo, sicuti superius in cephalaea passione scripsimus, ipsum caput cum vicina sibi subiecta membrana curabis et sanabis.

XLII. Ad stomachi passiones.

- Stomachicam passionem veteres reumatismum stomachi dicunt sive humectationem, quam pladarosin vocant. 10 sequitur autem in passione constitutos iugis salivarum sputus fastidium et nausea vel reiectatio, vomitus etiam frequenter aliquando felliti aliquando flegmatici, articulorum perfrictio, pulsus parvitas, quam microsfyxian vocant, et circa superiores thoracis partes sudoris emissio.
- 15 in curationibus autem oportet adhibere cataplasma quod appellant dia tu absinthii ad debilitatem et humectationem et fastidium stomachi. recipit autem carnes tunsas palmarum numero XXXVI, id est in una die XII, aloes epatices, absinthii pontici, mastices, omnium trium ÷
- 194 singulas semis, pollinis polentae | partes tres et lini se-

2 ad efficitur haec adnotat p^o (marg.) si fiat secundum primum modum. 4 ciclico g (ciclino p, et certo c). caephalea g. 7 Ad stomachi (—ci) passiones c et ind. cp: Ad illos qui patiuntur fastidium et nausiam p. 8 Stomachicam cp. 9 plata(—to c)rosin cp. 11 reiectatio g, reiectatio c (re-lactō p). 12 felliti etc. sic gcp. 13 perfrigatio p. microsfyxian (—iā) gp, microsfyan c. 14 remissio c. 16 diatu. absinthii g, diatu absinthii c, diatu absinthii p. 17 R (om. autem) cp. 18 numero om. p. XXXVI cp: om. (album — sine ras. — in cod.) g. id — XII om. c. id est in om. p (ubi una die <id est add. corr.> XII). aloen epaticen gc, aloes epa. (sic) p. 19 epatices (hepaticae): cf. Diosc. 3, 22 διττόν δέ ἐστι τὸ εἶδος τοῦ χυλλίσματος, τὸ μέντοι ψαμμοῦδες... τὸ δὲ ἡπατίζον. absinthii pontici g, absinthii (c, —thii p) pontici cp. mastice g, —cis c, —ē p. omnium — semis gc: an. $\frac{1}{2}$ I. S p. ÷: est (pro ÷) g, $\frac{1}{2}$ c. 20 pulentae g. tres: III. cp.

minis partem unam. concoques cum calida et modico oleo nardino, aut certe melino si aestas fuerit, et cataplasma-
bis. et post cataplasma, si forte hiemis fuerit tempus,
lanis mundis operies et fasciabis. dehinc postquam dies
cataplasmatismis expleveris, epithimate dia melilotou uteris. ⁵
est namque tonoticon et sympepticon medicamentum, id
est confortatorium et condigestorium. facit et ad debili-
tatem et ad tensionem stomachi passiones, et hepaticis
et spleneticis. est autem et podagricis optimum. et con-
ficitur sic. fascis gallici, cyperi, murræ, ammoniaci, iris ¹⁰
illyricæ, omnium specierum quinque dr octonas, croci
aloes dr quaternas, meliloti ÷ III, resinae colophonias
÷ VI, ceræ et olei cyprini libras singulas, aceti quod
suffecerit. crocum vero et murræ et aloen et ammoniacum
cum aceto conteres et sic conficies. ¹⁵

alia cura stomachi ad causas supra scriptas, ut
embrocismo curentur id est olei infusione foveantur.
primo facies duas embrocas laneas a quactiliario in modum

1 pars una *g* (ptem. I. c, pt. I. p). concoques *g*:
coques *cp*. 2 melino (mellino *c*) *gcp*. melino si etc. cf.
p. 103, 7. 4 operis *gcp*. 5 cataplasmatismis *gcp* (cata-
plasmationis *p*^c). Epithima *g*, — mate *cp*. dia
meli(lo add. *g*^c)ton *g*, diamelli loto *cp*. 6 simpeticon *gp*,
simplicis *c*. 7 confortatorium (*sic*) *gc*. condistiorum *ante*
corr. g. 8 passiones: passionem *g*, om. *c* (et passionem
ep. *p*). epaticis *gc* (ep̄sis *p*). 10 fascies gallicos (—gos *p*)
gp, faces gallicas *c* (ῥαφδον κελτικῆς *Gal. XIII*, 183. 186).
cyperum *g*, quiperi *cp*. mirra *g*, mirre (m̄re *p*) *cp*. amo-
niacum *g*, —ci *cp*. irisillirica *g*, —ce *c*, yrisillⁱ *p*. 11
omnium — octonas *gc*: añ. 3 VIII. *p*. quinque *g*: V *c*.
octenas (*sic*) *gc*. Crocum aloen *g*, c̄c aloen *c*, c̄c aloē *p*.
12 añ. 3 IIII. *p*. Meliloto *g*, melliloti *cp*. Resina colo-
phonia *g* (—e *cp*). post colofo om. *c* nie — (14) vero. 13
Caerē *g*, c̄c *p*. ciprini *gp*. añ. I. I. *p*. Acoeti *g*. 14
suffecerit *ante corr. g*, sufficit (—ō) *p*. mirram *gcp*. aloen *g*,
aloe *p* (om. *c*). amoniacum *gcp*. 15 acoeto *g*. conficies
gcp. 17 foveantur *p*: foveatur *g*, foveantur *c*. 18 facies *gcp*.
a quactiliario: aqua et iliario (illiario *p*, ilitrio *c*) *gcp*.

spaerae formatas, aut certe si ad praesens non fuerint, simpliciter ad horam de lana facies, etiam et unum quactile tenue, quod stomachum et praecordia simul et ventrem operiat. sed si forsitan et ipsum minime occurrerit, dibafos purpureos diligenter consutos similiter facies. et ipsum oleum de quo foveas conficies sic. absinthii pontici ~ I S aut si multum duas, aloes styracis mastices omnium trium scr̄ quaternos, vini veteris et olei spani ex aequali modo quantum suffecerit. omnes species pridie infusas coques lento igne in cacabo aeneo stagnato donec vinum consumatur, non tamen nimis ne oleum ardeat. et ipsum oleum liquatum mittes in gillone, et quando curare volueris, ipsum primo laborantem supino | schemate aequalem super laneo stramine iacere facies cruribus com-
 15 petenter collectis, tunc praecordia et stomachum quactili operies, et sic ipsum gillonem in olla ferventi calidae summittes ut oleum ferveat tantum quantum digitus hominis sufferre potuerit, et sic blande stomachum embrocabis. et cum ex parte oleum tepuerit quod stomacho
 20 infuderis, iubebis de embrocis laneis suprascriptis ambobus ministris ex utroque laterum astantibus celeriter rapi, et in singula vasa munda exprimes, et iterum plus calidius

1 sperae (—re) gcp. fuerit gcp. 2 facis gcp.
 quactile: quactilem (tenuem) g, quactile (q̄ctile) p, quactille c.
 3 quod (q) cp: qui g. 4 ipsum etiam g. dibafos: deabfos g, deapsis c, diapsos p. 5 facis gp (consutos — ipsum om. c).
 6 Absentium ponticum g, absinthii pontici c et (om. pontici) p.
 7 I. S. (sic) gcp. si addidi (aut multum gcp). duas gc: II. p. aloen g, aloes c, aloe p. Stiracem g, sciracis c, storac p. mastice g, —cis c, —c p. 8 omnium — quaternos gc: an. 9 IIII p. scr̄p g, scr̄p c. spani (sic) gcp. 9 sufficerit ante corr. g. 10 igne g: igni cp. stagnato gp: stagneo c. 11 consumatur g. 12 mittis in gillone gcp. 14 facis gcp. 15 quactile g, quactile p (qualitatum et si
 etc. c). 17 summittis g, summitis p, summitatis c. 20 ambos ministros... adstantes c. 21 ex utraque laterum g, ex utroque latere c, ex utraque parte p. 22 exprimis gcp. plus calidius g: calidum plus c, calidum p.

oleum infundes. hoc tam diu facies quam diu stomachus diligenter ipsa infusione foveatur. et postquam foveris diligenter deterges et purpura sicca operies et fasciabis. hoc autem per dies numero tres facies. per singulos dies ipsum oleum recalefacies.

illud praeterea admonendum, si forte mulier fuerit quae curatur, ut storacem prohibeas, ne iocundo odore matrix invitata ad stomachum levetur. solet enim haec passio frequenter fieri, stomacho per nausiam verso, secundo vel tertio mense praegnantibus rudibus ad conceptum aut certe post longum temporis partum concipiuntibus. et similiter ut reumatismum stomachi inferius scriptum curabis.

si vero duritia fuerit stomachi et praecordiorum tensio, in primis erit cataplasmandum ex faeni graeci polline et pane sicco et lini semine et malvae semine. coquantur in uno cum aqua et oleo modico et melle, et apponitur. item vero addes adipem porcinos sufficienti modo, et post dies cataplasmatibus expletos malagma Amythaonis a Graecis appellatum appones, id est Amythaonis patris Melampi. facit ad praecordiorum distensiones, dissolvit omnem duritiam, facit et ad difficilem motum articularum. est etiam et splenetice diaforeticum medicamen-

1 infundis *gc* (—des *p*). facis *gcp*. quam diu *gp*: donec *c*. 2 et postquam — operis *gp*: Post vero detergis purpura si cooperis (*relig*. et fasciabis — recalefacis *om*.) *c*. operis *gp(c)*. 4 numero *om*. *p*. facis *gp*. 5 recalefacis *gp*. 7 storacem *gp*, stiracem *c*. iocundo (*sic*) *gcp*. 9 verso *gp*: everso *c*. 10 pregnacibus *g*. 11 temporis *gp*: tempus *c*. 15 foeni *g*, fenu *c*, fen *p*. 16 pane sicco *c*: pani sicci *gp*. semine (*bis*) *c*: seminis *gp*. malve *cp*: malvae *g*. 17 Coquantur *g*: coquitur *c*, Coque(*q*)tur *p*. uno *g*: vino (*uio* *c*) *cp*. 18 adipe (*p* *p*) porcinū (*n* *p*) *cp*. sufficientē modū *c*, sufficientē (*om*. modum) *p*. 19 Malagma *g*: malagina *c*, malacina *p*. amitanos *g*, amictonos *c*, ametaones *p*. 20 amitaonis *g*, amictonis *c*, amigtaois *p*. 21 melampi (*sic*) *gcp*. dissolvit *g* (—vit *c*, dissolutū *sic* *p*).

tum, et conficitur sic. ammoniaci ÷ II, bdellii resinae terebintinae galbani omnium trium specierum ÷ singulas, |
 p. 196 cerae ÷ III S, turis masculi et murræ dr̄ quaternas, olei cyprini 2 III S. conficies et uteris.

5 aliud quod appellatur a Graecis picra Galeni, id est amara, faciens ad duritiam et ad debilitatem et oppres- sionem stomachi, quam dyspepsian vocant, et ad fastidium et ad humoris malignitatem, quam cacochymian vocant, et illis qui obtun- sionem visus ab stomacho patiuntur. et
 10 conficitur sic. accipit aloes epatices 2 I et scr̄ I, cassiae fistulae, xylobalsami, mastices, asari, croci, spicae indicae, cinnamomi, omnium septem specierum scr̄ singulos semis. tundes et tenuissime cernes et dabis coclearium unum cum calida aqua ieiunis.

15 sin vero reumatismus fuerit stomachi, quem in- continentia cibi vel frequenti vomitu plurimi humoris cognosces, omfacion in potione datum abstinet vomitum.

aliud ad stomachum confortandum et vomitum ab- stinendum. rosam siccam, absinthii pontici cymam, aloen,

1 sic: cf. *Asclepiadis apud Galenum (med. cata gene) XIII, 967.* Amoniacum (—cū) . . . bdellium. Resina terebentina. Galbani (sic) g. 2 omnium — singulas gc: añ. ÷ I. p. 3 Caerae g, certe c, cē p. murræ g, mirre c, mre p. añ. 3. III. p. 4 2 g: 3 cp (κοτύλας Gal.). Conficies gcp. 5 pigra gallieni (galieni cp) gcp. 7 quam — (9) patiuntur om. c. dyspsin g, pussim (πῦσι) p (ptān p^e). 8 cacoqui- miam g, cactochimiā p. 10 Accipit g, Accipe c: om. p. aloen epatiten g, aloes epaticen c, aloes epa. (sic) p. 2 I. et scrup. I. (sic) g(p), 3 I. 3 I. (sic) c. Cassia fistula. xyro- balsamum mastice Asaru crocu. Spica indica. Ci[n]namomum g (genitivos habent cp). 11 exirobalsami c, balsami p. masticeis c (—ō p). 12 omnium (specierum VII c) — semis gc: añ. 3 I. S p (qui post semis solus addit mel quod sufficit). 13 cernis g (—nes cp). coel'r. I. cp. 15 Sin gc: Si p. reumatismus (—mū c) gc (—mus p). 16 pluri (sic) g. 17 cognoscis gc (—ces p). omfacion gc: omfatum p. abs- tinet gc: retinet p. 18 retinendum p. 19 Rosa sicca g. comam gcp (cf. ἀψινθίου κόμης Gal. XIII, 135 etc.).

alumen scissum, crocum, masticen, omnia ad modum mittes, et quae tundenda sunt tundes et quae terenda sunt teres, et tenuissime cernes. tunc albore ovi tenui stomachum tanges et super asperges et purpura operies et fasciabis. quod si minus valuerit, cataplasmate uteris ex 5 palmulis et malis cydoniis et inanthe et alumine liparo id est liquido et polentae polline et modico rosaceo adiuncto et seminis lini modico. cum aqua coques et cataplasmas, et post cataplasmatibus dies expletos epithimate tonotico uteris id est confortatorio. croci scr̄ VI, absinthii pontici cymae scr̄ II, dactylos nicolaos numero 10 quinque, cerae 2 III, olei nardini 2 VI, vini <italici> quod suffecerit.

ad stomachi dolorem mitigandum medicamentum appellatum a Graecis anodion. recipit seminis apii partem | p. 197 unam, feniculi seminis et cumini torrefacti partes binas. hieme vero addes et piperis modicum. tundes et tenuissime cernes, et exinde dabis in potione vini ascalonii mixti calidi coclearii unius quantitatem.

sin vero paresis fuerit stomachi id est paralysis — 20

1 mastice g, —cen c, —c p. 2 mittis gp, mirtis c. et q. ter. s. teres g: om. cp. 3 tenui cp: tenuem g. 4 asperges g, —gis cp. operis gcp. 5 cataplasma ante corr. g. 6 cy(i)doniis gc, citoniis p. et inanthe (ολάνθη Gal. XIII, 180 etc.): ethinantibus g, et hinanti c, et hiantes p. liquido i. liparo (sic) gcp (rotundo supra g^e). 7 pulenti g, polenti c, pulenta p. 8 cataplasma cōis (—cionis) hic c (non p). 9 epithima g, —mate cp. 10 tonoticon i. confortatorium g(cp). crocum g (in c sic: confortatorium 7 singl'as cc 3 VI. absinthii etc.). 11 comam g, come cp. dactylos g, daptilos p (om. c). 12 V cp^e (VI ante corr. p). caera g, cere c, cē p. 2 g: 3 p, 3 c. vinum epatiten g, vini (uī, p^e nini) ptē p, aloes (sic) epatitē c. fort. italici, ut apud Gal. XIII, 184, 185 etc. 13 suffecerit: sufficit gcp. 15 appii g. 16 cimini tor(r)pecti cp: cum nitore facti g. 18 ascaloni g, scalonii c, ascoloni p. 19 coclearii unius gc: cocl'r. I. p. 20 Sin gc: Si p. parresis g, paresis c, paresis p. paralysis g, —lisis cp.

agnoscitur autem haec passio quotiens aegroti plurimo fastidio laboraverint tempore prolixo, cessante corporis nutrimento quam Graeci atrofian vocant. ob diligentiam vero curationis oleo rutaceo admixto butyro tepefacto in
5 anteriori et posteriori parte stomachum diurnis diebus perungues et lanis mundis loca tutabis et fasciabis. etiam et per inferiores podicis partes iniectionum magnifice facit.

ad stomachi defectum. vinum nigellum et fortissimum et carnosum calefacies in vase novo testeo aut certe
10 aeneo stagnato, et exinde spongiis duabus latioribus ac rudibus et concavatis alterna mutatione ipsum stomachum diebus tribus aut quinque ieiunis vaporabis. aliquando vero si plus virtutis ipsum vinum habere volueris, quo possit vires laborantis depositas erigere, species tonoticas
15 admiscebis, id est mastices grana sufficientia, absinthium ponticum, aloen, squinanthum, storacem, omnia ad modum mittes et coques in vino et sic vaporabis. hieme vero postquam vaporaveris, et nardino oleo calido summisso et diligenter calefacto perungues et sic purpura operies
20 et ut dixi fasciabis.

suppl. VI* [trociscus faciens ad stomachi atoniam et ad ventris reumatismum infantibus. masuca confecti de vitibus non-

2 laboraverint *g*, —runt *c*, laborant *p*. 3 quam (^q *p*)
gp: *q* (quod) *c*. atrocian *g*, atrofian *c* (—fiā *p*). 4 oleum
rutaceum *g*, oleum rutacois *c*, ol'm rutaceo *p*. admixtum
butirum *p* (—o *gc*). tepefactum *gp*, —to *c*. 5 diurnis *g*:
diuturnis *cp*. 6 perunges *gp*, —gues *c*. tutabis *gc*: tu-
babis (*ut semper*) *p*. 7 iniectionum *g*. 9 calefacies *gp* (male-
factis *c*). in vas novum testium (innos testium novum *c*)
a. c. eneum stagnatum *cp*. 12 ieiunus *g*. 15 admisces *gcp*.
mastices *gc* (—c *p*). 16 ponticum *om*. *cp*. squinanthum *g*,
—ti *c*, —tos *p*. 17 mittis *gp*, —tes *c*. 18 summisso *g*,
summisso *cp*. 19 perunges *gp*, —gues *c*. operis *gcp*. 21
seqq. usque ad v. 10 p. 103 exciderunt in g. aconia *c*, athoma *p*.
22 masuca (μασούχα): cf. *Act. 13, 118. Alex. Tr. p. 322. 470*
Bas. etc. masuca confectio ros corticis robustos (*sic versu uno*
om.) *c*, māsuca (māsūca = mansueta *p*^o) confectio de vitibus

dum mustariis, maciros corticis robusti quem profert India terra, balaustii, mannae turis, erices carpu, absinthii pontici suci dr̄ senas, acaciae, hypoquistidos suci, lapathii seminis, myrtae nigrae granorum siccorum, rus syriaci, omnium quinque dr̄ quaternas vino myrtino colliges et in usum ad nausiam pueris minoribus teres cum aceto et oleo melino, hieme nardino, et lines stomachum hieme tepido, aestate frigido, et super purpura operies et fasciabis. ad reumatismum vero ventris cum oleo lentiscino et aceto, et similiter purpura operies et fasciabis.] 10

ad stomachi perfrictionem et singultum. dia trion pipereon antidotum inferius scriptum in modum fabae cum calida aqua ieiunis dabis. aut filonium antidotum cum frigida apiata dabis, hieme cum tepida. sin vero ex calido humore circa digestionis tempus cum morsu et flaccore stomachi singultus fuerit natus, aqua tepida plurima patientes potabis, et postquam dederis immissis in ore pennis vomitum provocabis. etiam et sternutationem similiter provocabis. sin vero ex plenitudine humorum fuerit singultus praeter febrem acutam, purgatorium dabis, 20

nondum (nd') m̄taũs (in mag. ī ā d'tutib; n̄ | d'mutariis i. e. in alio de tutibus non de mutariis p^o!). magiros. cortices robustos p. 1 magiros p (μάκροσ. cf. macir Pl., μάκρ Gal. Diosc.). quam sic (q̄ p, q̄, c) cp. 2 india (terra om. p): cf. Plin. 12, 32. Galen. XII, 66 (ἐκ τῆς βαρβάρον Diosc. 1, 111). balusti. manne turis c, balaustium. thus manna p. erices cp. fort. mirices, μυρτῆς (Diosc. 1, 117 et 116). carpii c, carpum p. cf. c. 48. 3 3 senas c, añ. 5 VI p. 4 mirte p, mire c. grana sicca p. ros siriaci cp. 5 omi V. 3 quaternas c: añ. 3. III. p. cum vino m̄tō p. colligitur cp. 6 ī pueris m. c. 7 cum aceto m̄lō (sic) p. linis cp. 8 tepidum . . . frigidum c. operis cp. 9 ventris (sc. teres) cp. 10 et fasciabis om. c et ante corr. p, add. inter lin. p^o. 11 perfrictionem p. 13 aut g(p): Ahd' (aliud) c. filonium gp: philonium c. 14 apiata gcp (sed p^o opiata). Sin gc: Si p. 16 flaccore gc, flactione (flactōe) p. 18 in ore g: ore p, in os (unos sic) c. 20 sine febre acuta p.

si tamen virium qualitas fuerit suffragata, sin minus, acriori clystere ventrem deduces.

p. 198 ad stomachi ventositatem sive | inflationem et tensionem polii cretici manipulum unum in aqua decoques
5 et ipsa decoctione ieiunum potabis. aut nepetae aut mentae decoctionem admixto modico melle et piperis granis triginta potui dabis. et post haec epithima diaspermaton Filagrii appones. et conficitur sic. cardamomi, cyperi, herbae sabinae, nitri, bacarum lauri, cassiae fistulae, meliloti, faeni graeci pollinis, fascis gallici, seminis apii, samsuci, anesi, panacis radices, omnium tredecim uncias ternas, ammoniaci guttae et resinae terebintinae uncias senas, mellis, olei nardini, adipis taurini, cerae, omnium quattuor libras singulas. aliqui vero pro oleo nardino cyprinum mittunt et pro radice panacis opopanaxem.
15 et si ad praesens terebintina non fuerit, colofoniam mittunt. addunt olei 2 III, aceti quod suffecerit ad conterendum. ammoniaci gutta sola sive cum opopanace facit ad universas inflationes stomachi vel ventositates et epatis et
20 splenis, et ad omnia magnum est medicamentum.

1 Si c. 2 acriore c. deducis *gp*, —ces c. 4 polii cretici *p* (polue | retici c): polium creticum *g*. 5 et ipsam decoctionem ieiunus potabis *g* (et ipsam d. ieiuno potui dabis *p*), et in ipsa decoctione ieiunum potabis c. nepite (nebite *g*^c) mente *g*, nepite mente *cp*. 7 grana *gcp*. XXX *cp*. epithima *gc*, eph'a *p*. 8 filagri *gp*, filargiri et filagni c. accusativos iterum habet *g*, genitivos *cp*. sic enim *g*: Cardamomum. Ciperum. Herba savina (savine *p*, favine c). Nitrum. Bacas (Baccas etiam c, —carum *p*). Cassia fistula. Melilotum. Foenigraeci pollinem. Fasces gallicos (item *p*, fascis callicis c). Semen apii. Samsucum (Samsuci *p*, Sansuci c). Ani(e corr.)sum. Panacis radices (—cis *cp*). 11 omnium — ternas *g(c)*: añ. ÷ III. *p*. 12 Amoniaci guttam *g* (—gutte c), armoniac gutta *p*. 13 uncias senas *g*: 7 V c, añ. ÷ VI. *p*. caere *g*, cœ *p*: om. c. 14 omnium quattuor (omnium trium sic c) l. s. *gc*: añ. l'. I. *p*. 15 radicibus *g*, radiē c, radice *p*. inducunt opopanaxem *p solus*. 17 oleum. 2. III *g*: olei 3 III. *cp*. sufficit *cp*. Ad conterendum *g(p)*: om. c. 18 sive cum oppopanice c: sive opopanaxem *gp*.

aliud epithima dia samsucu appellatum similia medens. recipit samsuci et bacarum lauri siccarum et faeni graeci moliti omnium trium libras singulas, nitri 2 II S, storacis calamitae optimi 2 III, cerae olei cyprini libras singulas semis, resinae terebintinae libras duas. quae sunt sicca⁵ diligenter tundes et cernes et sic solubilibus resolutis superasperges, et movebis donec coagulentur.

ad vomitum constringendum de Vindiciani Afri. mastices et uvae passae enucleatae uncias singulas, cumini leviter torrefacti scr III, omnia in uno contundes, et¹⁰ panno inductum sicut emplastrum stomacho impones.

XLIII. Ad spleneticam passionem.

Est autem splenetica passio causatio in splene quae contingit cum insurrectione. sequitur patientes extantia et dolor circa sinistram praecordiorum partem et fastidium¹⁵ et corporis totius mala habitudo, quam Graeci cachexian vocant.

1 epithima *gc*, epith'a *p*. dia samsucum (—c *p*) *gcp*. appellata *g*. 2 samsuci et bacę l. siccae *g* (bacharum — bacarum *p* — l. siccarum *cp*). 3 moliti *g*: moliti *c*, melli loti *p*. omnium — singulas *g* (omnium trium libras *om. c*): añ l'. I. *p* (in marg. *p*^c i & l' S). Nitrum *g*. 3 (3 *c*) II. S... 3 (3 *c*), III. *cp*. Storacem calamiten optimum *g*, storaci calamite optime *c*, storaç cal' (sic, *om. opt.*) *p*. 4 libras — semis (S *c*) *gc*: añ l'. I. S *p*. 5 Quae sunt terenda diligenter teres et sic... *c*. 7 aspergis et moves *gcp*. coagolentur *gcp*. 8 de vindiciani afri. (sic) *g*, devinci diamasti. (mastiç. uve etc.) *p*, *om. c*. idem remedium sic accuratius habet Pseudo-Plinius (Romae editus) 2, 11 (f. 38^a Bas.): „Ad vomitum restringendum. Masticae unciam unam, cymini denarium unum, haec omnia separatim trita, postea uva passa enucleata permisceas, et linteo inductum stomacho suppones.“ 9 masticiis *g*, —c *p*, R mastiç *c*. añ. ÷ I. *p*. Cumini *g*: cimini *cp*. 10 omnia *gp*: *om. c*. uno *gp*: vino *c*. contundis *gcp*. 11 inductum *gp* (inducendum *c*): inducto *p*^c. im(i) *c*ponis *gcp*. 12 Abhinc usque ad finem libri incerta omnia deficiente codice *g*. Ad splenis passionem *c* (et in Ind. capp. *p*), De splenetica passione *p*. 13 causationi splene *c*, icatō i spleñ. *p*. 14 S. autem *p. p*. 16 cachexian *c*: cacesiam *p*.

curationis vero tempore flebotomia in manu sinistra adhibita circa medium digitum minorem desinit splenis extantia.

trociscus ex Filagrío conveniens splenetici et ortho-
 5 pnoicis id est is qui ab splene anhelitum patiuntur vel
 recto schemate iacentes praefocantur. traditur enim quod
 per urinam splenem attenuet et extantiam ipsius deducat.
 accipit autem struthii herbae radices siccae et capparis
 radices siccae corticis et chamaedryos et panacis radices
 10 et tamaricis seminis, omnium quinque paria pondera: cum
 aceto squillitico colliguntur et trocisci singularum drach-
 marum informantur et in umbra exsiccantur. ex quibus
 unum ieiunis cum oxymelle et apiata calida dabis.

aliud ad splenem. filonium antidotum cum frigida
 15 aqua apiata ieiunis dabis, hieme vero cum tepida, et post-
 quam dederis, supra eandem partem aegrotum iacere
 iubebis ita ut manus ipsius iacentis post dorsum habeat
 positionem.

ad splenem <potio> quae per urinam longi temporis
 20 splenem attenuando deducit. betonicae herbae tritae 3 III

1 in manu *om. c.* sinistra: *cf. Gal. X, 904.* 2 ad-
 hibita *c:* et habita (*hīta*) *p.* medium *om. c* (*κατὰ τὸν παρὰ-
 μσον δάκτυλον Gal. XI, 296. cf. Aet. 10, 11 p. 639.* de-
 primit *s.* extantiam *p.* 4 trociscū *cp.* filagrío *c,* filagrío
p (*hic non extat inter multa Philagrī apud Aetium 10, 11*
(cf. 8, 57) sed est Andromachi apud Galenum XIII, 241.
 splenetici *p,* — cum *c.* orthomnoicis *c,* orth'odico (*in marg.*
i ā orchondicis) *p.* 5 is: *his p, om. c.* ab *c:* a *p.* 6
 iacendi *c.* 7 deducat *c:* defluere faciat *p.* 8 Accip̄ aū *c:*
 B̄ *p.* struci *p:* struen *c.* 9 camedreos *c* (— deos *p.*) 10
 tamaricis (tamaraci *p*) seminis = *μυρίτης καρπὸν Gal.*
 omnium V *c:* *om. p.* paria pondera *p:* pari pondere *c.*
 11 sqliitico *cp.* colligis . . . (trociscos . . .) in formas . . . sicca
 (*sic*) *p.* 13 ieiunis *c:* *om. p.* oximelle *cp.* apiata *c:*
 opiata *p.* 14 filonium *c,* filonos *p.* 15 aqua *om. c.*
 ieiunum *c,* ieiunis *p.* vero *om. p.* 16 egrotum — (19) per
om. c. 19 Ad splēn. q̄ (que) *p* (*pro potio quae?*) 20
 splenem tenuando *p,* splenetici attenuando *c.* hēr trite 3. III
 cum (vino nigro ciatos *etc.*) *c,* herbe 3 III. teres cum *p.*

cum vini nigri cyatis III potui dabis per dies III aut V in mense.

item alia potio ad splenem et ad initia hydrops, quae per ventrem solvendo humorem deducit. ebulli herbae viridis radices eximito de terra et excutients lavare 5 noli. quod duobus digitis comprehendas, vel tribus si plurimum humoris deducere volueris, conterito ex vino veteri et potui dato: mirifice sanabis.

item alia potio ad splenem. hederæ radicem et caparis radices corticem viridem vel siccam decoques com- 10 petenter in vino styptico usque ad tertiam partem et ex ipso liquore ieiuno dabis calicem I minorem.

aliud. hederæ folia viridia et nepetam viridem, quam calaminthen vocant, et puleium et squillae medium decoques competenter in aceto acri. post haec proicies 15 herbas et in ipsam decoctionem mittes hordei pollinem et ervi et faeni graeci, et his sacculo inclusis splenem vaporabis, et post vaporationem cyprinum oleum cum aceto et nitro aut sale trito ex aequali modo simul ferve-

1 post ciatis. III. add. p et eā vel cā tātūd' (= et de ea tantundem?). 2 in uno mense p. 3 Item om. p. ad inicia ydropis c: ad initiantem ydropisin p. 4 que ventrem resolvendo p. 5 radicem dextra exuce (corr. deterra excute p^e et idem in marg. iterum i. summe eximito de terra et excute et) lavare noli p. 6 comprehendis cp (cf. Gargil. c. 24, Gal. XIII, 254 etc. χειροπληρές = manipulum ib. 242). 7 nolueris c et ante corr. p. contrito cum p. 8 de hac potione cf. Apul. herb. 91. 9 Item ad c, Alia potia ad p. radices p. 10 radiū cortices sive (sic) virides sive siccas p. competenter om. p. 11 stitico (sic) ad tertias et p. 12 ieiunum c, —nis p. 13 ne(o c)pitam cp. quam — medium om. c. 14 calamitem p (cf. Garg. Mart. c. 23). quille p. coques pott (pottē = potenter p^o) p. 15 post hec (h') p: et post quam c. proicis (—hiciis p) cp. 16 et om. c. ordeum et herbum et fēn g. p. 17 herbi c. his om. c. 18 p. v. adhibe ciprinum c. cum aceto om. c. 19 et (nitro) aut c. ex om. p. 19 ferve facis c, fervere facis p.

facies et in lanis redactum patienti loco appones, et fasciabis.

aliud splenicum medicamentum desiccatorium et confortatorium ad splenis debilitatem ex infusione humoris, a Graecis cedrinon appellatum. recipit cedriae, ammoniaci guttae uncias senas, resinae frixae libram I, auripigmenti, aluminis scissi, olei veteris, omnium trium uncias singulas et semis, aceti acrioris quod suffecerit.

aliud ad ventositatem splenis. epithimate dia spermaton
10 aut dia samsucu uteris superius ad ventositatem sive inflationem stomachi scriptis.

aliud ad duritiam splenis vel saxietatem, quam Graeci scirrosin dicunt. malagma Amythaonis appones quod superius ad duritiam stomachi scripsimus.

15 aliud ad duritiam splenis. tus masculum et ammoniaci guttam aequali pondere teres diligenter, et frequenter sucum supermittes coliculi ex foliis viridibus expressum ut efficiatur in similitudinem emplastri, et inductum in charta vel aluta spleni appones.

20 si vero in aegritudine cum febre acuta fuerit splenis causatio, tribus diebus cataplasma bis ex faeni graeci poline et hordei partibus singulis et lini seminis partibus duabus cum aqua et rosaceo et modico melle concoctis.

1 lanis c, latus p. redactum cp. apponis c. 3 splenicum p (—c c). 4 ex infusione: et infusionem cp. 5 cedrinon (cf. Gal. XIII, 249): citron c (Simon s. v.), cedrinon p. appellatum c: —tur p. B cp. cedriae: cere c, cō p. 6 7 senas c: añ. ÷ VI. p. lb' I. c, l' I. p. 7 o. tr. 7 singulas et semis c: añ. ÷ I. S p. 8 sufficit cp. 9 epithima c, —th'ate p. 10 diasansuco cp. inflammationem cp. 11 scriptum c, —tis p. 12 duritiem p. saxietatem p, sacietatem c. Graeci addidi: om. cp. 13 scirrosin c: sclirosin p (cf. Simon s. scirodes). amicaonis c, amitatois p. apponis c. 14 ad stomachi duritiem con. scripsimus p. 16 et sup. sucum c. (om. frequenter) p. 17 cauliculi cp. 19 apponis cp. 21 tribus p, in (pro III) c. 22 et ordeī partes II cum aqua . . . (om. partibus — seminis) c. 23 molē mellis p.

et oxymel ieiuno cum apiata dabis, et post dies cata-
plasmatis expletos Nileos splenicon lexyphyreton appones.
et conficitur sic. cerae, ammoniaci guttae, olei rosacei
÷ III, croci 3 VIII, aloes 3 VI. aliqui tamen croci 3
VI mittunt. aceti quod suffecerit ad conterendum crocum 5
et guttam ammoniaci.

XLIII. Ad epaticam passionem.

Est autem epatica passio causatio in epate, quae
contingit cum tumore viscerum. haec signa laborantes
secuntur. est dolor dextrae partis et extantia viscerum et 10
tumor. dehinc cum passio creverit, indigestio frequenter
nascitur.

in curationibus vero flebotomia in brachio dextro in
vena cava media secundum vires patientis adhibita utilis
comprobatur. 15

aliud. tritici farina in decoctione absinthii et aneti
cocta et apposita in sacculo inclusa dolorem mitigat.

aliud. artomeli cataplasma adhibitum est utilissimum.

aliud. absinthii pontici infusione ieiunos potabis.

aliud. costum ieiunis masticandum dabis, ut ipsum 20
humorem inglutiant. et in eodem latere aegrotum iacere
iubebis.

1 oximelle c, oximl' p. ieiunū c, —nis p. 2 nileos
s. lexyperiton cp (*Nελεως Gal. XIII, 182. cf. Nestlov 181*).
3 3 III c, añ. ÷ III p (uncias trinas). 4 cō 3 VIII cp.
aloe p. tamen (vel añ, autem): om. p, cū (*supra scr.*) c.
3 VI c, 3 VI p. 5 sufficit cp. et ad (cont.) p. 6 et
(g.) om. c. 7 Ad epaticam passionem c (Ad epaten in
Ind. capp. p). De epatica passione p. 10 est c: om. p.
et tumor c, et hūor c, et hūor p. 11 curaverit p. 13
vero c: autem p. *cf. Gal. II, 904. XI, 92 (Orib.*
Syn. IX, 18). 15 approbatur c. 17 dolores p. 18
artomelli c, āxo(= arxo)m'l'i p (*cf. Gal. X, 796. 910*). est
utilissimum (uti illisim sic c, in marg. p^c utillimū) p: valde
utilimū c. 19 ieiunus c, ieiun p. 20 ieiunus p. et ut
i. h. glutiant imperabis p. 21 et in e. l. iaceat (sic) c.

aliud. sanguisugae dolenti loco appositae mirifice operantur.

aliud. trociscus dia tom picron amygdalon appellatus ad conclusionem sive obstrusionem epatis, quam enfraxin
 5 vocant. petroselinī, costi, gentianae, amygdalarum amararum, anisi, aloes epaticae, absinthii pontici cymae, omnium VII paria pondera aqua colliges et facies trociscos drachmarum singularum, ex quibus dabis unum ieiunis
 non febrientibus cum vino mixto, febrientibus vero cum
 10 aqua calida. et in ipsa parte facies iacere laborantes.

antidotum tonoticon id est proficiens adversus debilitatem epatis. recipit spicae indicae, costi, gentianae, inulae campanae, omnium IIII 3 binas, rei pontici 3 I, mellis despumati 3 III. dabis in modum avellanae cum
 15 vino mulso ex modico melle confecto, febrientibus vero cum decoctione apii.

potio epatica ad enfraxin epatis. costi, ireos illyricae, ladani omnium trium ÷ singulas, piperis grana numero XXVIII. si vero ladanum non inveneris, faeni graeci

3 trociscō c, —cum (—ē) p. appellatum cp^c (—tus ante corr. p). cf. sim. Gal. XIII, 209. 4 obstrusionem cp (obstrusionem p^c). emfrasin c, <ē p^c?> fraxī p. 5 ante petrosilinū (c, pet. lini p et ita in rel. acc. c, gen. p) habet B p, h'. c. amigdalas amaras (acc., ut in rel. spec.) c. 6 comā c, cōc. (sic) p. 7 omī VI. S (S pro I?) c: om. p. cum aqua p. colligis (—g p) cp. facies cp. 8 drāmarum p, 3 c. dabis. I. c: unum dabis p. ieiunis p: —nū c. 9 μᾶτ' ὀλῶν ἡσυχίειν Gal. XIII, 212. vero c: autem p. 10 aqua om. c. et in ipsam partem super iacere facis l. p. facis cp. 11 tonoticon c: tonicon p. 12 B c: om. p. 13 inule ante corr. p: uelle c, enule (e ex corr. ips.) p. omnium... binas c: añ. 3. II. p. 14 m. d. 3 III. S. c. avellane p: om. c. 15 febricitantibus c. vero om. p. 17 enfrasin c, ēfrasī p. epatis om. c. urondill' c, viros. illirice p. 18 ladā c, laudini p. omnium tr. 2 s. c: añ. ÷ I. p. nūo c: om. p. 19 XCVIII p (ex corr. pro C VIII?). 19 ledan c, laudanum p.

leviter torrefacti et maltae pollinem mittes, tundes et cernes omnia tenuissime, et dabis coclearium I ieiunis non febrientibus <cum vino mixto, febrientibus> vero cum aqua calida.

cataplasma ad enfraxin epatis. afronitri cibaria numero 5 XV, lini seminis centum, hordei ducenta, calidae et olei quod suffecerit.

aliud ad duritiam et tumorem epatis. centaurium, anetum, asfodili radices et papaveris capitella decoques in oleo et modica aqua, et ex eodem oleo lanas appones. 10

sed si forte apostema in epate fuerit natum, quod ex praecedentibus signis in empyemate superius memoratis agnoveris, diureticis potionibus idem apostema per urinam purgabis, hoc est graminis radices mundaes, feniculi radices corticis, dauci cretici seminis id est pastinacae hor- 15 tensis, petroselini macedonici, asari, ysopi, inulae. haec singillatim aut simul in aqua decoquenda, et ipsa decoctio data per urinas ducit.

cataplasma diureticon id est urinale ad idem et ad dolores ex perfrictione natos. pollinis tritici et lini se- 20 minis et faeni graeci paria pondera, cymini seminis,

1 leniter *cp.* malthae (?): molti *c.* ml'ti (multi) *p* (*sed supra* malti *p^o*). pollines *c.* mittis *p.* tundes et *om. c.*
2 omnia *om. p.* cocl'r. *cp.* 3 non febrientibus (autem *add. p*) cum aqua calida *cp.* 5 enfrasin *c.* āfrax. *p.* nūo (*ante cib.*) *c:* *om. p.* 6 XV *p:* tv (= cv) *c.* linis *cp.*
centum *om. c.* bis *c c.* 7 sufficit (*suff' p*) *cp.* 9 asfo-
dilli *cp.* rad' *p.* radīc *c.* et papaveris — (10) aqua *c:* *om. p.*
10 et (*ante ex*) *addidi.* 11 apostema *om. c.* quod *p:*
q 2 cū (quod et cum) *c.* 12 empiemate *c:* empiēma *p.*
13 diureticis *om. c.* i. apā *p.* 15 seminis | l. (*pro i.*) pasti-
nace ortensis *c* (*Sim.*), sem δ(= ortico) *p.* 16 macedonici
om. p. isopi *c.* yso. *p.* imila *p* (*et supra ips. corr.* enula),
i ulle *c.* hec *om. c.* 17 singulatim *cp.* decocta, et ipsa
decoctio data *p. u. d. p.* decoquenda et sic contu(e?)ndenda
p. u. d. c (*cf. c. 47*). 19 diureticō *c.* —cū *p.* ad eandem
et dolores *p.* 20 perfricatione *cp.* 21 cimī. feniculi se-
minis ameos. baccarum lauri. dauci. cretici. sem. pastinace.
ortensis (*haec ex sup. v. 15*) añ. ÷ I. 5 *p.*

seminis feniculi, ameos id est seminis vilicionis, bacarum lauri, dauci cretici, omnium quinque uncias singulas semis, caricas pingues numero XV cum aqua et melle et modico oleo coques et appones, et post cataplasma dia
5 spermaton epithimate uteris aut dia samsucu superius ad ventositatem stomachi scripto.

XLV. Ad renum dolorem.

Piperis, petroselini, asari, bacarum lauri, omnium quattuor paria pondera tundes cernes diligenter, et dabis
10 coctlearium I in passo tepefacto potionem ieiuno tribus diebus. et si immobiliter se habeat aegrotus, confestim sanabitur. sin vero reperta fuerit arenosa qualitas in urinis post medicaminis potionem acceptam, sicuti Galenus in diagnostice ait, manifestissime nefretica passio
15 intellegitur id est renalis.

potio optime confringens lapides in renibus natos. carpobalsami, lapidis qui in spongiis novis reperitur, puleii sicci floris, malvae agrestis seminis, omnium

1 ameos. I. semin | vilicionis baccas l. d. cr. omī V. 2 singulas 5 c. 3 nūo c: om. p. 5 epith'e p: om. c. aut om. p. diasansucum c, —co p. 6 scriptum cp. 7 Rubrica deest in p (in marg. 46 p^o), cum ipso fort. principio capituli. 8 bacarum p, baccarum c. omnium quattuor c: om. p. 9 paria pondera tunsis cretis diligenter dabis c, paria p. tunde diligenter et cerne. dabis p. 10 coel'r. l. cp. potionem om. c. ieiunū III diebus c: I. tribus diebus ieiunis p. 11 si — egrotus p: om. c. 12 Sin c: si p. reperta p: repleta c. arenosa qualitas (τὴ φαρμάκων Gal.): arenarum qualitas c, arena (sic simpl.) p. 13 galienus c, gal' p. 14 diagnostice c, dig'staco p (= περὶ τῶν πεν. τόπων VIII, 391). 14 nefreca c, nefretica p. 16 lapidem . . . natum p. 17 R praemittunt cp. lapides p. om. c (ἴδου τοῦ ἐν σπύγγῳ ἐπισημαίνοντος Gal. XIII, 328 ubi idem fere remedium Asclepiadis). que p, q̄s c. re-
mittitur c; —iuntur p. 18 pulegii c, pullei p. florē cp
(Gal.). seminis c: semen p.

quattuor paria pondera conficies et dabis coclearium I in potione vini tepefacti aut passi conditi.

antidotum nefreticum calculosis aptissimum. recipit betonicae spanae, fascis gallici uncias singulas semis, saxifragae petrosae seminis aut petroselini, seminis olusatri, folii barbarici id est malobathri, piperis albi uncias singulas, meu S, omnia diligenter tundes et tenuissime cernes, et melle despumato colliges et exinde a balneo mox lotis dabis avellanae magnitudinem cum vino mixto.

confectio conditi nefreticis conveniens et maxime¹⁰ calculosis, quos lithiontas vocant, et minctus difficultate laborantibus, quos dysuruntas vocant. recipit piperis 3 I, saxifragae, betonicae ÷ binas, spicae indicae, petroselini, fu, asari, radices acori, dauci cretici seminis, omnium VI 3 singulas, vini aminaei cotylas quattuor, mellis despu-¹⁵ mati cotylas II. S.

trociscus dia fyalidon appellatus faciens ad ulcera quae in renibus sive in vesica nascuntur et indigent in cicatricem duci, et ad eos qui sanguinem mingunt. recipit cucumeris hortini seminis descamati, apii seminis,²⁰

1 IIII. c: om. p. conficies cp. coel'r. cp. 2 passo condito p, conditi passati c. 3 nefreticum c, nefreticis p. calculosis c (item infra v. 11). R cp. 4 spane c: om. p. 4 fascis gallicis c, fascis gallicos p. añ. ÷ I. S p: 7 singulas meu S. etc. c, qui intermedia omnia neglexit. 5 sem. olixatri p. 6 folii (cf. Diosc. I, 11): follis p. al. añ. ÷ I. meu. S. p. 7 tundis c. 8 cum melle p. colligis cp. a balne | i. mox lotis c, in balneo lotis p. 10 cf. sim. Alex. Tr. p. 534 Bas. 11 lithiuitas c, litiuntas p. et minctus — (12) vocant p: om. c. 12 R cp. 13 7 binas c: añ. 3 II p. pet. p. 14 sem. p: om. c. omi V (sic) 3 singulas c: 3 I (om. añ) p. 15 cotillas quatuor c. cotillas VIII. p. 16 cocillallu femis (pro cotillal II. S?) c: cotillas. II. p. 17 diafissalidon c, diafissalidē p. idem similiter describitur in additamento Alexandri Trall. latini (post gr. IX, 6) II, 188 quod citatur a Simone Jan. s. v. fyalidos. vulnera p. 18 et diligenter i. c. d. c. 20 ortim c, cortui p. descamatū p, om. c (qui post lapatii seīs habet descamati). sem. post apii om. c.

lapathii seminis, nuclei leviter torrefacti, croci, omnium
V 3 IIII, amygdalas dulces descamatas et avellanas simili-
liter purgatas numero denas, herbae fysalidos quam Ro-
mani vesicariam appellant, interiora grana numero XXXV.
5 conteres omnia et adiecto passo competenti veluti con-
spersione in unum rediges, et exinde ieiunis dñ I dabis
non febrientibus cum passo tepefacto, febrientibus autem
cum aqua calida.

aliud nefreticis et calculosis conveniens id est
10 Bestiane antidotum ieiunis datum lapides in renibus con-
fringit et urinam provocat.

aliud ad renum dolorem. exira medicamentum in-
ferius scriptum in aluta inductum appones, et sanabis.

1 nuclei cp: cf. *Alex.* nucleorum pini prefrigereorum (l.
pefrigmenon. cf. *Simon* s. prefrigmenum). leviter p: om. c.
cc (croci) p: om. c. 2 añ. 3. IIII. p. et om. p. simili-
liter om. p. 3 numero denas: añ. X. p, om. c, qui a pur-
gatas transit ad v. 4 nũo. 35. herbas sisalidos... bese-
cariam p. cf. *Simon. Jan.* s. fisalidos ex *Alex. lat. ed. Pap.*
f. 101^b: phisalidos quam latini vesicaginem vocant. 4 nu-
mero om. p. 5 veluti — rediges c: colligis p. 6 ieiun
dñ I. dabis c: ieiunis dabis 3. I. p. 9 Aliud nefreticis...
i. bestiae c: om. p. *Actio X*, 6 p. 630 ex urinam cientibus
antidotis memorata. cf. etiam cod. *Paris. app. f. 86^a*. Antidotum
bestiane appellatum confringens et in renibus caucolos sive
lapides quos greci litos appellant. convenit maxime his qui
ex obtusione caucolorum dissuriam patiuntur i. urine difficul-
tatem. facit et ad alia multa. Recipit cinamomi etc. 12 e
xira (ἡ ξηρά): o(e? p)xira cp. inferius ubi? — conscribitur in
antidotario cod. *Paris. app. f. 85^b* Exira (in marg. Ocxira) ap-
pellata et (est) desiccatorie virtutis ad omnia ulcera et sinus
universos conglutinat et fracturas. inunges et arteticis et poda-
gricis. nefreticis. spleneticis. et duritias mollit mirabiliter et
callositatem atenuat. et est ad omnia utilissimum medicamen-
tum. Recipit cere etc.

XLVI. Ad ea quae vesicae accidunt, quae a Graecis symptomata appellantur, nos vero accidentia dicere poterimus.

Omniū logicorū testimonio natura vesicae nervosa iudicatur, quae sub ingenti perfrictione aut frigore ab humore venenoso et mordaci nocetur. <quod> maxime fieri solet cachexia laborantibus id est mala habitudine corporis. oros enim sanguinis, qui latine serum appellatur, qui ex sanguine per venam epatis depurgatur mixtus felli rufo descendens vesicae ulcerationes universas vel asperitates aut debilitatem nutrit. unde omnes passiones vesicae difficili curatione medentur. sunt vero suprascripta accidentia periculosa ischuria id est ex toto urinae abstinētia, et dysuria id est urinae difficultas, et stranguria id est urinae paulatim per guttas exclusio.

15

1 Ad vesice passiones 46 c, Ad ea que vescice accidunt p, (Ad vesice dolorem ind. p). *deinde quasi a textus initio sequuntur veteris tituli verba* De his quae vesice accidunt quae . . . appellantur etc. c, sic mutata in p: Ea quae vesice accidunt. (que om.) a grecis s. app. 2 symptomata c, sinthomata p. 3 dicimus c. 4 logicorum p: om. c. natura — iudicatur: inatos vesice nervos iudicatur c, vesica irru (in marg. p^o natura) nervosa iudicatur p. 5 sub c: ab p. ing. perfrictione aut frigore c (item Petroc. p. 265): ing. frigore p. ab: aut cp (Petr.). 6 et p: aut c (Petr.). quod: hoc p, om. c. solet maxime p. 8 oros: sic cp. sanguinis — app. p: sanguinem pro latitudine feru appellatur c. 9 per v. epatis c (Petr.): exueā separato p. 10 ruffo c: suo p. descensu p. v. universas ulc. p. 12 p. v. curationes difficiles ingeruntur p. Sunt enim supradicta p, Si vero suis (pro SS) c. 13 scuria (—ā c) cp (Simon s., „Scutia ut Cassi. fe. vessice passio s. quando extoto denegatur urine exitus etc.“ cf. Petr. p. 265). 14 disuria (—ā c) cp. 15 p. p. g. urine exclusio p. exclusionem gignūt (sic) morsus et ulceratio ex antecedentis h. acredine fieri solet . . . c, exclusio. ex antecedentis h. a. contig. <et ulceratio add. corr.> et dolor et morsus et ulceratio fieri solet . . . p.

contingit morsus et ulceratio ex antecedenti humoris acredine et dolor fieri solet initio urinae excludendae aut in fine explicandae.

item in vesica paralyti vitata ant paulatim urina per
5 guttas insensibiliter excluditur, si ex parte fuerit tacta, aut involuntarie simul exclusa ostenditur, si omnis fuerit vitata.

est iterum altera passio ex incontinentia urinae paralyti vesicae deterior. ex renibus descendens et vesica
10 compatiens efficitur, et appellatur a Graecis diabetes, siquidem mox potione accepta per urinales vias raritate membrorum interiorum descendat tamquam per inania feratur. rarius quidem contingit haec passio, sed subito nascitur. et est omnino incurabilis. aliqui hanc passionem
15 hydropismo adscribunt, quoniam nimia siti patientes afficiantur et subalbidum et aquosum vultum ostendant.

contingit iterum ex renibus ulceratis sanguinolentus minctus aut saniosus vel subalbidus, aliquando cum gravi odore, attestante renium dolore et ilium. si vero sanguis
20 purus fuerit exclusus, eruptionem venae aut putredinem ipsius significat in renibus aut vesica factam fuisse, qua loca quae patiuntur dolore pulsata desanguinentur.

2 excludente *c* (*qui om.* aut — explicande). 4 item in: Item *c*, Iterum in *p*. p*er* vitata *p*. 6 omnis *c*, tota *p*. et est *p*. 9 descendens (*sc. urinae*): descendēs (*sic*) *p*, *om. c*. 10 diabetem *c*, —tē *p*. 11 mox potione accepta *c*, mox ut in potione acceperit patientes continuo *p*. urina — descendat: *p* urina² viam raritate membrorum suo descensu *c*, urinam (u²ra³) p*er* uā (*sic*) raritatis membrorum interiorum descendit *p* (*cf. Alex. lat. f. 104^a*: quia cum biberit mox decurrit sicut potatum fuit per vesicam et ventrem). 12 per inania *c*: p*er* inania (*sic*) *p*. 15 i(y *p*) dropismo *cp*. ascribunt *c*. quoniam (q*ui*m) *c*: Siquidem *p*. 16 et (*ante aq.*) *om. p*. ostendunt *cp*. 17 Contingit *p*: Exit *c*. 18 aliquando cum *c*: et *p*. 19 attestante *p* (att— *c*). renium *c*, renum *p*. iliorum *p* (illū *c*). 20 irruptōe³ (*ir del. corr.*) *p*. vene significat aut *p*. 21 ipse *c*, ipsius vene *p*. vescicam *c*, vesicā *p*. 22 qua(?): q*ui*ā *p*. qua — (*p. 117, 2*) patiuntur *om. c*.

si vero atonia fuerit vesicae id est debilitas, subito urinae egerendae delectationem patiuntur, et cum mingere coeperint cum ingenti conatu et gemitu humorosas urinas excludunt, aut per somnum involuntario lapsu urinam emittunt. et frequenter haec passio paralysin vesicae futuram significat.

contingit iterum dysuria in vesica ulcerata aut ex renibus irruente lapide extensa, aut limosa aut arenosa qualitate solidato et gleboso sanguine, quem Graeci thrombon appellant, in ipso urinali meatu obtrusa. 10

contingit iterum dysuria in aegritudine pessima, cum fuerit natura suo officio privata.

curationis vero tempore si fuerit ex frigore aut profunda perfrictione dysuriae causatio cum ingenti dolore, oleum rutaceum per podicem frequenter aegroto iniciendum est. in feminis vero matrici est infundendum. etiam et extrinsecus pubetenus praeraso pectini vel inguinibus lanae apponendae ex oleo cyprino calefacto, aliquando admixto castoreo, si forte plus calefieri oportuerit. et si venter abstinerit, clystere erit deducendus ex decoctione faeni 20 graeci aut radicis malvae oleo admixto. adhibendae sunt etiam in sessionis fomentationes, nam Graeci encathisma

1 athonia p. 3 ceperit cp. 4 per somnum (p
sonnū
sepnūāi p) p (Petr.): sompno c. 7 (item 11. 14) dissuria p.
8 irruente c, irruenti p. aut (limosa): autem cp. 8 soli-
data aut globosa c, sordidata aut glebosa p. quam cp.
trombon c: trumbon p. 10 obtrusa cp. 11 egritudinibus
pessimis cp. 13 vero c: om. p. aut c: vel p. 14 per-
strictio p. 15 iniciendum egroto (om. est) p. 16 matrix c.
17 pubetenus c: om. p. pectine cp. 18 calido p. mixto
c, amixto p. 19 si forte calidius fieri op. p (si forte plus
calidum fieri op. Petr.), Si vero plus calefieri op. c. 20
clisteri c. est p. 21 radicis c, indhē p (radicum Petr.).
amixto oleo p. sunt etiam p: om. c (ubi adhndum i. f.).
22 insessiones fomentationes c: sessiones (fñhoēs fomentationem
p (sessiones Sim.). nam c: quas p (Sim.). encatismā c
(encatismata Sim.).

vocant, ex calida et oleo. solet enim vesica etiam si fuerit constricta subtili fomento relaxari et urinam retentam reddere. quod si minime urina fuerit secuta et perseveraverit supra dicta periculosa abstinencia, oportet
 5 in cruribus si vires patiuntur supra talos interiores venas incidere. et si dolor non minuerit, adhibendum est cataplasma ex lini semine et faeni graeci et hordei polline, admixto papavere trito et resina pinali et pice. transacto autem dolore apponendum cerotarium ex resina frixa et
 10 ysopi suco et ammoniaci gutta et oleo sicyonio confectum. si vero lapidum vel arenarum fuerit querela, similiter ut nefreticos curabis.

sin vero ex cachexia corporis de humore venenoso et mordaci ulceratione facta asperitatem cum dolore in
 15 capite naturae senserint patientes, reumatismo adscribitur. oportet ergo lacte asinino tepefacto frequenter ieiunos potare. quod si ad praesens non fuerit, caprinum dabis, et embroce calida ex lanis succidis et rosaceo et vino mulso aut passo admixto sub umbilico pubetenus pectinem vel
 20 utraque ilia cooperies. mulieribus autem et pessarum ex lacte asinino vel caprino aut muliebri lacte apponendum. in viris vero si in capite naturae morsum cum dolore senserint, per auliscum oticum aeneum lenem, et non osseum ne frangatur, aut certe argenteum fabricatum et

1 etiam: et *p.* 5 tales *cp* (*cf. Gal. X, 904*). interiori vena *c*, interiores venas *p* (super talos venas interiores *Petr.*). 6 minuerit *cp* (minuitur *Petr.*). est *om. c.* 7 pollinis *c*, pollinibus *p* (polline *Petr.*). 8 papaveris *c* (et semine agrestis papaveris *Petr.*). pinali *cp*: pinea *Petr.* 9 et ysopi suco et armoniaci suco et armoniaci gutta *p.* 11 si — (12) curabis *om. c.* 13 Sin *c*: Si *p.* de *c*: vel *p.* 15 senserint (*cf. v. 23*): scripserint *p*, *om. c.* reumatismo *c*, renatismo *p.* 16 ergo *om. c.* ieiunū *c.* 17 quod: sed (*l*) *c.* appresens *p* 18 embroce calide *cp.* roseo *c.* 20 alia cooperis *c*, acoris *p* (ylia operis *p^o*). et *c*: *om. p.* 21 lacte *c*: *cm. p.* 22 si *i p*: *om. c.* 23 eneum *p*: *om. c.* lene *p*, lane *c.* et non osseum — fabricatum *p*: 7 ros siccu frāgatur aut arteum fabricatur *c.*

vesicae porcinae alligatum, non nimis interius sed in caput naturae incies cervinam medullam susino oleo resolutam aut butyrum recens aut adipem anserinum vel gallinaceum. adhibenda etiam encathismata ex decoctione rosarum lenticulae myrtae rubi lentisci vel his virtute 5 similium. apponendum etiam et dia iteon emplastrum sive illud medicamentum quod graece ebarbaros appellatur, renibus et pectini praeraso, aut finicinen quam Galenus in libris emplastrorum quos cata gene appellant, nostram dia chalciteos nominavit. proficiente autem curationis tem- 10 pore erunt in cibo dandi suini pedis mucrones, testiculi madidi ex aqua et cerebrum assatum, de piscibus autem torpedines aselli murenae, de pomis vero uvae mala cydonia granata et his virtute similia. dandum etiam ieiunis aliquid sorbile quod humorem acrem et tenuem 15 et asperum valeat obdulcare et crassificare et lenire, ut est amyllum procuratum aut polenta ex aqua elixa et cum vino nigello addulcata aut oryza aut grana ptisanæ et his similia. probatur etiam dari sorbendum quod conficitur sic. ex nucleis recentibus et cucumeris semine descamato 20 et amygdala dulci et amylo cum lacte in uno diligenter tritis et leviter concoctis dandum ieiunis cum vino

1 vesice porcine aligatū c: vesica porcina alligant p. 3
butyrum recentem cp. 4 adhibendam p, —dum c. etiam
p: et c. ancatisma c, encatasma p, encatasmata p.^c. 5
mire c, mirte p. 6 similibus cp. diaiteon p, diaciteon c.
7 grece c, greci p^c (om. p). embarbaros p, barbaros c.
8 et c: aut p. fenicene p, fenicēte c. galienus c, gal' p
(= Gal. XIII, 375). 9 in libro emplastrorum p, librum
emplastrorum c. quos cp. catagenos c, —nes p (Sim.).
nra (nostra) cp. 10 autem p: igitur c. 11 suini (c, suelli p)
pedes mucrones cp (cf. Gal. VI, 671). t. macrones madii c,
t. acroēs mādidi p (cf. Gal. VI, 676). 13 vero c: om. p.
uva cp. 14 cidonia cp. 15 quod p: ut accipiat quod c.
acerem c, acrum p. 16 linire c(p^c): lenire p. 17
po(u c)lentum . . . elixum cp. cum c: om. p. 18 adul-
catum c, obdulcatum p. grana p, grane c. 20 (item p. 120,
4) descamato p, desquamato c. 22 et concoctis leviter ;

chrysattico. frequenter dare iubebis vel illud quod curandae ulcerationi vesicae aptum a veteribus probatur, et conficitur hoc modo, et magis caniculari tempore. lini seminis et papaveris albi <et cucumeris> seminis descamati⁵ et draganti tunsii et creti, omnium IIII ÷ binas, amyli recentis 3 IIII. aqua colligitur et trociscus informatur. etiam et trociscus epuloticus ad obducendam cicatricem dari oportet ex vesicaria herba confectus, quem Graeci dia fysalidon vocant, quem superius in nefretica passione¹⁰ conscripsimus. utendum etiam aquis calidis naturali calore plantatis — nam Graeci autofye idata vocant. sunt enim virtutis metasyncriticae hoc est quae valeant naturalem temperiem corporis renovare.

XLVII. Ad cholicam passionem et defluxionem.

¹⁵ Utraeque passiones acutae vel celeres esse noscuntur. sed cholerica passio plus acutissima et molestior a veteribus esse traditur. et est reumatismus ventris et stomachi sursum et deorsum per os atque ventrem subito natus.

1 dlatico p, oris atico c. dare iubebis c: om. p. illud p: om. c. curanda ulceratione c, curande ulcerationis p. 2 probatur p: —tum cp^e. 3 et magis (mag) cp. canicularis temporis c. 4 hoc ipsum est Andromachi apud Gal. XIII, 322 πρὸς κύστιν ἡλικωμένην καὶ δυσουρίαν (cf. Orib. syn. 9, 24). 4 (et 5) et om. p. et cucumeris addidi (ex Gal. I. c): om. cp. 5 draganti p, tracanti c. om IIII 2 binas c: añ. 3. II (cf. Gal.). 6 cum aqua p. troc p, trociscū (... confectū) c. 7 etiam et empulēticum obducendum c, etiam i t^o cis. epuleticus ad obducādā (sic) p. 8 besicaria c, beficaria p. 9 diafysalidon p, diafysidion c. 10 cūscripsimus c, scripsimus p. caloris c. 11 nam: sic cp. octo hes data c, ā offies data p. 12 meta sincretice c, —cratici p. 14 Ad colericam passionem 47 c, De fluxione rubr. p. 15 Utræque p. (sic incipit) c: In defluxione utraque p. p (unde in tit. addidi et defluxionem). 16 plus acutissima et molestior c: plus acuta magis molesta p. 17 stomachi et tris p. 18 natus p: inatus (enatus?) c.

sequitur autem in passione constitutos articuloꝝ perfrictio et parvitas pulsus, iugis vomitus cum intestinorum tormento, et ventris solutio ac stomachi cum pruritu ventris. efficitur ex antecedenti indigestione aut mali medicaminis accepta potione. et differt a diarria, quoniam ⁶ cholERICA passio sicut diximus per ventrem efficitur et vomitu plurimo, diarria vero non.

in curationibus vero polentam elixam calidam in cibo dabis cum vino melino id est granaticio, et alia quae simili virtute valeant stomachum confortando recreare et ¹⁰ vires patientis depositas erigere. sed si forte ea quae acceperit minime stomachus tenuerit, modico <tempore> interposito iterum reficies. hoc tertio vel quarto facies quousque stomachus aliquid acceptorum retineat, ne vires aegrotantis minuto corporis nutrimento insumantur. etiam ¹⁵ et summitates manuum ac pedum constringi iubebis, et articulos pannis calidis calefacies et lana molli opertos tutabis, et si nimium senserit intestinorum tormentum, spongiis duabus ex calida posca expressis alterna mutatione umbilicum vaporabis et post vaporationem lanis ex oleo ²⁰ melino tepido operies et fasciabis. et si nimietas vomitus coegerit, cucurbitam stalticam id est constrictoriam ori ventris conglutinabis, et omfacium cum calida aqua dabis. et si adhuc cibos minime tenuerit stomachus, erit

1 con(9)frictio c, perfricatio p. 2 cum om. c, ubi int. tormentum. 3 ac c: et p. 5 potione accepta p. 8 vero om. c. polentum (pulentum c) elixum calidum cp. 9 mellino p, malino c. granaticio p: grana triticeo c. 10 simili mō (= modo) virtute c. 12 denuerit (sic) c: retinuerit p (cf. v. 24). modico (sc. tempore) sic cp. 13 reficies (sic p) — (14) retineat om. c. 14 <aliquid add. p^o> ut (del. corr.) p accēto p. 15 egrotantium c. etiam et in p, etenim et c. 16 constringi: cf. Gal. XI, 50 (διαδυσ. scil. propter musculorum contractiones. Aet. 9, 12. 13. p. 545. 546 Lugd.). 17 calefacti et l. m. c. et om. p. optos tuta (sic) c: om. p. 18 senserit c: sumserint p. 21 et tepido p. operis cp. 24 tenuerit c: retinuerit p.

accipienda curatio in reumatismo stomachi superius memorata.

XLVIII. Ad dysenteriam.

Est autem dysenterica passio intestinorum causatio
 5 cum ulceratione, ex qua excluditur egestio sanguinolenta
 aut fellita et alia immutatio humoris. et illa noxia a
 veteribus nuncupatur quae nigram egestionem ab initio
 ostenderit. nam Hippocrates in aforismis sic ait „dys-
 enteriae a felle nigro incipientes mortiferae“. sequitur
 10 autem patientes iugis assellatio inferioris ventris, aliquando
 fellita, aliquando viridis et sanguinolenta, aliquando mucil-
 aginosa. et rasuras cum gutta sanguinis emittunt, cum
 morsu intestinorum et umbilici. insomnietatem patiuntur
 et fastidium, frequenter et febriculam. aliquando etiam
 15 et longaonis exclusio contingit, maxime infantibus. et
 efficitur aliquando ex perfrictione, aliquando autem ex
 corruptione acriorum ciborum.

tempore autem curationis mala cydonia in aqua de-
 decoquenda usque ad tertiam partem, et ipsa decoctio potui
 20 data abstinet ventrem.

aliud. palumbus, quem Graeci fassan appellant, in
 posca decoctus et comestus similiter abstinet.

item ovum in aceto coctum facit similiter.

1 in: ex c, et (7) p. 3 Ad dissinteriam c, De disinterica
 passione p. 4 dissinterica cp (et ita semper). 5 cum
 ulceratione: cf. Gal. VIII, 85, 381. (XIII, 288). Aet. (ex
 Archig.) 9, 43. 6 et aluminatio humoris c, et alia i mutō
 (inmutatio) humoris p. 7 nuncupatur. que nuncupatur. que
 nigra etc. p. 8 ypocrates p, ipocras c. amforismis c.
 Dissinterie cp. 9 a om. c. mortifero c, mortificare p.
 11 mucil(p)aginosa cp. 12 et c: etiam p. emittit c.
 14 et fastidium frequenter et fabricula p, et sanguine frequentat
 et febricula c. 15 et om. p. in infantibus p. 16 per-
 fricatione p. aliquando autem: aut cp. 18 cidonia c,
 citonia p. decoquenda (cf. c. 43): decocta cp. 20 re-
 tinet p. 21 palumbꝫ p, plūbuꝫ c. q, greci palūbū fossa
 app. c. 23 item — similiter c: om. p.

aliud. acaciae, croci, ges asteros in vino datum coclearium I similiter abstinebit.

aliud. summitates rubi quas vulgo turiones vocant, et murra cum caduco granatae et galla omfacitide in vino styptico simul decocta et in potione data sive per inferiores partes podicis iniecta summe facit.

aliud. ptisana cum plantaginis suco decocta et data abstinet ventrem, iniecta autem eadem perficit.

potio ad dysenteriam. ossa de locusta marina super carbones exusta, gallas leviter subassatas, os sepiae similiter subassatum, crocum sive caducum mali granati, bitumen iudaicum aut pro bitumine picem siccam, omnium V paria pondera diligenter teres et in posca dabis.

aliud ad dysenteriam. trociscus dia symfytu appellatus, quem superius ad sanguinis reactivationem scripsimus aut dia coraliu aut certe dia electru aut trigonus trociscus similiter in potione datus magnifice operatur.

aliud. lac asinum aut caprinum schiston confectum et datum abstinet ventrem. schiston dicunt Graeci lac in quo lapides fluviales incensi mittuntur sive extinguuntur.

aliud ad dysentericos et ciliacos, id est illos qui ex ventris passione id est ulceratione similiter ut dysenterici

1 acacia cp. croci (cc): cū cp. gesteros c, gesastereos p. dato c: data p. 2 coel'r I cp. 3 vulgus cp. vocant c: diē p. 4 mirra p, mire c. candico c, fadico p. granate (sic) cp (i. e. mali granati, ut infra). gallas omfatidas cp. 5 simul decocta et data potione p, si coques et in pocionem data c. 6 sume fecit c, suē fac p. 7 et om. p. 8 autem c: vero p. 9 (item infra semper) dissinteriam cp. et super cp. 10 exustas c. leniter cp. 11 crocū c, cc p. 12 pice scice c. 13 V c: om. p. posca c: puscas p. 14 ad dissinteriam p: om. c. dia sinifrus p, dianifstus c. 15 superius cap. 38. 16 diacoral(l add. p)ium cp. dia electiū p, dia eletirū c. 17 in potionem damus et m. c. 18 kalton p, filcon c (σφατόν Diosc. 2, 77). 19 Sciton p, Siascon c. lac p: ita c. 20 fluviales p: fluinales c. incensi p: om. c. 21 ciliacos c: quiliacos p. i. illis qui c, i. qui p. ex om. c. 22 i. ulceratione — caprinum om. c.

reumatizant. lac caprinum optimum et pingue coques moderate super carbones in cacabo fictili novo et admiscebis amyli recentis sufficientem modum, et sorbendum dabis ieiunis diurnis diebus. et post haec supercomedendum dabis aliquantum sicci panis. etenim hoc adiutorii genus reuma crassescit, acredinem temperat, ulcera cicatricat et intestinorum ac ventris asperitatem lenificat.

trociscus anotericus id est qui sursum in potione datus servando superiores ventris et intestinorum partes medetur, optime faciens dysentericis et ciliacis. recipit iusquiami seminis albi, ameos seminis id est vilicionis, apii seminis, feniculi seminis, hypoquistidis suci, balaustii id est floris <mali granati>, ammoniaci, omnium specierum 3 IIII, opii, gallarum, amyli, ges asteros, rus syriaci, acaciae, draganti 3 II. aqua colligitur et fiunt trocisci 3 singularum, ex quibus datur unus non febrientibus vespertino tempore cum vino mixto calido in potione, febrientibus vero cum aqua calida. et lentericis optime facit.

lenterici dicuntur qui ex antecedenti dysenteria intestinorum debilitatem faciente, perduto naturali calore, cibos quos accipiunt continuo indigestos vel crudos tamquam per lenem intestinorum lapsum egerunt. unde passio lenteria dicitur. et est incurabilis, maxime in

2 amiscebis *cp.* 4 ieiun⁹ (—nus) *c* (ut saepe). diurnis: diuturnis *cp.* 5 aliquantulum *p.* 6 cicatricat *c*: —zat *p.* 8 anaticus *c*, anotic⁹ *p* (*opp. κατωτερικὰ φάρμακα Gal. X, 527. Aet. 9, 48. 49.*) 9 servando (fervando) *c*: om. *p.* 10 quiliacis *p.* R *cp.* 11 ameos *p*, et ameos *c.* i. uilicionis *c*, i. iucilidiois *p.* cf. *supra c. 43.* 12 ypoquistidi *c*, —dos *p.* et balaustia *c* (*ἀνθος ἀγρίας ροιᾶς Gal. cf. Plin. 23, 112.*) 13 i. floris (—res *p*) a(r)pmoniaci *cp.* omī spē 4 3. IIII *c*: añ. 3 IIII *p.* 14 gallarum — (15) trocisci *om. c.* 14 gestastereos (*sic*) *p.* rossiriaci *p.* 15 añ. 3 II *p* (i. e. omnium sp. 3 binas). cū aqua collig⁹ *p.* 3 singularum *c*: 3 unius *p.* 16 unus *p*: I. *c.* 17 mixto *om. p.* in potione: *om. p.* potionem (ποθοēm .I. febrientibus *etc.*) *c.* 18 aqua *om. c.* 19 illi qui *p.* ex *om. c.* 20 calore *p*: cocolore (*sic*) *c.* 22 ole^r *p* (eierunt *supra p.*), gerunt *c.*

aetate vergenti, unde plerumque laborantes si hanc passionem curare praeterierunt, hydropici postmodum efficiuntur.

catapotia ad dysentericos et ciliacos et lentericos. gallae tunsae et cretae 3 II, opii 3 I. aqua colliges et catapotia facies in modum ervi. et post annum a quo confeceris dabis in ovo sorbili euntibus dormitum grana tria aut V, aut si multum VII.

cataplasma dysentericis conveniens. mala cydonia numero VI in partes incidēs, interius purgata in posca usque ad maturum coques et diligenter teres. simul et palmulas numero XXXVI, id est in una die XII exossabis et in posca similiter coques et teres et addes caduci mali granati et acaciae ÷ III, mastices 3 II, aloes et aluminis lipari id est liquidi ÷ singulas et semis, rus syriaci 3 I, pollinis polentae partes III, et lenticulae partem I, mellis et aceti et aquae quod suffecerit.

epithima dysentericorum dia finicon appellatum non solum ad dysenteriam faciens verum etiam et solutionem ventris et stomachi ac pulmonis et omnium interaneorum reumatismum compescens. recipit autem palmularum nicolaorum carnum ÷ II, acaciae, aluminis scissi, turis masculi, mastices, corticis granatae, hypoquistidis suci,

1 estate *Petr. p. 270.* vergenti c: útēti (vertenti) p,
urgenti *supra p.* 2 curari *cp.* 4 catapocio c, —putie p.
quiliacos p. 5 3 I. p: 3 II. c. colliges p: —gis c. 6
catapocias c, —putias p. facies *cp.* herbi (her c) *cp.*
a quo dabis conficis dabis c, aqua conficis dabis p. 7 eunti
dormientibus (*sic*) c: dormientibus p. 8 ā. multum VII p,
aut multum VIII c. 9 citonia p. 10 nūo c: om. p. 11
matu4 (*sic*) *cp.* simul p: similiter c. 12 nūo c: om. p.
exossas c, exossa p. 13 et (in p.): sed *cp.* caducum *cp.*
mali granati c: granate p. 14 (*item* 23) mastiē *cp.* aloen c,
aloe p. 15 liparii p. singulas et S c, I. S p. 17
sufficit *cp.* 21 conpescet p, —cit c. R *cp.* autem
om. p. 22 cōnū p, carnes c. 23 corticis granate (*sic*) c
ipoquistidi c, ypoquistidos p.

gallarum, aloes, omnium VIII ÷ singulas, et si forte hypoquistidis sucum non inveneris acaciae duplum mittes, cerae lib' I, olei myrtini lib' I, aceti ad conterenda quae sunt sicca quod suffecerit. cetera cum oleo resolves et
5 raso cerotario in mortario commiscebis.

trociscus catotericus id est qui deorsum per podicis partes iniectus servando inferiores intestinorum partes medetur, et appellatur a veteribus Faustinianus, conveniens is qui diuturna putredine in dysenteria laboraverint. accipit autem auripigmenti, sandaracae, calcis
10 vivae, omnium trium ÷ binas, chartae combustae 3 XXX. colliges suco plantaginis et facies trociscos 3 ternarum et binarum ac singularum. secundum diversas aetates mensuram temperabis et inicies cum suco oryzae aut
15 lenticulae.

alius trociscus optime medens. ubi putredines non fuerint singulariter adhibitus et somnum provocat. nam dormientibus cicatricem inducit. ubi vero putredines fuerint, admixto suprascripto Faustiniano uteris. recipit
20 autem hypoquistidis suci, gallarum, lycii indicii, omnium trium 3 V, cadmiae 3 VIII, acaciae 3 XI, murrae 3 VIII,

1 aloe c, —ē p. omī etc. c: añ. ÷ I. c. 2 ypoquistide c, —dos p. mittis cp. 3 lb' c, l' p. q. sicca sunt p. 4 sufficit c (non p). 5 rasum cerotarium cp. commiscet cp. 6 catroius c, catorēticus p. 8 idem fere est *ἐνεμα φασστινιανόν* apud Gal. XIII, 296 (ex *Andromacho*). cf. etiam pastillos Faustinianos apud Aet. 9, 49 p. 612 (et de iis Archig. ib. p. 611). Petr. p. 273. 9 his cp. qui put. d. p. durna (sic) c. 10 Accipit autem c: R p. 11 omī etc. c: añ. ÷ II p. 3 (pro ÷ p) XXV p°. 12 colligis cp. cum suco p. fac cp. 3 ternarum c, 3 III. p. 13 et binarum — singularum c: om. p. et secundum d. p, sed et d. c. 14 suo (suo p°) oridie cp. aut c: i. (id est) p (et in marg. rep. oride i. léticl'e). 16 Al' tōē p, Aliud trociscum c. 17 Nam p: nō c. 18 SS c: supradicto p. trocisco (post Faust.) add. p. R ypoquisti (sic) p, R et ūt h i ipoquistide c. 20 luci indicii c, litii. indiē p. omī trium 3 V c: añ. 3 VI. p (in marg. i & V p°). 21 catmie cp. acatie 3 XII. p. mirra c, mirre p.

balaustii 3 X. colligitur vino myrtino et inicitur cum decoctione rubi aut myrtae aut mali granati corticis aut rosae siccae aut ramorum siliquae graecae. decoques in vino et aqua singillatim aut simul in uno, et prae-vaporatis partibus alterna mutatione spongiarum, supposito 5 clunibus cervicali, incies per enetera id est tibiam in-jectoriam multis cavernulis perforatam quae appellatur polytretos.

collyrium suppositorium, quod Graeci ypotheton vocant, conveniens is maxime qui frequenti deiectione assellationis 10 surgendo fatigantur. somnum etenim provocat, ventrem abstinet et quietam noctem laborantes transire facit. accipit autem croci styracis murrae castorei acaciae, omnium V 3 singulas, turis masculi 3 III. suco plantaginis colli-gitur et fiunt collyria sublonga. 15

ad exclusionem longaonis. erices carpu, gallarum,

1 in vino m. c. 2 vel mali p. cortices c, — c̄ p.
3 decoque (—q) p. 4 singulatim cp. 5 subposito c. 6
cruribus c. ptibienethera p, pt'ibi z (et) edera c (unde la-
tentem voc. tibiam transposui post i. = id est. cf. aulicon quem
nos tibiam dicere poterimus Cael. p. 191). iniectorium c,
—ria p. 7 multis — (9) Collirium om. c. perforata
que . . . politreton p. 9 ipoteton c, ypotēn p (cf. Alex. lat.
f. 115^b, gr. p. 462 ed. Bas. 1556. cf. p. 450 ἄλλο ὑπόθετον
ἢ κολλύριον etc.). 10 et conv. p. c. maxime his qui p.
is: his cp. 11 resurgendo p. 12 retinet p. transire
facit p: . . i|scere fac (sed mutata c in i) c (ubi scil. primae
litterae, i. e. versus praecedentis ultimae, legi nunc non possunt).
Accipit autem c: R̄ p. 13 stiracis c, storacis p. mirre p,
mire c. omnium etc. haec dedi ex c. nam mire confusa
(propter turis masculi notam duplicem) praebet p (post acatie)
haec: ypoquistidos suci. pini cortic. thuris mas. añ. 3 I. paria
pondera collig. cum suco plantaginis et fac. colliria sublonga
confectum lenibus apponens. preloto ipso longaone uno bono
subanstero aut lentisci vel mirre decoctione. addunt etiam
gallas. cerusam. acatiam supradicto pondere. 16 idem est
τὸ ἡμέτερον πρὸς τοὺς προπύκτωρας ἀρχοὺς ap. Gal. XII.
313 (ἐπεὶ τῆς κακροῦ etc.) et Act. 14, 7 p. 842.

cerussae, acaciae, hypoquistidis suci, pini corticis, murrae, turis masculi, omnium VIII paria pondera. siccum appones levius confectum praeloto ipso longaone vino bono subaustero aut lentisci vel myrtae decoctione.

5 XLVIII. Ad ictericos.

Icterici dicuntur morbo regio laborantes. et est fortitudo fellis cum totius corporis insumptione. sequitur autem aegrotos ex infectione fellis pallor corporis cum aurium et oculorum crocei vel aurei coloris fantasia. unde
10 ab aliquantis latine aurugo appellatur. sequitur autem ventris egestio humida, urina etiam fellita et corporis pruritus. et sunt ictericorum distantiae duae, una cum febricula, et appellatur a Graecis oxites id est acuta, altera sine febre diuturna quae appellatur chronites. sed
15 illa quae cum febricula fuerit facta oxites ex tumore epatis fieri ostenditur, altera vero quae sine febre est chronites ex fellis dissolutione.

ob diligentiam vero curationis eam quam ex tumore epatis fieri intellexeris flebotomia in manu dextra in vena

1 ipoquistidi *c* (ypoquistidos *p*). mirrae (*propter* VIII) *addidi ex Gal.* (σνίγουρης). 2 siccum appones lenis confectum (*sic*) *c* (ξηραιὸς κατὰ πᾶσας *Gal.*). 3 levius (leib; *p*): lenis *c*. 5 Ad hystericos *c*: Icterici dicuntur morbo regio (*pro rubr.*) *p*. 6 Hicterici *cp*. et est *p*: i. (id est) *c*. 8 autem *om. p*. 10 aurigo *c*. autem: a (*sic pro aū*) *p*, et *c*. 12 duae: *vid. Gal. XIII, 229 (XIV, 735)*. 13 a grecis — appellatur *om. c*. oxites: *sic p*. 14 cronites *p*, chronites *c*. Sed et que *om. c*. 15 oxites *c*, oxith *p* (—ten *supra p^c*). 16 chronites *c*, cronites *p*. 17 *post* dissolutione haec addit *c male interpolata*: Hictericis in primis purgatorium dari convenit deinde flebothomare post ea color illa aliter non colligitur in suco de radícula frequenter in balneo per unguatur. Item ad desperatos hictericos rauani sucus sicca bibatur cum quocūque potu pām mane ieiunus. Ob diligentiam vero *etc.* 19 *de flebot. cf. Gal. XI, 92.* in vena cava mādia a. curabimus *p*.

media cava adhibita curabis. et post dies detractio-
nis sanguinis expletos oleo anetino diligenter toto corpore
perunctos lavacro calido ex aqua dulci lavabis.

aliud. apium cum modico aceto decoques usque ad
tertiā partem et ipsam decoctionem cum modico melle 5
potui dabis ieiunis ante lavacrum. hoc autem summe per
urinas fel deducit.

alia potio ictericis. ervi subtorrefacti 3 VI, fascis
gallici, cornu cervini exusti 3 binas, cyperi 3 I, meu
3 I. dabis coclearium cum aquae mulsae calidae cyatis 10
III in lavacro.

aliud. piperis, rutae hortinae, seminis melanthii,
iuniperi bacarum quas Graeci arceutidas vocant, cymini
alexandrini agrii sicci, nitri vernicarii, omnium 3 I.
tundes et cernes et dabis ante lavacrum ieiunis coclearium 15
I cum vino dulci. et si venter non fuerit, clystere de-
ducendus erit ex decoctione cantabri et betae et colo-
quintidis cum oleo et afronitro et melle modico.

aliud conveniens is qui sine febre fuerint. in una
coloquintide excavata mittes passum aut mulsam ex vino 20

1 detractio-*nis* (*om. sanguinis*) *p*: curationis sanguis (*sic*) *c*.
3 peruncto *p*. dulci *p*: *om. c*. 4 opii *c*, app'os *p* (*cf.*
Act. p. 647 extr.). aceto *c*: aneto *p*. dequoques *ante*
corr. c. 6 ieiunum (*—nu3*) *c*. 7 fellem *p*. 8 Alia pocio
hictericis *c*: Al' disintericis potio *p*. herbi subdorefei *c*,
herbi rub' torrefacti *p*. 9 binas *c*, III (? *obscur.*) *p*. ci-
peri *c*: qpis (quiperis) *p*. 10 coel'r. (*et ita semper*) *cp*. cum
aqua mulsā calida (*—dos c*) ciatis (*—tos c*) III. *cp*. 12
rute ortice semiñ *m. c*, rute. cortice sicco semen *m. p*. 13
bacarum *c*: baccas *p*. arcotidas *c*, orotidas *p*. vocant *c*:
dicunt *p*. 14 agrii argui (*argui sic*) *cp*. vermicarii *c*,
uerui. carui *p* (*νίτρον βερνίκιον Gal. XIII, 568*). omi
coel'r. I (*om. 3 I — ieiunis*) *c*. añ. 3 I. . . ieiunis coel'r. I. *p*.
16 fuerit *p*^o *in marg.* 17 colocynthide (*—d' p*) *cp*. 19
is: his *cp*. una *c*: uno *p*. 20 colocynthida *c*. cavata *p*.
mittes *p*: —te *c*. ex vino melle (mellis *p*) tempera-
tam *cp*.

melle temperato, quam appellant Graeci inomelitos, et calefacies et potui dabis per dies III.

aliud. silfii coclearium I cum vino mulso ante duas horas lavacri potui dabis. aut marrubii viridis suci co-
5 clearium unum cum vini mulsi cyatis III potui dabis aut anchusae coclearium I cum vino.

aliud. apoflegmatismum qui naribus infunditur, et a Graecis appellatur rinenchyton, eo modo quo superius in capitis passionibus scripsimus per triduum naribus in-
10 fundes, et sanabis.

L. Ad ventris et intestinorum reumatismum.

Est autem reumatismus ventris et intestinorum praeter febrem assellatio ventris humida, et aliquando cum morsu et aliquando sine morsu.

15 curatio autem eorum talis est, sicut Galenus ad Glauconem scribens ait: uti lavacris debebis calidis et constrictiva cibatione.

LI. Ad colicam et iliacam.

Est autem colica passio tumor cum ingenti dolore
20 totius ipsius intestini quod Graeci consuete colon appel-

1 ynomelitos *p.*, momellitos *c.* 2 calefacis *cp.* per
III. dies *p.* 4 potui — (5) dabis *om. p.* 7 Al¹ *p.*: *om. c.*
apoplegmatismū *c.*, apoflatismū *p.* (*de apoflegmatismis v. Gal.*
XII, 566. 582.) qui: quod *cp.* et *om. c.* 8 reneticō *p.*
mētītō *c.* (*Sim. s. menticon = δινέγγυρον*). eo *c.*: eodem *p.*
9 passione *p.* 11 De reumatismo *p.* 13 asellatio *p.*
aselatio *c.* 14 et (*om. p.*) *add. p.* et — morsu *om. c.*
ubi cum morsu in eo curatur (—rat¹) autem eorum calēe sic
galienus *etc. in his* sine morsu *p.* = in eo (*pro* sine eo?)
c. 15 Cura *p.* (*cf. c. ad v. 14.*) eorum *c.*: ipsorum *p.*
galienus *c.* (gal¹ *p.*) *ubi?* in libro *deperdito?* an in *textu ver-*
sionis vet. latinae? 16 ait uti lavacris dabis calidis et con-
strictiva vaporazione *c.*, ait filz lavacra (—*cri ante corr.*) calida.
et constrictiva cibatio *p.* (*cf. Petr. p. 277.*) 18 Ad *c.* et yliacam
(*sic*) *c.*, De colica passione *p.* 20 totis ipis itestis colli qm̄ *c.*
totius ipsius (i^o) intestini coli quod *p.* *cf. Cacl. ox. 3, 143.*

lant, quod aliquanti inferiorem ventriculum dicunt. sequitur autem aegrotos dolor iuxta umbilicum initians frequenter a sinistro ilio, aliquando a dextro, cum constrictione ventris et doloris punctione discurrente per singula ventris loca, aliquando usque ad splenis partes⁵ vel epatis. efficitur cogente interclusa ventositate intercutem et peritoneon <id est> membranam quam vulgo mappam dicunt, quae ventrem sub cute circumvestit. et cum passio augmento dierum creverit, sequitur insomnietas, febricula et nausea cum frequenti vomitu humoris flegmatici, aliquando felliti. sin vero modicum retro circa renes aut circa urinales vias, quas Graeci ureticus porus vocant, subito natus fuerit dolor similiter ut colicis praeter vomitum et constrictionem ventris et febriculam, vastioris lapidis constrictionem in renibus significat.

ileos autem sive chordapsus est acutissima et molesta cum abstinencia ventris et vomitu et omnium intestinorum tumore distentio cum tortione simili torturae chordarum. unde nomen ileos sive chordapsus accepit. et cum passio increfcere coeperit, spe sanitatis consumpta nimio intestinorum tumore, stercorum vomitus efficitur, ultimo etiam

1 aliquanti c: aliquando p. v. inicians dicunt c (cf. ad v. 2). 2 autem om. p. inici et (post dittographiam verborum) consuete — ventriculum) iterum inicias c: ī tās (intrans) p. 3 ylio p, alio c. 4 dolor punctuosos discurrrens c, dolores punctio discurrentes p. 5 et aliq. p. splenis p: ventris c. 6 cogente p: congruente c. 7 peritoēō (—toneon) p: pitonea c. id est addidi. cf. Petronc. p. 275. vulgus mapp'a dicit p, vulgo mappa dicit (dicunt) c (Petr. p. 275). 8 sub cute p: succincte c. 9 creverit c: cernitur p. 11 Sin c: Si p. 12 urinalem viam quam pc. ureticus porus c, uritidū porum p. 15 i. r. esse significat p. 16 cordapsum (—su3) c, cordapsonem p (—psōē3, et iterum psōē p^o). est c: om. p (ubi sc. coaluit cum chordapso). mol. passio est cum a. p. 17 et int. omnium t. p. 18 tamore om. c. fil'it' ture c, simili tē'tē1 p (in marg. tature p^o). 19 ileos c, yleos p. cordapsum c, —son p.

pulsus concadit et corpus nigro colore fuscatur. efficitur ex antecedenti maiorum ciborum indigestione frequenti aut profunda perfrictione aut letali cibo sive potione accepta quam Graeci deleterion dicunt, ut fungis venenosis
5 comestis aut quotiens intrinsecus in ipsis vitalibus membris aut in ipso omento conquassatio aut disruptio fuerit facta.

in curationibus vero colicos oportet, id est qui coli intestini tantum causa laboraverint, primum in cruribus si vires patiuntur supra talos interiores venas flebotomare
10 et ventris constrictionem acriori clystere relaxare ex decoctione cantabri et coloquintidis cum oleo anetino et afronitro cum melle modico. utendum etiam et sacculo calido ex cantabro, in quo antea fuerit decoctus aneti manipulus admixto modico oleo, et sub ipsa vaporazione
15 adhibita tenui linteolo ac mundo et calefacto sudorem excitatum deterges, et manu calefacta chalastico perungues superius in tetanica passione memorato, et molli lana loca tutabis et fasciabis. etiam et lenticulam aeream vel testeam calida repletam ipsis locis dolentibus appones ob
20 mitigandum dolorem.

aliud. anetum et cyminum decoques in olei ÷ IIII, et inicies post depositionem ventris. aut rutam decoques similiter in oleo et admisceris resinam terebintinam ad modum coclearii unius, et inicies.

25 aliud. enema, id est infectio, faciens ad tumores.

1 cū cadit c. eff. autem e. p. 2 maiorum c (Petr.).
ciborum om. c. 3 perfricatione p. 4 greci om. p. 6
facta p: nata c. 7 colericos p. coli om. p. 11 et colo
quin etiam et saculo etc. (om. tidis cum oleo — utendum) c.
13 decoctum a. manipulum: sic cp. 14 ipso c. 15 et
(post mundo) om. p. 18 loca p: locū c. tutabis c: tuba-
bis (ut supra semper) p. etiam — dolentibus om. c. 19 ob-
mittigando c. obmittigandū p. 21 anetum (ἀνηθον) — 24 =
Ps. Gal. XIV, 379. cimin p, — num c (cf. Gal. XIII, 267).
÷ IIII. p, 7 IIII. c. 23 d. in oleo similiter p. admisces
24 cocl'r. I. (I^o. p) cp.

anetino oleo admiscebis butyri coclearia II, et uteris. aut pro butyro adipem anserinum mittes aut medullam cervinam.

aliud. enema colicon anodynon id est dolorem detrahens. recipit autem haec. opii 3 I, alii capita integra 5 numero III, rutae viridis manipulos II, olei dulcis et butyri libras singulas, picis liquidae 3 IIII, cedriae 3 II. rutam et alia conquassata coques in oleo donec frigantur, liquabis et cetera liquida commiscebis in uno et reserabis, et inicies post depositionem ventris medicaminis 10 3 II, cum olei corpore 3 IIII et 5.

trociscus iniectorius anodynus colicis conveniens, et magis in ipso superpositionis tempore, quam Graeci epithesin vocant, id est in quo passio superimponendo dolores increscere facit. recipit castorei obolos IIII, opii 15 3 II, iusquiami seminis 3 I, styracis optimi isaurici 3 III. aqua colliges et facies trociscos 3 singularum aut binarum, et in usum conteres cum suco cantabri et inicies. summe operatur.

si nimietas fuerit doloris, Filonium antidotum in 20 potione dabis.

1 amiscebis cp. butyro c, —rum p. 2 mittis cp. 4 colico cp: De anodynism et colicis cf. Gal. XIII, 266 (cf. 89). 5 R cp. autem h c: om. p. alei cp. integra nūc c: om. p. 7 lib' singl'as c: añ. l'. I. p. cedie p (cedrine p^c), cedria c. 8 alia c: alleum p^c (aleū p). conquassata c: —t (= tum) p. coquis c. 9 liquabis et cetera liquida: liquas et cetera alia cp. 9 miscebis 3. IIII S. Trociscus etc. (om. in unum — corporis) c. commiscens in unum p (z = et ante in unum add. p^c). reserva p. 11 corpore: corporis (sic) p (om. c). 12 iniectato c. colericis p, om. c. 13 epithesi p, epitheson c. 14 in quo (ante corr. qua) p: om. c. dolorem p. 15 R cp. obolos: sic cp (III c, III p). 16 styracis optimi isaurici 3 III c: castoreā 3 IIII p. 17 cum aqua p. colliges et facies p, collig et fac c. singularum et binarum c, 3 I. aut II. p. 18 unum c. 20 philon c, filonium p (Gal. XIII, 267).

aliud. ad colum et ischuriam id est urinae ab-
stinentiam et ad strofum id est tortum ventris. cymini
torrefacti et salis 3 singulos, piperis grana XXX. dabis
totum bibere cum aquae tepidae sufficienti modo. etiam
5 et conditum nefreticum frequenter dari oportet, maxime
si sine febre fuerit.

aliud. ad inflationem. epithima dia spermaton aut
dia samsucu superius ad inflationem stomachi conscriptum
appones.

10 aliud. ad colum. alium siccum cum modico melle
pipere et coriandri foliis contritum addito liquamine cum
oleo spano, aut cum iure pullino, non oleo sed condito
commixto, mirabiliter colicis auxiliatur. aut certe ipsius
alii spicas purgatas integras, si grandiores numero tres,
15 si minutas V aut VII, vespertino tempore transvoret:
omnem ventositatem cum flegmatico humore deducit.

si vero iliacam passionem signis supra memoratis
agnoveris, praedicto passionis periculo, permittentibus
viribus, ante quam ad stercorum vomitum perveniant, in
20 brachio venam cavam mediam flebotomabis. si tamen
nimietas doloris coegerit, etiam et vaporationibus et in-
ijectionibus supra memoratis uti oportet. sed si forte
nimia intestinorum verticula sive involutione acceptum

1 ischuriam: dis(s)c(uriam) cp. 2 ad scorofum ad torē c,
adstrictum i. tortum p. 3 3 singulas c. 4 bibere: libre c,
om. p (ut δίδου πλεον Gal.). aqua tepida cp. sufficienti
modo p: sufficientem modum c. etiam om. c. 5 neu-
fraticū c, nefreticū p. maxime si c: ei maxime qui p. 6
febre c, —bri (—b3) p. 7 epithimia c, epith'a p. 8 dia-
sansucum c, —co p. 10 collum cp. aliū c, allium (ante
corr. album) p. melle om. p. 11 foliis p: folio c. li-
camine p, modica aliq(ue)mine c. cum p^o: et cp. 12 pullino
p: polline c. 13 commesto c, comestum p. 14 allei cp.
nūo tres c: III. p. 15 si minutas c: minute p. trans-
vorate c. 16 deducit c, —cunt (ēt) p. 17 yliacam p,
illicam c. 20 vena cava media p, venam mediam c. 21
etiam om. c (et add. p^o). iniectationibus c.

clysterem retinuerint aegrotantes, simul et ventris officio negato, oportet ex folliculo aerarii curam adhibere, quo possit supra memorata intestinorum verticula sive involutio accepto vento replicari. et fit hoc modo. intestina bubula mensura cubiti unius tubulo folliculi diligenter sparto ab una parte ligabis. similiter iterum alteram partem ipsius intestini osseo aulisco colligabis, et supino schemate iacenti aegroto incies, subposito prius clunibus cervicali, et per podicem eremizato folle competenter ventum inflabis vel quam diu sibi patiens ventum usque ad stomachum sentiat. tunc auliscum detrahes et spongia calida expressa podicem obtrudes, et cum nimie assellare desideraverit auferes. sic enim poterit omnis stercorum vetustas correctis intestinis nimia ventositate excludi. dehinc ventri et praecordiis ex calida et oleo sufficienti ptygmata dabis. si vero nimia siccitas corporis fuerit, etiam ex calida et oleo semicupio depositis embasim adhibebis.

LII. Ad podagram et arthriticam.

Est autem podagra causatio pedum nervorum partium ultimarum, ex qua contingit patientibus gressus corporis impediri. sequitur autem laborantes in ipso initio sensus

2 felliculo *cp.* aerarii (*cf. Cael. ox. 3, 154*): erari *c.*,
^{he}etori *p^c* (*ubi to ex corr.*). 3 intestinorum *p: om. c.* in-
 volutacōe (—cione) *c.* 4 bubule *p.* 5 tubulo: *in marg.*
p^c i. exsufiatorio. fuluculli *c.*, felliculi *p.* sparto: spato *p.*,
 spatio *c.* 6 parte *om. p.* ligabis *c:* religabis *p.* 7 ligabis *c.*
 iacentem egrotum *cp.* 8 sub posito *cp.* 9 eremizato *cp^c*,
 erimizato *p.* felle *c.*, follem *p.* vento *cp.* 10 sibi *c:*
 si *p.* usque ad stomachum *p: om. c.* 11 detrahens *c.*
 podicem obtrudes *c:* pollicem obstinens obtrudes *p.* 13
 omnium *cp.* vetustius corrigere correctis (*sic*) *c.* 14 et:
 ac *p.* 15 (sufficiencia) | tīginta *c.*, ptigmata *p.* 16 fuerit
 corporis *p.* etiam in calida et oleo *p.*, et calida ex oleo *c.*
 17 semicupio *c.*, soicupio *p.* depositos *cp.* ēbasī *p: om. c.*
 18 Ad podegram et arteticam *c.*, De podaga pōda pass. *p* (Ad
p. et arteticos ind. p.) 19 pedum neuorum *c.*, ped(. . . ra)lorum
p (cf. Gal. XIII, 332).

doloris maioris digiti, nullis praecedentibus causis, cum
rubore circa articulorum locum, et magis nocturno tem-
pore. increscente vero passione plurimum articuli com-
patiuntur et digiti invertuntur et durescunt. veterescente
5 autem passione, diuturno doloris tempore etiam et pori
nascuntur, ex quibus aegrotantes lapides similes gypso
emittunt. et torpor quidam accessionis tempore per
membra patientibus discurrit. aliquando rigorem sentiunt,
aliquando calorem. et sunt ipsius podagrae distantiae duae,
10 est enim frigida et calida. cognitio autem illarum talis
est. in calidiori fervor incendiosus cum vehementi dolore
sentitur, apparente rubicundo tumore. in frigidiori vero
inflatio subalbida efficitur. utrarumque autem sanatio ista
est, in calidiori refrigerativa, in frigidiori calefactoria et
15 eiectoria, quam Graeci diaforeticam vocant. et differt
podagricus ab arthritico, quia podagrici in crure solum
causationem habent, arthritici autem in omnibus articulis.
in curationibus autem ad calidam podagram mustelae
sanguinem cum plantaginis suco inter ipsa initia illines.
20 aliud. coriandri folia aut iusquiami folia aut coliculi
folia, non praesente iusquiamo, teres diligenter et super
mittes medium panis mundi frigida et aquata posca infusi,

2 robore *cp.* circa locum art. *p.* 3 incr. passione
vero pl. *c.* 4 patiuntur *c.* 5 etiam *om. c.* 7 corpori
quidem *c.* cor quidam *p.* 9 et sunt — (15) vocant = *Gal.*
XIV, 384. 10 i. (id est) frigida aut *c. p* (*ad rem cf. Cacl.*
chr. 5, 31.) 11 calidiori *cp.* — o2 ante *corr. p.* 12 frigi-
diori *p* (—o2 *p.* —ora *c.*) vero — (14) frigidiori *om. c.*
14 calefactē *p.* 15 et eiectoria (*sic*) *c:* *om. p.* diaforesin
c. diaffō^uta (—forata) *p.* 16 artetico *c.* aretico *p.* quia *c:*
quoniam (qm) *p.* podagra incurra solum habet arteticus
autem *c* (*ad rem cf. Gal. XIII, 332.*) in cura (icura *c.*
i cuā *p*) *cp.* 17 arthritici hic *p.* 19 sanguinem: cinerem
affirmat Diosc. p. 179 (ex quo Galenus XII, 362). de san-
guine aliter D. l. c. 20 illinis *cp.* coriandri *p:* cantabri *c.*
folia post iusquiami *om. c.* cauliculi *cp.* 21 presenti *c.*
22 mundi *om. c.* frigida et aquata posca *c.* frigida et in
ua posca *p.*

et simul teres et iterum admiscebis adipem porcinum recentem sufficienti modo, aut pro adipe oleum roseum modicum mittes et induces et appones bis in die, aliquando et semel in nocte, ad noctem vero praefotis pedibus, si aestas fuerit et iuvenis aetate, frigida aqua aut certe posca aquata, et postquam foveris deterges et sic appones. hieme vero posca calida fomentabis.

aliud. ad fervidos tumores. herbam lenticulatam de stagnis virentibus colliges et cum modico aceto tritam impones, et iugiter mutabis.

aliud. uvae lupinae sucum et coriandri sucum et iusquiami sucum in uno commiscebis et illines.

LIII. Ad ischiadicam et psiadicam.

Utraque passio sub aquoso et frigido reumatismo efficitur. et est ischiadica causatio in vertebro, quod 15 Graeci ischion vocant, quotiens ipse nervus interior inter vertebra frigidissimo flegmate fuerit infusus. psiadicis vero musculi patiuntur similiter supra lumbos iuxta spinae

1 et iterum *p*: Item *c*. admiscebis *cp*. 2 adipem porcinum recens sufficienti modo *p*, adipem porcini recente sufficientem modum *c*. roseum *c*, ro. *p*. 3 mittis *cp*. inducis et apponis *c*, inductum apponis *p*. bis *om. p*. 4 et (*ante semel*) *om. p*. in nocte *om. c*. ad noctem *c*: in nocte (*iterum*) *p*. vero *om. c*. proforis *c*, $\bar{p}fo$ $\bar{h}a$ *p*. 8 tumores *p*: dolores *c*. h. lenticulatam (*sic*) *c(p)* = $\varphi\alpha\delta\acute{o}\nu$ $\tau\acute{o}\nu$ $\epsilon\pi\iota$ $\tau\acute{o}\nu$ $\tau\epsilon\lambda\mu\acute{\alpha}\tau\omega\nu$ *Ps. Gal. XIV*, 386. 9 urētibz *c*, urētibz *p*. colligis *cp*. (*herba . . .*) trita *p*: tutatā *c*. iponis *p* (—nes *c*). 11 et coriandri sucum *c*: *om. p*. 12 ī unū *c*, ī unō (in vino *ante corr.*, in uno *corr.*) *p*. commiscebis et illinis *cp*. 13 Ad sciaticam et psiaticam *c*, De passionibus frigidi et aquosi reumatismi *p* (*Ad sciada et psiada ind. p*). 14 Utrique (*Uterque c*) passiones . . . efficiuntur *cp* (*Utraque passio . . . reumate efficitur Petr. p. 256*). 15 ischiadica: psiaca *c*, psidiaca *p*. quod *p*, quam *c*. 16 ischion (*Cael. Aur. p. 29. 31. cf. 547*): coxile *p*, uoxile *c* (*item Simon s. „Uoxile. g. vertebra Cas. fe. ca. de sciatica“*). 17 psia adadici⁹ *c*, sciadicis *p*.

finem adhaerentes ex interioribus <atque exterioribus>
sibi coniuncti.

curationis vero tempore primitus oportet saccello
calido torrido sale repleto loca dolentia vaporare et sub
5 ipsa vaporatione oleo simplici tepefacto perunguere et
post vaporationem adhibitam linteolo mundo calefacto su-
dorem excitatum detergere, et sic oleo laurino aut acopo
metasyncritico defricare, donec sibi cutis virtutem medi-
camenti bene retineat, et post defricationem adhibitam
10 lana munda operire et molli ac tenui calabrica ligare.
quod autem acopum conficitur sic. olei communis et
radicum cucumeris agrestis libras singulas. radices pur-
gatas et concisas friges in oleo donec carbonescant me-
diocriter. post haec proicies radices et super mittes oleo
15 colato cerae 3 III, adipis porcini et taurini ÷ quaternas,
et postquam soluta fuerint mittes galbani 3 I, styracis
calamitae optimi et resinae colofoniae 3 quaternas, sam-
suci et stafisagriae 3 binas, afronitri cibaria XIII, pyretri,
bacarum lauri, adarces, omnium trium 3 senas, et move-
20 bis in uno donec coagulentur, et uteris.

aliud ischiadicis et psiadicis. iniectione ex decoctione
coloquintidis et centauriae et cantabri modico cum oleo

1 ex interioribus sibi coniuncta c, extibz grūtis p (cf. *Cael.*
chr. 5, 1. 6). 3 oportet p: om. c (non *Petr.* p. 256). saccello
cp. 4 loca dolere et sub i. v. p, loca dolentia vaporantia
i s. i. c (vaporare loca *Petr.*). 6 adhibitam om. p (*Petr.*).
8 metasyncreticon c, meta sincretico ē p. 9 adhibitam
om. p. 10 calabrica cp. 11 autem om. p. et radiē p:
radicis c. 12 ul' singl'is c, añ. l'. I. p. 13 carbones m. c,
carbones cāt m. p (cf. *Cael. Aur.* p. 409. 555). 14 proicies
cp. 15 et taurini om. c. 7 quaternas c: añ. ÷ III. p.
16 mittis p (—tes c). 3 I c: ÷ I p. storace p, stratis c.
17 calamite p, —mitte c. optimi c: —me p. colofoniae p,
colo sime c. 3 III c, añ. 3. III. p. sambuci c. 18
et om. p. 7 binas c, añ. 3. II. p. cibaria XIII (? cf.
c. 44): cibari 3 III p, cibarii 3 III. c. 19 adarces p:
adaricis c. añ. 3. VI. p. moves in uno cp. 21 scia-
dicis et psiadicis p, siadis et p^o piciadis c. 22 coloquintidis
de c.

veteri et nitro et melle modico adhibita vertebri humorem frigidum depurgat. si vero post secundam vel tertiam iniectionem minime fuerint relevati patientes, extrinsecus sub clunibus et humor ipse ostenditur, praeter ea oportet ipsos laborantes calido uti lavacro et loca quae fuerint oleo 5 vel unguento polluta diligentissime pridie sapone lavari. dehinc alia die thapsiae suco ipsas illines partes et sines donec inflentur seu pustulescant, et post dies III aut V cerotario ex diachylon confecto uteris. sin vero nimis acerbus coegerit dolor, etiam et in cruribus supra talos 10 interiores venas incidet et post detractionem sanguinis factam medicamento emplastro ischiadico uteris. et conficitur sic. recipit adarces, sinapis, pyretri, stafisagriae, bacarum lauri, samsuci, nitri, piperis, omnium octo ÷ singulas, resinae frixae 3 VI, cerae et olei veteris libras 15 singulas. ne molle exeat, 3 VI mittes olei.

LIII. Ad paralysim.

Est autem paralysis causatio nervorum qui singulis motibus membrorum inserviunt aut quorum naturali colligatione singula membra reguntur. ex qua contingit sine 20 operatione effici partes quae patiuntur. et sunt distantiae

3 relevati c: revelati p. 4 sub cubitis humor c,
sucub^{et} 2 humor p. ipse om. p. preterea p: postea c.
6 polluta p: pocula c. pridie (sic) pro prima die cp. la-
vacri c, lavare p. 7 sucū c. illinis cp. sinis cp. 8
pustulescant cp (cf. Cael. Aur. p. 553). 9 cerotario et p,
centaurea ex c. diachilon cp. confectō (—tio) p (—to) c).
Sin (ubi n in ras. corr.) p: Si c. 10 acerbus c: acer (? ex
corr. incertum) p. etiam om. c. 11 inferiores cp. in-
cidis c (—des p). 12 medicamentum cp. eplastr
p. p. c. i. a. c. p. 13 R c: om. p.
adaricis c. sinapi c: —pe p. 14 omi octo 3. singl'as c:
a. ÷ I. p. 15 c'te. olei uteris. singl'is ne . . . (sic) c. añ.
l'. I. p. 16 ne molle exeat (sic) cp (forte scrib. aut n. m. e.).
17 De passione paralisi p. 21 efficere cp.

paralysis duae. aliquanti perduto sensu tactus cum torpore
paralysim patiuntur, hoc est ut neque frigus neque calidum
cuti appositum sentiant patientes. aliquanti ex parte
suprascripto sensu manente patiuntur. sequitur autem in
5 passione constitutos, cum difficultate sensus et insolito
usu, difficilis motus aut ex toto amputatus. et efficitur
aliquando totius corporis aliquando partis, aut membrorum
multorum aut aliquorum aut membri unius. et contingit
frequenter aut ex frigore nimis acuto aut vinolentia aut
10 indigestione frequenti aut immodico usu venerio.

in curationibus vero oportet ipsa prima die flebotomia
in brachio adhibere quod fuerit patienti parti contrarium,
quod antispasin vocant. si vero sub plenitudine cibi aut vini
fuerint aegrotantes, vomitum ad
15 praesens provocabis ex ydrelaeo calido, id est ex aqua calida
et oleo admixto modico sale, et sic secunda die flebotomabis
et mundis ac mollibus lanis ex oleo calido membra patientis
involves et fasciolis levibus fasciabis. post haec acopo
thermantino ischiadicis superius scripto
20 uteris et scarificatione ex levibus laceraturis, quas Graeci
amychas vocant. et si forte in lingua contigerit, similiter
scarifabis, et post scarificationem mulsam calidam frequenter
coluendam dabis et a salsamentis vel liquamine, quod est

1 et post (*sic*) paralysim due c. torpore: corpore c,
cō2 p. 2 neque calidum neque frigidum p. 6 SS c: supra-
dicto p. autem om. p (in om. c). 5 constitutos paralysim
corporis cum difficultate sensus c, constitutos difficultas sensus p.
et insolito usu difficilis p, et insolitos usq; difficili c. 7
aliquando aut totius c. aut partis aut etc. cp. 9 aut ex
om. c (*ubi* et extinguit fr. frigores). 11 ipsa c: om. p.
pridiora (*sic*) die c, primo die p. 14 vini aut cibi p. 15
idroleo c, ydroleo p. 17 mollioribus p. 18 involves et
fasciabis lenibus fasciolab' (*sic*) c, involvens fasciolis levibus
fasciabis p. 19 acopum (—pū p) thermanticum (—ē p) . . .
scriptum cp. sciaticis p, —co c. 20 scarificatione c,
scarificatione p. 21 amicas cp. 22 scarificabis cp. scarifi-
cationem cp. mulsa calida f. lavabis p. 23 a c: om. p.

paralyticis noxium, observabis. solatione vero uteris, quam eliosin dicunt, et gymnasio id est exercitio, et sinapismum et dropacem et drimyfagiam, omnia cyclico modo adhibebis, sicuti superius in passione capitis scribentes docuimus. et si nimius rubor in vultu apparuerit, et purgatorium cholagogum dabis, si tamen senilis aetas minime impederit.

LV. Ad quartanam.

Simplex quartana typica ordinatione prima die movetur et biduo interposito quarta die reformatur. si vero duobus diebus typi formam ostenderit, id est ut ipsum biduum prima die cum febre sola efficiatur et secunda die post exagitationem frigoris accessio febrium nascatur, et una die interposita quarta die reformetur, duplex quartana ostenditur. si vero per ipsum biduum inter horas diurnas et nocturnas tertio accessionem typicam senserint aegrotantes, una die sicut supra dixi leviores habeant et quarta die reformentur, tres quartanae esse significantur. et nascitur ex melancholico humore.

in curationibus vero quartanarios ab ipso initio oportet mediocriter et mite haberi et neque eis medicamentum 20

1 Solidatione *cp.* 2 gimnasio vel exercitiū *c.* g^{is}siis i. exercitiis *p.* sinapismo et dropace et drimyfagia *p.* 3 oīa cidiaca mō *c.* oīa cidico m̄ (moīco *ante corr.*) *p.* et adhibebis *p.* 4 sicuti *om. c.* scribentes *om. p.* 6 colagogum *p.* coagulatum *c.* senilis *p.* iuvenis *c.* 7 De typica passione *p.* (Ad tipum quartinum *sic ind. p.*) 8 typica *p.* tipo *p.* 9 biduo — die *om. c.* III. die *p.* 10 (formam) ostenditur *c.* ostendit *ante corr. p.* ut ipsum biduum *p.* ut *p.* ipm iudiciū *c.* 12 post e. fr. *c.* exagitatione frigoris *p.* 13 et una die (I. die *p.*) — (16) egrotantes *om. c.* IIII. die *p.* hic notam habet *p^o in marg.* „Idem in passi<onario>. de pery febre. Nam cotidiani“. 15 diurnas *p.* senserit *p.* (ubi iterum *p^o in marg.* „Idem ī pa^s — i. e. in passionario — de eodem *c.* Qui vero“). 16 una die *c.* I. die *p.* diximus *c.* leviorē *c.* leniores *p.* 17 reformetur *p.* — matur *c.* 19 quartaniorum *p.* *cf. Galen. XI, 37 sq.* 20 mitte *cp.* (mite *p^o*).

aliquod fortissimum dare vel apponere neque vacationem aliquam facere, quam cenosin vocant, sive per clysterem acrem adhibitum sive per purgatorium datum sive per flebotomiam. sed postquam aegritudo pepsin fecerit, id
 5 est digestionem, post VIII aut XI accessiones, quas Graeci episemasias vocant, adiutoria oportet impendere. nam et Galenus ad Glauconem scribens ait: qui in ipso initio aliquod medicamentum dederunt, de simplici quartana frequenter duplicem fecerunt, similiter et in duplici
 10 dantes triplicem quartanam fecerunt. et iterum ait ipse supra memoratus Galenus, se scisse medicum quendam in ipso initio aegritudinis ausum fuisse dare sub tribus quartanis laboranti antidotum quod appellatur diechidnon theriace sub ipso tempore augmenti, et incrementibus fe-
 15 bribus ardentibus ac iugibus vel continuis hominem occidit. unde olim senior Hippocrates commotus in aforismo generaliter dixisse ostenditur, maturatas causas debere curari, crudas vero minime. propterea admoneo ut post VIII vel XI periodum, si forte nimia sanguinis
 20 plenitudo coegerit, in brachio sinistro venam medianam

1 evacuationem c. hic p^o in marg.: Ypocrates i ā dig. Not quod plures sunt cause in quibus errant faciendo clysterem. ut hic et in pass. ca^o (capitulo) de malfactionibus. 2 tenosin c, chenosin p. vocant c: dicunt p. clistere acre (—crum p) cp. 3 adhibitum om. p. datum om. p. 4 pesi cp (pesin p^o in marg.). fecerit c: om. p. 5 accessionis c. 6 episemasias c, episemas p. adiutoria c: om. p. 7 et c: om. p. galienus cp (Gal. XI, 40). ut ad gl. c. qui (ἄσσοι): quod (q) p, Quotq, (quotquot, pro quod qui?) c. 9 et om. c. in duplicem p. 10 quartanam c: om. p. 11 supra memoratus c: om. p (cf. Gal. XI, 40). 12 ipso om. p. 13 laborantibus cp. diecnō c, diacrudō p (διὰ τὰν ἐχιδνῶν Gal.). 14 tiriace cp. temporis augmento cp. 15 vel c: ac p. 16 olim c: al. (sic) p, alē (alius) p^o. ypocras c, ypocrates p (Hipp. III, 711 Lips.). i āfo p: amforismo c. 17 ostenditur hoc est dicere m. c. etc. c. 18 curare cp. ppea c: Preterea p. amoneo ut p, admoneo ut c. 19 IX vel XI c, nonum vel XI p. 20 medianam c: mediam p.

flebotomes, ita ut cum diviseris venam sanguinem currentem inspicias. quod si apparuerit niger et crassus, competenter detrahes quantum vires ipsius laborantis et causa et aetas et temporis et regionis qualitas exegerit. et maxime in spleneticis talis sanguis ostenditur. si vero ⁵ ex contrario flavus et tenuis apparuerit sanguis, continuo abstinebis et nihil omnino detrahes, sed tantum diaetam eius ordinabis, id est vitae regulam, quae non inflat sed magis ventrem molliat cibis maxime consuetis. quod si minime fecerit ventrem, oportet inter initia molli clystere ¹⁰ deducere, novissime vero acriori. et a porcinis carnibus abstinendum et ab omnibus quae similiter tenacissimum vel crassum humorem nutriunt et digestionis tardae esse probantur. vino vero utendum tenui et albo et mediocri virtute calido, et omnibus volatilibus praeter illa quae in ¹⁵ aqua nascuntur et piscibus digestibilibus molliorem carnem habentibus et nihil in se crassi humoris retinentibus. etiam et salsamentis et sinapi uti oportet, et diebus aliquantis et dia trion pepereon antidotum in magnitudine fabae maioris aegyptiae cum calida ante unam vel duas ²⁰ horas accessionis dare. aut certe antidotum quod Filagrius synpepton lexopyreton appellavit, similiter dabis, aut diaspoliten medicamentum. aut piper solum cum calida

1 flebotomabis *cp.* 2 inspicias *c:* aspicias *p.* 3 et *cā p*, *vl' cās c.* 4 et temporis *p*, e *z pme c.* exigerit vel ostenderit *p.* 5 et *om. cp.* 5 ostenditur — (6) sanguis *om. c.* 7 retinebis *p.* 8 *S3 tm* dietas eius *o. c.*, sed dietam *o. p.* 9 magis *c:* tantum *p.* cibis: cuius (*cui?*) *c*, *cio(?) p.* consuetudinis *c.* quod si *v.* non fecerit *p.* 10 clysteri deduci *c.* 13 crossum *cp.* 14 comprobantur *p.* 15 et ab omnibus *p.* 16 mollem *p.* 18 etiam *om. p.* et (*ante* diebus) *om. cp.* 19 et (*ante* dia) *c:* *om. p.* pipereon *cp.* 20 *f. egyptiae* maioris *p.* cum calida aqua *p.* vel duas accessiones. | *omf (pro oras) p.* 21 dare *om. c.* ut certe vel (*ul'*) *ant. c.* filagricus *cp.* 22 sinpeptico lexopetias *p*, sinpepti celebs opitios *c.* appellavit *p:* appellatum *c.* 23 diaspoliten *c*, diaboliten *p* (diaspolites *p?*). solū (solutum *ante corr.*) *c:* *om. p.*

aqua diurnis diebus ieiunis si dederis, recte facies. etiam
et defricationibus ceromaticis et deambulationibus et la-
vacris calidioribus et ceteris exercitationibus usualibus
omnino non prohibebis. et viscera eorum tali cataplas-
mate curabis, hoc est apii seminis, malvae seminis,
baccarum lauri, cymini, pollinis lolii aut tritici, faeni
graeci seminis, omnium VI cotylas singulas, lini seminis
cotylas II, caricarum pinguium diligenter tunsarum numero
C, mellis lib' I S cum calida et oleo concoques et cata-
plasmabis per dies numero III aut V. etiam et urinas
provocabis potiónibus diureticis supra memoratis. et pur-
gatorium ex epithymo confectum, quod melancholicum
depurget humorem, non solum semel sed frequenter
dabis. cuius confectionem purgatorii superius ad maculas
nigras scripsimus. et post purgationem adhibitam dia-
spermaton epithimate uteris, quod superius ad ventosi-
tatem stomachi scribentes memoravimus.

LVI. Ad emitritaeum.

Emitritaeo laborantes sic intellegis. die inter diem
accessionem patiuntur praeter tremorem frigoris. in initio
accessionis impetum sentiunt in superiores pectoris partes
circa arterias cum sudore calido et roscido in vultu vel

1 diurnis: diuturnis *cp.* si d. d. i. dabis (dederis *p*^o)
et recte facis *p*, d. d. ieiunū si desideraverint recte facias *c.*
etiam *om. c.* 4 cataplasmate *c:* catismate *p.* 5 hoc est
cp. apii s. feniculi seminis (*quod om. c.*) malve s. omnium
cotilas singulas (*sic del. p*^o) baccarum l. *etc. p.* 6 lolii attici *c,*
folii attici (*ante corr. attici*) *p* (*et in marg. corr. i & lolii*).
fenugreci *cp.* 7 omī VI *c:* omnium *p.* 8 nūo. C. *c:*
cētū *p.* 9 lb' I S *c:* l' I. *p.* concoques *c:* coques *p.*
10 nūo. III. *c:* .IIII. *p.* urinas *cp.* 11 supra: seu (*sic*) *cp.*
12 epithimo *c:* epith'e *p.* 13 non semel solum s. f. *p.*
dabis *om. c.* 14 cuius purgatorii *conf. p.* 16 epithimate *c,*
epith'ate *p.* et quod *p.* 18 De hiis qui habent vitium
emitritei *p* (Ad emitriteum *c et ind. p.*) 19 diem inter d. *p.*
tremorem *p:* tūoris *c.* 22 rosido *c.*

fronte cum ingenti impetu excluso cum pulsu valido. contingit autem frequenter aestatis tempore iuvenibus ex commotione rubei fellis.

ob diligentiam vero curationis ante solis ortum herbae semperviventis, quam aizoon vocant, folia X rapies et tempore galli cantus prima die folia V teres et cum aquae cisterninae calice uno potui dabis, ita ut ex ipsa potione modicum in calice restet, et ex ipso residuo liquore tanges leviter nervos cervicis cum collo et thorace et spina, et levi ac tenui et tilto operimento operies patientes. hoc per triduum facies sicut dixi. prima die V folia dabis, secunda VII, tertia VIII, et sanabis.

LVII. Ad typum tertianum manifestum.

Tertianus manifestus a Graecis acribes appellatur. et efficitur maxime tempore aestatis sub ingenti commotione flavi fellis id est rubei, quod Graeci xanthen cholen vocant.

curationis vero tempore postquam aegritudo pepsin fecerit, hoc est post III vel IIII periodos sive accessiones, <quas patiuntur die inter diem,> in prima anetica die,

2 autem om. p. 3 rubri p. 4 vero om. c. 5 aizoon cp (cf. Apul. herb. 123 ad hemitritaeum). X (sic) cp. fort. XXI? rapies: rapis c, om. p. 6 V. c: VIII p (sed in marg. p^c i & V). cū aqua cisterne calicem unū c. 7 calice in uno p. 8 liquore c: liqre p (sed supra rigore p^c). tangis leniter cp. 10 et trito (t^o p) cp. operis cp (oper. pat. operis p). 11 facies c: facis p. 12 tertia die p. 13 De tertiano p (Ad tipum tercianum manifestum ind. p): Ad veram tercianam c (item ind. c). 14 Tertianus etc. (sc. tipus) cp. acribes p: om. c. 16 rubei cp. quod: qs p, q̃ (quam) c. ex añcolen (id est ex ante colen) c, exacolō p. 17 curationis — postquam om. c. pesit (pepsin p^c) fecerit p: pepsin <add. quam?> vocant fecerunt c. 18 vel IIII om. c. 19 q̃ sepiissime dicūt die inter diem (sic) c: om. p. ipa enetica die I. dimosoria c, in prima igitur anetica die una (sic) dimissoria p.

id est dimissoria, oportet cumprime aegrotum ydrelaeo
calido perunctum lavare calidiori lavacro ex aqua dulci
praeparato, et maxime illos lavacrorum amatores, quos
Graeci filolutruntas appellant. et postquam calidioribus
5 cellis egressus fuerit, in piscinam descendere facies. etiam
et urinas simplici apozimate provocabis ex decoctione apii
et aneti, quo possit humor ille fellitus per urinas de-
purgari. vino vero antequam aegritudo pepsin faciat pro-
hibebis. postquam vero fecerit pepsin, tenue et aquatum
10 concedes. et mulsam frigidam sub hora accessionis post
primam periodum potui dabis, quoniam fel rubeum, ex
quo causa movetur, super omnes humores in corpore
sicca et amara virtute viget, ideoque ut supra dictum est
competenter humectando et refrigerando et obduldando
15 sanabis. sic enim omnia contrariis sibi rebus curantur.
fysicum ad typum tertianum. coriandri seminis grana
III post tertiam vel quartam periodum dabis nescienti in
ovo sorbenda ante solis ortum ante accessionem, et sanabis.

LVIII. Ad typum tertianum non manifestum.

20 Non manifestus tertianus a Graecis nothus appellatur.
hic typus sordidus a Graecis ryparos appellatus sub frigidiori

1 o3 cū pme egrotum c, oportet egrotum primo p. idre-
leon calidum c, ydrolee (—l'e) calido p. 3 pparato c:
temperato p. 4 filolutrūts p, filolutimidos c (Gal. XI, 34).
5 in om. cp. facis cp. etiam — provocabis om. c. 7
et tanei c, et añ. p (et aneti p^e). quod p. vinum cp.
urinas c: —nam p. depurgari: provocari (sic) cp. 8
pepsin cp^e (pesi ante corr. p). faciat p: facit c. 9 pepsin
fecerit p. 11 primum cp. quoniam p: quā c. 12 causa
(cā) cp. 13 ut — (14) refrigerando c: om. p. 17 tertium
vel quartum c: III. vel .IIII. p. in ovum (ovo c) sorbendum
(—dⁱ) p. 18 a. ortum solis p. ante (acc.) p: aut c. 19
De non manifesto tertiano p (in quo tamen male antecedit cap.
„De typo quotidiano“), Ad typum tertianum non manifestum
ind. c (et p): Ad notham tercianam c. 21 ryparos cp.
atur c. frigidissimo p.

flegmate et **fellis flavi commixtione** efficitur, et similiter die **inter diem** sicut **acribes tertianus** movetur, sed in **ipsis accessionis** horis **inordinatus** invenitur, et si **autumni tempore** fuerit natus, in **quartanum** frequenter vertitur **typum**.

propterea **curationis tempore** ex **initio die inter diem** 5 **reficies aegrotantes**, hoc est ut die ipsa qua **accessionem** patiuntur **ieiument** et die **anetica** recipiant. sed si forte **ieiunium** minime potuerint tolerare, **remissionis tempore** recipiant. et postquam **pepsin** fecerit **aegritudo**, id est post **III** periodos sive **accessiones**, quas **Graeci epise-** 10 **masias** vocant, **praecordia eorum cataplasma**bis, sicut in **cotidianariis**, et **lanis mundis** loca **tutabis** et **fasciabis**, et si **venter** non fecerit, non valde **molli clystere** deduces. dabis etiam his et **ptisanæ** **sucum** ex **aceto** et **melle** **puleio** **pipere** **cymino** **origano** **confectum**. etiam et **urinas** 15 **provocabis** ex **decoctione apii** et **dauci** et **aneti** et **spicae indicae**, et post haec **absinthii pontici** **infusionem** per **triduum** **ieiunis** dabis aut **oxymellis**, vel ea quae **ventrem** **molliunt**, et **sanabis**.

LVIII. Ad typum cotidianum.

20

Typus cotidianus **graeco** **vocabulo amfermerinos** sive **cathemerinos** appellatur. et efficitur sub **frigidissimo fleg-**
mate **quotiens** **os ventris ipso humore** fuerit **infrigidatum**.

2 diem *p.* agribes *c.* in *om. c.* 3 accessionibus
horis *cp.* autumpno tempore *c.* i autūno tempore *p.* 6
reficis *cp.* 7 reficiant *c.* 8 remissionis *c.* dimissionis *p.*
9 reficiant *c.* reficiant *p* (*sed in marg. p^c i & recipiant*).
p. si *p.* pessim (*pessmi*) *c.* 10 accessionis *cp.* episemasias
c. epimiscos *p.* 12 tutabis *c.* tubabis *p.* 13 venter non
fecerit *p.* venter non fuerint *c.* clisteri *c.* 14 dabis etiam
et his ptisane *p.* datū et ius et tipsane *c.* 15 pullegio *p^p*
cimino erigano *c.* puleio et pipere et organo *p.* etiam —
(17) haec *om. c.* 18 ieiunus (—*n?*) *c.* oximellis *cp.* 20
emolliunt. 20 De typo cotidiāno *p* (Ad tipum cotidiānum
ind. cp.) Ad cotidiānam *c.* 21 afemerinus *c.* amfimerinos
22 cathemerinos *cp.*

in curationibus vero primitus aegrotum trispermo
cataplasmabis, id est tribus seminibus ex faeni graeci et
seminis lini et hordei pollinibus cum aqua et oleo et
modico melle concoctis. et postquam tuleris cataplasma,
5 ipsa loca calido sabano deterges et oleo anetino tepefacto
perungues, et sic lana munda ac molli operies et fasciabis.
etiam et oxymel diurnis diebus ieiunis cum aqua apiata
calida dabis. novit enim crassitudinem flegmatis incidere.
etiam et urinas eorum provocabis ex decoctione apii et
10 feniculi radicum cortice. etiam et ventrem flegma de-
ducentibus et vomitum ex radicibus provocabis. post
haec epithima dia spermaton appones.

LX. Ad efemerās.

Simplices febres Hippocrates efemerās appellavit,
15 sicuti Galenus ad Glauconem scribens primo libro edocuit.
et contingunt frequenter ex antecedenti labore aut vino-
lentia aut iracundia aut tristitia aut ex indigestionibus
aut aliqua cogitatione animi vehementi, aliquando et ex
inguinum dolore, quotiens glandulosa praeter aliqua ulcera
20 fuerint ipsa inguina.

1 tuspermon c, trisperimon p. 2 fenugreci c, feñg p.
3 lini om. p. 5 sabano p: sapone c. 6 perunges p.
lana c: cum lana p. ac c: et p. operis cp. 7 etiam
et: etiam p, et c. oximell' c, oximel p. diuturnis diebus
c, diebus diuturnis p. ieiuniū c. cum apiata calida p,
cum aqua tepida piata calida c. 8 incidere p: scidere c.
9 etiam om. c et ante corr. p. 10 radiē cp. corticē c,
—ē p. ventrem om. c. 12 9(com)ponis c. 13 De effi-
meras c, De febribus effimeris p (Ad effimeron ind. c, Ad effi-
meron ind. p). 14 ypocras c, ypocratico(e?)s p. efemerās
c, effimeras p. appell'āu p, —latū c. 15 galienus c, G,
(sic) p (Gal. XI, 6). edocuit c, edocuit p. 16 con-
tingit cp. violentia p, vindemia c (cf. μείρας Gal.). 18
ā aliq cogitacōe animi c, aut filiis (aliis p^o in marg.) cogi-
tationibus animi p. vehementer (—mē p) cp. et om. p.
ex ing. dolore (contingit add. p): ἐνι βομβῶσι Gal. 19 glan-
dulose pter aliqua ulc'a fuit c, glandulosa aliquando <et add.

in curationibus autem oportet aegrotos plurimo oleo mollioribus manibus defricari et lavacris frequentioribus curari, etiam et cibo diurnis diebus refici, sed tamen ab indigestione custodiri. vinum vero aquatissimum et lene potui dabis, et illos maxime qui nimia corporis ariditate laboraverint, plus solio immorari quam in aere iubebis, et sanabis.

LXI. Ad causon.

Causos latino sermone febris incendiōsa dicitur. et fit aliquando cum deliratione, et maxime quotiens tumor epatis et splenis apparuerit, ex multa ciborum comestione inflammatio erigitur et inurit cerebrum et maniam facit, quam nos insaniam dicimus.

curationis vero tempore oportet in ipso initio per-mittentibus viribus aegrotum in brachio flebotomare, si tamen aetate iuvenis fuerit. et si ex encauseos caput doluerit laborantis, id est ex adustione, ex oleo omfacino embroce uteris aut ex aceto et rosaceo, quod oxyrodion vocant. non praesenti vero rosaceo pro rosaceo oleo omfacino frigido uteris, id est IIII olei partibus unam aceti admiscebis. sin vero plus infrigidare volueris, ex aequali

corr. ulcerosa fuerint *p* (πλήν ἐλ μὴ χωρίς ἔλκους φανεροῦ γένοιτο *Gal.*). 2 defricari — frequentioribus *om. c.* 3 etiam *om. c.* diuturnis *cp.* reficis *cp.* 4 custodi *cp.* vinum (—ū) v. aquatissimum (—ū) et lene (—nē *c*) potabis *cp.* 5 maxime *om. c.* 6 in solio *p.* 8 De causone. que febris incendiōsa dicitur *p.* 9 Causon *cp.* 10 deliracōne *c:* declinatione *p* (debilitatione *p^o* et iterum in *arg.* 1 à ē d'htatoē sic *p^o*). et (max.) *om. p.* tumor *p:* humor *c.* 12 inflatio *p.* erigitur et nutrit *c,* erigitur. Inurit *p.* 14 oportet *om. c.* ipso *om. p.* 15 si tm etate *p:* si tpr (tempore) *c.* 17 doluerit laborantes *c,* doluerint laborantes *p.* onfacino *p,* —cio *c.* 18 embroce *c.* oxirodion *c,* oxirodū *p.* 19 presenti (pnti *c*) sic *cp.* vero *om. p.* rosaceo (ante pro) *om. c.* omfacino *p,* —cio *c.* 21 admiscebis *c,* amiscebis *p.* sin *c,* Sin (*i. e.* Si *p^o*) *p.* et

modo temperabis. ét si venter non fecerit, clystere deducendus erit ex decoctione cantabri aut betae cum oleo et afronitro et melle modico.

alius clyster lexyreton conveniens maxime post
5 depositionem ventris. sucum ptisanæ et lini seminis, ovi
crudi medium, olei rosacei et chamaemelini quod suffecerit.
post hæc humido et frigido cibo reficies, id est lactuca-
rum murturias elixatas et frigidas cum modico sale et
cisternina aqua et oleo spano et aceto in cibo dabis, aut
10 cucurbitam incisam cum suo corio elixatam similiter dabis,
si tamen nimia fuerit sitis. si vero sitis minime fuerit,
non frigidis sed humidis tantum cibis nutries, id est sor-
bilibus multa aqua solutis, ut sunt ptisanæ, ova sorbilis,
micæ panis diligenter elutæ et cetera quæ in sorbitioni-
15 bus similiter accipiuntur.

alimma lexyreton id est perunctio ad febres aestatis
tempore, si aeger nimio februm aestu bullire coeperit,
et magis in ætate ferventi. cucurbitam viridem rades et
eius corticem exprimes et adiunges sucum uvæ imma-
20 turæ et acetum excellens et oleum rosaceum aequali

1 venter non fecerit *p*: ventrem non fecerint *c*. clisteri
(ut supra) *c*. 4 Aliud *c*, aliū *p*. clistere lixoperitus *c*,
cliste' (—tere) lexpit' *p* (ubi lexperitus *del. p*^o). 5 sucum
(—ē) *p*: Sucus *c*. ptisane *p*: tipsane *c*. 6 camomellini *p*,
calnolli (*sic*) *c*. suffic' *c*, suffic' (—citur) *p*. 7 cibo re-
ficies *c*: cibo et frigido potui refici *p*. lactucas mamas eli-
xatas *c*, lactucarum murturias (*sic*, in marg. *p*^c 1 & murturias
elixatas *p* (cf. *Philum. ap. Act.* 5, 78 καυλοῦς θριδάκων ἀ-
σχεσμένους μετ' ὀξυκράτου ὕδατος). 9 spano *cp*. 10 et
(elix.) *c*. 11 S; tñ si n. *c*, si tñ n. *p*. mīme mē | fuerit
non fr. *c*, minime fuerit n non fr. *p* (*fort. scr.* minime fuerit
nata non fr.). 12 tantum: tñ *c*, tñ (tamen) *p*. nutris *cp*.
13 ut sunt: i. (id est) *cp*. ptisane *p*, tipsane *c*. 14 micæ
c, micās *p*. elutæ *cp*. 15 accipiunt *c*. 16 Alimma *c*,
Alimma (ig *p*^o) *p*. lexyreton *cp*. febres *c*, feb' *p*. 18
magis *p*: maxime *c*. fervente *c*. radis *p*, radix *c*. 19
exprimis *cp*. adiungis *p*, adungues *c*.

mensura. omnia commiscebis et adicies ovum unum crudum et in ampulla mittes, quam in frigida aqua submissam infrigidabis. et quando uti volueris, agitabis ut unum corpus liquor ipse faciat, et sic de embroca lanea aegrotum perungues, etiam et capiti eius aliquantum infundes.

alia perunctio lexi-pyretos, ad causam et ad iugem sive continuam febrem, quam Graeci synochon dicunt. cucurbitae rasuram exprimes et rosaceum oleum admiscebis aequali modo, et cum diligenter miscueris ut frigidum sit, totum corpus perungues. aliquando et ptygmata frigida in eodem liquore infusa sufficienter, visceribus superimpones, si tamen aestas fuerit. hieme vero calida et oleo rosaceo ptygmata infundes et similiter visceribus appones.

sed si forte aliqua tensio praecordii occurrerit, cataplasmate uteris. dactylos nicolaos numero V per diem aqua calida infundes et conteres et in calida resolves et adiunges olei rosacei modicum et super mittes lini seminis partes II et olei partem I. et post dies cataplas-
matis expletos lexi-pyreto uteris. facit enim ad febrem

1 commiscis c, —cēs p. ovum crudum .I. p, cūū (ovum unum?) crudum c. 2 ampulla c: ampullam p. frigidam aquam p. 3 infrigidabis c: in frigida dabis p. 4 lana cp (lanea p^o). 5 perungere p. etiam om. c. capiti eius c: capitis ei p. aliquantulum p. 7 lexiperiton p, lexi-petitō c. 8 sinodum c, sinecon p. 9 exprimis p. admiscebis c, amiscebis p. 10 ita ut p. 11 perunges p. ptygmata (om. et) c, exptimata p. 12 sufficientem c, —tia p. v. super inponis c, v. appones p (qui transit ad v. 33: nam Si tñ — appones in marg. addit p^o). 14 tipmata c, ptygmata p^o. 16 Sed om. p. albeuit p (obcurrerit p^o). cataplasma cp (qui addunt lexiperiton c, lixoperiton aut ante corr. lixopatōn p. quod delendum videtur. cf. v. 21). 17 uteris hoc modo d. p. nūo c: om. p. 18 in aqua cp. infundes — calida om. c. et om. p. 19 adungues c. mittis cp. lini semen par. II. c, lini seminis pollinis fēis partes. II. p. 21 lexiperiton cp. enim om. p.

calidam intercidendam vel si fervor fuerit in stomacho. troci dr̄ S teres cum suco cucurbitae et suco lini seminis et suco portulacae aequali modo, cerae 3 VI concisas cum sufficienti oleo rosaceo solves et cum infrigidaverit rades et in mortario simul commiscebis. et exinde duos inductos facies, unum appones et cum calere coeperit tolles et alterum frigidum impones. hieme autem Nileos lexi-pyreto uteris, quod superius in splenetica passione scripsimus.

- 10 si tarde desudaverint, oleo chamaemelino cum modica tepida die critica perungues et sufficienter aegrotum operies, et statim sudorem provocabit. quod si non provocaverit, periculi indicium est aut prolixam aegritudinem ostendit, quam macronosian dicunt. sunt autem dies critici
15 quibus per sudorem prospera aegrotis determinatio februm sive discussio fieri solet, id est aut III aut V aut VII aut VIII aut XI aut XIII, hoc est duae ebdomades coniunctae, aut XVII aut XXI aut XXX. si vero nimia febre aegroti corpus desiccatum fuerit, ut etiam et lingua ariditatem ostenderit, die critica, ut supra dictum est, oleo
20 chamaemelino singulariter totum corpus perungues et in calida semicupio depositum usque ad guttur embasi adhibita fomentabis et exinde in lectulo competenter operies,

2 croci dr̄ c: croci <ūccā. in ras.> S. p. s. seminis
lini p. 3 concisa p, cū cias c. 5 simul om. c. com-
mises cp. 6 facis p. inductos (sic) cp. unum: imū p
(? unū p^o), unū c. 7 ipones c: appones p. Nileos p (sed
lineos supra p^o), nigellos c. cf. c. 42 extr. 8 le(i) c) xiperiton
quam cp. 10 Et si p. camomelino p, camomillo c. 11
die critica c, diacretica p. 12 operis cp. provocat cp^e
(—cāt p). 14 macronosian c, —noxiam p. critici cp.
15 egrotis om. p. 16 aut V. die c. 17 XIII p: XIII c.
hoc est duas ebdomadas coniunctas (sic) c: om. p. 18 aut
XVII om. p. XXX p: XXV c. 19 egrotū corpus descic-
catum f. c: corpus egrotantis f. desiccatum p. linguae p.
20 ostenderit p^o: —dit cp. critica cp. supra om. c.
21 camomelino p, camomilla c. corpus totum p. 22 de-
posito cp. basi p, bassin c. adhibito cp. 23 operis cp.

et continuo sudabit. et si forte sitis nimia eos astrinxerit, rodomeli aquae calidae admixtum potui dabis.

aliud ad repulsandam sitim, quod adipson vocant. myxa aqua infundes et ipsam infusionem dabis ut in ore contineant frequenter. 5

aliud. lini seminis sucus collutioni oris adhibitus sive transvoratus sitim mitigat.

aliud. olei rosacei dimidium coclearium et ovi album et tenue simili quantitate commiscebis et sorbendum dabis. 10

aliud quod appellatur a Graecis oenomeli, faciens ad nimiam sitim et fervorem extinguendum, et conficitur sic. mellis optimi partem I et vini partes II in uno commiscebis et repones, dehinc tempore caniculari soli dabis diebus XL, et uteris. 15

aliud. ad linguae asperitatem. oleo rosaceo succo seminis lini admixto frequenter de penna tanges.

aliud. ad causon. postquam pepsin fecerit aegritudo, die critica captato tempore imminētis discussionis secundum aetatem et vires et causae magnitudinem et temperaturae et regionis qualitatem, frigidam nimis aquam ad satietatem bibendam dabis, et sanabis.

1 nimia sitis p. a(st'n?)xeris c, affecerit p. 2 rodomet
(sic) c: om. p. aquā calidam admixtum c, aq cā mixt p.
3 repausandum c. ad ipson c: adipōt9 p. 4 mixā p
(mixas p^o), mixta c. cf. Garg. Martialis med. c. 59. effusio-
nem p. 5 frequenter egrotantes p. 7 si et ovi albumine
(om. ve — cocl'r) c. 8 album p: albumine c. 9 similem
quantitatem cp. commiscebis c, — cēs p. sorbend' p: potui c.
11 cionomelitos cp (cf. Diosc. 5, 16). 13 mel optimū c.
et vini: niniū p, ininū (vel minū) c. in uno commiscebis
cp. 16 oleum rosaceum (ro. p) suc (suci c) seminis lini
a(d)mixtū (—t p) cp. 17 de c: cum p. 18 ad om. p.
pesin c. 19 cretico c (—ca p). captato c: caprato (sic) p.
22 ad satietatem c: ad faciē p (in marg. ad faciē sic p^o)
bibendam dabis p: dandum bibendum dabis c.

LXII. Ad freneticos.

Est autem frenesis immutatio mentis cum febre in uno perseverans. et efficitur maxime ex nimia adustione, quod ex encauseos dicunt, aut ex vinolentia. sequitur
 5 autem aegrotos febris acuta, rubor vultus, multa mobilitas oculorum cum tensione, lucubratio sive insomnietas, pulsus parvitas, quam microsphyxian dicunt, mentis alienatio et crocydismos id est florum electio, si quidem digitis frequenter ipsi patientes operimenta attractare videantur.
 10 aliquando e parietibus stipulas legunt, quod Graeci carfologian appellant. et aliquando cum hilaritate frenetizant, aliquando vero cum tristitia.

in curationibus vero inter scapulas circa spondyli locum cucurbita cum scarificatione uteris, et post haec
 15 praetonso pressius capite lanis oxyrodino infusis operies. et si venter non fecerit, clystere deducendus erit.

aliud. hederæ albae folia in aqua decocta cum aceto et rosaceo trita et per linteolum eliquata et capiti supino schemate iacentis infusa frequenter, somnum adducunt
 20 freneticis.

aliud. in calida et oleo rosaceo ptygmata infusa et apposita a tergo inter scapulas et pectori, frequenter humectato thorace, somnum faciunt.

1 De frenesi p. 2 frenesis c: freneticis p. 4 quam encauseos d. cp. violentia p. 6 cū intentio c, c̄ tensio p (cf. Cael. Aur. ox. I, 36). lucubratō p: ī brachio c. 7 microsphia c, migfia p. 8 florum electio c, florum electio p. 9 patientis c. atratare c, adtractare p. videntur p. 10 e c: om. p (a add. p^o). carfologia c, —am p. 11 cum om. cp. freneticatur c, frenetidiāt p. 12 vero om. p. 13 spondilii c, spondiliorum p. 14 scarificatione (—ficōne c) cp. 15 pretunso c: preraso p. exiridino c, exirodiū p. operis cp. 16 si venter cp^o (sumtem ante corr. p). clysteri c. 17 Aliud edere albe c: Albe edere p. cum aceto et r. p, in aceto et cum r. c. 19 iacenti cp. 7 somnum p. adducit (—c̄ p) cp. 21 ptimata p, —ca c. 22 pectoris cp. 23 et (somnum) c. facit (faō p) cp.

aliud. opium aceto resolutum et fronti illinitum et naribus appositum somnum facit. aut certe ipsum opium floculo inclusum et filo ligatum podici iniicies, et cum soporati fuerint detrahes.

unguentum soporiferum freneticis conveniens. codyas 5 id est papaveris agrestis capitella, serpillum, hederæ folia, castoreum, omnia IIII in aqua et oleo decoques et ipso oleo uteris.

aliud. hederæ folia, chamaemeli flores, spondylon, herpyllon, herbam papaveris hortini, sisymbrium, omnia 10 sex simul in aqua et oleo decocta et capitis fotui adhibita dormire faciunt freneticos.

LXIII. Ad lethargicos.

Lethargici dicuntur ii qui sensibus obtusis cum oblivione mentis acuta febre iactantur. sequitur autem 15 patientes ut supra diximus febris acuta, sensuum pressura somno similis, insensibilitas, motus difficultas cum pulsu extanti et inani. et contingit frequenter hæc passio senibus magis ætate quam iuvenibus, tempore vernali.

in curationibus vero primitus sicut in freneticis 20 scarificabis aut acriori clystere evacuabis et caput oxy-

1 solutum c. et — (2) facit om. c. 3 floculum c.
follicul'm p (—l'o p^o). et p: a c. inities p. 4 opati c.
sepati p (sepati p^o). trahes p. 5 codias: sic cp. 6
capitula p. 7 omnes IIII (sic) c, om. p. 9 folia om. c.
camemoli p, camamelini c. spondilii heripilion c, spondiliõ.
serpillõ. p. 10 ortini c, ortiũ p. sisimbrii c, —b' p.
omnes VI. si in aqua et o. c, Omnia simul in oleo et a. p.
11 capitis fotui p: capiti focum c. 12 facit cp. 13 Ad
litargicos c: De litargia p. 14 Litargici (sic semper) cp.
ii: hii c, his p. obtusis c, optusis p. 15 acute febre c.
acuta febris p. 16 sensuũ c: sensus p. 18 inani c (cf.
Oæl. A. ox. 2, 3): malci (sic) p. et om. p. contingunt p.
19 vernali c: verno p. 20 Curationis primitus c, Curatio
vero primordio p. 21 scarificabis cp. aut om. c.

rodino embrocabis. post haec sub umbilico ilia utraque et coxas et manuum et pedum summitates rutaceo aut sicyonio aut oleo veteri perungues.

aliud. sinapi cum caricis et farina hordeacea cum
5 aceto decocta et in cataplasmate visceribus adhibita excitant lethargicos.

aliud. domus luminosa et stramina dura aut certe frigida stratoria substrata excitant similiter.

aliud. thymi cyma in aceto decocta cum melle sufficienti ipso liquore ori infuso educit flegma et excitat
10 lethargicos.

aliud. sternutatio spissa ex euforbio vel struthio aut ex pipere et castoreo excitat.

aliud. capitis rasura excitat si urtica feriat aut
15 sale fricetur.

LXIII. Ad cardiacos.

Est autem cardiaca passio distensio membranae cordis, ex qua contingit exhalatio fieri animae per sudorem tetricum, tumente membrana cordis ex antecedenti perfrictione aut vomitu frequenti aut ex adustione, quod ex encanseos dicunt. sequitur autem aegrotos perfrictio articularum, nimia parvitas pulsus, quam microsphyxian dicunt,

1 umbilico *cp.* ilia: et illa *c.*, et ylia (alia ante *corr.*) *p* (*omisi et*). utraque *c.*, uterque *p^o* et ante *corr.* *c.* (utq; ante *corr.* *p*). 2 et (ante coxas) *om.* *p.* 3 aut veteri oleo *p.* 4 sinape *p.* ordeacea *c.*: ordeï *p.* 5 et cataplasma v. adhibendum *c.* excitat *p.*, exitat *c.* 8 excitat *p.*, excurat *c.* 9 timi *cp* (thimi *p^o*). comam (—mā) *cp.* decoctam *cp.* et cum melle s. ipm liquore ori ifusum *c.*, cum s. mell' et liqorē ipē ori infusus *p.* 11 litargicos — (14) excitat *om.* *c.* 14 si urtica senciatur *c.* 15 frigetur *p.* 16 De cardiaca passione *p.* 17 passio m. c. distensio *p.* 18 animi *cp.* per(?) sudorem: pludorē *p.* tetricum (*cf. Cael. A. ox. 2, 167. 186. 190*): ret. ici? *p.* 19 perfricatione *p.* 20 aut (vom.) *c.* et *p.* quam causeos *c.*, quam encanseos *p.* 22 pulsum *c.* os faciat *c.*, micros fixiā *p.*

et multi cursus sudorum, adiuncta febricula parva. aliquantos et sitis sequitur. aliquanti etiam vero hanc passionem syncopen appellaverunt, id est amputationem, si quidem ab ossibus et nervis per singula membra patientes occiduntur, cum per sudorem mortiferum animam obmiserint.

in curationibus vero oleum melinum aut myrtinum aut lentiscinum cum vino austero in lanis redactum et appositum stomacho et praecordiis et umbilico syncope laborantibus abstinere sudorem. ¹⁰

aliud. in cubiculum aeris boni et neque satis oppressum neque aestuosum ramulos virides myrtae et cetera similem virtutem redarguentia in circuitu iacentis apposita relevant aegrotantes.

aliud. myrta sicca et tenuissime creta et singulariter ¹⁵ aspersa aut pollini polentae aut cretae admixta syncope laborantibus abstinere.

aliud. glebula multa de pariete aqua frigida perfusa et in circuitu iacentis apposita et naribus odorati applicata sudores abstinere et vires aegrotantis confirmat. ²⁰

aliud. polenta cum vino granaticio resoluta et potata aut in cataplasmate adhibita non calida abstinere sudores et vires depositas erigit.

2 et c: etiam p. sitis c: τῆς (?) p. 3 syncopen p. sc̄icopem c. 4 patientem occidat c. 5 et cum sudore mortifero p. animam amiserit c, αἰῶν. ὠφύτ (in marg. ² ob = animam obmiserunt) p. 7 mellinum c. 8 illat | redactū c, in lanis reductum p. 9 syncope c. 10 abstinere c: retinet p (gr. στέλλει). 11 et c: om. p. 12 viride mirte c: mirte virides p. 13 simili (—lia c) virtute cp. redarguentia c: —tes p. 14 relevat c. 15 mirta p: smira c (μυρσίτη Diosc.). 16 aspersa (cf. Diosc. 1, 155 Aetius 9, 1): aspera cp. polente aut certe c, pulente aut creta p. cretae: cf. Cael. Aur. ox. 2, 200. syncope om. c. 18 glenula m. de paxioe c. 19 odoratu c, —tū p. applicata p^o, —cita p, —cite c. 20 abstinere c: retinet p (item v. 22). confortat p. 21 polenta (hic) c. granaticio c, granate p. 22 aut in: et cp.

confectio cerotarii stypticae virtutis conveniens syncope laborantibus. recipit granatae siccae corticis 3 VI, aluminis scissi 3 I, cerae 3 III, olei lentiscini aut myrtini ÷ III. facies sic. granatae corium tundes et tenuissime cernes, cum alumine in mortario simul teres, et sic crassum cerotarium admiscebis.

LXV. Ad apoplexiam.

Apoplexia est dicta passio ab eo quod mortifero ictu corporis simul et animae concidant patientes. et est paraly-
 10 lysis acuta nervorum qui singulis motibus membrorum inserviunt cum animi compatientis insensibilitate. sequitur autem patientes insensibilitas totius corporis et oppressio subita praeter rationem et paralysis, ut etiam repentino casu obmutescant et sensibus omnibus priventur. et ali-
 15 quanti in dextra parte paralytin patiuntur, aliquanti in sinistra. et sunt distantiae passionis duae. nam dicitur apoplexia et paraplexia. sed apoplexia quam primam diximus totius corporis esse intellegitur cum mentis et sensus paralyti, paraplexia vero in una parte corporis efficitur
 20 aut dextra aut sinistra. nam ipse Hippocrates senior dogmatum princeps duas distantias passionis scribens in aforismis sic ait, solvere apoplexiam fortissimam impossibile, imbecillem vero non facile.

■ ob diligentiam vero curationis vomitum in praesenti
 25 provocabis ex ydreleao, id est ex aqua calida et oleo, ad-

2 ð cp. 3 cē (pro cē) p. aut: et cp. 4 ÷ III. p:
 3 III. c. facies sic p: om. c. 5 teres c: om. p. 6 ad-
 miscoes cp. 7 De apoplexia p. 8 dicta est p. 9 con-
 cadant p. 11 cū animi paciēti 7 i sensibilitate c, cum animi
 (cā) insensibilitas compatientis passio p^c (in marg., nam om. p).
 13 rationem p: iactōm (—tionem) c. 15 in om. c. ali-
 quanti c: quidam p. 18 totis corpibus c. intelligitur cp.
 19 paralyti p, —sin c. paraplexia om. c. 20 ipse om. p.
 ypocras c, ypocrates p (Hipp. III, 717 Lips.). 22 am-
 forismis c, anffo. (sic) p. 23 vero om. p. 25 ydreleao c,
 ydroleo p.

mixto et modico sale. tunc et flebotomia in praedictae passionis periculo adiuvat. et lanarum mundarum ex oleo chamaemelino involutionem adhibebis, et caput ipsorum ex aceto et rosaceo oleo embrocabis, et humorem collectum in arterias gutturis et thoracis, ex quo praefocationis causatio efficitur, sicut in lethargicis apoplegmatismis depurgabis. etiam et oxymel propinabis. novit enim incidere omnem humorem crassiorem.

LXVI. Ad pleureticos.

Est autem pleuritis causatio in una parte pulmonis et hyezocotos id est laterum membranae, ex qua contingit fieri dolor lateri patienti. sequitur autem patientes febris acuta, dolor patientis loci ingens usque ad iugulum et palam. tussicula etiam et reiectatio flegmatis aliquando viscosi aliquando tenuis et spumosi aliquando sanguinolenti et aliquanti super dolens latus schema iacendi libenter habent. et fit vel nascitur in masculis magis quam in feminis, et secundum aetatem senibus magis quam iuvenibus, in pueris vero difficile. et secundum annualia tem-

1 et om. c. predicto c. 3 camemilo (sic) c: calido
(ca. p, cā^{do} p^o) p. 4 oleo c: calido p. embrocabis p:
comprobabis (!) c. 5 in arciam c. 6 s. in litargicis p:
sicut litarius c. apoflegmaticis p, ipsos mathismis c. 7
etiam oximel (sic) p, om. c. 8 enim et omnem h. c. om. c.
crassiorem (cf. c. 59): cō'rū (?) p. 9 De pleuresi p. 10
pleuritis: pleureticis (sic) cp. 11 et i herpedio cotā l. c,
ethipedi coctā l. p (i. e. hipediocotā). 12 lateri patienti c:
lateris patientis p (—ti p^o). 13 feb'a (febricula) p. dolor
lateris patientis loci cp. iugulum c, ingulū p (cingulum p^o).
14 spalā c, plo(?)tū p (palam Cael. Aur. ox. 2, 91). etiam
et c: ē (est) p. reiectatio c, reiectio p (reiectatio p^o). 15
et om. c. aliquid p, aliqñ (—quando) c. 16 sup c:
sr (supra) p. iacentis c. 17 et sic nascitur c, et fit et
nascitur p (cf. c. 71). 18 etates c. magis om. c. --
annualia (sic) cp.

pora frequenter hieme et autumnī fine contingit, et magis quando hiems inchoatur, verno autem et aestate difficile.

peripleumonia vero est causatio in toto pulmone, ex qua contingit tumor fieri in visceribus. sequitur autem
 5 aegrotos febris acuta, thoracis gravedo cum contractione, et supino magis schemate et altius capite iacere delectantur, in latus vero difficile. sputa etiam similiter ut pleuretici prociunt et linguam subalbidam proferunt. tunc accessionis tempore anhelitus increscit, rubor malarum in
 10 vultu ostenditur. peiorante vero passione cum ad ultimum venerint aegrotantes, stridor ille interior gutturis resonat quem Graeci rogmon appellant.

efficiuntur frequenter ex antecedentibus similiter causis quibus et synanchica passio efficitur. aliquando ex
 15 violento percussu contingit aut concubitu plurimo aut indigestione, aut si quis pondus grave baiulaverit et post ipsum laborem sitiens nimis frigidam potionem praesumpserit.

in curationibus autem si nimius fuerit dolor oportet
 20 in brachio flebotomiam adhibere, si tamen ventris solutio minime impederit, ex eo scilicet brachio quod fuerit patienti lateri contrarium, id quod antispasin vocant, et tantum detrabere quantum aetas et virium qualitas et regio et tempus et causa et magnitudo poposcerit. et si
 25 venter non fecerit, blando et chalastico clystere de-

1 contingit *p*: om. c. et magis *c*: om. *p*. 2 quando hiems: quotiens (*pro* quō iems) *c*, q̄ (quo) yemis *p*. 4 q̄ *p*, quo *c*. in om. *p*. autem om. *c*. 5 feb'c (*sic*) *p*. 9 tracōe *c*, 9tōe *p* (9tētōe *p*^o). 6 capite *c*: a capite *p*. 8 propiciante linguam *c*, prociunt linguam *p*. 10 ad ultia veniūt egritudines *c*. 11 ille | t'ior *p*, ille inferior *c*. resonans *p*. 12 ragmon *c*, regmon *p*. 13 efficitur *c*. similiter *sic* *cp*. 14 sinancia *c*, —chica *p*. efficitur om. *c*. 15 in marg. *p*^o i ā cēuta. 17 sumpserit *p*. 19 autem *c*: vero *p*. 21 ex eo. s. *p*: et os silibet *c*. 22 id quod: ut (ū *p*) quod (q *c*) *cp*. antispasin *c*, ā tipasī *p*. 25 venter *c*: untrē *p*. clisteri *c*.

ducendus erit ex decoctione cantabri et oleo et modico sale.

aliud. marrubium, ysopum, puleium, omnia tria simul in aqua decoques, et cum modico melle ipsam decoctionem potui dabis. desinet dolor. 5

aliud. si forte thoracis nimia fuerit strictura, cogente tumore patientium locorum, maxime si et viscosum <flegma> ostenditur, faenum graecum coques eo modo quo superius ad tussim aridam conscripsimus.

aliud. tritici farinam crassam, id est similam quam mola ceciderit, <aut> farinam hordeaceam simul coques in decoctione aneti et marrubii et sacculo inclusam quotiens doluerit appones et loca dolentia vaporabis et lana molli ac munda ipsa loca tutabis et fasciabis. aut lenticulam testeam vel aeream calida repletam appones ob 15 mitigandum dolorem.

si vero sputa tenuia et spumosa emiserit, sacculo ex sale torrefacto vaporabis, et postquam vaporaveris, calido sabano sudorem deterges, et sic medicamentum dia tessaron id est de quattuor speciebus confectum appones. et conficitur sic. recipit cerae, picis siccae, re-

3 marubium *cp.* pulegium *c.* tria *c:* trita *p.* 4
decocta *cp.* ipsa decoctio potui (potui *om. c*) data *cp*
(dabis *ante corr. p.*) 5 desinit *p*, desin (*sic*) *c.* dolores
ante corr. p. 6 structura *p.* 7 si *om. c.* et: ex *cp.*
viscosum flegma: viscosa (*sic*) *cp.* 8 ostendit *c.* fen̄ gē *p*,
fenu greci *c.* coquis *c.* quo *c:* *om. p.* 9 scripsimus *p.*
10 crossam *cp.* semilā q̄ mola ceciderit *c*, semela | q̄
ceciderit *p.* similam: *cf. Gal. XI, 121.* 11 mola: *cf. Plin.*
18, 72 sq. aut *addidi.* ordeaceam *c*, — ciam *p.* simul
coqs *p:* si quis *c.* 12 in *c:* ex *p.* saculo inclusa *cp.*
14 ac *c:* et *p.* loca *om. c.* tubabis *p.* lenticula
testata vel erea calida *c*, l. eream vel testeam *c. p.* 15
ad
obmittigandum *p*, 7 ob mitig. *c.* 17 tenuia *c:* ieiuna *p.*
spumosa (*C. A. ox. 2, 117*): spumam *c*, spumas *p.* emiserit *c*,
— rint *p.* 20 diatesaron *c*, diatesseron *p* (*cf. C. A. ox. 2, 112*).
confectum appones i. de IIII. speciebus confectum (*sic*) *p*, id
est — confectum *om. c.* 21 R̄ *c:* *om. p.* cere *c:* cē *p.*

simae terebintinae, iris illyrica, omnium quattuor paria pondera. tundes ireos <radicem> et tenuissime cernes et ceteris lento igne resolutis et a foco depositis et leviter infrigidatis superasperges, et movebis donec coagulentur.
 5 et exinde magdalia facies, et in linteolo densum induces et appones. hoc autem emplastrum cum diligenter cuti inhaeserit, dolores mitigat. hieme vero si forte durum fuerit medicamentum, praetactis digitis modico cyprino oleo ad molles carbones malaxabis.

10 sed si forte aliqua tensio in praecordiis insipientis digitis praeter effusionem ventris occurrerit, trispermo id est tribus seminibus in aqua mulsa adiecto modico oleo simplici decoctis cataplasmaabis, hoc est ex tritici polline et faeni graeci et lini seminis. et postquam tuleris cata-
 15 plasma, calido sabano deterges, et oleo cyprino tepefacto non solum praecordia sed etiam cetera quae dolent perungues, et molli lana operies et fasciabis. et a vino et omnibus carnibus omnino abstinebis quousque minuatur febris.

sed si forte suprascriptum flebotomi usum aut virium
 20 imbecillitas aut solutio ventris impenderit, topicis adiutorii uteris id est localibus. praeterea sanguisugas ipsis locis dolentibus appones, cuius adiutorii usum superius in empyemate conscripsimus.

1 iris illyrica *p*, utisillirice *c*. omī IIII *c*: om. *p*. paria pondera *p*: pari pondere *c*. 2 tundes yreos (*sc. rad.*) *c*: yreos tundes *p*. 3 leviter: leniter *cp*. 4 aspergis et moves (*—nes c*) *cp*. 5 magdalia *cp*. facies *cp*. linteolo denso *p*, lintheolum tensum *c*. inducis *cp*. 6 apponis *c* (*—nes p*). hoc vero (*sic*) *p*: om. *c*. 7 durum *p*: ductum *c*. 8 hoc (*ante med.*) *add. p*. tum (*post med.*) *add. p*. caprino *c*, ciprino *p*. 9 molles *c*: rall'es (?) *p*. 10 insipientis: —tibus *cp*. 11 trispermon *cp*. 15 et primo tep. *c*. 16 praecordiis *cp* (non *p*. solum *p*). etiam om. *c*. 17 operis *cp*. 18 abstinēt *c*. quousque minuatur (*sic*) febris *p*: quando minuāt febris *c*. 19 supra scriptum *p*: SS *c*. 20 ventris solutio *p*. topicis *c*, thopicis *p*. 21 i. localibus *p*: om. *c*. 22 adiutorii usum *c*: adiusū (1 & adiu. *in marg. p^c*) *sic p*. est (*pro ē*)piemata (*sic*) *c*, epimate *p*. 23 scripsimus *p*.

si vero cogentibus febribus sub ingenti siccitate corporis doluerint laborantes, pygmatis id est pannis calidis ex decoctione faeni graeci et aneti adiuncto oleo uteris. post haec etiam cerotarium ex diachylon confectum appones, quod superius in tetanica passione scripsimus. aut cerotarium pleureticum ex oleo cyprino confectum et lin-teolo densum inductum similiter appones. et conficitur sic. olei cyprini 3 VIII, cerae 3 VI, adipis asinini et faeni graeci moliti et meliloti, omnium trium ÷ binas.

electuarium pleureticis et peripleumoniceis conveniens 10
dia ton picron amygdalon a Graecis appellatum id est ex amaris amygdalis. recipit autem nuclei leviter torrefacti et lini seminis similiter torrefacti, ambarum specierum ÷ singulas, amygdali amari decoriati leviter torrefacti ÷ XVI, faeni graeci moliti ÷ VIII, draganti tunsii et creti ÷ VI, 11 mellis despumati quod suffecerit.

aliud. post minutum dolorem si forte sputa purulenta proiecerint, dia prassiu superius in pthisica passione conscripti coclearium I cum faeni graeci suco ieiunis et ad vesperam potui dabis. 20

aliud. catapotia bechica, id est tussicularia, vespertino tempore cubaturis in ovo sorbili aut certe tepida aqua dabis. et somnum provocant et tussiculam mitigant.

aliud conveniens maxime is qui cum solutione ventris

2 tigmata c, pimata p (ptimata p^o). pannis calidis c:
pannos ca. p. 4 etiam p: et c. dichilon cp. 5 quod —
(7) appones om. c. 9 moliti c: molliti p. et meliloti añ
÷ .II. p. 10 elac c, El'm p. 12 R cp. autem om. p.
nucleum etc. p. 13 et l. s. similiter om. c. torrefacti
addidi. ambaꝝ spēbus 3. singl'as c: ut'sꝝ (pro utriusque)
añ. ÷ .I. p. 14 decoriati c: discoriati p. siml' torefacti
(hic) c. 15 moliti ÷ VIII p, melliloti 3 VIII c. tracanti
c, dragāt. p. 16 m. dispumati q. sufficit cp. 18 dia-
prasium c, —sii p. tisica cp. 19 conscriptum c. cocl'r
p, cocl' c. cum fenu greco (om. suco) c. ieiunū c. 20
ad vesperum (om. et) c. 21 capucia c, catapucias p.
bethica c, bechicas p. tussicularias p. 22 ova sorbilia cp.
23 et c: que et p. 24 is: his cp.

doluerint et sputa sanguinolenta emiserint. dia codyon electuarium vespertino tempore dabis. habet enim virtutem tollendi pleureticis dolorem et somnum provocandi, quod Graeci anodynnon ypnopion dicunt.

5 LXVII. Ad canis rabidi morsum.

In primis, hoc est in praesenti, morsum ipsum medicinali scalpello circum incidens competenter et sale contrito asperges et sanguisugas et cucurbitas appones. attrahunt enim venenum sanguini canis commixtum. etiam
10 et cautere vulnus inures, quo possit supra dictum venenum cum scara, quam nos crustam dicimus, in eodem loco retineri, ne sanguinem persequendo usque ad vitalia omne corpus invadat. et ipsa vulnera appositione medicamentorum acriorum multo tempore servabis, usque ad
15 XL diem vel eo amplius. praeterea piscis salsi carnem tritam vulneri appones.

medicamentum aliud. nuces combures et ex ipsa favilla cum aceto cataplasmas, et desuper sponsia madida operies et fasciolas. et a vino et omnibus carnibus
20 et leguminibus aegrotum abstinebis. poscam vero subacram diurnis diebus per dies numero XL bibendam dabis,

1 diaco diomelaē c, diacodion elact p. 3 pleureticis c, pleuretis p. 4 anodiū ceipon c, anodionon cepnson p. 5 Ad tabidi (sic) canis morsum c: pro tit. in textu Medicamentum R p, in marg. p^o de morsu canis rabiosi (Ad canis rabidi morsus ind. p). 7 circū icides c, circum des p. sale contritum c, salem tritum p. 8 aspergas p. apponis c. 9 enim om. c. sanguis cani (sic) c, canis sanguini p. 10 et om. p. cauteri c. inuris (I urinis c) cp. quo: qui c, quod p. 11 scara c, schara p. 13 ulcera p. 14 multi tpr c. 15 XL p: om. c. salsi p: assi c. 17 medicamentum om. (Al) p (appone medicamentum Aliud misces c. etc. c). et om. p. 19 a p: om. c. 20 poscā ūo subaram (sic) c, p^oca ū sb^o açm (in marg. p^o I & p^oca sub acra) p. 21 diuturnis p, diūnis c. per dies XL bibendū dabis c, numero exaginta dabis bibenda p.

et non solum extrinsecus, sed intrinsecus certis potionibus infra scriptis rabidi canis morsus sanantibus ab initio dando curabis.

potio ad canis rabidi morsum. caneros fluviales vivos in olla aerea rubri aeris combures supra carbones donec⁵ cinerescant, et expendes ex ipsa favilla drachmas X, et adiunges turis masculi dr̄ I, gentianae tunsae et cretae dr̄ V, et exinde dabis bibere cum posca ieiunis per dies numero XL.

alia potio rustica fortioris virtutis quae per triduum¹⁰ datur ad morsum canis rabidi. cani pecori animali homini, ad omnia ita facies et dabis. mittes in partes II aquae ad modum librae unius et vini veteris dimidiam partem carei quantum tenuerint IIII digiti, cumini tantundem, bacarum lauri grana V, radices de cesisboum lotas V mi-¹² nores quae possint habere scrip̄ VIII, quod cesisboum habet folia similia feniculo. quae sunt sicca tundes et cernes et radices separatim tundes, et sic in mortario simul vino adiecto modico mero usque ad ultimam tenuitatem conteres, et omnem humorem sive vini sive aquae²⁰

1 sed intrinsecus *om. c et ante corr. p, add. p^o in marg.*
certis *c: ceteris p.* 2 infra *c, i (sic) p.* rabidos *c. morsus*
c, rabidi c. morsum p. 3 curabis *c: sanabis p.* 4 ad
morsum *c. rabidi p, ad canis morsum (om. r.) c.* fluminales
p. 5 erea *om. c.* rubri ceris *c, rub' eris p.* com-
buris *c, —rēs p.* 6 expenda *(sic) c: tolles p.* 3 X *c,*
dag X p. 7 dr̄ I. *p, 3 I c.* tunse *c, tuse p (contuse p^o).*
8 dr̄ V. *p, 3 V. c.* 9 numero *p: om. c.* XL *c: XXX. p.*
11 cani pecori *c: canis pectoris p.* 12 facies *cp.* et mittis *c.*
II. partes aque *p: in partes II atque c.* 13 et vini veteris
om. c. 14 careū quātū *c, cātu q̄tū p (in marg. p^o careū*
q̄tū). 15 bacarum *c, bacas p.* grana V *p: 3 V. c.* de
ceffis boi milotos *c, de cesis boinu lotas p (χέαις βοών?)* 16
que *c: quam (q̄) p.* possit *p, possunt c.* sc̄p̄. VIII. *p,*
3 IX *c.* cesis bōum *c, cesis boniū p (boinu p^o).* 17
feniculi *c.* 19 simul uno a. *p, sibi i uno a. c.* ad u.
lenitatem *p.*

admiscebis, et in ampulla rediges et dabis. sed propter vim potionis primo dabis I coclearium olei spani sorbendum, et sic super dabis potionem. triduo recte per singulos dies cyatos ternos aut quaternos, secundum aetatem
 5 uniuscuiusque, in potione dabis.

hi autem lyssodecti, id est qui rabidos morsus incurrerunt, si ab initio secundum rationem quod Graeci cata logon appellant, minime fuerint curati, post XL vel LX dies hydrofobici efficiuntur, id est aquam timentes.
 10 et est acutissima et molestissima passio. est namque causatio in stomacho et corde ex veneno canis concepta. sequitur autem qui laboraverint ex aqua tumor stomachi et cordis. difficultas etiam transvorandi potus aut ex toto negatio sequitur et singultus. tunc increscente passione
 15 ipsi cum insanire coeperint, veneno pervasi vocem latratui canum similem emittunt et praesentes mordent et aqua perfusi vehementi raptu interficiuntur.

LXVIII. Ad phalangionis morsum.

Caponis cerebrum cum pipere modico et rutae hor-

1 a(d)misces c(p). ampullam p. redigis c^{ps} pp
 m̄ pois c, pp utif potōem p (in marg. p^o i ā l̄ pp vini po-
 tionis). 2 cocl'r p, cocl' c. 3 superabis p. tridu rectu c.
 4 cietos c, quistos p. 5 in potione: potionem cp. 6 hii
 aū lisodenti c, hi'ālisodera p (in marg. hii aū lisodēti p^o). 7
 quod: quam p, qui (q) c. 8 catalogon p, catalogim c. 8 p?
 XL. i XL (sic) dies c, post quadragesim vel sexagesim diem p.
 9 ydrofonici c. 10 molesta p. Et ā nāz cātō p, ē qm
 causacō c. 11 ex: et c, et ex p. 12 s. a. laborauint (sic
 —verint) ex aqua mor stoācho et corde c (addidi qui): s. a.
 laborantes tumor stomachi et cordis p. 13 etiam p: et c.
 aut — singultus om. c. 16 mordunt p. 17 „raptu inter-
 ficiuntur“ C. A. p. 233. 18 Ad spalangionis (falangionis
 ind. p) morsum c et ind. p (in p pro rubrica legitur Medica-
 mentum B). 19 A^upois p (A rubr., sed in marg. pro litt.
 initiali praescribitur ē). CAponis c (cf. Plin. 29, 88 de gal-
 linaceorum cerebro). ruta ortice p, rute (om. ort.) c.

time viridis foliis numero X cum posca potione una ieiunis totum potui dabis. hoc per triduum facies, et extrinsecus ab initio ipsa hora qua morsus fuerit primo impones herbam quam dicunt zaccarionem sic integram in loco ubi fuerit morsus, et cum arefacta fuerit, alterum ⁵ folium viride mutabis. hoc per triduum facies cottidie, et cum se ulcus ostenderit, avellanae pulpam conteres et appones aliquantis diebus. post haec appones cataplasma de polline hordei et suco uvae lupinae. coques eundem sucum sincerum et inductum appones quam diu se scara ¹⁰ levet, id est crusta, et cum se levaverit tali medicamento in cicatricem induces, id est adipem anserinos, coagulum caprinum, radices cerdae quae latiora folia ostendit ruta silvestri, et oleum stellionis in quo vivus fuerit necatus et in ampulla in sole et aura caniculari tempore diebus ¹⁵ numero XL fuerit suspensus. aequis ponderibus tundes in se omnia et appones ad locum tam diu quam diu ad perfectum sanetur. interea ipsum patientem admonebis ne forte ignoranter in cibo avellanas accipiat. sicuti extrinsecus in cute morsui apposita avellana venenum ad se ²⁰

1 foliis: folia *cp.* potionem *I. c.* 2 tot potui *p:* potū potui *c.* 3 ip̄is ore quo mōditū *f. c.* ipsius qua morditus *f. p.* 4 ꝥaccariōe *p.* ꝥaccariōz *c.* 5 ꝥon(m c)is *cp.* 6 folium *om. c.* cotidie facis *p:* facis cotidie *c.* 7 ulcus *p^o:* uultus *c et ante corr. p.* 8 apponis *c.* 9 sucum *cp.* coques in eundem *s. cp.* 10 quam diu se *c:* quam diuise *p.* scara *cp.* 12 in *om. cp.* t. m. cicatricem inducis *p.* t. m. cicatrice ducis *c.* i. (id est) *sic cp (pro acc. vel recipit).* coagulatū *c.* 13 certe *c.* c̄de (in marg. *p^o c̄de*) *p.* latiora: lauoris *c.* latōris *p (latōris p^o).* rute silure (silvestre) *p.* rute silvestris *c.* 14 stelionis *c.* stelcoīs *p (cf. Plin. 29, 90. 73).* vivus *p^o:* vinus *c.* humus *p.* necatus *p.* iectē (sic) *c.* 16 numero *p:* *om. c.* XL *c:* XI *p.* tudis *cp.* 17 apponis *c.* ad perfectum *c:* ad perfectam (alp̄fāz sic) *p (unde p^o in marg. alp̄fca sanatōe = a perfecta sanatione pro ad p. s.).* 19 ignorat̄ *c.* igrāt *p.* 20 avelana *c.* ad se ducit *c:* aducit *p.*

ducit, similiter comesta ad semet intrinsecus venenum adducendo hominem necat.

LXVIII. Ad scorpionis ictum.

Scribes in charta rudi hoc nomen A<CT>IC et postquam scripseris plicabis. pones in ipso puncto percussurae chartam conscriptam et trahes illam usque ad locum ubi descenderit dolor, et confestim sine dolore efficietur. hoc fysicum de viri illustris <vindiciani> est. etiam et the-riacam. diatessaron in potione vini dabis.

LXX. Ad fugandos serpentes.

Capillos de capra aut mulieris aut cervinum cornu aut fel fumigatum serpentes fugiunt.

aliud. cervina pellis substrata facit non timere serpentes.

LXXI. Ad epilepsiam.

Est autem epilepsia subitus corporis casus cum spumatione et raptu membrorum effectus. et sunt distantiae passionis duae. aliquando enim sub diverso raptu membrorum efficitur, aliquando cum somno. sequitur autem
20 patientes, ut dixi, subitus casus, aliquando cum contractione corporis membrorum, aliquando cum oppressione,

3 Ad a. i. tit. c (= ind. p): Experimentum bonum. B pro rubr. p. 4 Scribes c, —bēs p. rudi p: om. c. ARcic c, A h p c p. 5 plicas pones cp. puncto p: puteo c. 6 carta conscripta cp. trahis (trabis c) illa cp. 7 et om. c. efficitur cp. 8 deū illustris cariē ēēt z tiriacā c, de viri illustris dari, etiam et teriace p. 9 diatesa(e p)ron cp. 10 De capigo. B rubr. p. 11 Capillos: Capillorum c, Capigos (sic) p (cf. Plin. 28, 70). 12 fugiunt p: fugat c. 13 substrata p, subscripta c. 14 Ad epilensiam c (ind. p), De epilensia p. 16 epilensia cp. 17 effecta cp. 18 enim om. c. sub c: cum p. 19 autem ut dixi p. p. 20 et aliquando p. 21 corporis om. p (corporis vel membrorum c).

spumatio etiam et insensibilitas et tenebratio. in his cerebrum patitur et omnis nervositas a cerebro descendens sub melancholico humore et frigido flegmate. aliquando a stomacho patiuntur. est enim stomachus multis nervis sensibilibus perplexus. et si forte, ut dixi, a stomacho passio fuerit nata et cerebrum petierit, accessionis tempore fantasiae oculis efficiuntur, ut illis quibus suffusio imminere ostenditur. etiam et vapor quidam in eis ab inferiore ventris parte super fertur, quo vapore mininga pulsata concutitur, et cadunt. aliquotiens vero 10 sub melancholico humore laborantes difficile cadunt et ieiuni flegma subamarum et spumosum in faucibus sentiunt. aliquando et cibos non digerunt, sed crudeos post cenam emittunt. et est molesta passio maxime infantibus brevissimis et novellae aetatis pueris. fit vel nascitur 15 omni tempore, sed plus verno frequentare manifestum est.

in curationibus autem in primis a tergo inter scapulas circa spondyli locum praeavaporabis spongiis calida aqua expressis. aut cantabro in linteolo ligato et calida ebullienti infuso et expresso vaporabis, et sic scarificabis 20 et per cucurbitae raptum competentem sanguinem detrahes. etiam et stomacho, ubi ferrum operari non poterit, sanguisugas appones eodem modo quo superius in empyemate conscripsimus. et post detractionem sanguinis

1 hiis c. 2 a om. c. descendens c. 4 enim p:
autem c. 5 pplexus p, pflex c. 6 passio c: om. p. 7
oculi c. efficiunt p. infusio c. 8 iminere p, i miore c.
in om. c. 9 interiori c. superfertur (fēt) c: frequenter p.
mininga c: imiriga p. 10 concutitur c: cūrit (— curritur) p.
aliquando (om. vero) c. 12 flegma om. c. subspumosum p.
13 cibos c: carbones (pro carnes) p. 14 emittunt om. c.
in inf. p. 15 brevissimis c: parvulis p. 16 verno tempore c.
18 circa om. c. spondilii c, spondiliorum p.
praeavaporatis p, — tius c. calidis aqua c, ex calida aqua p.
19 calide bullienti p, calide ebullientis c. 20 infundo expresso c.
scarificabis cp. 21 per c: post p. competentē sanguis c, competentē sanguinem p. 23 apponas c, — nis p.
24 epimate p.

factam, post unum vel duos dies si forte venter a solito officio abstinerit, clystere subdeducendus erit ex decoctione coloquintidis et betae et cantabri cum melle et oleo veteri et afronitro. erunt praeterea duabus ebdomadis in lectulo custodiendi, et caput embroce curandum
 5 ex rosaceo et aceto, quod oxyrodinon vocant, aliquando et castoreo admixto, maxime si forte hieme contigerit. sed oportet ante caput pressius detondere et sic curam ipsi capiti adhibere. et postquam embrocaveris, caput
 10 pileo operies. post haec summitates manuum et pedum oleo veteri aut sicyonio perungues et tenuissimis ac levioribus fasciis ligabis. etiam et castorei ꝓ I ieiunis in potione aquae mulsae dabis, singulariter aut foliis rutae hortinae admixtum.

15 si vero sub melancholico humore cum insomnietate fuerit passio, epithymi decoctionem diurnis diebus ieiunis dabis aut die inter diem. post haec vespertinum lavacrum adhibebis. sin vero sub crasso vel tenacissimo humore fuerit passio, oxymel ieiunis dabis ex ysopo et peucedano
 20 et puleio et origano confectum. nec non etiam et cucurbitas cufas id est <levi> cum appositione deduces in primis spondyli loco et spinae et lumbis, novissimo etiam

1 I. vel .II. p. a solito officio p: solutū officiū c. 2 clysteri c. 3 coloquintide cp. 4 olei veteris p, —ri c. et afronitro erunt &toica d. e. p, et affer ꝑterea d. e. c. 5 embroce p, embrice c. (caput . . .) curandi cp. 7 forte om. p. contingit cp. 8 añ (ante) c: aut p. et siccurādūꝫ qūo expica adhibere c. 9 embrocabis c. 10 pileo p, paleo c. operis cp. i. articulos add. p (post pedum). 12 fasciis ligabis p: fasciabis c. etiam et: Et etiam p, etiam c. 13 rute ortine cp. 16 epithimi (epith'i p) decoctione cp. diurnis c: diurnis p. 17 vespertinum p: intestinum (om. lav.) c. 18 tenuissimo c. 19 ex isopo c: et ysopo p. peucidano cp. 20 n. n. e. et cucurbitam i. cufas (cf. Cael. Aur. p. 575. 297. 31 sq.) cū appositione deducis I p'mis c, n. n. e. et cufas apponis Iprimis p (cf. c. 77). 22 spondilis locus c, spondiliorum locis p. no-
 mo (sic) cp.

thoraci et praecordiis, in feminis vero et pubetenuis sub umbilico et inguinibus. post haec cucurbitis cum scarificatione uti oportet in utraque capitis parte iuxta auriculas in ipsis arteriosis locis, aliquando et venam mediam si extantior apparuerit in fronte incidet, et post III vel V⁵ detractiois dies ptarmico medicamento, id est sternutatorio, nares sicut in lethargicis apoplegmaticis, et post dies III apoplegmatis expleto ieiunis ex radicibus vomitum provocabis, et cibis inprimis triticeis et holerosis nutries, nam Graeci sitodis et lachanodis dicunt, novissimo vero variis. observandum autem a carnibus suinis et bubulinis ac caprinis et a leguminibus universis et a vino et lavacris usque ad menses VI.

trociscus <conveniens> scotomaticis, id est qui subito ante oculos tenebras patiuntur, et spiritu inflatis epilepticis. recipit autem fel leporis, castorei, turis masculi, murræ, omnium III dr singulas, mustelae iecoris sicci 3 III, aceti cyatum I. conficies et facies trociscos drachmales et dabis cum passo aut cum mulsa per dies VII aut VIII.

20

1 thoracē c, thorace p. 2 et inguinibus c: inguinibus p (et in inguinibus p^o). cucurbitas c, — tam p. scarificatione cp. 3 utramque c. partem c, utrasque c. partes p. 4 et c: etiam p. vena media si <ex p^o>stantior apparuerit in fronte p, vena media et antior i fronte c. 5 p^o III ul' V detractiois obtinico c, post tertium vel quartum detractiois diem optarmico p. 7 apoplegmaticabis (pro çabis) c, apoplegmatis dabis (pro — diabis) p. 9 holerosis cp. 10 nutris cp. Nā c: quod p. sitodis celaconodis cp (σιτώδεις καὶ λαχανώδεις). dicunt c: vocant p. Novissimo — VI | c (f. 90^a extr.): om. p (cf. C. A. p. 298. Gal. XI, 372 etc.). 11 autem: aut c. suinis (?): mulsionis c. 12 et (ante a leg.) om. c. 13 et om. c. 14 conveniens addidi. scotomaticū c, scototic' p. i. qui c: i. in quo p. 15 inflammati c, inflammatis p. epilepticis (ut semper) cp. 16 p cp. autem om. p. 17 omī .III. dr singlas c: añ. 3. I. p. 18 conficies et facies (fac c) cp. dragmales cp (item infra). 19 aut (post dabis) add. p.

aliud. trociscus conveniens epilepticis qui cum tre-
more membrorum accessionem patiuntur. recipit castorei,
abrotani, radicum panacis, omnium trium 3 IIII, piperis
albi, rutae hortinae 3 binas, croci et cyperi 3 singulas.
5 aceto colliges et facies trociscos drachmales, ex quibus
unum in potionem dabis, habitudine corporis fortioribus
cum vino mulso cyatis IIII, debilibus vero cum aqua
mulsa. oportet autem patientes post acceptam potionem
currere. et post haec epithima dia spermaton aut dia
10 samsucu appones, et sanabis.

ad epilepsiam. hirundinum pullum de primario fetu
luna prima apprehendens aperies, et invenies <lapis in
ventre> unum formosum et alium malefactum. et ita ut
terram non tangant, ligabis in pelle vitulina aut cervina
15 et in collo aut in brachio sinistro suspendes.

LXXII. Ad lumbricos.

Fiunt vel generantur lumbrici, quos Graeci elminthas
dicunt, plerumque ex multo cibo accepto aut indigestione
frequenti. sequitur autem laborantes morsus stomachi et
20 ventris nullis praecedentibus causis, et tussiculae modi-
cissima ex causa provocatae, somni etiam flegmatici id

2 R cp. 3 aprotani cp. radiē cp. omī t'um 3 IIII
c: añ. 3 IIII. p. 4 rute ortine 3 binas c, r. ortine sumi-
tatem añ. 3 II. p. cocti 7 cip'ni 3 singl'as c: cō piperis
añ. 3. I. p. 5 cum aceto p. colligis (—g c) cp. facis
(fac c) cp. 6 unum p: pma c. i poicōne dab' c, dab' i
poitōem p. habitudinem c, iuxta habitudinem p. 7 c. vino
mulso (c. vinum mulsum c) cp. 8 mulsa om. c. 9 epithimia c,
epith'a p. diasam sucum c, dia sāsuc p. 11 epilensiam cp.
12 prima luna p. invenis unum p, invenies in unum c
(lacunam explet Diosc. 2, 60. ceterum cf. C. A. p. 315). 13
malefactum p. et: sed cp. ita ut'ra c, ita ut tra p. 14
tangat et ligas cp. 15 et collo p, i collo c. in om. p.
suspendat c, —dit' p. 16 De lumbricis generatis ex multo
cibo p. 17 āmictas c, almitas p. 20 modicissime ex causa
provocante (—cāte) cp (cf. C. A. chron. 4, 106).

est salivam per os ostendentes cum solutione corporis, et exurrectio sine ratione et pulsus inaequalis, aliquibus vero et fastidium. pueris etiam dormientibus masticatio efficitur cum modica linguae exclusione. schematizato etiam ore iacent, similiter ut illi qui post nimiam operationem resumunt. et post diastema temporis modicissimi aliquotiens cum clamore exurgunt et cito iterum deponuntur et dentibus dormientes strident. contingit vero hoc quotiens ipsa violenta insurrexerint animalia. etiam et aliquibus occurrentes stomachi nausiae et morsus causationem faciunt. aliquando et reiectantur singulariter aut cum aliquo humore flegmatico aut cholerico.

curationis vero tempore maxime in acutis febribus, si et constrictio fuerit ventris, cataplasmandum ex lini seminis et lupini farina pari modo commixtis et cum mulsa 15 aqua concoctis. cataplasma, oleo violaceo umbilicum tanges et molli lana operies et fasciabis. et post expletos cataplasma dies cerotario ex absinthio et oleo cyprino confecto ventrem sub umbilicum usque cooperies. et si venter abstinerit, in infantibus balanis iniectionis depones, 20 in aliis vero perfectis aetate clystere ex decoctione absinthii admixto melle deduces. et potionabis frequenter,

1 per os *om. c.* 2 exurrectio *p.* exurrectio *c.* 3
dormientibus *om. c.* masticatio: *cf. C. A. l. c. p. 534.* 5
iacentem *c.* —tes *p.* quidem *cp.* 6 diastema *c:* diestema *p.*
7 cum — (9) quotiens *om. c.* 9 etiam *om. c.* a. et oc-
currentes *p.* 11 reiectant *c.* reiectantur (*sic*) *p.* 13 i. a.
febris quod esse solet. si et constrictio *p.* i. a. febribus si
ex constructio *c.* 15 cum aqua mulsa *p.* 16 umbilico con-
tangis *p.* 17 operis *cp.* 18 ex *c:* et *p.* 19 confecto
om. c. venter sub umbilico usque cooperies *c.* ventrem simul
usque sub umbilico operies *p* (*sc. mediis partibus Cael. chr. 4,*
128 etc.) 20 in *om. cp.* balanis *p:* *om. c.* iniectionis *c.*
leptis *p.* deponis *cp.* 21 clysteri *c.* ex *om. cp.* 22
deducis *cp.* et potōab' frequenter maxime *p:* et potōne
maxime *c.*

maxime pueros, myxarum et myrtae et coriandri seminis, omnium trium specierum decoctione.

epithima ad lumbricos excludendos sive necandos. recipit farinae lupini tenuissimae ÷ II, absinthii contusi
5 et creti ÷ I, myrtae viridis S. mittes in girba, et in uno diligenter contusis, optimo melle colliges et in linteolo illinitum medicamentum visceribus mediis impones. aliquando vero medicamento supra scripto admiscemus.

aliud. medulla cervina oleo violaceo resoluta a nervis
10 cervicis quos tenontas dicunt per totam spinam usque ad sexum perungues, aut ipsum oleum violaceum singulariter tepefactum auribus instillabis et ipsas cavernas lana obtrudes.

sin vero cum adiuncta solutione ventris fuerit lumbricorum passio cum rasurarum egestionem, tunc stalticis,
15 id est constrictoriis, sicut in dysenteria inicere oportet, et propinare plantaginis sucum aut granatas acidas aut sucum coliculi aut limaturam cornu cervini in modum coclearii unius.

si vero praeter febrem fuerit passio in diuturna
20 aegritudine, quam Graeci chroniam vocant, etiam et lupinos amaros edendos dabis et santonicum caricis immisum et vinum violaceum.

1 mixarum: rarum (*sic*) c, nularū p (nixarū p^o). cf. noxarum C. A. p. 539. 541. et mirte p: et nocte c. 2 omī trium speī c: horum trium p. 3 sive necandos p^o in marg. (om. p): siue uocandos c. 4 lupini farine t. p. 5 mirte p (Diosc. 1, 155): mente c (cf. infra). viridis mittis... c. girbā c, girba p. 6 colligis c, —g p. linteolū p, —lo p^oc. 7 illitum p. viscer media c. iponis cp. 8 medicamentum 3 s (pro SS) admiscemus c, ml'icū supra dictis admiscimus p. 10 cerviō c: cervinis p (sed in marg. p^o I ā c'ucis). tenontas: tonātel c, tetanos p. spinam usque ad om. c. 12 auribus stillabis p, aut columbos (*sic*) c. lana obstrudes (*sic*) c, lanas obstrues p. 13 Sin p^oc: Si ante corr. p. 15 desinteris c, disinteria p. inicere om. c. 16 propinatum c, —nandum p. 17 cauliculi sucum p. 20 cronā c, acrolā p. 21 sandonicū c, sād'icū p. caricis p^o (cālicis p), cario c.

aliud. ad lumbricos. alium cum mentae foliis contritum et piperis modico, adiuncto aceto et oleo spano comestum lumbricos excludit.

aliud. folia persici contrita aut olivae folia aut sambuci folia similiter contrita et super umbilicum imposita & summe faciunt.

LXXIII. Ad elephantiasim.

Est autem elephantiasis corporis callositas operata sub melancholico humore ad similitudinem elefantorum, unde elephantiasis, ut supra dixi, passio nomen accepit. haec 10 autem signa patientes secuntur. extantiae riposae, quas Graeci oncus octodes vocant, id est riposis verticibus prominentes circa vultum et articulos, adiuncta corporis mala habitudine, quam Graeci cachexian dicunt. ex qua passione frequenter summitates digitorum cadunt putre- 15

1 mente (mête) c (cf. Diosc. 3, 36. de murra 1, 77): mirte p. 2 modicum c. et (ol.) c: vel p. 5 sup c: sub p (umbilicum cp). cf. Gal. XII, 76. Iposita p: apposita c. 6 post faciunt haec addit unus c, quae licet Cassii esse non dubitem hic infra adscribo, ut leguntur: Lumbricorum dolor sive tineae et tunc h sunt carenum optimum ad tertias decoques ex eo dabis ieiunis examinatum. Item folia ocimi alii galli clarè voc coligis et super ventrem inpones lumbricos excutiet. Alia radix polipodie i. felici (Diosc. 4, 185. cf. Gal. XIV, 514) depur- gate 7 teris de ligno addis radicè innule 3 VIII 7 si viridis fuerit radix filiè de suco conficis f(?)ecisum armoniacum 9 euforbii 3 II faè pilulas ei? magnitudine que anno incit s(?)e seu eas factas infundis in cervisa nova SS II. Si inventa non fuerit ex aqua calida dabis ubi mirre. SS. II decoxeris admittis anei ciatis II. aut sape. SS. II dabis bibendum ante horas III egici et vermiculos et tineas ante triduum sane debes eos cibari cum pane et posca bibere. 8 corporum p. 9 7 simili- tudine c. elefantorum nominata. unde sic cp. 10 ut — passio c: om. p. 11 autem om. p. patientes c: laborantes p. extantia riposa p, extanti anpossa c. quam cp. 12 ecos etedes c, ecosetodes p (ὄγκος ὀκτώδης. cf. Gal. XII, 827). riposis p: rē possis c. 13 prominens p, promittes c. circa ventrem c. 14 cacexiam c, cacesiam p.

factae, et vox eis aspera efficitur et anhelitum fetidum emittunt. et fit ex putredine sanguinis corrupti circa cutem cruoris nigri vomitus, et immutatur in callosam qualitatem.

- 5 in curationibus vero in principio flebotomiam adhibebis cum secunda sanguinis detractio, quam epa-
faeresin vocant, et post VII aut XI detractiois dies iera
logadio appellato antidoto pridie a cena observantibus in
potione ieiunis dato ventrem purgabis tempore magis fer-
10 venti, sub cane aut post canem. nam Hippocrates in
aforismis sic ait, sub cane aut post canem debere unum
quemque purgatorio operari. quod antidotum iera facit ad
universas melancholicas causas, et conficitur sic. murræ
euforbii 3 singulas <semis>, agarici, ammoniaci, folii elle-
15 bori nigri, folii . . . <dauci> cretici, squillae assae, da-
crydii, omnium specierum VII 3 binas semis, coloquin-
tidis interioris carnis, quam vulgus geledam vocat, 3 V,
aloes, epithymi, hyperici, bdellii, marrubii, polypodii, thymi,
cassiae, chamaedryos, <dauci> cretici, cinnamomi, <omnium
20 specierum XI> 3 binas, opopanacis, castorei, aristolochiae

2 mittunt p. 3 cuti p. 4 quantitatem p. 6 san-
guinis om. c. 7 diem cp (sed post VII dies aut XI d. diem c).
geralogodion c, xeralegodion p (cf. Sim. s. iera, Steph. thes. V,
344 Par.). 8 appellatum antidotum cp. in potione om. c.
9 dato c: data p. 10 ypocras c, ypocrates p. 11 amforismis
c, āphori. p (Hipp. III, 727). unū q purgatorium o. c, unum
quemque purgatum o. p. 12 yera p. 13 casus c, caīs (sic) p.
mirre p: hēr (sic) c. 14 3 singl'as c, añ. 3. II. p (1 & 3 IS. p^o).
armoniaci cp (ut semper). elebori cp. 15 folii cretici cp.
asse c: assate p. diagridii p, diagredii c. 16 omnium —
semis (om. 3) c: añ. 3 II. et 5. p. 17 carne quam guldus
vulgus geldan vocāt c, cortices quos vulgus gelelā dicit p
(cf. Antidot. cod. Par. f. 86^b 1 „Cataputiae catartice aloydarie.
R aloes epatice, diagridii. gelela (sic p^o = gella) interiores
carnes trium paria pondera . . .). est gr. ἐντερίων. 18
yperici — marubii p: om. c. cimi (= timi) c. 19 came-
dreos cp. dauci iterum addidi. cūci (ut supra) p, creti c.
cinamomi. añ. 3 II — castorei om. c. 20 opopanace p.
ologie. lo. (longa c) cp.

longae, piperis albi et longi et nigri, croci et sagapeni, petroselini macedonici, omnium specierum VIII \supset singulas, mellis despumati quod suffecerit. et est perfecta dosi 3 III. aliquantis 3 III dabis, secundum hominis crasin, id est naturam vel temperantiam corporis. et post-
quam diligenter fuerint purgati, lac asinum aut capri-
num schiston appellatum, sicut in dysentericis, frequenter
potui dabis, aut ptisanæ sucum aut faeni graeci sucum
similiter dabis ob lenificandam intestinorum rasuram ex
antecedenti malo humore effectam. 10

aliud. ad elephantiasm. coriariorum rus herbae viridis
suo cum vino tritae totum vultum penna illines.

aliud. ad strumam. amyllum optimum adiuncto modico cumino albo cum ovi albumine tenui teres et horis
serotinis totum vultum oblines et per totam noctem sic-
cari dimittes. tunc lucente die frigida aqua lavabis.
aliquando ob nimietatem callositatis etiam et guttae am-
moniaci competentem modum supra dictis admiscemus.

smegma faciens ad vultum, ad nigredines et ad lenti-
gines, quas facus appellant, et ad solis uestiones, quas
efelidas dicunt. recipit ges asteros et cimoliae cretae \div
binas, cerussae et specularis assati \div ternas, afronitri

1 albi longit 7 nigra c, al. 2 lō. 2 ni. p. 2 omnium
specierum IX 3 singl'as c: añ. \supset I. p. 3 sufficit cp. 4
dabis om. c. 5 crasin: horasin c, horas 1 p. vel p: et c.
7 sciton c, sciston p. disintericis cp. 8 potabis cp.
tipsane c. sucum (post f. g.) om. p. 9 similiter p: fre-
quenter c. linificandum c. 11 coriariorum p: cor-
varum p, corariorum c. rus herbe viride cp. 12 sucum
(—ē p) . . . tritum (—ū) cp. illinis c, linis p. 13 strumam
c: —mas p. 14 cūino p (in marg. I & cumino al'), cimino c.
et cum p. tenui p: tunde c. 15 oblines c: oblines p.
siccare cp. 16 dimittis cp. 18 admiscuntur c. 19
smigma cp. et om. c. 20 facus p, fac' c. 21 effelidas c,
?fellidas p. gesast'os c, gesastare p. 7 cimolie c: qui-
molie p. 22 3 binas c: añ. \div III. p. ceruse specular
assati añ \div III. p. assati cp.

albi ÷ I, fabae fresae pollinis lib̄ I. conficies et exinde vultum lavabis.

LXXIII. Ad ragadas.

Ex antecedenti egestionis nimia duritia frequenter in
5 sessu, quem Graeci edran vocant, diversa podicis vitia
efficiuntur, ut sunt ragades, id est hiatus, et tumores,
quos Graeci flegmonas, et condylomata, quae nos latino
sermone dicimus tubercula.

propter ea curationis tempore cataplasma edricon
10 appones, quod Latini sessorium dicunt. et conficitur sic.
panis mundi medii infusi vino veteri et rosae siccae si-
militer infusae 3 II, croci dimidiam, meliloti purgati sine
semine in aqua cocti 3 III, faeni graeci pollinis 3 II, ovi
assi vitellum unum, olei rosacei quod suffecerit.

15 alia quae appellatur a Graecis dactylisce, id est podi-
calis, siquidem podicis vitia emendat. recipit cerae ÷ I,
adipis anserini, plumbi combusti, ambarum specierum ÷
singulas semis, ysopi attici suci, butyri, cerussae, omnium
trium ÷ binas. solubilia resolves et rasum cerotarium
20 aridis commiscebis. summe ducit cicatricem in omni-
bus locis.

aliud medicamentum edricon, sycotice appellatum, ad
condylomata et ragadas et ad podicis inversiones, quas

1 ÷ I. p. 3 (sine num.) c. faue frixe c. 1'. I. p. lib'
I c. conficis c, — ce p. exinde c: inde p. 2 lavabis c:
lava p. 3 Ad ragadas c, (ragadas ind. p), De diverso podicis
vicio. R̄ p. 4 antecedentis p (—ti c). 1 sesso c, incēsu p
(incessu p^o). 5 quam cp. greci om. p. edram p, edaot
(sic) c. 6 ragade p, rapade c. 7 quos c: quas p. fleg-
mones cp. 8 dicimus hoc ūo sentula c, tubercula dicimus p.
11 medium cp. infusum p, om. c. rosa sicca s. infusa p
(—e c). 12 melliloti cp. 14 sufficit cp. 15 aliud q, c.
dactylisce c: diartilisce p. 16 R̄ cp. 17 ambarum — semis
(sic) c: añ. ÷ I. S. p. 18 antici c, actici p. ceruse. añ.
3 II. p. 20 commiscebis cp. 22 ficitice cp. 23 ragades c.
ad podicis i. p: ad ydropicum i. c.

Graeci ectropas vocant, et ad dolores intolerabiles. recipit spumae argenti, cerussae, mastices, omnium ÷ ternas, cerae ÷ VI, iusquiami viridis suci, olei myrtini libras singulas. quae sunt sicca teres cum suco iusquiami et sic cerotarium rasum admiscebis. et in usu tolles ex ipso medicamine et teres in mortario plumbeo cum rosaceo aut myrtino oleo donec crassescat, et illines locum. et si volueris, ex ipso medicamento emplastrum superimpones et ligabis.

LXXV. Ad idema.

10

Antiqui seu veteres medici dicunt esse idema, quod nos aquosam inflationem dicimus, subalbidam et laxam extantiam quae ostendat digitorum impressione designatas concavitates corporis resurgere. et fit vel generatur ex flegmatis substantia aut ex spiritu vaporoso circa pedes vel crura saepe eveniens in pthoes, hoc est in pthisicis et in cachexies, id est corporum malis habitudinibus. frequenter si cum tenui febricula contigerit, hydropicas superaffert passiones, et maxime in cachecticis corporibus, id est mala habitudine affectis, praesertim si et ventris fuerit cursus in isdem, ut dixi, passionibus, sub difficili temperantia corporis, quam Graeci dyscrasian vocant, stomachus nocetur.

1 hec tropas c, ἐκτροπας p. R cp (cf. Petroc. p. 278).
 2 mastici c, masēici p. 3 añ. ÷ .III. p. l' singl'i c, añ.
 l'. I. p. 5 admiscebis p, gmisces c. in usum cp: cum opus
 fuerit Petr. et ex p. 7 aut p (Petr.): et c. illines p,
 —nis c. 8 iponis cp. 10 Ad hydema c (idema ind. p).
 De aquosa inflatione. R p. 11 idema p, hidema c. quam
 cp. 12 subalbida et laxa extantia cp. 13 ostendat p:
 —dit c (ad rem cf. Oribas. synops. 7, 35 ex Gal. X, 963).
 impressiones c, —nem p. 14 corporis om. p. 16 pthoed' c,
 pthocs (sic) p (ἐν φθόαις Gal. X, 953. XI, 101). R 3 ty-
 sicis c, .I. ptisicis p. 17 cacexies c, cacexics (sic) p.
 malas habitudines cp. 18 ydropicas cp. 19 afferre p.
 caceoticis c, cacetictis p. 21 hiisdem c, hisdem p. 22
 discrassiā c, diatrasī p (in marg. ī & diacñian p°).

in curationibus vero si cum constrictione ventris fuerit passio, cataplasma laborantes ex faeni graeci et lini semine et hordei farina, adiuncto sufficienti cumino et ruta, hieme et lauri bacis cum modico melle et oleo. ⁵ et postquam tuleris cataplasma, ante et retro cucurbitas dabis et lanis mundis loca tutabis et fasciabis. et ieiunis antidotum diureticum dabis superius in nefretica passione conscriptum. post haec epithima dia spermaton vel dia samsucu appones, et acri clystere ventrem deduces, aut ¹⁰ certe oxymelle cathartico competenter purgabis, quod oxymel inferius in loco suo conscripsimus.

sin vero cum fervore et tensione et gravedine cum aliquanto dolore ipsam tumoris sive inflationis extantiam in cruribus senserint aegrotantes tempore quo magis deambulaverint, oportet sola crura per totum levioribus ac ¹⁵ multis laceraturis scarificare eo modo quo superius ignem sacrum scarificare praecepimus, vel pro scarificatione sanguisugas appones. et post detractionem sanguinis factam poscam cum modico alumine temperabis, ex qua posca ²⁰ penicillos rudes ac molliores moderate expressos superpones et ligabis. et post dies III dia iteon emplastrum appones. aut certe illud quod a Graecis e barbaros ap-

1 vero om. c. 3 cimino c, cōmīo p. 4 baccarum c, bacas p. 6 tubabis (ut semper) p. et fasciabis c: om. p. 7 diare(i?)tic p. I effretica c, ^{in ne} le fretica (sic) p^c. 8 epithimia c, epith'i p. diaspiatō p. dias ad sucū c, dia sāsuē p. 9 clisteri c. deducis p, —cit c. 10 oximel c, oxiel' p. oximel c, oxiel p. 11 inferius: immo superius (c. 34). inf. suo loco p. 12 Sin c: Si p. et tensione om. p. 13 ipsam tumoris p: ipō tūore c. sive inflationis extantia c, seu extantiam inflationibus p. 15 ac p: cū c. 16 scarificari c (—re p). eo p: eodem c. 17 acrem c. scarificare (sic) p: —ficare c. pro scarificatione: pro scarificare (sic) cp. 19 ex qua posca p: ex aqua c. 20 penicillos cp. moliores c: molles p. 21 ponis cp. .III. (sic) cp. dialte c, dial|ceoⁿ (corr. obscur.) p. 22 e: om. cp (cf. c. 38. 45).

pellatur similiter appones. novissimo vero si aliqua forte remanserint, dia thapsias sicut in ischiadicis uteris.

LXXVI. Ad hydropicos.

Est autem hydropica passio diffusio humoris aquosi cum inflatione secundum retentionem spiritus isdem laborantibus effecta. et sunt distantiae passionis duae, quarum una a veteribus ascites nominatur, id est utriculosa, ab epatis vel splenis aut stomachi vel renum saxietate creata. altera vero quae tympanites appellatur a pulmone contingit, ex quo pulmone sub ingenti ventositate venter inflatus ostenditur, ita ut cum fuerit inspicientis palma pulsatus, tympani sonitum faciat, unde nomen ut supra dixi passio tympanites accepit. sed illam primam quam asciten diximus haec signa secuntur. insurrectio ventris superdistensa et <super> inguina et crura, albida efficitur. quae inflatio cum digitis fuerit impressa concavitatis formam ostendit, quod Graeci entyposis vocant. ceterae vero superpositae partes macie attenuatae efficiuntur, ut thorax pectus brachia. etiam et potus nimia appetitio sequitur cum retentione humoris, ex qua retentione humor intra spatia ventris inclusus semipleni

1 novissime c. alique forte c, forte aliqua p. 2
diapta psia c. sciaticis p, —cū c (cf. c. 52). 3 Ad ydropicos c (ind. p), De ydropica passione p. 4 ydropica cp.
5 hisdem cp (cf. c. 75). 6 due p, II. c. 7 asortes c,
ascites p. articulosa c. 9 saxietate p, sanxietate c.
ti(y c)mpanites cp. 11 venter: venti p, tenui c. inspicientes c et ante corr. p. 12 tympani cp. sonitum faciat p:
sonum signant c. unde passio tympanites accepit (sic) p,
unde nomen ut supra dixi passio tympanites nomen (sic iterum) accepit c. 13 illum primum quem p. 14 asciten p, asitos c.
sequuntur cp. insurrectionem c. 15 super distensa et inguinum (—nū) et crura albida (—de c) efficiuntur cp. 17
entyposis c, etiposis p. 18 maciei tenuitate afficiuntur p.
19 ut c: et p. et brachia p. etiam om. c. 20 ex aqua
redēcōē fumor t'ra spana vētrem pulsus s. v. c, qui retentione intra spatia ventris inclusus s. v. p.

utriculi similitudinem ostendit. unde nomen proprie passio ascites, ut dixi, accepit. tympaniten hydropem haec signa secuntur. insurrectio ventris et distensio praecordiorum et venarum subtractio. et ipse a supra dictis minus sitit. 5 aliquando etiam peiorante passione tussi exagitantur. nam generaliter Hippocrates omnibus hydropicis, plus autem a pulmone patientibus, in aforismis sic ait: hydropicum si tussis obtinuerit, hoc est exagitaverit, sine spe efficitur. etenim tussis, secundum expositionem Magni iatro- 10 sofistae, si hydropicum ut supra dixi exagitaverit, aquosus omnis humor dissolvitur, ut per omne corpus effusio efficiatur.

ob diligentiam vero curationis chamaedryos, asarum, elelisfaci semen id est herbae salviae, dauci cretici semen 15 id est pastinacae hortensis, petroselini macedonici, feniculi radicem, graminis radicem, haec et singulariter et simul in uno decoques in aqua et ipsam decoctionem mane et ad noctem potui dabis. et excludet vel inaniet

1 utriculi *p*^o: ventriculi *cp* (cf. *C. A. p. 471*). proprie *p*: proprium *c*. 2 ascites *p*: absque tenentes *c*. dixi *c*: diximus *p*. Tympanitē idropē *c*, timpanitē ydropicum *p*. 3 secuntur *c*: sequuntur *p*. 4 et venarū subtractōe *c*, venarum surrectio *p*. a s. *c*: ad supradcōs *p*. 5 tussi *p*: tusse *c*. Nam yocrates g. *p*, Nē g. ypoē *c*. 6 pl^o aū a pulmōe *c*: pl^o a pulmonem *p*. 7 amforismis *c*, aphoris. *p* (*Hipp. III, 762. cf. 754 Lips.*). ydropicum *c*, —ē *p* (*in marg. p^o i ā yd^opū*). 8 si t. exagratuauerit h et (*sic*) | obtinuer (*ἐνέχῃ*) sine spe *c*, si t. exagitaverit sū spē *p*. 9 magni hyatro | ciase *c*, mag^o (*corr. mag*) hia | t^ofiste i. sapientis medici *p*. 10 dixi tussis (*it.*) ex. 11 corpus omnis humor dissolvitur *c*, Omnis humor aquosus dissolū *p*. 13 vero *om. c*. came- dreos asarum (*sic*) *cp* (*scil. cham. semen, asari radicem*). 14 elilisfagi *p*, alilis faci *c*. semen *p*, seminis *c*. i. herba salvie *c*, i. salvie *p*. 16 radicē *c*, rad' *p*. graminis radicē *c*: *om. p*. haec et: h *p*, 7 (*et*) *c*. 17 i uino cocta *c*, in uno decocta *p*. l'a decoctōe *c*, ipsa decoctō *p*. 18 dari *c*, da. (*sic*) *p*. et *p*: *om. c*. excludit *cp*. inaniet: fi amat *c*, iaia *p* (*p^o in marg. iaia*).

per vesicam hydropicis aquosum humorem. etiam et per ventrem suprascriptum humorem hydragogo dato similiter excludes, hoc est cocci gnidii optimi id est non vetustissimi sed novelli ex locis maritimis collecti grana competentia aut XXVIII aut XXXI aut XXXVII singularia 5 aut bina cum modicissimo nitro uva passa singula enucleata includes et dabis vespertino tempore abstinentibus a cena cata en id est singulatim comedenda, et postquam comederint tres guttas aquae calidae superbibendas dabis.

aliud hydragogon fortioris virtutis, quod et per 10 ventrem et per urinam et per vomitum hydropicis aquosum depurgat humorem. aeris usti in modum fabae aegyptiae, stercoris columbini agrestis 3 I, rutae hortinae viridis foliorum 3 II simul in uno diligenter tritas cum vini cyatis tribus potui dabis. 15

aliud. sambuci radices cortices tundes et exprimes et ex ipso suco expendes ÷ I et superaddes mellis coclearia III et dabis cum aquae calidae cyatis III. tunc sufficienter ipsos laborantes deambulatione movere iubebis. et postquam sive per ventrem sive per urinam aquoso 20

1 p uexicā c: om. p. 2 SS c: supra dictum p. ydro-
gago cp. 3 h (om. est) p, h. 3 (sc. unciae signo ÷ posito
pro ÷ = est, ut supra) c. coco nidio p, ggcio c. i. ve-
tustissimi f molli c, i. non veteri sed novello p. 4 collectis
c, —to p. 5 XXXI c: XXI p. XXXVII c: XLVII p.
singl' aut binas c. 6 uva passa singl' enucleata indues c,
in singulas uvas passas ?nucleatas includes p. 7 dabis c:
om. p. 8 cata en i. singulatim: singulatim cata una (una p)
cp. comedenda c: —das p. 10 y(i)drogagon cp. quod
et: qui et c, quod p. per ventrem urinam et v. p. 12
es ustum p. (faue) egipcie c, egiptiace p. 13 3 I. (i. e.
singulas) c: añ. 3. I. p. ortine cp. 14 uno cp. tritas:
tritis p, om. c. 15 tribus c, III. p. 16 sabuce p. ra-
dices p, —c c. cortices p, —c c. tundis c. exprimis
cp. 17 et (ante ex) add. p^o, om. cp. expendis cp. 18
cocl'r. III. cp. cum om. p. aqua calida cp. 19 suf-
ficientes p, supficiētis c. 20 aquosum humorem c.

humore fuerint exinaniti, refectioni dabis aut piscem aut aliquid ex volatilibus. et iterum post dies V aut VII simplici purgatorio et sine aliqua malignitate, quod Graeci acaciston vocant, non solum semel, sed et secundo interiecta una vel duabus ebdomadis si vires permittunt, ventrem purgabis. et conficitur sic. scammoniae assatae semunciam, nucleorum pini, piperis, uvarum enucleatarum, cocci gnidii id est seminis turbisci, omnium quattuor grana quina, mellis libram. diligenter conficies et in doliolo vitreo repones. et quando uti volueris dabis coclearium I aut II cum calidae sufficienti modo.

aliud hydropicis, maxime hiemis tempore, si forte nimia tensio vel saxietas, quam scirrosin dicunt, praecordiis aut in splene aut in renibus occurrerit, et in corporibus natura frigidis. oportet sacculo desiccatorio et ex parte relaxatorio uti. recipit hordei farinae et faeni graeci farinae et ervi et cumini et stafisagriae et salis, omnium sex ss binos, malvae seminis moliti farinae et absinthii cymae et marrubii sicci et bacarum lauri et anisi et nitri, omnium ss singulos. quae tundenda sunt tundes et rarissimo cribro cernes, et quae molenda sunt

1 refectione c: —nem p. piscem p: pisionē c. 3 et: aut cp. 4 caciscaton c, cacisticon p. interiecta p, —to c. 5 una p, I. c. vel .II. c. ebdomadis: —das c, —dibus p. 6 scamonee c, scamonee p. assates $\frac{2}{3}$ c, assate semuncia p. 7 nuclei pini c, nuclea² pinea² p. uvarum enuclea² c, uve enucleate p. 8 coc(g p)o gnidii cp. seminis turbisci p (et in marg. p^c: h¹ ur — i. e. hic videtur — quod turbiscus sit laeureola. cf. Pl. 33, 88): semini ylsi (sic) c. 8 quattuor: III. c, om. p. 9 quina c: an. XXV. p. l' c, l'. I. p. conficies cp. 10 et nitro reponis c. $\frac{1}{2}$ q; cal'e (cumque calide) s. m. p: cū calid' (om. suff. m.) c. 12 hyemis c: veris p. 13 saxietas c: anxietas p. scirrosin p, sirosin c. 15 frigidis. (sic) c: frigidioribus p. 16 R c: om. p. et om. p. 17 herbi cp. 18 omnium β (? correctoris manu obscurum) binos p, omī sex. ss . binas c. 19 come cp. bacas p. 20 omī ss singl'as c, omnium sextarios singulos p. 21 et molenda moles c.

moles manuali mola, et sic in uno commiscebis. coques in vino et aquae modico et oleo, et sacco inclusis loca quae patiuntur vaporabis, et subter perungues oleo inferius scripto, et post vaporationem adhibitam loca tubabis et fasciabis. quod autem oleum conficitur sic. recipit cucumeris agrestis radicis viridis ÷ VI, afronitri ÷ II, aluminis lipari ÷ I, olei libras II S. radicem minutatim incidet et simul cum aliis speciebus coques in oleo et aceto donec oleum remaneat, et uteris.

potio ad hydropes. absinthii viridis turiones minores numero sex et florem spinæ albae diligenter teres cum piperis granis XII, et diurna potionem vini veteris dabis triduo aut per dies V. et per singulos dies hoc facies.

cataplasma hydropicis conveniens. etiam et splenetis optime facit. recipit capparis radices siccas, absinthii cynam, cuminum, bacas lauri, faeni graeci et hordei pollinem. omnia tundes et coques in melle et aceto, et appones ad vesperam et sines totam noctem, mane vero mutabis. hoc frequenter facies.

epithima hydropicis conveniens. epithima dicunt Graeci medicamentum quod stomacho et praecordiis simul et ventri superponatur, cum fuerit panno inunctum. recipit

1 et sic in uno p, et si uno c. commiscebis cp. 2
Iclusis c, claudis p. 3 et om. p. 4 tubabis p. 5 aut c,
ā (aut) p. 6 viridis om. p. 7 liparis c,
—rii p. lb' II. semis c, l' II. sels p. rad' p: om. c.
8 incidet simul cum p, incisas sic cum c. coquis c. 9
d. ad oleum c. 10 ad om. c. i(y p)dropes cp. minores
VI p, minores nūo tres c. 12 XII c: VII p. ei diurnam
potionem p, diurnā et (?) potionem c. veteris I feratis (c,
iferatū p) dabis (sic) cp. 13 triduo — V c: per dies III.
aut V. p. 16 facit c: operatur p. 17 come cimini bacca-
rum c. 18 et in melle p. 19 pones p. sines: si vis cp.
tota nocte c. 20 mane vero c: et mane p. facis c. 21
ad ydropicos c. p. greci dicunt p. 23 pannum (sic p'
cibaria (sic p) om. c. 24 p.

afronitri cibaria < . > , cupressi viridis spaerularum, torrefacti nitri libras singulas, absinthii, staffsagriae, caricarum pinguum libras binas, passi cretici quod suffecerit. conficitur sic. spaerulas cupressi viridis in vino aminaeo in
 5 cacabo novo decoques donec leviter torrescant, et sic in girba mittes et tundes, et sic iterum diligenter teres. etiam et caricas separatim diligenter tundes et sic tunsas admiscebis. tunc deinde omnia quae sunt tunsas et sicca et creta adiunges et adiecto passo simul tundendo in unitatem coges, et uteris.

epithima Filagrii conveniens hydropicis ad diffusiones humoris per totum corpus, quas parechysis dicunt. recipit ervi farinae tenuissimae, anisi, cumini, hordei pol-
 15 linis, chamaeleontis nigri radices id est sefra, salis fossilis, bacarum lauri, nitri, cardamomi, faeni graeci moliti, omnium specierum X dr̄ tricenae, cerae, resinae pinalis quam pituinam dicunt lib' II, olei veteris quod suffecerit. quae sunt sicca tundes et cernes, tunc cum vini veteris ÷ VIII teres, et sic solubilia soluta et in mortario re-
 20 fusa siccis commiscebis et in unitatem coges.

1 cibaria 9^{cu} pressi p, cipressi c (deest numerus cibariorum. — V?). viridi speculas c, viride(i p^o)s ferulas p. 2 t. nitri añ. l'. I. p, t. ut (= lib') absinthii (quod abs. om. p) c. 3 añ. l' II. p, ul' (pro l') binas c. sufficit c. conficitur om. c. 4 virides p, —dis c. 5 leviter c: diligenter p. torrescant: maturescant cp. in girba i. mortario (glossam del. p^o) p, agriba c. 6 et sic — (7) tundes cm. c. 8 admiscebis c, amiscebis p. et tunc c. deinde c: demum p. omnia que p: dimitte quod c. et sicca om. p. 9 5 tundendo c, simul 7tūd'd' p. 10 cogis (sic p) et om. c. 11 Epith'a p, post h' (hec) c. filagrium cp. diffusiones p, —nis c. 12 quas p: om. c. parathisis c, pēchul' p (—h' p^o). cf. C. A. p. 468. 13 herbi p, hēr c. pollines p. 14 cameleonte c, —leotes p (cf. C. A. p. 475). nigre cp. radices id est sefra: radices. II sefra^{ti} p, et radiē I. se fra c. salis fossilis: sal' fos fil' c, sa | l'. fossil' p. 16 omī spēr X dr̄ tricenae c: añ. 3. XXX. p. 17 pithima c, pitimia p. l' II c, añ. l' II. p. sufficit cp. 18 que sunt p: om. c. tū c. 19 resoluta p. 20 commiscebis cp. cogis cp.

aliud. cretam cimoliam cum alumine scisso aqua resolves et per totum ab inguinibus et pectine usque ad pedes in sole oblines.

aliud ad hydropicos. sympasma desiccatorium arenae ferventis adobrutione, quam ammosiosian vocant, et hydropica et sicca lavatio, quae a Graecis xerolusia appellatur. id est sympasmate prius corpori sudanti in aere bono lavacrorum asperso, et sic sabano sicco detergantur, et alia multa cyclico modo. mirabiliter operatur.

LXXVII. Ad praefocationem matricis. 10

Praefocationem matricis sequitur subitus casus, vocis amputatio ut obmutescant, et apprehensio sensus, dentium confixio et stridor rapidus ita ut accessionis tempore una pars oris ad alteram partem conduci videatur, articulorum contractio, praecordiorum subrectio, ipsius matricis ad superiores partes subfugium. tunc etiam thoracis extantia efficitur et pulsus parvitas, aliquibus et alienationis et iterum subita resumptio ita ut omnia quae in accessione senserint dimissionis tempore recordentur.

2 pectine: pedena c, pudenda p. 4 sīpasma cp. 5
ferventes (c)p. ad obrisionem c, adobritionem p (ad rem cf.
Actus 10, 27. 28 et 3, 9. Cels. 3, 21). amocisian c,
āmocosiā p. et ydropica p, et tropica c (fort. est h.). 6
xero(u)c lusia cp. 7 i. (id est) sispasma prius corporis asu-
danti c, et sispasmata, al' q (q del. p^o) corporis sudanti p. in
aere bono lavacrorum c: in lavacris p (cf. Cael. Aur. chr. 3,
117). asperse c, —sa p. 9 licito modo c, ciclo modo p, ubi
adnotat p^o i. e. corrector coaevus saec. XIV: i. modo hoc modo
illo iterando opus et ad idem sepius revertendo ita videtur
licet dubitem (!). operatur (sic) cp. 10 De praefocatione
m. p. 11 matricis p: aut (autem) c. 12 aphensio c,
adp^{en}no p. sensuum c. 13 confrixio c. rapidus c: om. p.
15 gōd p: detractio c. subereptō (sic) c, surrectio p (με-
τεωρισμός Sor. p. 249 D). 16 subfigiūt p, subfumigant c
(ἀναφυγή Sor. p. 249). 17 parvus c. a. et mentis
alienatio p, a. alienatio et mentiri c. 18 subdita c. 19
accessionem cp. senserit c, sumpserint p. diuisionis c.

in curationibus vero opopanax aut capilli mulierum
exusti aut caprae, aut pix combusta naribus applicetur.
desinent praefocationes matricis. inferius vero in ipsis
genitalibus locis aut opobalsamum aut nardum aut folium
5 appones, etiam et optimo styrace suffles. sic enim matrix
poterit fetidis odoribus a superioribus ad inferiora fugari
et loco proprio revocari, cum melioribus et iucundis ad
inferiores partes fuerit invitata et provocata. etiam et
cucurbitas cufas <id est levi> cum appositione a superi-
10 oribus partibus usque ad inguina blande deduces.

aliud. cumini torrefacti coclearium I diligenter teres
et cum vino mixtum ieiunis dabis.

aliud. vulpeculae adeps aut caprae cum modico bitu-
mine tritus et in pesso appositus praefocationem matricis
15 mitigat.

trociscus ypocapnistos id est suffumigatorius faciens
ad menstrua deducenda et ad matricis adscensum sive
supernum recursum, quem Graeci anadromen dicunt, et ad
praefocationem matricis optime faciens. recipit dictamni
20 cretici, artemisiae, paeoniae, lapidis gagatis, aristolochiae

1 aũ capre ā pic' combusti c, ā cap̄ āpicis combuste p
(cf. Gal. XIII, 320. Act. 12, 68 p. 997. Th. Prisc. gyn. 2.
contra disputat Soranus p. 256). 2 naribus c: auribus p.
applicato c, applicata p. 3 desinunt p, desinũ c. vero
om. c. 4 aut c: matricis p. 5 storace p, sciracum c.
suffis p, fuis c. s. e. pot. matrix p. 7 proprio c: primo p.
iocundis cp. 8 partes om. c. iurata p, iũcta c. 9
cucurbitas (cufas add. c) cum appositione cp. 10 blande
ducis p, albe blande delucis c. 11 torrefacti om. c. 12
cũ c: om. p. mixto cp. ieiunos dabis c, ieiunans pota-
bis p. 13 adipem . . . tritum cp. cap̄ c, cap̄e (capree) p.
14 et inpresso appositum c, et inpresso et appositũ p. ma-
trix p: aut c (pro matricis compendio m̄ lecto, ut saepe infra,
aũ, ũ = autem, aut, ut). 16 ypocapnistos c, opocanistes p.
suffumigatorius cp. 17 adscensũ c, adcessũ p. 18 anadromen
c, —drom̄ p. 19 facit c. B cp. dictami c, dip-
tami p. 20 agagatis p.

rotundae, bacarum lauri, ungulae mulinae, onanium VII ÷ I, styracis calamitae, bituminis iudaici, ambarum specierum ÷ ternas. conficies et uteris.

LXXVIII. Ad procidentem matricem.

Matricis prominentem casum, quem Graeci proptosis⁵ vocant, sanant naribus applicata opobalsamum, nardum, folium optimum, styrax et omnia bene redolentia, inferius autem subfumigando pix lana <combusta> et omnia fetida. si vero post partum fuerit matricis tumor aut prominens casus, lanam succidam in spaerulae modum for-¹⁰ matam et in vino et oleo tepefacto lanas infusas et mediocriter expressas appones et fasciabis.

Pessus chalcisticus faciens ad resolvendas duritias matricis, ubi proptosis minime fuerit facta. recipit lilii floris, olei cyprini, aut rosacei si forte aestas fuerit,¹⁵ adipis anserini, faeni graeci pollinis tenuissimi, medullae cervinae, cerae ponticae, omnium VI ÷ singulas, ovi assi vitellum unum. conficies et uteris.

Pessus malacticus, id est mollitorius, ad resolvendas matricis duritias sive stricturas. recipit ovi assi vitelli,²⁰

1 rotundae: ro. (sic) p, om. c. bacarum lauri añ. ÷ I.
<hic inter lin. p^o add. ungule marine ÷ . . num. extincto>
storace. cal. (sic) p, baccarum lauri omī VII singl'e unici | cule
marine ³ I. storaē calamitis c. 2 b. i. añ. ÷ III. p. 3
conficies cp. 4 Ad cadentem (procidentem ind. capp. cp) m.
c: De prominente casu matricis p. 5 quam cp. proptosis
c: protosi p. 6 pro naribus c. 7 storaē p, —cis c.
Inferis c, I feti^o (ut mox v. 9 fetido sic) p. 8 a. fumigando c.
10 et lana c. lana succida . . . formata cp. sperule c:
specule p. formatam (sc. appones etc. desunt nonnulla. cf.
Sor. p. 125—26). 11 et in oleo c. lana infusa . . . expressa c.
18 Pessum c. ad solvendas duritias c, ad resolvendam
duritiam p. 14 recipit om. cp. 17 cere pōtice c: om. p.
cervine añ. ÷ I. ovi etc. p. 18 unum p, .I. c. 19 pessus
ante corr. p, possis c. resolvendam . . . stricturam p.
B cp. vitellum cp.

cerae, diachylon medicamenti, omnium trium paria pondera, olei rosacei quod suffecerit.

aliud pessarium conveniens ad dolorem vesicae et matricis. recipit croci 3 I, ovi assi vitellum I, cerussae 3 III, cerae ponticae, adipis anserini, adipis gallinaei, olei rosacei, omnium IIII 3 octonas.

aliud pessarium malacticum. recipit faeni graeci torrefacti pollinis tenuissimi, cerae, adipis gallinaei, adipis anserini 3 I, olei rosacei quod suffecerit.

aliud pessarium simplex id est dia tessaron ad mitigandum matricis calorem et ad duritiam vel callositates et ad sordida quaeque purganda. et universas matricis indignationes quae fieri solent absolvit. recipit ovi crudi medullam croceam et olei rosacei et mellis despumati optimi et olei susini paria pondera. diligenter commixtis uteris in pesso.

encolpismi confectio ad siccitatem et relaxandam constrictionem et ad duritiam matricis, etiam ad obdulcandam acridinem. faeni graeci et lini seminis et ptisanae, omnium trium paria pondera commiscebis et cum aqua dulci coques ut sucum faciant non nimis mucilentum, et diligenter ipsum sucum liquabis. potione lavata admiscebis mellis despumati coclearium I aut duo, admiscebis et olei susini tan-

1 cē p, cere p^c. medicamentum c (—ti p). omnium
trium om. p. paria om. c. 2 sufficit cp. 4 R cp.
cē cp. 5 anserini. (et add. c) gallinaei cp. 6 om̄ IIII. 3
octenas c: añ. 3 VIII. 7 recipit om. cp. fēñ gēci torrefacti om. c. 8 adipis add. p^c: om. cp. 3 I: om. c, añ. 3
I. p. sufficit cp. 10 diateseron p, —saron c. ad m.
m. calorem p: ad stigmata ad colorem c. 12 et ad p:
vel c. p. et ad universas p, p. admiscis (sic) c. 13
fieri solent. ad solvet (sic) p: om. c. R cp. 14
et olei susini om. c. pari pondera c. 15
mittis et p. 18 etiam om. c. 19
(sic) c: om. p. 20 pondera
licabis p, liqua h' c. 21
23) admisces cp. 22
suci adm. c.

tundem, et sic in uno commixtis et tepefactis encolpizabis per corneum metrenchyten appellatum <id est> supino schemate iacentis in sinum mulieris infundes, quem Graeci colpon appellant. quod si ad praesens metrenchyten non inveneris, per enetera osseum vesica aptata id facies. 5

LXXXVIII. Ad metromaniam.

Metromaniam latino sermone matricis furores sive insaniam dicimus. hoc medicamentum convenit, et ad omnia carcinomata matricis id est cancerosa, et ad alia dyscola id est difficilia valde bonum et probatum. recipit 10 croci opii galbani auripigmenti, omnium IIII 3 quaternas, olei dadini et nardini ÷ singulas. conficies et uteris post annum aut certe post VI menses in pesso in modum fabae aegyptiae maioris aut in modum avellanae nucis appositum. 15

LXXX. Ad aperiendam matricem.

Flebotomia in cruribus supra talos interiores adhibita patefacit matricem.

aliud. nitrum album cum melle et cum resina tere-

1 in vino p. et tepefactis om. c. encolofizabis cp.
2 metro(ū p) ēciste cp. id est addidi. 3 mulieri cp, —ris p^o.
infunde c. quem greci colfon p: om. c. 4 metretifcen c,
metrē elufn p. 5 apenetece ossa p, metrend'fcen (sic iterum)
penetro ossea c. 6 De furore et insaniam matricis p. 7
Metromania cp (sed in latino p). 9 ad om. c. 10 valde
bona probatur c, velud bonum <et add. p^o> probatum p.
p cp. 11 (pimenti sic p) añ. 3 IIII. 12 dada c, clad'1 p
(sed in marg. p^o l' dadini). et (nardi) c: om. p. 3 sing'las
c, añ. ÷ I. p. conficies p, —citur c. 13 aut post VI certe
m. p. pessum p. 14 egyptie cp. nucis c: minoris p.
16 De flebotomia in cruribus facienda p. 17 talos inferiores
c, tales (sic) interior p. 18 matricem (aū c, cf. supra) om.
p qui statim transit ad Al' fel bub. (p. 192, 3) sic: Al' fel
bubulinum cum resina . . . (p. 191, 19—192, 2) patefacit ma-
tricem. al' nitrum album et ruta positum similiter facit.

bintina et oleo veteri illinitum aut orificio matricis appositum patefacit.

aliud. fel bubulinum cum ruta similiter facit.

aliud. caricarum pinguum caro cum nitro et oleo
5 cyprino contrita similiter operatur.

aliud. pessarium menstrualem sanguinem provocans, quod Graeci emagogen dicunt. etiam et mortuos fetus excludit. accipit autem pulei, <mellis> acapni, absinthii pontici cymae 3 ternos, nitri 3 VIII, mellis quod suffecerit.

10 aliud. potio menstrualem sanguinem provocans. recipit fu, asari radices, mellis acapni, omnium III 3 binas. dictamni cretici manipulum I, passi cretici 5 III. simul omnia in cacabo novo sufficienter decoques et in usu exinde potui dabis cyatum unum semis mox lotae.

15 LXXXI. Ad accelerandum partum.

Thymum tritum et cum vino potatum accelerat partum.

aliud. faeni graeci semen et ibisci radicem quam althaeam vocant et marrubii herbae manipulos II et lini semen simul omnia in aqua decoques, et ipsa decoctio in
20 encathismate, id est in balneo, supra sellam sedenti patefactis pedibus ante et retro podici adhibita confestim excludit quae diu tenebantur.

1 veteri: vulneri c, ulceri p. 3 cum om. c, et p. 4
carnes . . . contritas p, carnē . . . contrita c (. . . operatur cp).
7 emagogen c, —gen p. et ad m. p. 8 Accipit (sic)
autem c: B p. pulei acapini c, pulei acapni p (sed p^o
acaptif pro acacie?). 9 comax c, comam p. 3 ternos
(sic) c, 3 III p. 3 IX c. sufficit cp. 10 aliud om. cp.
11 mel acopi c, mll' acoz p. m. a. añ. 3. II. p. 12
diptami c, ditani p. cretici (post dict.) om. p. 5 p,
55 c. 13 in om. c. et om. p. in usum cp. 14 unum
p, I. c. loti (sic) cp. 15 Ad celerandum p. c, De acele-
ratione pti aliū p (Ad celerem partum ind. p). 16 Timum p,
Fimum c. 17 et ibisci: gūla p (sed supra gūla pro evisci
p^o), om. c. radicem p, —c c. 18 alteam (—ā) cp.
dicunt p. hēr c: om. p. 19 semls (—minis) c. simul
p: sic c. in aqua om. p. in om. c (in catismate p). 21
podici: potui cp.

aliud. resina frixa suffita aut in pecudum vel boum galbanum suffitum, aut elleborum nigrum aut styrax aut vini faex suffita non solum secundas mulierum sed etiam fetus mortuos excludit.

item potio. tria grana de medio citri tolles et teres et cum potione aquae calidae dabis, et continuo curabit.

LXXXII. Ad emorragian matricis.

Matricis emorragian latino sermone sanguinis fluxum vel profluvium dicimus. et est passio incurabilis, maxime si longi temporis sit et ex antecedenti frequenti abortione et secundum putredinem arteriarum fuerit creata.

ob diligentiam vero curationis oportet in principio, antequam passio tempore diuturno veterescat, ea adhibere quae valeant virtute styptica omnia soluta densando vel constringendo sanare, hoc est rosam siccam, lenticularum turiones virides, myrtam siccam, siliquae graecae aridos ramulos et caducum granatae. omnia in uno mixta decoques ex duabus partibus aquae et una vini, et pygmate confecto diligenter fomentabis, et inicies ex ipso liquore supino schemate iacenti pedibus patefactis, subposito prius clunibus cervicali ut renes patientis sursum erigantur, quod Graeci anatropen dicunt. tunc mannae turis, alu-

1 vel boum vel sones (senes *p*) galbanum (*sic*) *cp.* 2 galbani suffin (*sic*) *c.* nigri *c.* stiraē *c.* stirace *p.* 3 secundinas *p.* 4 s. et mortuos fetus *p.* 5 Itē *c.* om. *p.* 6 aqua calida *c.* carebit *cp.* 7 Ad emorogia matricis *c* (*ind. p*), De fluxu matricis *p.* 8 emorogia *c.* emorrogia *p.* 10 si longo tempore sit *c.* si ī (*sic*) longi temporis fit *p.* frequenti — secundum om. *c.* aborsione *p.* 13 tempore diurno *c.* diuturno tempore *p.* ea om. *p.* 14 virtutem stypticam *p.* 15 rosa (ro. *p*) sicca *cp.* 16 turiones *c.* bituōe^s *p.* mirta (sicca om. *c*) *cp.* 17 ramos *c.* granate *cp.* uno: uino *cp.* mixto *p.* mitte *c.* decoque *c.* 18 aqua et vino *c.* stigmate *p.* scimate *c* (*cf. ad c. 18 et Sor. p. 218, 15 Erm., Th. Pr. p. 79*). 20 iacentem *c.* —te *p* (—ti *p*^o). 22 anatropō *c.* anacarpō *p.* manne et turis *c.* manna. thuris *p.*

minis scissi parte singula, caduci granatae dimidia parte cum ptygmate supra scripto contrita usque ad mellis crassitudinem, abstinēt profluvium sanguinis iniecta.

aliud. granatae siccae corium et pini cortex et galla
5 et acantha aegyptia adhibita similiter operantur.

aliud. acacia cum hypoquistidis suco et decoctione rosae contrita et in floculo apposita abstinēt fluxum.

1 parte singl' c, partes singulas p. et granate caduci p.
dimidia pars (pas sic p) cp. 2 cum sticmate p, cōscimate c.
SS c: supra dicto p. 3 retinet p. sanguinis c: matricis p.
4 corticem p, —cū c. gallas p. 5 achanta p, alchanta c.
egiptia om. c. operatur p, apta c. 6 ypoquistidis p,
—de c. et: ex p, om. c, ubi y. suco decoctione facta et... c.
7 floculo c, focolo p (foculo p^o). retinet p. Explicit
casius felix c. in p continuo sequuntur antidotarii cuiusdam
antiqui unguenta (c. 84. 85) acopa etc. cum aliis deinceps anti-
dotariis recentioribus.

Index I graecolatinus

(glossarum scil. graecarum ab ipso Cassio latine expositarum).

ἀγχόνη: cuius laquei suspensio Graeci anconas vocant, unde ... synancica passio nominatur. 37.

ἄδιψον: *med.* ad repulsandam sitim quod adipson vocant 61 (τοῖς ἐγκασιμένοις ἀπόζειν αὐτὸ καὶ διὰ τοῦτο ἄδιψον ὀνομάζει Asclepiades sec. Gal. XIII, 145). hunc locum male respicit Simon. s. dipsa g. sitis. Item Cassius Felix cap. de cansone dipseon sitiens.

ἀεὶζων: herbae sempervivens quam aizon vocant cp 56 (herba sempervivum ... sempervivens Ap., sed ap. Plin. 18, 159 et Marc. p. 217 aizoum ... latine sedum).

αἶμα: cum sanguinis supernae ductionis (ductionis, educationis ut et Sim.) reiactione quam Graeci ematos anagogen vocant g 39. ex antecedenti sanguinis reiactione quam Graeci ematos anagogen (—ges gp) dicunt g 40 (cf. ischemon 30. 39, poliemos 6. 30 etc.). contra in Plin. Aug. non emat, —emon sed „Graecis enhae-

mon“ 12, 77 ut „quod ideo vocatur horaeon“ 11, 36.

αἱμαγωγόν: pessarium menstrualem sanguinem provocans quod Graeci emagogon dicunt 80.

αἱμοπτεικός: emoptoicos Latini sanguinem spuantes appellant 39 (emoptoicos sic semper codd. med. lat. veteres, unde male idem habent Graeci recentes. cf. Simon Jan. s. v.).

αἱμορραγία: matricis emorragian (emorogia c, ut Simon s. v. et codd. Plin. l. XXII. XXIII. emorragia p) latino sermone sanguinis fluxum vel profluvium dicimus 82.

ἀκίστον: simplici purgatorio et sine aliqua malignitate, quod Graeci caciscaton (c, cacisticon p) vocant 76.

ἄκρον: manuum ac pedum acra id est summitates 30. acra oris spatia 35.

ἀκρασία: intemperantia [complexionis add. Simon] corporis quam Graeci acrasian vocant 6.

ἀκριβής: tertianus (tipus) ma-

nifestus a Graecis acribes appellatur 57. 58.

ἀκροχορδών (*verrucarum sp. cf. Paul., Gal. def. 400*): dicuntur acrocordones (—dines *cp, ut Simon*) quae sunt fundatae et immobiles vel callosae sine dolore *g 6. cf. Cels. 5, 28, 14 quem corrigi Daremberg ad p. 216, 37. sed convenit cum vulgato Celsi textu etiam vetus Oribasii versio (cod. Paris) saec. VI (Rose Anecd. II, 117. Molimier praef. ad Orib. t. VI p. 25) ex Celso ab auctore aucta VI, 184 Dar. (— ad verrucas quas Greci acrocordonas ...).*

ἄλειμμα: alimma (alimma *c, alma p, aligma p^o*) lexiperiton id est perunctio ad febres *cp 61.*

ἄλθατα: ibisci (evisci *p*) radicem quam alteam vocant (*cp 81 (= Diosc., Ap.)*).

ἄλφός: maculas albas Graeci alphas (*c, alfos p et Simon*) leucas vocaverunt *cp 8.*

maculas nigras Graeci alfos melanas (*c, alfos melenas p*) vocant *cp 9 (vitiligo Cels. 5, 28, 19).*

ἄλωπεξία: alopecia . . . si (*post desertionem capillorum*) . . . tenues canosos et veluti flavos capillos ostendant, sicut animalis vulpeculae quam Graeci alopeca (—can *g*) vocant 5 (*= Isid. 4, 7, 1*).

ἀμβλυωπία: ad ambliopiam id est obtusionem visus *g 29 (videndi debilitas Demo. ap. Sim. s. v.)*.

ἄμμος: ameos id est seminis in *c 44 (id est etc. om.*

p), ameos seminis id est uili-
ciomis (*c, iucilidiōis p*) *cp 48.*
citat Simons. „Uilitionis semen
i. ameos Cassius Felix cap. de
morbis epatis et de disinteria“.
ami gen. ap. Plin. 20, 264
(ἄμμος *Gal., ἄμμιος Diosc.*):
cf. ἄμμου Rom. in Diosc.
recensione alphabetica (Vind.).

ἄμμοχώρα: arenae ferventis
adobrutione quam ammo-
cosian vocant *cp 76 (cf. not.).*

ἀμυχή: scarificationis com-
petentes laceraturas dabis
quas Graeci amichas vocant
g 18. scarificationis levissimas
laceraturas dabis quas Graeci
amichas vocant gc 24. minutas
vel densas scarificationis la-
ceraturas dabis quas Graeci
amichas (sic gcp) vocant 5.
uteris et scarificatione ex levi-
bus laceraturis quas Graeci
amichas vocant cp 54. cf. Sim.
s. amichas grece scarificationes
Cassius Felix ca. de igne sacro
(i. e. c. 24) — idem s. „amictica
virtus grece laccessitoria irri-
tatoria. Cassius Felix de oleo
aurino (leg. ciprino — i. e.
Cassii appendix Paris. f. 85^a
Ciprini confectio . . . quae fini-
tur f. 85^b in haec verba habet
enim virtutem termanticam
et amicticam id est calidam
— leg. calefactoriam — et
laccessitoriam). Item . . . De-
mostenes colliria laccessentia
que Greci amictica vocant“.

ἀμφημερινός: tipus coti-
dianus graeco vocabulo am-
femerinos (amfim — *Sim.*) sive
cathemerinos appellatur 59.

ἀναγνώγη: — vid. αἶμα.

ἀναδρομή: matricis adscensum sive supernum recursum quem Graeci anadromen dicunt 77 (*Cael. Aur. chr.* 4, 109 cum ascensu matricis quem Graeci anadromeu vocant).

ἀναπνευστικόν: ex respiratorio interaneorum membro quod Graeci anapneusticon morion vocant *g* 39.

ἀναστόμωσις: osculationem quam Graeci anastomosin (—masin *gcp*, ut et *Simon*) vocant, siquidem perforatione facta veluti ex orificio sanguinem emittant (venae) 39 (= *Cael. Aur. chr.* 2, 121 osculationis quam Gr. anastomosin vocant). eodem vocabulo lat. utebantur vet. Galeni interpretes, unde etiam nunc legitur apud Kühn. VII, 232 etc.

ἀνατομή: ut renes patientis sursum erigantur, quod Graeci anatropen dicunt 82.

ἀνετικός: in prima anetica die id est dimissoria 57. die anetica 58.

ἀνθερεών: gutturis partem sub mento quam Graeci antereona vocant *g* 33. sub mentum gutturis partes quas Gr. ante(the)preona vocant *g* 34. 37. sub mento in gutturis parte . . . quam antereona vocant *g* 35 (*Cael. Aur. chr.* 2, 102 gutturis summitati quam Graeci anthereona vocant. *id.* 2, 116. *cf. ox.* 3, 20. 23. 27).

ἀνθηρά: confectio anthera a Graecis appellata *g* 35 (quae omnibus nota est *Th. Pr. p.* 16^o *Arg. cf. Cels.* 6, 11). si

et ant(h *cp*)era(n) cum melle inlinies *g* 36.

ἀνθράξ, ἀνθράκιον: carbunculi quos Graeci antraches vocant *g* 22 (in medio . . . nigri ut carbonēs *ib.* — rustici pustellas malas appellant, *Orib. interpr. lat. saec. VI in. VI*, 143 *Dar.*). — et appellatur a Graecis antrachion singulari genere nominatum *ib.*

ἀντιάς: ad digerendos tumores et praefocationes antiadum 35 (*Sim. s. antias*. Paulus „est“ inquit „tumor durus paristmion“. *cf. Cels.* 7, 12, 2 tonsillas autem quae post inflammationes induruerunt, *ἀντιάδες* autem a Graecis appellantur).

ἀντίσπασις: flebotomiam in brachio adhibere quod fuerit patienti parti contrarium, quod antispasin vocant 54 (*Gal. XI*, 91. — *cf. infra s. catixin*).

ἀνώδυνον: ad stomachi dolorem mitigandum medicamentum appellatum a Graecis anodininon 42. enema colicon anodininon id est dolorem detrahens 51 (quod habet virtutem tollendi . . . dolorem 66 *vid. s. ὑπνοποιόν*). trociscus iniectorius anodinus colicis conveniens *ib.* *cf. Celsus* 5, 25, 1 *ἀνώδυνα* vocant quae somno dolorem levant. *Cael. chr.* 4, 79 nos indoloria dicere poterimus (!).

ἀνωτερικός: trociscus anotericus id est qui sursum in potione datus servando superiores ventris et intestino-

rum partes medetur 48. *cf. κατατεμνός* (... medicaminibus potis quae Graeci anoterica vocaverunt *Cael. Aur. chr.* 4, 64 *opp.* quae clystere iniciuntur *ib.*).

ἀπλήθαιρεσις: simplici correctione (correptione *p.*, *corr.* conectione?) divisuram (*Cael. Aur.*) dabis, nam Graeci aplen dieresin vocant. 18.

ἀπόξεμα: urinas simplici apozimate provocabis ex decoctione apii et aneti *p* 57 (*Sim. s.* apozima decoctio diversarum medicinarum...).

ἀποκρουστικόν: collyrium apocrusticum Hermolaon staticon appellatum (*Aetius* 7, 102) faciens... ad reūmata repellenda et desiccanda *g* 29. *cf. Simon s.* apocrusticum grece repercussivum redarguens ut *Dia(scorides)* et *Cassius Felix* ca. de oleo mirtino (*i. e. Cassii appendix Paris. f.* 85^b, *ubi sic*: Mirtam viridem et minutam coques in aqua et oleo donec aqua insumatur, non tamen ninis ne oleum ardeat, et redactum usui reservabis. habet autem virtutem apocrusticam id est redargentem).

ἀποπληξία: apoplexia est dicta passio ab eo quod mortifero ictu corporis simul et animae concidant patientes... nam dicitur apoplexia et paraplexia, sed apoplexia... totius corporis esse intellegitur... paraplexia vero in una parte corporis efficitur 65.

ἀπόστημα: collectiones Graeci apostemata (eruptiones *gloss.*

interl. g^o) vocant 18 (*sic gcp, at Simon s.* apostasis vel apostaseos grece apostema. *Cassius Felix*: collectiones greci apostaseos vocant) = *Isid.* 4, 7, 19. *ἀποσμήματα* = abscessus *Cels.* 2, 1 (collectiones occultae = *ἐμπνήματα c.* 21. *cf. Cael. Aur. chr.* 5, 91).

ἄρθριχοι: artritici (*rec. cp* artetici, *cf. Sim. s.* arthritica grece artetica) *def.* 52 (*diff.* podagrici = *Cael. Aur. chr.* 5, 27). articularis passio *Cael.* (*cf. Plin.*).

ἀρχευθίς: iuniperi bacarum quas Graeci arciotidas (*c.* orotidas *p*) vocant *cp* 49. (*cf. Diosc.* 1, 103).

ἀρτόμελι etc.: artomeli (*rec. c* —melli) cataplasma 44 (panis cum melle factus *Simon*). *Alex. lat.* 2, 129 (*cit. Sim.*). *cf. Gal.* (X, 796 τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν λατῶν ἀρτόμελι. *ib.* 910 etc.), *Oribas. etc.*

ἄρτοπάγον: cataplasma ex lenticula et pane adiecto modico melle confectum, quod artofagon vocant 32. lenticula... trita cum modico melle et pane infuso cataplasma, quod Graeci artofagion (*gp*, artopagion *c*) appellant 22.

ἀσθματικός: astmatici (*rec. asmatici gcp. cf. Sim. s.* asma *cit. Paul. et s.* asthma) dicuntur latino sermone anhelosi vel suspiriosi. 41 (*cf. anhelatio Cels.* 4, 8. *Cael. ox.* 2, 102).

ἀσцитης: (altera *hydropicae passionis distantia*) a ventribus ascites nominatur id

est utriculosa 76 (quemadmodum in utro quodam *Paul. ap. Sim.*, sequitur sonitus... tamquam semipleni utris *Cael. chr.* 3, 105).

ἀτονία: si vero atonia fuerit vesicae id est debilitas 46 (*cf.* 42 *etc.*). *cf.* *Cael. chr.* 2, 123 defectione vel debilitate corporum quam Graeci ἀτονίαν vocant. *Alex. ap. Sim. s. v.*
ἀτροφία: cessante corporis nutrimento quam Graeci atrofian vocant 42 (*Cael. chr.* 5, 3 *etc.* — *Isid.* 4, 7, 27).

αὐλλίκεος: auliscus (*sine gl.*) oticus, ossens, aeneus *etc.* saepe vertitur tibia 48 *cf.* *Cael. ox.* 3, 29 clysteris auliascon quem nos tibia dicere poterimus.
αὐτοφύη: utendum etiam aquis calidis naturali calore plantatis, nam Graeci autofie idata vocant 46.

ἄφθα: et appellatur a Graecis consuete aptha, quam nos oris coctionem dicimus 36. sin vero aptha fuerit in ore id est oris coctio *ib.* (*ubi apthes vel corr. asthes quater gcp.*) *cf.* *Oribas. vet. lat.* VI, 585 sunt etiam oris vitia quas Graeci aptas appellant. fiunt ergo ulcera in oris summmitate (*cuius textum alterum cit. Sim.*). ulcera oris *Cels.* 1, 2, 6; 11.

ἀφορισμός: secundum aphorismos (*Hipp.*) id est definitionis eloquentiam 29.

ἀχώρ: tineas capitis Graeci achoras (*sic gcp.*) vocaverunt 2. *cf.* *Sim. s. acora* (*Alex. lat.* 1, 19 achora passio est in ipsa cute capitis facta

parva foramina habens, ex quibus fluit humor quem ycora greci vocant, unde et ipsa passio acora appellatur, quam nos tabem dicimus. *cf.*

Paul. ap. Sim., *ubi acor*).
βалаύστιον: balaustii id est floris mali granati 48. *Sim. s. v. post cit. Diosc. addit haec*: Cassius Fe. cap. (48) de dissinteria — item in antidotario in confectione saponis (*quod si verum est habuit Antidotarium hoc a Simone saepissime excerptum, cuius hic quoque mentio inserta est, Cassii etiam fragmenta excerpta*) — dicit quod est flos amoniaci (*nimirum in cod. Simonis ut in nostris cp haec ita corrupta legebantur ypoquistidis suci, balaustii i. floris a(r)moniaci, omnium specierum etc.*).

ἡ βάρβαρος: illa quae a Graecis ebarbaros appellatur 39. illud medicamentum quod Graece ebarbaros appellatur 46. illud (emplastrum) quod a Graecis barbaros appellatur 75. *cf. c. 45 extr.* exira medicamentum interius scriptum (*sc. ἡ ξηρά*).

βήξ: longi temporis tussiculas quas Graeci chronias bæccas (*sic g.* cronias becas *p.*) vocant 33. — humida... tussis quam Graeci igrobecca (*g.*) vocant *ib.* *cf. Sim. s. driobetade* (*sic! cf. drobecade c. ydropica p.*) — tussis arida a Graecis xerobeches (*g.*) appellatur 34 (*cf. Sim. s. bechas et s. xerobiche*).

βηχικά: catapotia singulari-

(catapotias singulares *g*, corr. tussicularia) quae Graeci bechica vocant 33. catapotia bechica id est tussicularia 66 (item in *app. cod. Paris. f. 87^b* cataputiae bechice i. tussicularie).

βοθρίον: botria ulcera id est fossulas 29. ad ulcera universa et botrion dolores *ib.* cf. *Demosth. ap. Sim.* s. ulcus... botrion est quod rotunditate fuerit concavum in acemate fossarum unde nomen accepit (*Gal. XIV, 774*).

γαλακτώδες: (anagargarisma) non nimis calidum... sed... tantum ut secundum tactum teporem habeat lactis quod Graeci galactodes vocant 35. cf. *Cael. chr. 4^p 58. 63* (leviter) gelatum... sive tepens quod Gr. *γαλ.* vocant (*Aurel. c. 14*).

γαργαρεῖν: si grossa vel vastior (uva)... gargareon appellatur 35.

γῆς ἔντερα: ges entera id est vermiculos de arrugia 28 et 30 (cuniculis... cavantur montes... arrugias id genus vocant *scil.* Hispani. *Plin.* 33, 70. 77. cf. *corrugas 74*. arrugia = arvirugia, ackerfurche?).

γρόπωνσις: cum obuncatione unguium quam Graeci griposim (*gp*) vocant 40 (cf. *Cael. ox. 2, 168* unguium uncatio quam γρόπωνσιν vocant. *id. chr. 2, 198* obuncatis unguibus quod Graeci γρόπωνσιν vocant).

γυμνάσιον: (uteris) gymnasio vel exercitio *c* (gymnasiis id est exercitiis *p*) 54.

δακτυλική: alia quae appellatur a Graecis dactilice id est podicalis, si quidem podicis vitia emendat 74 (δακτύλιος = anus, annus, anulus = ring, after).

δαύκος: dauci cretici semen id est pastinacae hortensis 76 = 44 (quem male intelligit *Sim. s. v.* daucus creticus est semen banciae [*Matth. S. s.* bancia ortensis i. pastinaca domestica etc. cf. *Simon. s.* bancia pastinacha] ortensis = *Matth. Silv. s. v.* cf. *Oribas. lat. (VI, 463)* daucus qui et staflinus (*Diosc. p. 401 et 419 Spr.*) quod Latini pastinaca vocant.

δηλητήριον: letali cibo sive potione accepta quam Graeci deleterion dicunt 51.

διά: „de“ quibus rebus medicamenta facta sunt haec nominantur:

διὰ τῆς ἀλόης: Galeni cactartico dia tes aloes appellato 1.

δι' ἀλῶν: emplastrum (dialon *gc*, dialoen *p*) 21. (dialoon *gc*, dialeon *p*) 26. „Cassius Felix in antidotario“ *Sim. s. v.*

διὰ τοῦ ἀψινθίου: cataplasma quod appellant diatu absinthii (*g*, diatu absinthii *c*, diatū absinthii *p*) 42.

δι' ἐχιδνῶν: antidotum quod appellatur diec(id)non (*c*, diacrudon *p*) teriace 55 (*Gal. XI, 40*).

δι' ἡλέκτρον: troscus (dielectrum *gp*, dieleti *c* 33. — dialectrum *g*, dialectos *p* 39 — diaelectum *p*, diaeletirum *c* 48) id est ex sucino 39.

διὰ θάψιας: diatapsias (*p*, diapta psia *c*) sicut in isciadiciis uteris 75 (*cf.* 53 tapsias succo ipsas illines partes).

διὰ ἰτεῶν: emplastrum (diatheon *g*, dia hitheon *cp* 19 — diachiteon *c*, dialitcon *p* 31 — diaitheon *g*, thahitheon *c*, diatiteceon *p* 33 — diaitheon *g*, diatheon *c*, diachiteon *p* 38 — diaciteon *c*, diaiteon *p* 46). 75. — „in antidotario... Cassii Felicis“ *Sim. s. v.* (itea grece salix).

διὰ τῶν καρύων: diacrisma stomaticon... et appellatur ediaton carion (*gp*, ediato | netron *c*) 35 (*Gal.* XII, 905).

διὰ κέρατος ἐλαφίου: collirium dia ceratos helafiu (*g*, ellafui *c*, elephiñ *p*) appellatum id est de cornu cervino 29.

διὰ κοράλιον trociscus (diacoralium *c*, diacoralium *p* *Sim.*) 48 (ad emoptoicos Cassius Felix in antidotario *Simon s. v.*, sed non memoratur in *c.* 39).

διὰ κοχλίων: emplastrum... quod appellant dia coclion (dia codion *p*) id est ex cocleis *cp* 31.

διὰ κωδύων (dia codion *gp*) 33. d. electuarium 66. *cf.* *s. κωδύαι*.

διὰ λευκόλου: collirium dialenco | hui (*g*, dialeuco hui *c*, dialento hui *p*) appellatum id est de viola 29 (*cf. Sim. s. hyu.*).

διὰ λιβάνου: collirium dialibanum *g* 29.

διὰ μελλιλώτον epithima (diamellilotum *g*, diamellilotum

p, —to *c*) 34. (diamelliloton *g*, diamelli loto *cp*) 42.

δι' ὀρόβου: potio diorobum (*g*, diárobo *c*, diorubū *p*) appellata id est de ervo 40. aliud diorobum electuarium *ib.*

δι' ὀστρέων: sicco medicamento diostreon (—tren *c*) appellato *cp* 32 (Dia ostreon de cocleis ostreorum Cassius Felix in antidotario... *Sim. s. v.*).

διὰ τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων: trociscus dia ton picron amigdalon appellatus 44. electuarium... dia ton picron amigdalon a Graecis appellatum id est ex amaris amigdalalis 66.

διὰ πιτύρου: diapitiron anagargarismate id est ex cantabro *g* 35. illud quod diapitiron vocant id est ex cantabro *g* 37.

διὰ πρασίου: medicamentum quod appellant diaprassium id est ex marrubio *g* 40. *cf.* 41. 66 (diaprassium *c*, —sii *p* 66). *marr. etiam Plin. Ap., Diosc. alph.*

διὰ ραφανίδων: vomitu ex radicibus uteris quod Graeci diarafanidon vocant 1.

διὰ ῥόδων: collirium diarodon de septuaginta duabus quod Graeci diebdomaecontadio appellant 29 (*Gal.* XII, 767).

διὰ συμψύχου: epithima diasamsucum appellatum *gp* 41. (diasansuco) *cp* 42. (diasansucum *c*, —co *p*) 43. 44. 51. 71. 74.

διὰ τοῦ σιλφίου: electuarium diatusilfū (*gp*, —um *c*) a Graecis appellatum 41.

διά σπερμάτων: epithima diaspermaton 34. 43. 44. 51. 55. 59. 71. 75 — epithima diaspermaton Filagrii 42.

διά συμφύτου: trociscus diasimphitum (*g*, diasinfitus *c*, diasimphitus *p*) 39. (diasinfitus) *cp* 48.

διά σφόνγων: aliud quod appellatur a Graecis diasfongon . . . id est ex spongia confectum *cp* 30. *cf.* 39.

διά τεσσάρων: aliud diatessarum appellatum id est de quattuor *c(p)* 28. medicamentum diatesaron (—tesserum *p*) id est de quattuor speciebus confectum *p(c)* 66.

διά τριῶν πεπερέων: diatrion pipereon antidotum inferius scriptum *g* 42. *cf.* 56.

διά ὕσώπου: anagargaris-matis confectione dia ysopū (*g*, dia isopum *c*, dia ysopi *p*) appellata 1.

διά φοινίκων: epithima . . . dia finicon (*cf. infra* *ἰδ.* palmarum nicolaorum) appellatum 48.

διά φνσάλλιδων: diafisallidon trociscum *g* 21. trociscus diafisallidon (*c*, diafisalliden *p*) appellatus 45 (*cf. s. φνσάλλης*). trociscus ex vesicaria herba confectus quem Graeci diafisallidon vocant *c* 46.

διά χαλκίτεως: finiceneae (fenicene *c*) Galeni quam diacalcitheos dicit *g* 39. fenicene quam Galienus . . . nostram diacalciteos nominavit 46 (*Gal. XIII*, 375).

διά χάριτον medicamentum (diacartum *g*) 19. 22 (—tu *g*). 32. 35.

διά τῶν χελιδόνων: diacisma . . . quod appellant diaton cae(ce *cp*)lidonon id est ex hirundinibus *g* 37.

διά χυλῶν: cerotarum ex dia chilon (diaquilon *g* 38) confectum 17. 38. 53. 66. (diaquilon et diachilon medicamenti *g* 38, *c* 78).

διαβήτης: et appellatur a Graecis diabetes (—ten *cp*) si quidem mox potione accepta per urinales vias . . . descendat tamquam per inania feratur 46.

διάθεισις: inveterata passio quam (*sic*) greci chronias diathesis vocant 1. et appellatur a Graecis reumatice diathesis (*cf. Gal. XI*, 79) id est reumatica passio 23.

διαίτα: dietam eius ordinabis id est vitae regulam 55 (regulas ciborum *Cael.*).

διάκλυσμα: collutio quam Graeci diaclyisma (dialisma *c*, diaclima *p*) vocant 32.

διαλείπων (πυρετός): febricula . . . intercapedinata quam Graeci dialiponta vocant 40.

διάρροια: diarria (defluxio *tit.*) 46.

διαφορητικός: sanatio . . . eiectoria quam Graeci diaforeticam (diaforesin *c*, diaforata *p*) vocant 52. (diaforeticum medicamentum 17. 42. adiutorium 21. emplastrum 18.)

διάχρισμα: diacrisma (diacrissime *g*, diacrisme *c*, —ma *p*) stomaticon (—ce *gcp cf. διάχριστος Gal.*) id est inlinimentum ori conveniens 35. diacrisma (—clisma *g*, —disma

c, —clima *p*) hoc est inlinimentum 37.
δικέφαλος: alia (uvae distantia) dicephalos (diaccephales *g*) appellata vel (id est *cp*) bicapita 35.
διουρητικός: diureticas potionibus dabis id est quae per urinam purgare noverunt 21. (44). cataplasma diureticum id est urinale 44. (antidotum diureticum 75.)
δυσανούλωτα: ulcera difficile in cicatricem venientia quae disapulota (desapiolota *g*, disapolita *cp*) vocant 29 (*cf. Sim. s. s. disulota*).
δύσκολα: ad omnia carcinomata . . . et ad alia discola id est difficilia 79.
δυσκρασία: sub difficili temperantia corporis quam Graeci discrasian vocant 75.
δυσουρία: disuria id est urinariae difficultas 46.
δυσουροῦντες: minctus difficultate laborantibus quos disuruntas vocant 45.
δυσπεψία: faciens ad duritiam et ad debilitatem et oppressionem stomachi quam Graeci dyspsin (*g*, pussim *p*, ptisin *p*^o) vocant 42.
δύσπνοια: dispnia (dipsnia *gc*, disnia *p* *cf. Sim. s. disnia*) a Graecis dicitur id est difficultas respirationis 41 (*cf. ib. dispnoici*).
ἐγκάθισμα: in sessionis fomentationes, nam Graeci encatisma vocant 46. decoctio in encatismate id est in balneo supra sellam sedenti . . . adhibita 81 (*cf. Sim. s. v.*). *Cael. chr.* 5, 69 et sessionem

ex vino vehementiori confectam quam *ἐγκάθισμα* vocant.
ἐγκανσῖς: si ex encauseos fuerit dolor id est ex ustione aeris 1. si ex encauseos caput doluerit laborantis id est ex adustione 61. ex . . . adustione quod ex encauseos (quam encauseos *cp*) dicunt 62. 64. (*item App. cod. Par. f. 85^b* ex adustione quam Graeci encauseos dicunt).
ἐγκολπισμός: *Sim. s.* „encolpismus gr. Cassius Fe. ca. (78) . . . injectio in matricem“ — *vid. κόλπος*.
ἐγχυμα: ad dentis dolores enchima (endima *c*, enclima *p*) id est infusio in nares 32.
ἐδρα: in sessu quem Graeci edran vocant, diversa podicis vitia efficiuntur 74. *cf. Cael. chr.* 4, 45 (*item* 86) sessioni quam Graeci *ἐδραν* vocant.
ἐδρικόν: cataplasma edricon appones quod Latini sessorium vocant 74. aliud med. edricon *ib.*
ἐκδόριον: medicamento descoriatorio (descor— *gc*, decor— *p*, excor— *Sim. s.* exdorian) quod Graeci ecdorion (exdorion *c*) vocant 13.
εἰλεός: = verticula intestinum 51 (*Cael. p.* 235. 236).
ἐκτροπή: podicis inversiones quas Graeci ectropas (hectropas *c*, encropas *p*) vocant 75.
ἐκτυλωτικός: medicamento ectilotico (et cilotico *g*, ectilotico *c*) id est excallatorio infra scripto 20 — confectio collirii siringiaci ectilotici (ectilogici *g*) *ib.*

ἐλατήριον: flegmagogum purgatorium quod dicitur elaterium 8.

ἐλελιόσφακος: elilisfai semen id est herbae salviae 76.

ἐλμυνθες: lumbrici quos Graeci elmintas dicunt 72.

ἐμβροχισμός: embrocismo curentur id est olei infusione foveantur 42 (cf. embroca embrocare *passim ap. Cass.* „embroca gr. infusio quam nos fomentum dicimus“ *Sim.*).

ἐμπύημα: empiemata dicuntur collectiones sive apostemata occulta 21. interna collectione quam empiema dicunt 40 (cf. 44).

ἐμπυον(η?)τικός: empy(i)oticis (*sic gcp Sim.*) adiutoriis uti oportet id est quae saniolam nutrire valeant 21.

ἐμφραξίς: ad obtrusiones (aurium) quas Graeci enfraxis (anfrosis c, ἔφρασι p) vocant 28 (ad enfrasim epatis c 44, ubi ἔφρασι, ἔφραx. p). anfraxis *Alex. lat.* (enfraxim i. opilationem 1, 92. anfraxis i. constipatio 2, 154).

κατὰ ἐν: cocci gnidii . . . grana . . . in uvas passas singulas . . . indues (*al. includes*) et dabis . . . cata en(a) id est singulatum (singulatum cata una cp) comedendas 76.

ἐνema: enema id est injectio 51 (enema colicon anodinon *ib.*). cf. *Sim.* enema proprie vocatur decoctio que per clisterem mittitur.

ἐνερήq: decoques . . . et supposito clunibus cervicali incis per enetera id est tibiham iniectionem 48. cf. 78

(per enetera osseum vesica aptata infundes). *item* per auliscum fissarium 19.

ἐν κατακάλυψει: apostemata . . . absconsa et in altioribus viscerum partibus nata (in occultis nata *Cael. chr.* 6, 91), nam Graeci encatalypsin (*g* cf. *Sim.*, encalypsin c) vocant 21.

ἐντόποις: quae inflatio (ventris) cum digitis fuerit impressa concavitate formam ostendit, quod Graeci entiposin (—sis cp) vocant 76.

ἐξ υποβολῆς: crassius sub palpebro inungues (collyrium tracomaticum) sive sub ciliis quod Graeci exhipoboles (*g*, exipobolos cp) vocant 29.

ἐπαφαίρεσις: flebotomare oportet et secundam detractionem facere quam epaferesin (—faresin *gcp Sim.*) vocant 24. secundam detractionem facias quam epaferesin (*sic g*) vocant 36. cum secunda sanguinis detractione quam epaferesin vocant 73.

ἐπίθεμα: epithima (*sic semper gcp*) dicunt Graeci medicamentum quod stomacho et praecordii simul et ventri superponatur, cum fuerit panno inunctum 76 (cf. *Simon. s.* epythyma graece superpositio emplastrum molle vel aquosum *Cass. Fe. etc.*).

ἐπίθεσις: superpositionis tempore quam Graeci epithesin vocant 51. *sic (solemni apud Latinos omnes huius rei interpretatione quae Graecis etiam pro epitasi est ἐπίθεσις, ut Sor. p. 267 D. opp. διάλειμμα)*

etiam Caelius (ox. 1, 45. 2, 88 etc. nam chr. 4, 22 male *edidit* quam *ἐπίτασις* vocant). *Simon* s. „epithesis superpositio Demosthenes etc.“

Pseudo-Sor. resp. 194 (*Rose Anecd.* II, 267) Quid est epithesis? superpositio. superpositio accessio aegritudinis est vel motus vitiorum et agitatio causarum earundem...

ἐπισημασία: et postquam pepsin fecerit aegritudo (febris) id est post IIII periodos sive accessiones, quas Graeci episemasias vocant 58. *item* 55.

ἐπουλωντικός: extrinsecus medicamentum epuloticon (—lenticum *gp*, —lenticum *c*) appones id est quod valeat in cicatricem ducere 40. *cf. Simon.* s. epulentum (*qui pro Cassio quem vult citat Theod. Prisc. cap. de ptisi*). trociscus epuloticus 46 (*cf.* 45).

ἔρπειν, ἔρπης: araneas Graeci a serpendo quod herpen (*g*, —pin *c*) herpetas (herpenas *g*) dicunt, nos vero similiter latino sermone sicut supra diximus a serpendo serpusculos (serpiginem *Sim.* s. herpetas, *cf. Isid.* 4, 8, 5 serpedo) nominamus 25. facit et ad herpetas (herbenas *g*) hoc est serpusculos 24.

ἐρυσίπελας: ignis sacer ab invadendo a Graecis erisipilas (*gcp* „sed Grecus erisipelas dicit“ *Sim.*) appellatur, siquidem vicina sibi loca invadendo possidet 24 (*unde Isidor.* 4, 8, 4).

ἐρυσίπελατώδης: tumor...

cum rubore igni sacro simulante quod Graeci herisipelatodes (*g*) vocant 86. sin vero herisipelatodes fuerint carbunculi id est cum rubore ut in vicina parte sibi veluti ignis sacer ostendatur 22. *cf. Alex. ap. Sim. s. v.*

ἐσχάρα: cum escara (scara *cp*) quam nos crustam dicimus 67. quam diu se escara levet id est crusta 68. scara *lat. etiam g* 22 (membrum... inuritur et ulceratum scaram facit) etc. *cf. Simon* s. escara (... Cass. Fe. scara i crustula). *Cael. chr.* 5, 16—18.

ἑτεροκρανία: dispari temporum dolori, nam Graeci etherocraniam (*gc*) vocant 1. *cf.* dolores heterocranii *Marc. p.* 38, heterocraniam *p.* 39. *Cael. chr.* 1, 4 vel certe temporum (dolor) quem dolorem crotaphon (*sic ed.*) appellant. *sic et (ἑτεροφθαλμία)*, etheroftalmia Demo. est alterius oculi ab altero differens color“.

εὐχνυμός: est namque bonus humor lac quod Graeci euximon (*gp*, eupinon *c*) vocant 29 (*Sim.* eukimos Cas. Fe. bonus humor).

ἐφελκίς: iterum resolvuntur (ulcera) et in orificio aliquando certidiones (corticiones, —zones? *cf. adnot.*) ostendunt, quos Graeci efelcidas vocant 20.

ἐφηλίδς: maculas nigras in vultu feminis ex abortione praecedenti factas vel adustione solis quas Graeci ephelidas (*g*, efelidas *c*, effilidas *p*) vocant 9. ad solis

ustiones quas efelidas (affili-
das *c.* efellidas *p.*) dicunt 73.

ἡλιωσις: solatione vero uteris
quam eliosin dicunt 54. *cf.*
Cael. chr. 4, 18 *etc.*

ἡμικράνιος: ad eius (*sc.* ca-
pitis) medietatis (dolorem)
quem (quam *codd.*) emi-
g(c)ranion vocant 1. aut
ipsius membranae partis
(passio) quam consue-
te emi-
g(c)ranion dicunt *ib.* ad emi-
g(c)ranion vero *etc.* *ib.* ex
antecedenti dolore totius ca-
pitis aut emigranei (*sic g.*
—nii *cp.*) 29. *cf. Ps. Plin.*
med. 1, 1 emigrania un-
guntur.
ad emigranium *cod. Brux.*
Th. Prisc. p. 93^b *et p.* 102
ubi mox emigranium pausat
si . . . *Cael. chr.* 1, 4 dolor
vehemens capitis totius aut
dimidii quem consue-
to no-
mine hemicraniam (*sic ed.*)
vocant. *Marc. p.* 38. 39 (*ubi de*
codicis lectione non magis
constat). *Alex.* 1, 45—51
(emigraneus dolor, emigranea
passio, emigraneum). *Escolap.*
chr. c. 1: quodsi dimidium
caput doluerit, emigraneum
appellatur (*cod. Aug.*). tro-
ciscaria emigranica *ib.*

θεραπευτική: Galenus in
sua therapeutice hoc est libris
curationum 30.

θρόμβος: glebulas (globulos
Sim. s. v.) sanguinis quas
Graeci trombos (trumbos *c.* =
Sim.) appellant 30. gleboso
(*al.* globoso) sanguine quem
Graeci trombon (trumbon *c.*)
appellant 46. *cf. Cael. Aur.*
chr. 2, 12. 4, 84 gelati san-

guinis corpusculis quae **θρόμ-
βος** appellant.

θρομβούμενος: si vero ni-
gellus fuerit (sanguis) et ve-
luti glebosus, quem Graeci
tro(u)pmbumenon vocant 39.
cf. Cael. Aur. chr. 4, 40 si
gelatus obstiterit sanguis,
quod Graeci **θρόμβωσιν** vo-
cant.

θύμοι (*al.* **θύμα** *Cels. etc.*):
(verrucae) in similitudinem
summitatis tymi, unde a
Graecis tymoe (tymos *g.* thim-
os *c.*) appellantur 12 (*de*
origine nominis fere consentit
Cels. 5, 28, 14).

ικτερίκος: icterici dicuntur
morbo regio laborantes . . .
sequitur . . . pallor corporis
cum . . . crocei vel aurei
coloris fantasia, unde ab ali-
quantis latine aurugo (aurigo
c. Sim.) appellatur 49.

ικτερώδης: cum ingenti pal-
lore ictericum morbum simu-
lante, nam Graeci icteroden
vocant 32.

ιλιγγιώρες: vertiginosos
quos ilingiontas appellant 1,
ubi ilicnuntas *g.* illi guntas
c. giuntas (*sic, in novi versus*
initio altera vocabuli parte
per errorem omissa) *p.* quo
ipso scilicet codice usus videri
potest Simon Januensis (saec.
XIV in.) qui sub litt. G (!)
habet „Giuntas grece vertigo
Cass. Fe. etc.“ atque hoc
Simone recentior fuisse cor-
rectoris manus quae saec. XIV
in p. adscripserit illi. Cassius
enim „qui continet tractatus
duos de pratica“ (ut ait Simon
in praef.) significat aut exem-

plar Parisiense altero antidotario (i. e. libro II) post indicis capitula 81 sine discrimine auctum usque ad f. 90^b ubi Expleto libro referamus gratiam christo — aut ei simillimum (sunt enim quae non reperiuntur in app. Par., velut quae citat Simon s. diadiphtamum, gerontica, ibiscus, leuce diapsimitium etc., sunt etiam quae non respondeant lectionibus cod. Par., velut menticon illud Simonis (= menticon c!) pro rinenciton. cf. s. acrocoordines etc.

ἰονθοί: ionti (hionti) = (tit.) papillae quae in vultu nascuntur 7.

ἰσχαίμος: (dia sfongon) schemon id est . . . retinens sanguinem 30. anagargarisma schemon (gc, scemon *Sim. s. v.*) appellatum id est retinens sanguinem 39.

ἰσχίον: et est sciadica (—tica) causatio in vertebro quod Graeci uoxile (*sic c et Sim. s. v.*, coxile *p*) vocant 53. *cf. Sim. s.* ischion vertebrae scia (vertebrum = *ισχίον Cael.*, vertebrae v. l. vertebrae ossa = scia, *ισχία Isid. 4, 7, 29*).

ἰσχυρία: scuria (*cp Sim.*) id est ex toto urinae abstinencia 46. ad colum et iscuriam (*codd. disuriam*) id est urinae abstinencia 51.

καθημερινός — vid. *ἐμφημερινός*.

καί: ce (= et) 71 — *cf. σιτώδης*.

κακοήθης: in aegritudinibus malignis quas Graeci cachoethes

(cachoethes c, chachohetes *p*) appellant. *cp 17*.

κακόχυμος, κακοχυμία: in cacocymis (*g*, —cimis *cp*) corporibus id est malo humore possessis 26. ad humoris malignitatem quam cacoquimiam (*g*, captochimiam *p*) vocant 42.

καλαμίνθη: nepetam viridem quam calamintem (—mitem *p*) vocant *p 43. cf. Gargil. 23*.

καρκινώδης: cancerosa ulceratio . . . gingivarum quam Graeci carcinoden vocant 32.

καρκίνωμα: ad omnia carcinomata matris id est cancerosa 79.

καρφολογία: aliquando e parietibus stipulas legunt (frenetici), quod Graeci carfologian appellant 62. *cf. Cael. ox. 1, 21. 48* (carphologiam quae est festucarum levium a parietibus veluti detractio).

κατά: κατά ἐν — vid. ἐν.

κατ' ἴξιν: si una pars faucium tumuerit, ex ipsa parte quod Graeci atexin (*gp, l. catixin*) vocant, in brachio flebotomare 37.

κατὰ λόγον: secundum rationem curare quod Graeci catalogon appellant 20. 26. 27.

κατὰ σύμφυτον: scrofas . . . connaturatione infixas quod Graeci cata sinfin vocant 26.

cf. Demosthenes ap. Sim. s. v.

καθ' ὑπόρρυσιν: etiam et scema iacendi patientibus tale esse oportet ut semper (*super codd.*) orificium pendiginis iusum meatum habeat, quod

Graeci cata (h *add. cp*) yporusin (*g*) vocant 19.

κατάρροια, κατάρρους: nimia toracis constrictione ex viscosi flegmatis infusione nata quam Graeci catereon (*gc*, catareon *p* — *leg. catarian*) sive catarrum vocant 34. frequenti catarro (—*ru g*) temptatis 36. (= influxio *Cael.*).

κατωτερικός: trociscus cotericus id est qui deorsum per podicis partes iniectus servando inferiores intestinorum partes medetur 48.

καύσος: causos latino sermone febris incendiosa dicitur 61 (*cf. app. cod. Par. f. 87^b* universis viscerum incendiis convenit . . . et febribus incendiiosis a grecis causoninis appellatis).

καυστικός: causticae . . . virtutis id est incensoriae 13.

καχεξία, καχετικός: corporis mala habitudine quam Graeci cacexiam vocant 32.

item 43. 46. 73. in cacexies (*cp*) id est corporum malis habitudinibus 75. *Cael. chr.* 4, 18 *etc.* — in cacecticis corporibus id est mala habitudine affectis 3. 75.

καγχρία: aliud genus herpetis, quem Graeci cencrias (*sic*) vocant, siquidem in superficie cutis pustulas minutas milio similes ostendit. quam Latini vulgo araneam verrinam vocant. 25.

κένωσις: vacuationem aliquam facere quam cenosin vocant sive per clisterem acrem adhibitum sive per

purgatorium datum sive per flebotomiam 55. *cf. Cael. chr.* 3, 148 (vehementem humoris detractationem . . . quam Graeci κένωσιν vocant).

κεφαλαία: tardum sive inveteratum capitis dolorem quem Graeci cephaeam appellant 1. *cf. Cael. chr.* 1, 4.

κεφαλόποδες (?): vel (?) pedes quos appellant cephalopodas 40.

κιονίς: (uva) si fuerit longa et tenuis et in folliculi sui summitate plurimum humoris habuerit, cionis (cyonis *g*) appellatur 35.

κησημονή: pruriginem omnem Graeci cnesmonen (henesmonem *c*, henesionem *p* *cf. Sim. s. henesmone*) vocant 16.

κόκκος κνίδιος: cocci gnidii id est seminis turbisci 76 (*cf. id.* cocci gnidii optimi id est non vetustissimi sed novelli ex locis maritimis collecti grana *etc.*). *cf. Diosc.* 4, 170 *θαμέλαια, οἱ δὲ χαμέλαιαν . . . ἐκ ταύτης ὁ κνίδιος κόκκος καρπὸς ὧν συλλέγεται . . . πλανῶνται δὲ νομίζοντες τὸν κνίδιον κόκκον τῆς χαμελαίας* (*de qua Diosc.* 4, 169) εἶναι κάρπον ἀπατάμενοι διὰ τὸ τῶν φύλλων ὁμοειδές. recte igitur inter chamelaeam et coccum cnidium distinguere videtur *Cael. Aur.* (i. e. Soranus) *chr.* 3, 138. confunduntur tamen thymelaea et chamelaea, ut a Plinio (13, 114), ita post Dioscoridem, ut chamelaeae simpliciter dicatur granum cnidium [ita etiam Galenus, qui omittit thyme-

laeam, κνέωρον vocari dicit *chamelaeam* (XIII, 263) quae *thymelaea* est Dioscoridis . . . τὰ δὲ φύλλα ἀπὲρ ἰδίως καλεῖται κνέωρον 4, 170] et apud Pseudo-Apuleium (cap. de lathyride 111, de qua D. 4, 164 = Plin. 27, 95 cf. Gal. antemb. XIX, 734. Ap. c. 109 confundit chamaeleonem etiam et *chamelaeam* i. coccum). et a Caelio chr. 5, 11 *chamelaeae* semen quod Graeci coccum Cnidium vocant et ab Alexandri interprete lat. (saec. VII init.) II, 153 (cf. gr. IX, 2 p. 516 Bas.), ubi *camelee* . . . addit unde cocognidion colligitur. quem Alex. citat Simon Ian. s. *camelea* grece quasi infima oliva dicta (cf. *Mattheus Silvaticus* c. 129 „et est planta que vocatur olivella“ idemque s. *turbiscon* i. *olivella*. et est laxativa que est species laureole) eo quod folia habet similia foliis olive . . . et semen eius est cocognidion etc. cf. idem s. cocognidium, ubi addit qui dicunt cocognidium semen esse laureole non noverunt veritatem (nec novit corrector codicis Cassii Paris. cui videtur quod *turbiscus* sit *laureola*). *laureola* enim (ut Sim. s. v. et s. *dafnoides*) est *δαφνοειδής* Diosc. 4, 146 quod alii χαμαιδάφνην (quam distinguit Diosc. 4, 147) secundum editorem (saec. VI) graeci Dioscoridis ad litteras dispositi ad D. 4, 146 et 147 *δαφνοειδής* . . . οἱ δὲ χαμαιδάφνην — χαμαιδάφνη . . .

οἱ δὲ *δαφνίτην* (i. e. *δαφνοειδής*) . . . Παμαίσι λαυρόεοι. erat autem quod *Simonis* causa dico, *laureola* („*dafnoides* id est *laureola*“) in *vetere Diosc. translatione latina* (quam citat *Mattheus Silvaticus* s. *camelea*). ceterum de tribus his eiusdem generis (*Daphne*) speciebus vid. *Fraas flor. class. p. 224 sq. cf. Matth. Silv. c. 129.*

turbisci novum est vocabulum, cui antiquus nunc testis *Cassius* accedit is quae collegit *Simon Ianiensis*. hic enim, qui sub v. *timelea* *Dioscorides* aut *camelea*. multi istam cocognidion dixerunt quia (quod?) maxime semen *turbisci* est (sequuntur deinde verba *Diosc. de thymelaea et Plinii*), haec addit s. *camelea* . . . liber antiquus de simplici medicina „*camelea* sive *turbiscus* quasi olea terrestris“ etc. liber de doctrina greca „idem *camelea turbiscus*“ etc. atque sic revera etiam in libro q. d. de herbis *Galen* et *Apulei* et *Chironis* (*Anecd.* II, 122) c. 93 de *camelea*: *Camelea* hoc est *turbiscum*. folia habet similia oleastro et amara (etc. = D. 4, 169 de *chamelaea*) . . . semen eius siccum coccum gnidium (coccu | nidium cod.) dicitur.

cf. *Isidor. or.* 17, 7, 56 *turbiscus* quod de uno cespite eius multa virgulta surgunt quasi turba (nil ultra ille). κόλλησις, κολλητικός; colesin . . . id est glutinationem 18. *colleticam* (*collecticam*

gp, *Sim. s. v.*) virtutem id est glutinatoriam 39.

κολλώδης: glutinosum flegma quod Graeci collodes (coliode *gcp*, colliade *Sim. s. v.*) vocant 34.

κόλον (unde *κοιλῆ*): totius ipsius intestini, quod Graeci consuecte colon appellant, quod aliquanti inferiorem ventriculum dicunt 51 (*cf. Poll. 2, 209 καλεῖται κόλον καὶ κάτω κοιλία*).

κόλπος: pendigines vel sinus (ulcerum *Sim. s. colfos*) Graeci colpus (colfus, —*fos gp cf. 19 colfi ipsius g*) vocaverunt 19. encolpizabis (encolpismum) *id est* supino scemate iacentis in sinum mulieris infundes quem Graeci colpon (colfon *p*) appellant 78.

κονδύλωμα: condilomata quae nos latino sermone dicimus tubercula 74 (*cf. Cael. chr. 2, 129 tubercula quae Graeci condylomata vocant*).

κούφος: cucurbitas cufas *id est* levi cum appositione deduces 71 (*cf. Cael. ox. 1, 78. 79. chr. 1, 77 in eadem re etc.*) . . . *item* blande deduces 77.

κράσις: naturam sive temperantiam corporis quam Graeci crasin appellant 39 (*ubi citatur Galenus libris pericraseon appellatis in quibus de temperantia corporis scribit*). secundum hominis crasin *id est* naturam vel temperantiam corporis 73.

κρετικός: sunt autem dies critici (cretici *cp*) quibus per sudorem prospera determinatio

februm sive discussio fieri solet 61.

κροκιδισμός: crocidismos *id est* floccorum electio, si quidem digitis frequenter ipsi patientes (frenetici) operimenta attractare videantur 62. *cf. Cael. ox. 1, 21. 48.*

κωδύα: codias *id est* papaveris agrestis capitella 62 (*μήκωνος κωδύας*).

λαχανώδης: holerosus — *vid. σιτώδης*.

λειεντεριχοί: lienterici dicuntur qui . . . cibos . . . indigestos . . . tamquam per levem intestinorum lapsum egerunt 47 (*cf. Isid. 4, 27, 37. λειεντερία = levitas intestinorum Cels.*).

λειχήν: impetigines quas Graeci lichenas (*sic gp*, lichinas *c*) vocant, Latini vulgo zernas appellant 11.

λειχηνικός: trociscus appellatus a Graecis lichenicos (<*i.*>) medens impetigines 11.

λειχηνώδης: maculae . . . asperae veluti zernosae, quas Graeci licenodes (licedones *p cum Sim. s. v.*) vocant 9.

λεπίς: corticosas squamulas in cute ostendunt quas Graeci lepidas vocant. unde nomen a Graecis lepra accepit 15. super inducta lepidā (*sic gcp*) quam nos squamulam dicimus 20.

λήμη: egestionis sive pituitas oculorum quas Graeci lemas vocant 29. *cf. Dem. ap. Sim. s. lēnas (= Cass. cod. p) et s. lema: lemas inquit vocant Graeci grana parva sicca ac dura in oculis apparentia,*

quas gramas etiam vocant. (*Cael. az. 2*, 30 oculos lemis obsitos vel lacrimantes. *cf. Plin. 23*, 49).

λιθιῶντες: calculosis quos litiuntas (*p*, lithiuitas *pro lithuntas c*) vocant 45 (*Sim. s. lithyasis*).

λιπαρός: aluminis lipari id est liquidi 48. *item* 42 (*cit. Simon s. alumen*). *et simpliciter* alumen liparum 4. 10. 32 (rotundum *ut supra scripsit* *g*^o 4. 42).

λιποθυμία: cum ingenti animi defectu quam lipotomian (*g*, lippotomiam *Sim. s. v.*) vocant 21.

λογάδιος (λερά 73) — *vid. ad. p. 176*, 7.

λυσσόδητος: lissodecti (—denti *cp*) id est qui rabi- dos morsus incurrerunt 67.

μακρονοσία: macronosia laborantibus id est longa aegritudine 4. pessimam aegritudinem et prolixam ostendit, quam Graeci macronosian vocant 30. prolixam aegritudinem ostendit, quam macronosian dicunt 61.

μαλακτικός: pessus malacticus id est mollitorius 78.

μαλόβαθρον: folii (follis *p*) barbarici (*i. e. indici, vid. Diosc. 1*, 11) id est malobatri 45.

μανία: maniam facit, quam nos insaniam dicimus 61.

μαρσύνιον: vaporabis marsupio id est sacco torrido sale repleto 27.

μασώμενος: apoflegmatis- mum masticatorium oportet adhibere quem Graeci masu-

menon vocant *cp 32* (*cf. Sim. s. masumē*).

μετασυνκριτικός: adiutoria metasincri(e)tica id est quae renovare valeant temperiem corporis naturalem 8 (= re- corporativa *Diosc., Oribas., Alex., Demosth. apud Simon. s. v., item Cael. Aurel. chr. 1*, 112 *etc. cf. Gal. X*, 268). sunt enim (aquae calidae) virtutis metasincreticae hoc est quae valeant naturalem temperiem corporis renovare 46. *cf. 21* electuario <meta> sincretico (sincretico *codd. cum Sim. s. v.*) id est quod valeat occultam collectionem rumpere.

μετάσφενον: aliquando et a tergo dolorem inter scapulas sentiunt, quod Graeci meta- frenon dicunt 34. altera a tergo inter scapulas quod metafrenon dicunt 39 (*cf. Simon s. v. . . psalterio . . . posteriora dorsi*).

μήλιος: cum vino melino id est granaticio 47 (*sed oleum melinum 42 sec. Diosc. 1*, 55 *est κνδανίαν μήλων, ut μη- λόμελι = κνδανόμελι 5*, 29. *cf. emplastrum „melinon Vespasiani“ 21 etc.*).

μητρεγγύτης: encolpizabis (encolpismum) per corneum metrenciten appellatum 78.

μητρομανία: metromaniam latino sermone matricis furo- res sive insaniam dicimus 79.

μικροσφυξία: pulsus par- vitas, quam microsfixian vo- cant 42. 62. 64.

μογία: interiora membra cor- rumpat quae Graeci moria

vocant 21 (*cf. Sim. s. morion*). quo possint interiora corporis membra quae Graeci moria vocant . . . relevari 34. quo possint interiora membra a Graecis moria appellata relaxationis medelam percipere 37.

μυρμηκίαι: (verrucae) quae cum digito fuerint impressae dolorem faciunt similem moribus formicarum, unde graeco nomine my(i)rmeas nomen acceperunt 12.

νάρκη τῆς αἰσθήσεως: cum perfrictione et torpore sensus quod Graeci narcodes esteseos (*cp, cf. not. et Sim. s. narchoes*) vocant 29 (*leg. quem Gr. narcen tes e. v.*).

νεφρῆτικός: nefretica (*sic etiam g* 21 *cf. Sim. nefriticos grece nefreticus*) passio id est renal 45 (*cf. 21. 75. etiam ap. Cael. chr. 5, 52 renal 52 passio (νεφρῆτις = nefresis Sim. s. v., codd. Isid. or. 4, 7, 24 etc.)*).

νόθος: non manifestus (tipus) tertianus a Graecis nothus appellatur. 58.

νωτικὸς (*vulgo νωτιαῖος*) **μυελός:** et dorsalis medulla perfrixerit, quam Graeci noticon (nauticon *g*) mielon vocant 38.

ξανθή χολή: fellis flavi quod Graeci (e)xanten cholen vocant 24. flavi fellis id est rubei, quod Graeci (e)xanten colen vocant 57.

cf. (e)xanton medicamentum 20 (et „Cass. Fe. in antidotario confectione dicta

exantoxemon“ ap. Sim. s. catastalticum).

ξηρόβηξ — *vid. s. βήξ* (xerobeches).

ξηρολουσία: sicca lavatio quae a Graecis xerolusia appellatur 76.

ξηροφθαλμία: ad xeroptalmiam id est siccam lippitudinem 29 (*bis*). *cf. Cels. 6, 6 (arida lipp.)*. *cf. (o)xira medicamentum 45.*

ὀβολός: aut opopanacis obolos duos id est scrupulum unum (*g*) 38. *cf. Sim. s. obolus . . . in pratica Cassii oboli duo faciunt scrupulum I (idem ait Celsus 5, 17, 2).*

ὄγκος ὀχθώδης: extantiae riposae, quas Graeci oncos octodes (encos etodes *pc*) vocant id est riposis verticibus prominentes 73.

ὀδοντότριμμα: dentificium quod Graeci odontotrimma vocant 32.

ὄζαινα: ozaenas (ozerne *c*, zernas *p* *cf. Sim. s. ozimie, Alex. ed. Pap. 1, 131 ozime vel ozene*) quas nos fetores narium dicimus 31 (*cf. ib. quod a Graecis appellatur ozaenicon sc. medicamentum*).

οἶδημα: idema (*p*, hidema *c*), quod nos aquosam inflationem dicimus 75 (inflationem *simpl. Cael. chr. 4, 83*). *cf. Sim. s. idema . . . per oi diphthongum scribitur et s. ydema (ex Demosth.)*.

ὀινόμελι: mulsam ex vino melle temperato (—tam *cp Sim.*) quam appellant Graeci i(y *p*)nomelitos (*sic cp et Sim. s. inomel et s. mulsa*) 49.

quod appellatur a Graecis cionomelitos (*sic ep*) *describitur* c. 61.

ὄνισκος: asellos quos Graeci oniscos dicunt 28 (nos vero porcelliones vocamus *ait Simon* s. oniscūte, *cf. s. porcelliones ubi pro Cassio errans citat Dioscoridem, ex Th. Prisc. 2, 14 f. 45^b* oniscos quos porcelliones appellamus).

ὄξάλμη: in aceto salso infundes quod Graeci oxalmin (oxasmin *gc*, oxomion *p*) vocant 20. cum aceto salito infundes, quod Graeci oxalmen (oxalmē *p*, oxamel *c*) vocant 28.

(**ὄξύτης**): et sunt ictericorum distantiae duae, una cum febricula, et appellatur a Graecis oxites (oxia? *ὄξύτης*?) id est acuta, altera sine febre diuturna quae appellatur cronites (cronia? *χροινότης*) 49. *cf. c. 30* in aegritudine acuta id est celeri.

ὄξύδερχικός: xero collyrium acuens visum, quod Graeci oxidercicon vocant 29 *et ib. mox* fomentum oculis acuens visum quod Graeci oxidercicon vocant (*ubi oxidorcion bis g, oxidortium Sim.*).

ὄξύροδινον: oxyrodino id est aceto et rosaceo oleo ex lanis sucidis embrocabis 33 (*cf. 1*). embroce uteris . . . ex aceto et rosaceo, quod oxidoridinon vocant 61. 71.

ὀρθόπνοια: et ortopnia (*g*, —tonia *c*, —tomia *p*) aliter dicitur, si quidem recto scemate iacentes praefocantur aegroti 41. ortopnoicis (or-

thomnoicis *c*) id est is qui . . . recto scemate iacentes praefocantur 43.

ὀρός: oros enim sanguinis qui latine serum appellatur 46 (aqua *vel liquor lactis ap. Th. Prisc. et Cael.*).

ὀυρητικός πόρος: circa urinuales vias quas Graeci uriticus porus vocant 51 (*cf. 46. cf. Cael. chr. 5, 58 etc.*).

παιδικόν: collyrio tracomatico uteris, quod appellant pedicon id est puerile 29.

παρὰπληξία 65 — *vid. ἀποπληξία*.

παρέκχυσις: epithima . . . conveniens hydropicis ad diffusiones humoris per totum corpus, quas parecchisis (parathisis *c*, parenchisis *p*, *cf. Cael. chr. 3, 97*) dicunt 76.

πάρεσις: sin vero paresis (parresis *g*) fuerit stomachi id est paralysis 42.

παρωτίδες: nascuntur parotides (—de *c*) circa aurium partes, unde nomine graeco sic vocantur 17.

πατητοί: aut trigonum (troscum) admixtis palmulis calcatis, patetoe (pateton *codd.*) a Graecis appellantur 33. *cf. Cael. ox. 2, 108* apponentes palmulas quas patetos vocant contritas. *chr. 4, 542* palmulis quas patetos appellant, quae concisae . . . mederi valebunt. *Plin. 13, 45* tertium . . . genus (pommorum palmae) patetoe . . . calcatis similes. *Simon* s. patitos dactilos vocant Greci humidus pinguesque *etc. (cit. Gal., Alex., Demosth.)*.

περικράνιος: totius membranae quae ossa capitis desuper circumvestit superposita ossibus subposita cuti, et appellatur a Graecis perig(e)ranion (*sic*) 1. *cf. mox ib.* membranae pericranion supra dictae (τὸν περικράνιον ὀμμένα *Orib.* 44, 8 *etc.*).

περιτόναιον: cogente interclusa ventositate inter cutem et peritoneon membranam, quam vulgo mappam dicunt, quae ventrem sub cute circumvestit 51. (membranae maioris q. p. v. quae omnia interiorius tegit atque continet viscera *Cael. ox.* 3, 140.)

πέψις: postquam aegritudo pepsin fecerit id est digestionem 55 (*cf.* 57, 58).

πλεγμα: mirobalani piesmatis (*sic cp*) id est expressionis 16 (πρὸς κρησμούς *Diosc.* 4, 158).

πικρά: picra (pigra *gcp*) Galeni id est amara 42.

πιτυλίη: resinae pinalis quam pituinam (pithima *c*, pitimia *p Sim. s. v.*) dicunt 76 (abietalem *Sim. ex Diosc.*, pineam *Celsus*).

πιτυρίασις: cantabriem (capitis) Graeci pitiriasin vocant (a squamulis cantabro similibus) 6 (pit. id est furfures *Alex. lat.* 1, 15 *cf. Sim. s.* cantabrics vel cantabricium *sic*).

πλαδάρωσις: humectationem (stomachi) quam pladarosin vocant 42 (*cf. app. Par. f.* 86^a stomachum humectum habentibus quod greci plarion dicunt).

πλατυκορίασις: etnominatur talis suffusio (oculorum ex antecedenti dolore capitis) platicoriasis id est dilatatio pupulae 29.

πληθωρικός: si et pletoricum (pletoricum *gcp*) corpus habuerint aegrotantes, quod nos latino sermone abundabile (habile *gp*, decabile *c*) dicimus sive multitudine suci plenum 38. si . . . pletoricum (pletoricum *cp* et ante *corr. g cf. Sim.* pletoricos pletoricus plenus repletus *etc.*) corpus aegrotus ostenderit id est multitudine suci plenum 41. *cf. c. l.* . . . quod Graeci pleton (*gcp*) vocant („Plethon grece plenus *Cass. fe.*“).

πολύαιμος: invenibus vel plurimo sanguine naturaliter abundantibus, quos poliemos vocant 30 et similiter 6.

πολυπόδιον: radix polipodii id est filicis 72 (*in addit. cod. c*) *cf. Plin.* 26, 58 polypodii, quam nostri filiculam vocant, similis filici radix = *φιλκονία in recens. alphab. Dioscoridis ad* 4, 185 *ubi dicitur ὁμοιον τῇ πτέριδι i. e. filici Diosc. lat. ap. Sim. s. v. (Apul. herb.* 76 *Nomen herbe filicem Alii perion dicunt cod. Cassin. = Herba fe(i corr.)licem Alii pterigion dicunt cod. Vrat. cf. radiolus = fi(e)licina, similis filici Ap. 83).* „ab Y. in libro de regimine scutorum flichinum vocatur“ *add. Simon ib., cf. s. ptereos (cit. Alex. lat.* 2, 84 *ptireos — pro sereos — i. filicis sucos et Orib. lat.*

VI, 607 ptereos herbae quam Romani — *sic cod. Par. ubi nos Laud.* — felicem vocant = *Eupor.* 4, 91 *πέριδος ἡ δίζα*). *πολύτρητος*: tibiam . . . multis cavernulis perforatam quae appellatur politretos (*p*) 48. *πρασοειδής*: in similitudinem coloris foliorum viridium porri coleram (colera *g*) vomunt, quam prasoiden (prasohide *g*, *cf.* prassina colera *ex hoc cap. Sim. s. v.* et fellis prasii *Cael. ox.* 3, 194) vocant 21. *cf. διὰ πρασίου*. *προπτosis*: proptosis vero est oculorum ex nimio tumore prominens casus 29 *Sim. s.* „proptosis: Demo. est inquit prominentia precadentis oculi“, *cf. ap. Sim. s.* proptosis). — matricis prominentem casum, quem Graeci proptosis vocant 78. *πταρμικός*: ptarmico medicamento id est sternutatorio 71 (*cf. Sim.*). *πτύγμα*: ptigmatis (tigmata *c*, pimata *p*, ptimmata *p^c*) id est pannis calidis ex decoctione . . . uteris 66. ptigmate (tigmate *codd.*) fovebis id est calida aqua in qua decocta sunt *etc.* 2. *cf.* 18 ptigmate (tigma *g*, tigmatē *p*, stigma *c*). 51. 61. 62. 82. *Cael. chr.* 3, 22 pannorum vel plagellarum quae Graeci ptygmata vocant. — *cf.* duplicata linteola 20. *ραγάδες*: podicis vitia . . . ut sunt ragades id est hiatus 74. *ρευματική*: et appellatur a Graecis reumatice diathesis id est reumatica passio 23.

ρίζωνυχιαί: ad rizonichia (*sic*) id est radices unguinum 13 (*cf. Sim. s.* chrisonichia). *Sim. Jan. s.* „rhizentia (rizoncia *Matth. S.*) grece Casius Felix in antidotario. sunt radices dure quae in ulceribus apostematum iam vacuatorum remanent *etc.*“

ρίνεγχυτον: apoplegmatis- mum qui naribus infunditur, et a Graecis appellatur rinenciton 49 (*et* ferramentum quo infunditur rinenchyton *Cael. Aur.* 375. 445 = *ρίνεγχύτης*).

ρύπαρός: hic tipus (*tertiane nothe*) sordidus a Graecis rīparos appellatus 58.

ρώγμος: stridor ille interior gutturis resonat quem Graeci rogmon (ragmon *c*, regmon *p*) appellant 66. *cf. (in eadem peripleumonia) Cael. Aur. ox.* 2, 145 pectoris resonans stridor quem rogmon appellant.

σηπτικός: septicæ virtutis id est . . . putrificatoriae 13.

σιτώδες: cibis inprimis triticeis et holerosis nutries, nam Graeci sitodes (—dis *cp*) ce lacanodis (celaconodis *cp*) dicunt 71. *cf. Simon s.* sitos . . sition sitodes Demosthenes capitulo de optalmia: sic vocant greci frumentosum cibum.

σκληρώσεις: ad duritiam splenis vel saxietatem, quam <Graeci> scirrosin (scirosin *s.* sclirosin — *cf. Simon s.* scirodes — *codd.*) dicunt 43. nimia tensio vel saxietas, quam scirrosin (scirosin *s.* sirosin *codd.*) vocant 76. *cf. Cael. Aurel. chr.* 3, 49 in

iecore . . . duritia atque saxitate, quam scirrosin vocant. **σκοτωματικός**: ad tenebrosos quos scotomaticos dicunt 1. scotomaticis id est qui subito ante oculos tenebras patiuntur 71.

σταλτικός: cucurbitas stalticas id est constrictorias 33. 47 (*cf. Cael. Aur. chr.* 2, 103 cucurbitam constrictivam). stalticis id est constrictoriis 72. *cf. Sim. s. v.* . . . Cass. Fe. capitulo (33) de tussi humida: stalticas Graeci constrictivas vocant.

σταφυλή: stafyle (stafle *g*) a Graecis appellatur, quam nos uvam dicimus 35.

στέαρ: unde . . . steatomata vocantur. nam Graeci adipem stear dicunt 27.

στερεός: ciborum qualitas . . . oportet esse sicca vel solida aut corpulenta, quam Graeci sterean (sterea *codd.*) vocant 33.

στίγμα: stigmata dicuntur characteres nominati, quos militantium manus vel feminarum Maurarum vultus ostendit 13. *cf. Sim. s. v.* . . . Cass. Fe. stigmata cicatrices.

στοματική: confectio oralis, quam Graeci stomaticen vocant 36.

στρογγυλοτομία: rotundam (incisuram) quam Graeci strongylotomian vocant 18.

στροφός: ad strofum id est tortum ventris 50.

συγκοπή: aliquanti . . . hanc passionem (cardiacam) sincopen appellaverunt id est amputationem 64. *cf. Alex.*

3, 21 quedam ruine virtutis quas greci sincopas vocant (*sic etiam Guinterius retinuit in versione sua quae ad exemplar veteris latinae facta est ed. Bas. 1556 p. 697*).

συγκριτικός — *vid. μετασυγκριτικός*.

σύκωσις: ad sycosin (palpebrarum) quam nos ficitatem dicimus, siquidem similis granis fici in palpebris versatis asperitas reperiatur 29 (*cf. Demosth. ap. Sim. s. sycosis*). — sicutice (*med.*) 74.

σύμπασμα: sympasmate tali uti oportet . . . cribellata in balneo aspergenda 6 (7. 8. 76). *cf. Cael. Aur. ox.* 2, 218 (*chr.* 3, 93. 5, 39. 76) sympasmatibus utentes quae nos aspergines dixerimus.

συμπεπτικόν: simpepticon medicamentum id est condigestorium 42.

σύμπτωματα: quae a Graecis symptomata appellantur, nos vero accidentia dicimus (*c. vel dicere poterimus p*) 46. *cf. C. A. chr.* 4, 14 symptoma . . . quod nos accidens dicere poterimus. 3, 131 accidentia passionum quae Graeci symptomata vocant. *ox.* 1, 71. 2, 30 *etc.*

συναγχικός — *vid. s. ἀγχόνη*.

συνεχής: nam Graeci continuam (spirationem) vel iugem syneci (sinecim *gp*, sinecem *Sim. s. sinanchis*) appellant 37.

σύννοχος: ad ingem sive continuam febrem quam Graeci sinocon dicunt 61.

σύριγξ: fistulas Graeci sirin-

gas appellant 20. *cf.* airin-
gotomo *ib.*

σκιστόν: sciston dicunt Graeci
lac in quo lapides fluviales
incensi mittuntur sive extin-
guntur 62. *cf. ind. Anthim.*
s. petrae.

τένοντες: musculorum et
nervorum cervicis quos tenon-
tas (tetanos *gcp*) dicimus 38.
a nervis cervicis quos tenon-
tas (tonantes *c*, tetanos *p*)
dicunt 72. *cf. Cael. Aur.*
chr. 1, 89 omne caput cum
nervis maioribus quos tenon-
tas appellant (*id. chr.* 5, 32
spinae maioribus nervis quos
tenontas appellant. *cf. ox.*
2, 20 *etc. Sim. s.* tenontas:
Demosthenes nervi, inquit,
cervicis quos greci tenontas
vocant *etc.*).

τερηδών: aliud cancri dentis
genus... tumor... qui ipsam
buccam perforet, quod Graeci
teredona vocant 32 (*cf. Gal.*
XIX, 443. *Sor. qu. med.* 227
sq.).

τετράριζοι: illi maiores
(dentes) vel molares qui quat-
tuor radicibus fixi esse no-
scuntur, quos Graeci tetrari-
zus vocant 32.

τεφρωδης: ulceratio... ci-
nericio colore fuscata, quem
tefrodē vocant 36.

τιλτόν: molli (moto?) tilto
(μότω τιλτώ) vel strictorio 19.
cf. taltarum.

τονωτικόν: tonoticon... me-
dicamentum id est confor-
tatorium 42. epithimate to-
notico uteris id est confor-
tatorio 42. antidotum tono-
ticon id est proficiens adversus

debilitatem (epatis) 44. *cf.*
c. 42 species tonoticas ad-
miscebis.

τοπικά: topica adiutoria ad-
hibere quae nos localia dici-
mus 2. adiutoria localia quae
topica appellant 1. topicis
adiutoriis uteris id est locali-
bus 66. topicis medicamentis
id est localibus 31.

τραχώματα: ad tracomata
id est asperitates palpebrarum
29 (*item Paulus ap. Sim. s.*
v.) — collyrio tracomatico *ib.*
(*cf. Gal. X*, 1018).

τρίσπερμον: trispermo cata-
plasmabis id est tribus se-
minibus ex feni graeci et se-
minis lini et hordei (tritici
66) pollinibus cum aqua et
oleo et modico melle con-
coctis 59. *cf.* 34. 66. *et Paul.*
ap. Sim. s. v.

τριχοκόλλημα: tricolllima
capillis oculorum ligandis 29.

τροχίσκος: ceræ modicum
admiscebis et rotulas finges,
quas Graeci trociscos vocant
32. (trociscus trigonus 33. 39.
40.)

ὕδρελαιον: ex ydrelaeo (idro-
leo *codā.*) calido id est ex
aqua calida et oleo 54. ex
ydrelaeo id est ex aqua ca-
lida et oleo 65. (57.)

ὕδροφοβικοί: ydrofobici ef-
ficiuntur id est aquam timen-
tes 67.

ὕπεζωκός: hypozocotos (hi-
pediocotā *cp*) id est laterum
membranae 66. *cf. Cael. Aur.*
chr. 2, 127. 5, 95.

ὕπερχριστον: collyrium
superinunctorium quod Graeci

hyperenchriston (yperechriston *g*) vocant 29.

υπερφά: per palatum purgabis quod Graeci dia tes yperoas dicunt 1.

υπόθετον: collyrium suppositorium (*ad disenteriam*) quod Graeci ypotheton (ipoteton *c*) vocant 48. *cf. in eadem re Alex. 2, 97 „ipoteca i. suppositorium“.*

υποκαπνιστός: suffumatorius (*sic g*, trociscus quem Graeci ypoapniston vocant 21. *item 33 (cf. Plin. med. Rom. 1, 61). 41. 77.*

υπόσφαγμα: ad hiposfaumata (*sic g*, hipostumata *Sim.*, *cf. c*) id est ad suffusionem sanguinis (ex antecedenti percussu in oculis factam) 29. *cf. Sim. s. hypostumata et s. ypoфраγμα (sic!).*

υπόπια (= υποφθαλμία *Gal. XII, 804*): ad ipopia (*sic g*) id est livores palpebrarum 29. *cf. Demo. ap. Sim. s. ipopios . . . alibi . . . vocat livorem sub oculo vel ipsis palpebris. diff. υπόπνος:* hypopyos (hipopios *g*) oculos sanat 29 (*cf. Demo. ap. Sim. ib. ypopios ophthalmos appellatur cum ipso oculo inerit sanies purulenta etc. et addit Simon:* „si sic est per. y. psilon melius scribitur“).

φακός: ad lentiginēs, quas facus appellant 73.

φαρμακεία: „catharticum datum, quod farmacian (?) appellant, solvit . . . (*ex Hipp. aph. III, 753 Lips., ubi φαρμακοποσίη*) 29. (*cf. phar-*

macia = medicaminum regula *C. A.*)

φάσσα: palumbus quem Graeci fassan appellant 48.

φθειριάσις: pediculosa passio . . . quam Graeci pthiriasin (pyasin *g*, pyriasin *g*^c, pthiriasin *pc*) vocant 3.

φθόη: eveniens in pthoes (ἐν φθόῃς) hoc est in pthisicis 75 (*de pthisicis — pthisici, pthisica passio sic et g Cass. c. 40 etc. — cf. Sim. s. „ptisis . . . non scribitur apud Grecos cum pt sed cum fth ut fthisis“.*)

φιλολουτρούντες: lavacrorum amatores quos Graeci filolutruntas appellant 57.

φλεγματικός: somni flegmatici id est salivam [per os *p*] ostendentes 72.

φλεγμονή: ad tumores (aurium) quos Graeci flegmonas vocant 28. tumores quos Graeci flegmonas 74.

φοινιγμός: ut operetur usque ad ruborem cutis quem Graeci finigmon vocant 1 *extr. cf. C. A. chr. 5, 40* rubor cutis ex sinapi faciendus quem Greci φοινιγμόν appellant (5, 15. 2, 181).

φοινικίνη (finicene) Galeni 39. 40. 46. epithima dia finicon 48.

φυσάλις = herba vesicaria 45. 46 (*Plin. 21, 177. βισικάλις Diosc. Vind. 4, 72* = vesicago *Alex. 2, 188. cf. not. ad c. 45).*

χαλαστικός: pessus calasticus faciens ad solvendam (duri-
tiam matricis) 78 (*cf. 38. 51. 66).*

πεχάλασμένος: ad uvas tumentes et summissas, quas Graeci <ce>chalasmenas (thalias menas g) vocant 35.

χείλη κατερόωγοτα: labia hiantia sive crispata Graeci chile caterrogota vocant 14.

χειμὼν: ab hiemis tempore quod chimona vocant 10.

χειρόμυλο(ν): et moles manuali mola, nam Graeci chironilon vocant 40.

χῆμωνις definitur 29 (cf. Th. Prisc. et Demosth. ap. Sim.).

χίμεθλα: Latini perniones... Graeci vero chimethla (cy—i—methla gp, cimecla c) vocant 10. „sed Paulus (ap. Sim. s. chimecla) chimetra scripsit vulgo muge dicuntur.“

χλωρά ξμμοτος 19. 22.

χοιράδες: scrofas (scrofulas Sim. s. cirades) Graeci chirdas vocant 26.

χροניתης (?) — vid. s. ὀξύτης (49).

χροόνιος: inveterata passio quas Graeci chronias diathesis vocant 1. si cronias fuerit passio id est longi temporis 30. in diuturna aegritudine quam Graeci croniam vocant 72. chronias becas 33

— vid. s. βήξ.

ψύλλιον: pulicinum semen quod Graeci psillion vocant 18. cf. Demo. ap. Sim. s. v. (pulicaria Th. Pr. id. et Diosc. Vind. 4, 70 etc. de nomine Plin. 25, 140. Diosc. l. c.).

ψωρικός: medicamento scabioso quod psoricon dicitur 15. cf. 1 (psoricum quod nos scabrum dicimus Demo. ap. Sim. s. psori).

ὠτική: auricularis sive ut Graeci otice adversus dolores... aurium 28.

Index locorum

„Cassii in (suo) antidotario“

quae e suo Cassii exemplari, in quo extabat Cassii practica aucta appendice antidotarii cuiusdam, quale est in Cassio Parisiensi ex diversis libris compilatum, habet Simon Januensis (unde Cassius „tractatus duo de pratica“ in praefatione). et sane ipse Cassius subiectum antidotarium (ad exemplum aequalis sui Theodori Prisciani in li. IV Physicorum) citare videretur c. 21 (= 26 v. infra s. dialon) cf. c. 42 (55) dia trion pipereon antidotum inferius scriptum et c. 45 o(e)xira med. inferius scriptum et c. 75 quod oximel... inferius conscripsimus — nisi omissa quaedam esse a librariis in libro eius nunc parum integro pareretur. nihili ergo est Cassii illud antidotarium Simonis errore natum, ut simili plane errore Theodori Prisciani liber de simplici medicina i. e. liber quidam de simplici med. (quali

in cod. S. Gall. 762 l. III, de quo Anecd. II, 122, ex Galeni Simpl. excerptus) Theodori Prisciani libris IV in msto Simonis exemplari fortuite subiectus. de qua re corrigendus Meyer in hist. bot. II, 291.

Albutium est asfodillus. Cassius Felix . . . et est potius latinum.

Amictica virtus grece lacesitoria irritatoria. Cassius Felix de oleo aurino (i. ciprino *cf. supra ad v. ἀυρή*).

Amoliptum seu amolentum dicitur quod est sine iniquatione ut cerotum aliquod quando digitos non inquinat. Cassius Felix in operatione unguenti palme. litargirum inquit coque donec amolentum sit. exponitur ut digitos non inquinet (*cf. cod. Paris. app. f. 87^a in descriptione malagmatis dia melitos ubi tundes spumam argenti . . . et amixto oleo teres et coques in trullo eris rubri lento igne donec amolitur fiat i. tactum non coinquinet. et ib. f. 86^a de meline Vespasiani spumam argenti in oleo igni molliori donec amolitur efficiatur etc. cf. etiam Cael. Aur. ox. 2, 203*).

Apocrusticum grece repercusivum redarguens ut . . . Cassius Felix capitulo de oleo mirtino (*cf. supra s. v.*).

Arsenicum a greco arsinago, ut Cassius Felix.

Arsinagon arsenicum, ut Cassius Felix.

Balaustia . . . Cassius Felix capitulo de dissinteria (48

textus corrupti). item (!) in antidotario in confectione saponis dicit quod est flos ammoniaci (*cf. Ind. lat. s. v.*).

Catastalticum medicamen grece repressorium. Cassius Felix in antidotario confectione dicta exantoxemon (i. ξανθὸν ὀξαιμον). stalticum enim stipticum est.

Crocomagma . . . et sunt eius diversae compositiones, quarum unam Cassius in suo antidotario scribit.

Diacoralium trociscus ad emoptoicos. Cassius Felix in antidotario (*cf. supra sub δια*).

Diadiptamum (i. διὰ διπτάμνον) a diptamo emplastrum est magnum. Cassius Felix in antidotario suo.

Dialteon ab itea que est grece salix in antidotario universali et Cassii Felicis (*Cass. c. 19 etc.*) et Oribasii. *cf. Sim. s. Ytea grece salix. indiediaton emplastrum quod cum foliis salicis fit. Cassius Felix in suo antidotario, et in universali (v. supra s. δια).*

Dialon emplastrum . . . a sale dictum . . . nam alos grece sal. Cassius Felix in antidotario (*cf. Cassius c. 21 et 26 ubi citatur dialon emplastrum inferius suo loco conscriptum — cuius con-*

fectio nunc non extat in Cassii „pratica“).

Diamelitos malagma a melle quod recipit. quod grece milli dicitur. Cassius Felix (*cf. cod. Paris. append. f. 87^a* Malagma diamelitos i. ex melle paragorice et calastice virtutis solvens universas stricturae tumores... sive duritias...).

Diaostreon de cocleis ostreorum. Cassius Felix in antidotario (*cf. supra s. διά*).

Euretica (*sc. ἀραιωτική*) virtus grece id est rarefactiva. Cassius Felix de oleo camomillino in antidotario (*cf. cod. Paris. app. f. 85^b* Camomilli viridis flores rotundi ÷ I. olei spani emina I. ÷ XX. conficitur in sole suspensum sicut rosaceum — *sc. quod praecedat* — et est lixeritos febrientibus. habet virtutem areuticam quam nos disraratoriam dicimus. siquidem cutem disrarando patefacit et in sudorem relaxat. *cf. Gal. XI, 749*).

Gerontica. Cassius Felix in antidotario in trocisco musa „gerontica velut Greci dicunt que cronica nos aut senilia“.

Gifco vel gif et gifco hermii antiquum antidotum dictum a gi quod est terra et ab hermete philosopho... laudatur in multis. confectio eius invenitur in antidotario universali et apud Cassium Felicem.

Ibiscus eviscus althea idem. Cassius Felix in antidotario

capitulo de dyaquilon etc. (*cf. supra s. ἀλδαλα*).

Leuce diapipereos emplastrum ab albo pipere dicunt quod recipit. in antidotario Oribasii et Cassii Felicis et universali.

Lēuce diapsimitium emplastrum album ex cerusa. nam psimiti est cerusa apud Cassium Felicem in antidotario.

Malagma dia mellilotos. Cassius Felix in antidotario (*cf. supra s. διά*).

Mollibdi. Cassius Felix in antidotario diamolibdi id est de plumbo.

Olosidera spatula Cassius Felix, id est ferrea. nam sydiron greci ferrum.

Opode medicine id est que de succis fiunt ut opium. Cassius Felix de cautella coliriorum.

Pyopion grece saniem ducens. Cassius Felix in confectione unguenti tetrafarmaci.

Rhizentia (Rizoncia *Matth. S.*) grece. Cassius Felix in antidotario (*cf. rizonichia c. 13 de stigmatibus cit. Sim. s. chrisonichia*). sunt radices dure que in ulceribus apostematum iam vacuatorum remanent etc.

Stantē (*sic, i. e. σταντή*) Cassius Felix in antidotario. est capitellum, scilicet aqua prima saponarii, ut exponit (*cf. s. capitellum vocatur aqua saponariorum. lixivium est quo fit sapo. aqua prima gutta prima a quibusdam dicitur*).

Matheus Silvaticus in libro Pandectarum medicine (ed. non interpolatae cf. Meyer Gesch. d. Bot. IV, 173) habet haec c. 419 s. „Lapis piritis Plinius... Cassius Felix in proprio capitulo lapis piritis i. focaria a quo per allisionem calibis vel alterius rei dure ignis evolat. sed Galenus in ep. ad Glauconem“ etc. quae unde sumta sint nescio. non enim extant apud Simonem, e quo qui ipso Cassio non usus sit (id quod non recte statuit Meyer Gesch. der Botanik IV, 167) sua omnia Cassii habet Matheus, velut s. daucus, litiasis, metafrenon, metroticum (s. metrencites), molibdi, piesmatos, regius morbus, rizoncia. illa igitur de pyrite, quae ad librum quendam Simplicium pertinere videntur, testium confusione debentur, sicut quae idem Matheus habet c. 88 sub „Brafalendi — Cassius Felix cap. de petroleo. Petroleum est oleum petre. invenitur autem in locis sulfureis. fit enim cum pinguedo terre et aequae actione caloris ad igneas convertitur partes“ etc. non sunt Cassii, sed Platearii ex libro (Circa instans) de simplici medicina s. v. Petroleum.

Index II latinus.

- a:** minus a solito excludere 19.
a solito minus cibum (1, potum 33) accipiant 1. 33. —
a balneo mox lotis 45. ab aegritudinibus (= *post aegr.*) 17.
ab: ab stomacho *g* 42. ab (a *p*) splene *c* 43.
abortio 9 (frequenti aborsione *sic p* 82).
absconsus 21 (*cf. Rönsch, Italia 295*).
absinthium: *sic cp* (*g* 1), absinthium *g* (21. 42, ut *semper Escolapii codd. Aug. Gall. s. X, ubi absynthium semper Cassin. s. XI*).
abstinere: a vino aegrotum abstinebis 67. 66. si a vino non potuerit abstinere 21. — cum misanguinem abstinere 39. omfacion abstinere vomitum 42. decoctio abstinere ventrem 48. abstinere sudorem 64, profluvium matricis 82, fluxum 82. aliud ad vomitum abstinendum 42. syncope laborantibus abstinere 64. — si venter abstinerit 1. 46. 72.
abstractio *g* 36 (*ubi adtractio p, abstractio c*).
abundabilis (πληθωτικός) 38.
acacia rufa 29. nigella *ib.* (*Plin. 24, 110 etc.*).
acantha aegyptia (ἀκανθα ἀγυπτίη *Diosc. 2, 13*. spina aegyptia s. arabica *Plin. 24,*

- 107) 32 (agante *cp*, *cf.* dragantum). 82 (achanta).
- accipere**: accipies dragantum *etc.* (in medicamentorum formulis) 7 8 *etc.* — (medicamentum) accipit = recipit (R) 11 *etc.* (quod ante accusativos specierum saepe aut subinteligitur aut omittitur a librariis velut 15. 16. 44 *etc.*).
- acetum**: acoetum saepius *g* (11 *bis*. 34. 42 *bis*), ut foenum grecum, dia coepales (35) *etc. g.*
- acina** (*fem.*) 35.
- acra** (ἀκρα) oris spatia 36.
- acredo** humoris saepe (6. 16. 25. 29. 32. 34. 46. 48. 78).
- acutus** (*opp.* diuturnus): in aegritudine acuta i. celeri 30. acuta (distantia ictericorum) 49.
- ad**: ad digestionem ciborum laborantes 41. — periculosae ad incidendum (ἐπιτείνωνται ἀποτάμνεσθαι) 35. mulsam ad gargarizandum dabis 37 (*cf.* 35 *etc.*) *rec. (p)* pro gargarizandam — (dum *gc*).
- ad perfectum** sanetur (*i. e.* ad perfectam sanationem *p* vel sanitatem ut c. 15) 68.
- ad praesens** (appresens *p*): quod si ad praesens non fuerit rosaceum 1. *cf.* 17. 42 (*bis*). 46. 78. vomitum ad praesens provocabis 54 = vomitum in praesenti provocabis 65. *cf.* 67: in primis hoc est in praesenti . . circumincides.
- ad-** (*sec. g*): agnosco, appono (*et* adpono 22), admoneo (*et* ammonico 34. 37. ammonitio *g* 37), admisceo (*et* ammixtus
- ter* 36), adsevero (36), aspergo, astantibus (42) *etc.* — attestante *c* 46 (*ubi* adtestante *rec. p*, sicut adtractare *p* 62, adpones *p* 75, adposita *p* 64, adpetitio *p* 76, admisceo *p* 51, adscensum *cp* 77 *etc.*).
- adarce** (ἀδάριον vel ἀδάριον *Gal.*, Diosc. ἀδάριος): *gen.* adarces *g* 1 *etc.* (adaricis *c* 53).
- addulcare**: acredinem humoris addulcat vel obtundit 6. polenta . . cum vino nigello addulcata (obdulcata) *p* 46. — *cf.* obdulcare.
- adeps** *fem.* uno loco *c.* 10 adipem vitulinam *gp*, — num *c* (*masc. g* 27, 28, 42 ut *cp* semper 5. 14. 16. 17. 51. 78 *etc.*).
- adiuvamentum** (βοήθημα) 32.
- adiutorium** (*med.*) 48. 55. 66 *etc.*
- adobrutio** (arenae = ἀμμοχασία) 76.
- adustio** (ἐγκαυσίς, *opp.* perfrictio) 1. 34. 62. 64. ex adustione solis 9. *cf. c.* 10 corpora glaciali frigore adusta.
- aes**: in olla aerea rubri aeris 67.
- agitantes**: ad dentes agitantes (= mobiles, σισιμένους) 32 (saepius). agitatio dentium *ib.*
- albor** ovi 42 (*cf.* Cael.).
- albugines** ovorum 31 (*ut saepe* ovi album et tenue vel albumen, *et c.* 42 albore ovi tenni). *cf.* Rönsch, Italia 67.
- alica**: suco ptisanæ aut alicae 21. *cf.* Cael. chr. 5, 10 *etc.*
- aliquanti** (= aliquot): ab aliquantis latine aurugo vocatur 49. aliquanti inferiorem ver

- triculum dicunt 51 *et sic saepe* (54. 64. 65. 66. 73). — aliquantis diebus 21. 32. 55. 68. — cum aliquanto dolore 75.
- allium**: *sic et c* 51 (*ubi* allium *et ante corr.* album *p*), *gen.* alei (*ut Ed. D., et max allei*) *cp* 51. *plur.* alia conquassata *c* (*ubi* aleum *vel corr.* alleum conquassatum *p*) *ib.*, *quae antea alii capita.* — alii spicas purgatas *ib.*
- aloen** epatiten (*ter gc, nisi quod semel* — *cen c*) 42. *α. ἡπατική = ἡπατίτις Alex.* *etc.* (*ἡπατίτιονα Diosc. p. 366*, iocineris modo coacta *Plin.* 27, 16). — aloen *sic accus. fere semper scribitur.*
- alterna** mutatione 29. 37. 42.
- amygdala** (—lus): amigdalas amaras *g(cp)* 9 (*cp* 44. 45). amygdali amari *g* (amigdale amare *c*) 40 (*cp* 66).
- amylum**: amilum *semper g* (29. 39) *cp*.
- ana** (an, *nunc à = gr. ἀνά Gal. etc.*) *pro numerali distributivo codicis g(c) semper ex recentiorum more medicamentorum scripturis ut ait Alex. lat.* 1, 88 („scribam tibi ipsa grapharia“ *i. receptas* 1, 49 *ubi gr. ἐνθέσεις, al. γραφάς. cf.* 126) *infert p* (*velut an* 3 II *p* = omnium specierum uncias binas *c* 48 *etc.*).
- anagargarisma** *passim* (*cf.* gargarizare).
- anhelitus**: qui ab splene anhelitum patiuntur *cp* 43.
- anhelosi** vel suspiriosi 41.
- animal**: cani, pecori, animali, homini, ad omnia ita facies et dabis 67.
- anisum** *gcp* 42. 44 *etc.* (*sed anesum g^o 42*).
- annualla** tempora 66.
- ante**: ante diem vel biduum 36. ante duas horas lavacri 49. ante unam vel duas horas accessionis 55. — post III vel V detractationis dies 71. 73. post detractationem sanguinis factam post unum vel duos dies 71. *etc.*
- apiata** (*sc.* aqua) calida, frigida 34. 42. 43. 59 (appiata *c* 43 *dis, ut et appii semel g* 42, *c* 43).
- apoflegmatismus**, **apoflegmatizare** *saepe.*
- apprehensio** sensus (*κατάληψις αἰσθησεως*) 77.
- aquatus**: vinum aquatum 57, aquatissimum 1. 21. 60. collyrium aquatius infusum 29. posca aquata 52.
- aranea** verrina (= *κεγχρίας, morbus miliaris*) 25. araneae (= *γῆς ἔντερα, cf. Isid.* 12, 3, 4) 28.
- arenosa** qualitas 45. 46.
- argentalis** (creta) *cp* 17 *pro* argentaria (*ital.* argenteale).
- arrugia** (*i.* cuniculus, stollen *Plin.* 33, 70. 77. *cf. Isid.* 12, 3, 4): gesentera id est vermiculos de arrugia 28. 30.
- arteriae**: ex arteriis venis (*gc, venis om. p, opp.* ex minutis venis) 39.
- arteriaca** confectio *describitur* 33.
- arteriosus**: in ipsis arteriosis locis 71.
- artificium manus** (= *χειροποιία*) 18. 20.
- ascalonium** (vinum) 42 (*Alex. lat.* 1, 102 = *οἶνος ἀσκαλῶ-*

σίρκης gr. 2, 6 p. 151 *Bas.*
cf. p. 398. 524 etc.).

asfodillus: asfodillus (*ital.* asfodillo) cp 44 (asfodillos *Apul. Vratisk.*, asfodilus *Orib. lat. Aa.* — dillus *Ab.*).

assatus: pumicis assati 1. cerussae tritae et ... assatae et ... lotae 29. ges asteros tritae assatae et lotae ib. specularis assati 39. 73 (assi 32). — cerebrum assum (g, ubi assatum cp) 1. cer. assatum 46. scammoniae assatae 76 etc. — subassatum, leviter subassatas 48.

assellatio ventris 48. 50. qui frequenti deiectione assellationis surgendo fatigantur 48 *extr.* — cum nimie assellare desideraverit 51.

astella: taedae pinguis astellas (= taedas pingues c) minutatim incisae p 32. cf. *Pseudoplin. med.* 1, 13 taedae pingues in astulas conciduntur.

attestante renium dolore (*ut apud Cael., Escolap.*) 46.

aturbis: herbam putidam quam punice aturbis (*sic gc*) dicunt 20.

auditoria caverna (cf. *Cael.*) 28.
auliscus oticus 28. 46. — fisarius (?) : per auliscum fisarium sive aeneum sive osseum vesicae porcinae aptatum 19 = *Gal. (ad Gl.) XI, 125* νόστιν προσήκει λαβόντα χοιρίαν προστιθέναι τὸν ἐνθύτηγον αὐλλικόν (ἢ ἐκ χαλκοῦ πεποιημένον ἢ ἐκ κέρατος).

avellana (*sic g* 84 etc.): venenum ad se ducit 68.

baca: bacca *interdum etiam g*

(2 bis. 18), ut bacarum etiam cp 42, c 49, c 76 etc.

balulare: si quis pondus grave bainlaverit 66.

balanis iniectis (ventrem deponere) 71.

balanstill id est floris <mali granati om.> cp 48 (*quorum codd. corruptam lectionem sequitur etiam Simon s. balautia*).

balneas g (balneum, ut *alibi*, c) 38.

basis(?): cum augmento dierum creverint (carbunculi) quemadmodum intra formam suam basis (*sic gc*) 22. — basi (basal p, basin c) *pro* embasi 66.

belua: fel beluae (i. *ἐλάτης*... πρὸς ὀφθαλμὸν *Gal. XIV, 241.* cf. *XII, 739. Orib. V, 714*) 29 = *Th. Prisc. I, 10.* — cf. *Cael. ox. 3, 13* beluae pelle (i. hyaenae).

betonica cp 43. betonice spane c 45 (*ubi spane om. p.*) cf. *Plin. 25, 84* Vettones in Hispania (invenerunt) eam quae vettonica dicitur in Gallia.

bicapitus (*δικέφαλος*) 35.

blando (i. leni *add. p*) clystere gc 34. cf. 66. blande embrocabis 42 etc. *saepe*.

breviloquium: (*βραχυλογία*) *prf.* cf. c. 1, *ubi citatur* ypo-crates ... in aforismis, *supra scripsit g* in breviloquio. cf. *Rönsch, It. 216—22* (longiloquium *Iren. etc.*).

brevis: aetatibus brevissimis eveniens 32. infantibus brevissimis 36 (et novellae aetatis) 71.

- bubulum (lac)** *c* (*ubi* bubulinum *p*) 6. bubulinis (carnibus) *c* 71.
- buccam** perforet (cancris dentis genus) 32.
- bulbus**: si vero cum consensu radicum oculorum bulborum ipsorum fuerit dolor 1.
- bullire**: si aeger nimio februm aestu bullire coeperit 61.
- butyri** *g*^c (*ubi* butiri *g* *cf. ind. ad Anthimum s. v., butiri cp*) 40. butirum recentem *cp* 46.
- calabrica** (*sic cp*): post defricationem adhibitam lana munda operire (cutem) et molli ac tenui calabrica ligare 53. *cf. Plin. med. (Rom.) p. 66^a ed. Bas.* haec pariter coques et . . . linteo grosso induces et locis dolentibus seu contractis impones et calabricis ligabis bis in die per triduum. *ib. p. 67^a* fricabisque vehementer bis in die et lanis involves et calabricabis.
- calcare**: lemniscis et tiltario (*vel* tilto) locum calcabis 18. lemniscum . . . calcabis (in fistulae cavernam) 20. cantabrum non nimis calcatus 35. palmulis calcatis (calcaticis *gcp*) (*v. s. πατητοί*) 33.
- calefactoria** (sanatis) 52.
- callositas**: (*in fistulis quae sunt ulcera pendiginosa et intrinsecus callosa*) 20. corporis callositas (*in elephantiasi*) 73. ad duritiam (matricis) vel callositates 78. — adipis callosi qualitate 27.
- cancerosa** ulceratio 32 (*vid. καρκινώδης*).
- caniculari** tempore 46. 61. 68
- (tempore magis ferventi sub cane aut post canem 73).
- canosi capilli** 2. 5 (*cf. Pauker Spicileg. 1875 p. 201 sq.*).
- cantabries** (κινεβλας) 6.
- cantabrum** 1. 6. 7. 35. 38. 51. 61. 66. 71 (*cf. Cael.*). *ad c. 1 corrector Germanus in g supra scripsit chlia.*
- capillatura** capitis 1. caput contra capillaturam lines 1 (*cf. Cael. chr. 1, 35. 98* nunc pro cap. nunc contra cap. *etc. cf. Rönsch It. 40*).
- capillosus** in locis 5. 6 (*cf. Cael.*).
- capitella** papaveris 44. 62.
- carbonescere**: radices . . . frigis in oleo donec carbonescant mediocriter 53 (*cf. Cael.*).
- carduus**: cardum (*ital. cardo*) *codd.* 1 (*cf. Schuch. Vok. 2, 464*).
- carnificare** (= σαρκούν *Gal. XI, 126. 128*) 19. 20.
- carnositas** 32.
- carnosus**: vinum (nigellum et fortissimum et) carnosum 42. — carnosus tumor 29.
- carpobalsami** 45.
- carpodesmoligabis** (membrum) 24.
- cartilaginosus**: articulosis et nervosis loris vel musculosis et cartilaginosis 27.
- catafricare** (?) : oculis clausis.. totum caput catafricabis (*sic gc, cataplasma*) *p*) et adiecta aqua calida lavabis et . . . (*iterum*) fricabis et iterum lavabis 1. *leg.* confricabis?
- cataplasmare** (*cf. Th. Prisc., Cael.*) saepe (*ut* cataplasma: post cataplasmatibus dies ex-

pletos 42, *ubi* cataplasmati-
onis *c* ut *supra ibidem p^o*.

catarrus: *abl.* catarro 37.

cattus: catti (*g*, gati *c*, gatti
p^o, *ital.* gatto, gatta) ster-
coris 5.

cauliculus (= brassica): *sic*
cp (43. 52. 72. *item in ras.*
g^o 1) *ubi* coliculus *g* (1. 24.
33). coliculi = καύβαι *Ed.*
Diocl. *cf.* *Cael.* (coliculus
agrestis *chr.* 3, 143. 5, 10 *etc.*),
Plin. med.

causa (ἡ ἐργασαμένη τὸ πάθος
alicia = *morbus*): omnium
causarum dogmata *prf.* —
ad causas suprascriptas 42.
facit ad universas melancoli-
cas causas 73. — fel rubeum
ex quo causa movetur 57.

causatio (= vexatio) nervosi-
tatis 1. ulcerationis *c.* 21. in
splene vel splenis 43. in epate
44. in vertebro 53. dysuriae
46. intestinorum 48. pedum
nervorum 52. stomachi mor-
sus 72. podagrici in crure
solum causationem habent 52.
est paralis causatio ner-
vorum 54. ex quo praefoca-
tionis causatio efficitur 65.
est autem . . . pleuritis cau-
satio in una parte pulmonis
66. peripleumonia vero est
causatio in toto pulmone 66.
est namque (lyssa) causatio
in stomacho . . . ex veneno
canis concepta 67.

cauter: cauterere vulnus inures
67. cauteris acuti calidi 22.
cf. (cauteris igniti *etc.*) *Cael.*
(unde cauteriare *Quich.*).

cavernare: ut etiam ipsi
dentes cavernentur 32. *cf.*
Cael.

cavernulae 20. 48.

cedria 51. *corr.* *cp* 43 (*unde*
cedrinon *med. ib.*).

centauria: *sic g* 1 (*ut c* 1. 21.
44. 53), *sed* centaurea *g* 21.
29 (*ut c* 28. 29 *et semper p*).
cf. centaureum (*plur.* tristia
centauréa *Lucret.* 4, 125 =
grave olentia centaurea *Verg.*
georg. 4, 270. *Plin. etc.*) =
νερανύριον *Gargil.* 18, *rec.*
centauria (—rea) *ind.* *Plin.*
med. *Isid.* 17, 9, 33.

cerda (?): radices cerdae (certe
c, *cde p*, *cede p^o*) quae la-
tioris folia ostendit ruta sil-
vestris 68.

ceromaticae fricationes 55.

cerotarium rasum 48. 74.

cervicali (supposito clunibus)
48. 51. 82.

cervisa nova 72 (*app. c*).

cesisboun (χέσις βοῶν? *cf.*
Matth. Silv. s. cesim *et s.*
chesim *i.* planta similis ferule,
semen habens album simile
lenticule. — *id. s.* chesice *i.*
orobus): quod *c.* (cessis bōum
c, cesis boviū *p* *et antea*
genit. cesis boi *c*, cesis boinu
p) habet folia similia feniculo
67.

ch in graecis codicis *g* plerum-
que solo *c* scribitur (*ut t pro*
th, *p pro ph*, *r pro rh* — *cf.*
catecuminis in *acrost. Com-*
modiani instr. 2, 5), *sed* chro-
nias 1. 33, amichas 5 (*sed*
amicas 18. 24), chimona 10,
lichenas *et* lichenicos 11,
chirurgia 18. 26. 35, chira-
das 26 (chyromilon 40),
characteres 13, rizonichia 13,
chemosis 29, schemon 38,

xerobeches 34 (*sed* igrobeca 33), stomachum, —chica 41. 42 (*et male* antrachion 22, *ut rec.* achanta, cachoetes). — x (*e gr. x?*) *pro* ch: euximon 29 (*sed* cacocymis 26). — *g pro* ch: dragma *semper*, diastrignu *g* 24. *cf.* cygnos 29. **chalcanthum** (= atramentum sutorium *Plin. Cels.*): *gen.* calcanti (*i.* vitriolum *supra p^o*) *gcp* 11. (*i.* vitriola *supra g*) 13. 20.

chalcites (χαλκίτης): *semper accus.* calciten *gcp* 11. 18. 29 *bis* (*ubi* calcideos *altero loco c.* *neque ibi tantum ubi pro genitivo positus librariis debetur:* calciten orudum et tritum appones *sic masc. gcp* 18. *sed* dia calciteos 39. 46 (χαλκίτης: χαλκίτεως *vel* χαλκίτιδος *Diosc. Gal.*, calciteos *lat. Oribas. et Alex.*, chalcitidis *Plin.* 34, 119 *etc.*).

chamaeleon: *gen.* cameleontae *codd.* cameleontae (cameleonte *c*) nigrae radices id est sefra nigra (*sic g*, sefā nigra *c*, sefre nigre *p*) 9, *ubi supra scripsit g^o* id est hedera nigra idem est et camelea atque scissa (*sic*). — cameleonte (—otes *p*) nigre radicē (—ces *p*) I (II *p*, *pro i.* = id est) se fra (sefra, *p^o*) *c* 76. *cf. Diosc.* 3, 8—9. *Apul. herb.* 26 (*contra hydropicos Cael. p.* 475. *Aetius* 10, 22). *Sim. Jan. s.* Sefra in libro antiquo de simplici medicina exponitur quod est cameleonta.

chrysatticum (*Ed. Diocl.*):

cum vino crisatico *cp* 46. *cf. Alex., Simon. Jan. s. v.*
cibaria: afronitri cibaria numero (*nūo om. p*) XV 44. afronitri cibarii 3 IIII (*corr.* cibaria XIII?) 53. afronitri cibaria cupressi . . . (*sic*) 76 (*cf. Scr. hist. aug. II p.* 77, 7 *Berol.* quid inquit sine afronitris esse non possum? — olei cibarii *Ed. Diocl.*, vini cibarii *Plin.* 28, 207 *etc.*).
cibatio constrictiva 50 (*cf. Cael.*)

cicatricare (*cf. Cael.*): hoc adiutorii genus . . . cicatricat ulcera 48 (*ut* summe ducit cicatricem in omnibus locis 74, cicatricem inducere *vel* in cicatricem ducere *saepe*, ulcera in cicatricem venientia 29).

cinerescere 67 (*cf. Cael.*).
cinericio colore fuscata (ulceratio) 36.

circumincides (morsum) 67.
circumvestit (membrana) ossa capitis 1, ventrem sub cute 51.
cisternina aqua 56. 61.

coactile (quactile *gcp*): quactile tenue 42. quactili operies *it.* 42 (*cf. Dig.*).

coactiliarius (quactiliarius *gcp*) 42.

coclearium *g* (coclr *semper comp. cp*) 34. 39. 40 (*bis*). 41. 42 (cocleare unum *bis* 21, *ubi tertio loco* coclear. I. *sic g*, *pro* cocleār = coclearium). coclearii 42. cocleario 34. coclearia 21 (coclearios singulos *male gc* 40).

cognitio (morbi = διάγνωσις) 52.

collectiones (ἀποστήματα) 18.

collectio erumpit *vel* rumpit 21 (*item* ruptio *vel* eruptio collectionis 21). electuarium quod valeat collectionem rumpere 21. — interna collectio (erumpit) 40.

colligatio nervorum 54, gutturis 39.

collutio (διάλυσμα) faciens ad dentium dolores 32. in collutione oris datum *ib.* collutioni oris adhibitus 61. — lac, vinum . . . coluendum dabis 36. mulsam . . . coluendam dabis 54.

coloquintida (= colocynthis, *κολοκυνθίς*) *nom. sg., gen. colocynthidae g 1 (bis) etc.* 49. 71. *ut* ypoquistidae *g 35 (bis) etc.* 48 (*sed* ypoquistidis *gcp 33. 39*), lepidā *g 20*, melotidā *ablat. g 20. (30).* *cf.* quinotetarum *g 18*. pomfoliga 29. emorroidae *g 36*. mininga 71. ebdomadis 71. 76. ragadae 74. parotidae *c 17* (lampada *Commod. apol. 12. cf. ed. E. Ludwig prf. p. VII. Rösch, It. p. 258*). epithimā (—mate *cp*) *g 34. 42.* simpasmā *g 1.* cataplasmā (—mate *cp*) *g 18. 42. 61 (sed — mate etiam g 2. 21).* apostema grandis, levata (*n. fem.*) *g 21 (bis).* reumam (*23 tit.*) 29.

comestio: ex multa ciborum comestione 61.

comparatio (?): lac . . . cum melle potui dabis pro comparatione pruritus 6.

compatiuntur (articuli) 52 *etc.*

competens, competenter saepissime (cum competenti dolore et rubore competenti 17,

cum aqua competenti 1 *etc.* competentem sanguinem detrahes 29. 37 = sufficientem 29. 37. 41).

concadere: ultimo etiam pulsus concadit 51.

condigestorium med. (= συμπεπτικόν) 42.

conditum (*sc.* vinum): conditi tepefacti potionem unam 33.

conflixio dentium 77 (= συρρίξεις ὀδόντων *Sor. 249 D.*).

confortatorium med. 42. 43. — ad stomachum confortandum 42. stomachum confortando recreare 47 *etc.*

connaturatio (συμμεσώσις) 26.

consectio (*ubi codd. correctio gc, correptio p*) 18.

consolvere (*ut* solvere, resolvere): in uno consolves 17. 28. 29. 38.

constrictivus 50. constrictio (*opp.* relaxatio) 34 *etc. passim.*

constrictorius 33.

contrarietas: contrarietate supradictarum intelleguntur 17. — ex contrario 55. e contrario 29.

corali (*c.* coralli *p*) 32, limatura corali *ib.*

corpus: incies . . . medicaminis 3 II, cum olei corpore (—ris *p, om. c*) 3 III et s. 51 (*cf.* corporum usus aciorum *Cael. chr. 1, 59. 39.* corporosa cataplasma bibus inductura *ox. 3, 148 etc.*). corpulenta (= solida) ciborum qualitas 33.

cortex *masc. g (29 etc.), fem. rec. (c 7, cp 15).*

corticosis: ulcera corticosa 2. corticosas squamulas 15.

cortizones (certidiones) —

pro cortidiones, corticiones)
= *gr. ἐπελκίδες* (*hisp. corte-*
zones = *crustae*) 20.
cottidie *g* 20. 21 *etc.* (cotidie
cp, *item* cotidianus *cp* 59,
cotidianarius — *ut* quarta-
narius — 58).
counentur (*g*, coadunantur *p*)
29.
crassescere 8. (*et transit.*) 48.
crassificare 46.
cribellare 6. — ipsum polli-
nem tenni cribello (*sic c*,
cribellata *g*) traicies 40.
crocati confectio 35 (*κροκα-*
τόν, *ut* afratum *Anthimi* =
ἀφρατόν, *ἀφραδες*. *cf.* tro-
ciscus crocodis *Alex. lat.* 2,
97).
croci (cc) *et* cere (ce) *confun-*
duntur in codd. (*cp*).
cubaturis (66) id est euntibus
dormitum (33. 48) 33.
cucumis agrestis amarus (*σι-*
κνος ἄγριος Diosc.), *ex quo*
elaterium 8.
cucurbita medicinalis 21 (sca-
pulæ *et* labia *cucurbitae* *ib.*
21). cucurbitam supervertere
21, conglutinare (occipitio,
toraci *etc.* 1. 30. 33. 37. per
cucurbitae raptum sanguinem
detrabere 34. 41. cucurbitam
conglutinare 30. 33. 37. 47 *etc.*
cum panno fricabis (= *ἐθονίφ*)
5 (cum lana munda operis *p*,
non c 59). *cf.* colligere suco,
melle, aqua (*medicamenti*
species), *ubi* cum suco, cum
melle, cum aqua *semper fere*
p, *rarius c*, (*cf.* 39. 41. 44.
45. 46. 48. 51. 71. 72 *etc.*) *et*
similia.
cuminum (κώμινον): *sic g*
(ciminum *cp*, *ital.* comino *et*

cimino) 9. 11. 42. (49. 55).
cūfino (= cum vino) *p* (*ubi*
cumino *p*^c = cimino *c*) 73.
ēmīo (cummino) *p* = cimino
c 75. — cumini (*vel* cuminum,
ciminum) *g* (= cu— co—
cimini *c*, cimini *p*) *pro* cummi
(= κόμμεως) *sacpissime c.* 29.
cimini alexandrini agrii
(argui *codd.*) sicci 49 (κώμινον
ἀγρίων *Diosc.*, silvestre *Plin.*
20, 160). — cumini torre-
facti 42.
cummi (κώμμι): *gen.* cummi
candidi (*Plin.* 13, 67 cummis
candida *fem.*) 29. *hic corrupte*
bis cuminum *g*, *ubi* cimini *p*,
κόμμεως *Gal.* XII, 763 sqq.
Aet. 7, 102. *mox* cuminū *g*
(= ēmini *c*, cimini *p*), cimini
albi *gp* (*ubi* comini *c*), cimini
gp (cumī *c*), ciminum *g* (cu-
mini *c*, cimini *p*), cimini *et*
iterum ciminum *gp* (*ubi* cu-
mini *c*), *deinde et* cumi *g*
(cimini *cp*). — *cf.* 39 *ubi* cu-
minum *ter g* (ciminum, —*ni*
cp, *semel* cominum *c*). *Sim.*
Jan. s. Comeos invenio in
pluribus libris antiquis ut
Pauli et Cassii et aliis *pro*
gummi arabico (*cf. id. s.*
Cumi). *cf. ind. ad Gargil. s.*
gummi (gummium *Plin. Aug.*
12, 32. *dat.* cummi 12, 35.
gumminosum 12, 36. *abl.*
cummi 12, 121. cummim 13,
66. *ex* gummi (*corrupte*) *vero*
cummi 13, 67. *nom.* cummis
utilissima *ib.* cummique 13,
82).
cumprime *c* (= primo *p*) 57.
cupressus: *sic g* (cypressus *c*,
cupressus *p*) 2. cupressi *bis*
etiam p 76 (*ubi* cipressi, ca-

prissi c). — cupressi viridis
sperulas (sferulas p) 76 —
σφαυρία Diosc. 1, 102.

cylicca curatio (cycli curatio)
1. — de cyclo superius 8.
ciclico modo 76 etc. *saepius*
(cf. Cael.).

cydonia: cataplasmate ex pal-
mis et malis cydoniis (sic g,
cidoniis c, citoniis p) 42. item
cidonia c, citonia p 48 (bis),
cidonia cp 46 etc.

cyma [quasi κύμα sec. Gal.
VI, 642 (cf. Diosc. 2, 146) id
est ἀκαλὸς καυλὸς imprimis
καρπῆς i. brassicae „ipsorum
caulium delicatior teneriorque
cauliculus“ Plin. 19, 137 —
lat. cyma fem., plur. cymae:
cymae optima = ὀρενόν
Ed. Diocl. cf. Athen. II, 62 f,
— mox etiam olerum om-
nium plantarumque simile ἐκ-
βάσθημα, quod cum coma
quae est κύμη velut arborum —
„quae semper retinent comas“
Plin. 16, 84. cf. 12, 112. 13,
30 etc. — confundunt librarii
latini (tithymali comae, iunci,
cepa Plin. 26, 62. 63. 66.
133. 19, 102. 34, 133) et ipse
Plin. de androsaemi comis
27, 26. 37. cf. Diosc. 3, 163]:
coma codd. (ital. le cime. cf.
Isid. cyma dicitur quasi coma.
est enim summitas olerum vel
arborum in qua vigens virtus
naturalis est 17, 10, 4. cymas
vocatas quasi comas 17, 6, 20).
isopi comam 40. absinthii co-
mam 42. 44. 76. 80 (= ab-
sinthii viridis turiones mi-
nores 76). timi coma 63
(gr. θύμον κορύμβων Gal.).
rubi virides turiones (id est

cymae g^o) 2. cf. apiorum-
comae Gargil. 2. absinthii
comarum Alex. lat. 2, 65 f.
98^a (= gr. p. 394 Bas. ἀφ.
κύμης ut Gal. XIII, 135. 117,
νεύτατον κύμης Gal. XIII,
540). Plin. med. (Rom.) cymas
olivae 22^d, mori cymas 28^b,
cymas de sambuco 37^a, rubi
cymulas 48^c vel cymas de
rubo 48^b. 47^a. 48^a. b. 49^b.
71^c etc.

cyperus (κύπερος, κύπερος)
vel ciperus gc, quiperus p
(quiperi cp 42) 1. 35. 42 etc.
dacrydium: rec. diagridium
gcp (unde ital. diagridio etc.).
dactyli (= palmulae): dacti-
los nicolaos 42. 61 (dactulos
nicolaos Ed. Diocl. — dacti-
los p 41 ut saepe codd. rec.,
cf. diptamus 77. 80). palmu-
larum nicolaorum (cf. Plin.
13, 45) carnes 48. palmulas
exossabis id. (cf. carnes tun-
sas palmarum 42). φοινίκων
νικολάου Alex. p. 462 etc. —
nuces palmulae 1 (cf. Cael.
ox. 2, 200 palmulae nucales
quas caryotas vocant). — cf.
etiam lex. gr. s. πατητοί.

dadinus: olei dadini 79.

dare: dabis bibere (δίδου
πίνειν) 51. 67 etc.

de (pro gen. et pro ex): nucleum
de persicis 1. cortices de malo
granato 2. membrana de canna
14. ossa de locusta marina
48. radices de cesisboum 67.
capillos de capra 70. — oleum
de lucerna 5. glebula multa
de pariete 64. pullum de
primario fetu 71. sucum de
lana 20. tria grana de medio
citri tolles 81. physicu

- Vindiciani 31. 42. 69. masuca confecti de vitibus 42. cataplasma de polline hordei 68. collyrium de . . . = *διά* . . . (de ervo *etc.*) *vid. lex. gr. s. διά*. herbam de stagnis colliges 24. 52. vermiculos de arrugia 28. quactile de lana 42. de piscibus torpedines, de pomis uvae 46. carbones de gufione vitis facies 33. de simplici quartana duplicem fecerunt 55. — de altitudine (*ἡ βύθους*) levatum ad superficiem 21. — cacexia de humore venenoso facta 46. — cavernulas de porcina seta inspicias 20. fovere de oleo 42. de embrocis laneis celeriter rapi 42. de embroca lanea aegrotum perungues 61. frequenter de (cum *p*) penna tanges 61.
- declinationis tempore saepe.**
- decoquere** usque ad tertiam partem (= *ἀπορριπν*).
- decoriatae** amygdalae 9. amygdali decoriati (discoriati *p*) 66. — dis(des— *gc*, de— *p*)—coriatorium *med.* 13.
- deducere** (*ὀπάγειν*): clystere deducendus erit (venter) 1 *etc.*
- defluxio** capillorum 4. defluxio corporis (et virium consumptio) 40.
- defricationes** ceromaticae 55.
- delavare** 19.
- dens fem.** (ut *Galli* la dent) bis *p*, semel *c* 32.
- dentifricium** (*ὀδοντότριμμα*) 32.
- depositio** ventris (i. e. *stercorum exclusio*) 51. 61. ventrem deponere = deducere 72. catharticum quod *¶*
- deponat 24. — vires laborantis depositas erigere 42. *cf.* 40. 47. 64 (inflammatio erigitur 61 *etc.*).
- depurgare** (vel purgare) ventrem 6. aegrotantes 21. — humorem (= excludere) 32 (a capite 8). 9. 55. 57. 76 (depurgat aquosum humorem = excludit vel inanit *ib.* *cf.* aquoso humore exinainti 50). putredinem 32. sanguinem 30. serum 46. ulcera 21. 22. 37. 40. apostema 44. — purgamenta aurium (= *sordes*) 28. — purgatorium saepe.
- desanguinare** 46.
- descamatus** *gc* 34 (*p* 45, *item cp* 45, *c* 46 — desquamatus *p* 45, *c* 46). *cf.* squamilla (squamula, scamula).
- desertio** capillorum 5.
- desiccatoria** (*medicamenta*) 31. 43. 76. — sacculo desiccatorio 76.
- desudare**: si tarde desudaverint 61.
- determinatio** februm (*s.* discussio) 60.
- diachylon** (diaquilon) *et sim. uno verbo scripta*: cerotario ex diachilon confecto 53 *etc.*
- dibafos** purpureos diligenter consutos 42.
- diastema**: post diastema temporis modicissimi 72.
- dies** (*sing. semper fem.*: alia die, prima, secunda die, die critica 8. 20. 48. 53. 54. 55. 56. 61 *etc.*, *sed* post unum vel duos dies 29. 71 *sicut plur.*): sines die et nocte (*g*, diem et noctem *cp*) 20. hoc facies diebus tribus (20) *etc.*
- l-bus*, die (diem *p*)

inter diem 33. 56. 57. 58. 71.
pridie (*ut* prima die 54) *opp.*
alia die 53. in una die XII
48. per diem 61.

digestibilis 55.

digestio (πέψις) morbi 55.

digiti: circa medium digitum
minorem (i. e. anularem *Gal.*
XI, 296) 43. — maioris digiti
(*pedum*) 52 (= *Cael. chr.* 5,
31). — digitorum capita 40.

diligentia: ob diligentiam vero
curationis contores . . . 4. *cf.*
32. 42. 56. 65. 76. 82.

dimissio (= remissio, *ut Cael.*)
18. dimissionis tempore (*opp.*
accessionis) 71 *etc.*

dimissorius (ἀντιτικός) dies 57.

dimittere (= sinere 21 *etc.*):
solio descendere dimittes 1.
dimittes ut operetur 1. di-
mittes ut infrigidet 34. illines
vultum et dimittes tota nocte
7 (= sines medicamentum
manere tota nocte 31. 76).
humorem decurrere dimittes
31. per totam noctem siccari
dimittes 73 (*cf. Oribas.* di-
mittis stare dies tres VI, 545
etc.). — humorem dimittere
(= *rec.* deponere *p.*, *Petr.*)
29. 34. 35.

diruptiones 29. secundum
diruptionem (diruptionem *c*)
venarum *gp* 39.

discurrere: dolor (doloris
punctio, torpor *etc.*) per mem-
bra discurrit 18. 50. 52.

discussio sanguinis 30.

distantiae (= differentiae 37
διαφορά): quatuor distantias
cum suis vocabulis habere
uva ostenditur 35. tetanica
passio tres distantias habere
manifestatur 38. sunt icteri-

corum distantiae duae 49 *et*
sim. 52. 54. 65. 71. 76.

diurnis diebus (= cottidie
aliquantis diebus *ut* 21, per
triduum facies cottidie 68)
g 38. 42. *c* 67. 71 (*male* diu-
turnis diebus *gcp* 24, *ut p* 38.
67. 71 *et cp* 42. 48. 55. 59.
60 *cf.* inter horas diurnas
et nocturnas *p* 55). — diurnis
diebus per dies nūo XL. 67.
cf. Cael. passim (*apud quem*
et cotidianis diebus ox. 2,
62 *cit. Rönsch It.* 343).

diurnas passio (*opp.* acuta) 49.

divisura (*Cael.*) 18.

diversa podicis vitia (= *varia*)
74.

dogma: omnium causarum
dogmata latino sermone con-
scriberem *praef.*

doliolum vitreum 76.

dorsalis medulla 38.

drachma (= drg *vel* dr *brev.*):
dragma *semper codd.* (*etiam g,*
nisi quod dracmas 11 *ut* cygnos
29, emigranion 1. 29 *etc.*).
trociscos dragmales *cp* 71 (*bis*).
cf. trociscos dragmeos *Alex.*
2, 145. 154 *etc.*

dracontea (herba): *sic gc* (*Orib.*
etc.), dragontea *p* (= δρακοντία
Diosc.) 9 *etc.*

dragantum (τραγύκαρα): *sic*
etiam g semper (29 *ter et* 33),
ut cp 7. 29. 33. 46. 48. 66
etc. (*nisi quod* tracanti *c*
29 *uno loco et* 43. 46. 66).
cf. traccantum *Escolap.* (*San-*
gall., ubi traccantum *Cassin.*),
dragagantum *Alex.*, traga-
ganta (*sub T*) *Orib.* VI, 513.

dropax describitur 1.

dulcor (γλεῦκος) 29. *cf.* dul-

coratum acetum *Med. Plin.*
(*Rom.*) 1, 2 etc.

durities *gcp* 18 (*ter*) et *nom.*
plur. 27 (duritias 26. duritiam
ter 43, *ubi bis* duritiem *p*^o).
dysenteria: dissinteria *cp* 48
(*cf.* dissuria).

e = *lat.* *ae* (*g*) *plerumque* et *g.*
= *gr.* *ai*: esteseos, dieresim,
poliemos, ematos, pthoes
(*φθόαις*), cacexies (*καχεξίαις*)
75, *ce* (*καί*) 71 etc. (*contra*
lat. *ae* = *gr.* *ε* in caephalea
41, caephalopodas 40, dia
coephalas 35, caelidonon 37).

educatio (*g*, eductio *cp*): tussi-
cula cum sanguinis supernae
educationis reiactione 39.
trociscus ad sanguinis supernae
educationis reiactionem *ib*.

electoria (= diaforetica) sa-
natio 52.

elaterium (elacterium *p*) *descr.*
8 (*cf.* *Plin.* 20, 3).

electuarium *g* 21. 34. 40. 41
(*item* *c* 21. 40 *sed* elactuarium
c 41. 34 et *elaç* 66, *elact* *p*
34. 40. 41. 66 *sed* elictarium
p 21), electarium *Orib.* etc.
elixatus 22. 39. 61 etc.

ellebori (*gen.*) *semper* et *g* (*cp*).

embroca: embrocas laneas 42.
abl. embroca 61 *vel* embroce
cp 46. 61. 71.

embrocare 1 etc. *saepe*.

embrocismus 42 etc. *passim*.

emmotos clora 19. 22 (*ἐμμο-
τον* *χλωρόν* *sc.* *φάρμακον*
Gal.) *confunditur* moton
(*μωτόν*) in quo *ἐμμοτον* (me-
dicamentum melli admixtum
e moto tilto apponere 19.
22 *ubi* emmotto *codd.*) *cf.*
Gal. XIII, 520 (*τοῦτο τὸ*

φάρμακον . . . *ἀνιμμένον δι'
ἐλάτου καὶ ἐμμοτον ἐπιτιθέ-
μενον*) etc. *cf.* *Orib.* VI, 158
mutariis id est carpias de-
foris inponi oportet (= *gr.*
V, 363 *τοῖς μωτοῖς*). *id.* 173
cum mutariis (*Aa* = inmotis
Ab = *τοῖς ἐμμοτοῖς* V, 378).
mutaria (*vel* motaria) munda
VI, 385 etc. *Cael. chr.* 3, 134
motarium aqua infusum.

encolpismos 78.

encolpizare 78.

eneter — *vid. lex. gr.*

epar, epatis, epate *saepe* (ieco-
ris 71).

epatica passio 44.

equidem: quod equidem (*g*,
quidem *cp*) 37.

eremizato folle 51.

erogare (humores per ventrem)
1.

ervum: herbum, herbi *gcp*
(*unde* et herbe *g* 21) 21. 36.
40 (*bis*). 41. 43. 48. 49. 76
(*bis*). erbi *semel* *g* 40 (*tertio*
loco). diorobu i. de erbo *c*
40 (*brevius* her *c* 21. 40. 48
etc.). *cf.* *Ed. Diocl.* hervi,
herbilliae.

eschara (= *lat.* crusta 67. 68
ex quibus locis sic *semper*
vides escharam, *at non* cum
codicibus scaram *legendum*
esse apud Cassium): scara *g*
(22, et scara, cum scara 32.
36) *cum* *cp* (achara *p*^o 22. 67,
ascaras *p* 32, ut *Escolapii*
cod. Cassin. cum ascaras =
cum scaras *Aug., Gall.*).

etiam et (1. 2. 6. 7 etc.) *sae-
pissime. ut* nec non etiam 6,
ita et nec non etiam et 18.
29. 71. etiam simul et 23.

non solum — verum etiam et 41. 48.

ex pro solo abl. = cum vel in saepissime (ut Plin. etc.) vel = per (instrum.): ex aceto infusus 1 (lana ex posca infusa 30). ex aceto coctam 15. ex sapone fricabis 2. ex decoctione lavabis 6 (detergere 10). infrigidanda facies ex aqua 30. pulverem ex ovi albore conspersum 16. ex ipsa favilla cum aceto cataplas-mabis 67 (ex palmulis... cataplas-mabis 33, cataplas-mabis pane ex posca i. pane posca infuso 1). ex aceto oblinies 1. uteris ex aceto 28. ex oleo ro. stillabis 28. ex aceto et oleo embrocabis 65 (ex lanis sucidis embrocabis 33). mollibus lanis ex oleo calido membra involves 54 (lanarum mundarum ex oleo camaemelino involutio-nem 65). penicillis calidis ex vino vaporabis 29 (i. e. peni-cillis ex vino calido expressis, ut 29. 30. 34. 37 etc.). — ex siringotomo fistulam nudare 20. ex melotide ferrea radendo purgare 20. per os depurgari ex melotide 30. — (pro gen.) dabis ex ipso suco calicem unum 34 (21. 40 etc.).

exaltatio (loci patientis) 21.

excludere (sudorem) 56, (hu-morem) 76, (urinam) 46 etc. exclusio longaonis 48.

exinaniti (per urinam aquoso humore) 76. inaniet per vesicam aquosum humorem *ib.*

exire: ne molle exeat (em-plastrum) = evadat 53.

exinde (gall. en) pro gen. ma-

teriae cf. sub ex, semper: exinde dabis (coclearium I et sim.) 21. 34. 36. 39 (bis). 40 (bis). 42. 45 (bis). 67. 80. exinde datur 41. exinde tro-ciscos finges 33. exinde va-porabis 42. facies 41. 66. vultum lavabis 73. — exinde = deinde *semel* 61.

exossabilis (palmulas) 48.

explicare (urinam = egerere, emittere, excludere) 46.

exprimere (ex vel add. vel om.): spongia frigida posca expressa 24. 29. spongiis ex aqua calida expressis 21. 28. penicillis calida aqua ex-pressis 34. 37 (posca 30). penic. ex cal. aqua expresso 29 (cf. 47. 71 etc.).

extantia: cum se extantia ostenderit 18. cf. 7. 17. ex-tantia et dolor (splenis) 43. ext. viscerum 44. subalbida et laxa extantia (οἰσθημα) 75. tumoris extantiam 75. toracis extantia (διόγκωσις Sor.) 77.

exsucare (Cael.): paulatim exucando (g) transvorent 34.

esucatio (arteriacam... paula-tim sub ipsa esucatione trans-vorandam) 33.

esudatio (essudatio g) venarum 39.

exsurrectio (exurectio c) 72.

facilis: et sunt... curatione (—nes p) faciles gc 26. et sunt curationis difficilis gc (curatione difficiles p) *ib.*

faenum graecum (faenum Ed. Diocl.): feni greci g 21, feni greci g 29 bis, sed plerumque foenum (ut acoetum q. cf.) grecum, foeni greci g 34. 37 40: 42 ter. *semel* fenigree

- g* 29 et fœni[ñ]grecum *g* 34, *sicut* fenugrecum et fœnu(fœn)
*p*greci *cp* *semper* (U. cc. et 43 bis. 44 bis. 46 bis. 55).
- falangio** (phalangium *Plin.*, *falangius codd. Ps. Plin. med.* 3, 33 etc.): ad falangionis morsum 68. *cf. med. Plin. (Rom.)*.
- fantasia** crocei caloris 49.
fantasiae oculis efficiuntur 71.
- fasciare saepe.**
- fasciolare** 67.
- fascis** gallicus (νάφθος κελτικὴ *Diosc.* 1, 7) 42. 45. 49.
- fecia** (*ex gr. φέκη pro faecula*): fecias (id est feces vini vel aceti *g*) 1. *cf.* fecum vini exustarum *c* 16. feces vini *gc* 29. (vinum vetus faecatatum 76).
- fel** rufum 46 = rubeum 56.
57. flavi fellis id est rubei
57. flavum 24. 58. — felle nigro 48.
- fellitus**: vomitus 41. humor 57. vomitu humoris felliti 51.
egestio fellita 48. urina 49.
- ficitas** (σύνκωσις) 29.
- ficus**: *gen.* fici (*ubi* ficus *c*) 34.
acc. pl. ficus *g* (*pro gen.* fici *p*, ficus *c* *cf. Th. Pr.* 3, 6) 21. ficorum (*ubi* piarum *codd.*) 33.
- fili**: polipodie i. felici *add.* *c* 72 (radix fili² *ib.*) = *Diosc.* 4, 185 (*Gal. XIV*, 514) *cf.* 183. — filix (*codd.* filix) *Vitr.* *p.* 163, 10.
- flum**: *sic neutr.* (fit autem hoc etc.) 36.
- fit**: et fit vel nascitur (pleuritidis in masculis magis quam in feminis 66. fit vel nascitur omni tempore (epilepsia) 71.
- fiunt vel generantur lumbrici . . ex multo cibo accepto 72. et fit vel generatur (idema) ex flegmatis substantia 75.
- fixum** pectori (mentum) 38.
- flaccor**: cum morsu et flaccore stomachi 42.
- flacidus**: papyrus fragile vel flacidum (*sic gc*) *opp.* carnosum 20.
- flebotomare saepe.**
- flebotomum** (*instr.*) 8. 20. 37. 41.
- flocorum** electio (προσυνδισμός) 62. — opium floculo inclusum 62. acacia . . . contrita et in floculo (fleculo *c*, focolo *p*) apposita 82.
- fluminales** *p* (*ubi* fluviales *c*) 67.
- foc**: *pro igne nusquam.* *cf.* 66: ceteris lento igne resolutis et a foco depositis. — ab igne tollere 15. 34 (= levare de foco *Plin. med. Rom.* 24^b. 28^c. 63^b. 74^c etc.)
- folium** (= φύλλον, *scil.* μαλαβάθρον *Diosc.* 1, 11): folii 29 (= φύλλον *ap. Gal.* XII, 734). 32. folii optimi 36. 78. folii barbarici id est malobatri 45. aut nardum (*cf. Diosc.* l. c.) aut folium appones 77.
- folliculus** aerarii 51 (*Cael. ox.* 3, 154 folliculo artis aerariae. *cf. Soran. p.* 258. 124 *D. ἐνδλίβαν πνεῦμα διὰ χαλκευτικῆς φύσεως*).
- fomentare saepe.**
- fomentatio** 1. *cf.* fotus.
- forpex** (= ψαλῖς *Gal.* XI, 130): forpice *g* (forfice *cp*) 19.
- fortitudo** fellis 49.
- fotus**: capitis fotui adhibita 62 (fotus olei dulcis *Cael. chr.* 4, 94).

frenesis, frenetici 62. **frenetica passio** 30.
frenetizare 62.
frequentare: plus verno frequentare (epilepsiam) manifestum est 71.
fysarius — *vid.* auliscus.
gargarizare saepe.
gelela (gelda *Sim. Jan. cf. Matth. Silv.* s. gelona i. coloquintida. gelela idem quod supra. *Lex. arab. lat. cod. Lugd. Scal.* 231 saec. IX s. galla cucurbita agrestis et veementer amara): coloquintidis interioris carnis (*ερεσις*) quam vulgus geldam (c. gelelam p, gellam p^o) vocat 73. *cf. in antidotario (post Cassium addito) codicis Paris. f. 81^b* 1: Experimentum cataputiae catartice aloydarie. B aloes epatice. diagridii. gelela (*sic p^o = gella*) interiores carnes trium paria pondera. cauliculi suco ex foliis expresso colligis et cataputias in modum herbi formatas (*sic*). *facit cum cod. Paris. etiam Matheus Silvaticus* c. 283 s. „Gelona i. coloquintida. Gelela idem quod supra“. *sed idem infra* c. 294 „Gilea i. coloquintida“. *atque in Herbario cod. Gall.* 762 (*cf. Anecd.* II, 122) *sic legitur* c. XC De coloquintis agria. Coloquintis agria id est cucurbita silvatica hoc est galalai interius quod est a semine separatam. iscripulo uno cum mulsa tritum potui datum ventrem purgat colera et flegma. — *cf. hisp.* jalea, gelea.

gesastera nom. 29, **gesastere** (g, —ra cp, —rea p^o) 39 (*ubi supra* unormo g^o). *gen.* **gestasteros** (*γῆς ἀστέρως*) *gcp* (—tereos p^o) 39. **gestasteros c** (—tereos p) 43 *bis*. 73 (**gestastere sic p**).
gillo: et ipsum oleum liquidum mittes in gillone 42. ipsum gillonem in olla ferventi calidae summittes 42 (gillonem fictilem quem baucalem nuncupant *Cassian. cf. Quicherat Add. lex. lat.* s. gillo et s. baucalis, *Loewe Prodrum. corp. gloss. lat. p. 69*).
girba (*ῥίπος, mortarium vel ut Sim. Jan.* pila pistatoria): in girba contusus (= *ῥίπος* *Orib. et Ps. Gal.*) 31. in girba (girva c) mittis et in unitatem . . . tundendo coctis 38. mittis in girbam et in uno diligenter contusus 72. in girba i. mortario (*glossam del. p^o, om. c*) mittes 75 (*cf.* 35 in mortarium marmoreum refundes).
glandulosus 18. 26. 60.
glebosus sanguis 39. 46.
glebula multa de pariete 64.
glebula sanguinis 30.
glicirritia (—ricia, glyquiricia) g 33. 34 (gliciriza c, liquiricia *semper p*). *cf. Simon* s. glicoriza.
glutinatorius 39.
glutinosus 34 (*bis*).
granata (= malum granatum, *ital.* granata, melagrana, melagranata): granatae siccae corium 20. 64. 82. corticis de granata sicca (g, granati sicci c) 36. corticis granatae cp 48. granatae siccae corticis

cp 64 (*sed* mali granati corticis cp 48). caducum granatae cp 48 *et bis* 82 (*sed* caducum mali granati *altero loco* c 48 *ubi* mali grana p, *item ibidem tertio ubi* granate p). granatas acidas cp 72 (*sed* mala cydonia granata etc. 46). — balaustii i. floris <mali granati> 48. — cf. *Isid.* 17, 7, 6. *Diez Altr. Gl.* 56.

granaticium (vinum) 47. 64. graves capitis (austri = *καρφαρινοί Hipp.*) 1.

guflo (γούφος?): carbones etiam de gusione cp) vitis facies 33. *quod ita exprimit in eorundem troiscorum usus descriptione Plin. (Rom.) med.* 1, 61 f. 32^b Bas. facies carbones de vite valida.

h (*sec. g.*): spiritus asper *omittitur in graecis non graece scriptis, nisi quod ponitur hic illic in v. a praep. ὑπὸ compositis*: hypocapniston 41 (*sed* ypocapniston 21. 33, *ut* catapyrrusin 19, ipopia 20, ypoquistidae 31. 35 etc. cf. yperchriston 29, diathes yperoas 1), hipopios — pia 29, ex hipoboles 29, hiposfaumata 29, hypoquistidae 39 cf. hipediacota 66, praeterea herpen 25, herpetas 24. 25. *ponitur et falso ut* helafiu 29, herisipelatodes 22. 36, hicteroden 32 *atque in med. v. leucohiu* 29 *ut lat. cohumentur* 29, trahicis 40. — *ab in. emicranion* 1. eterocrania 1. apfen 18. igrobeca 33. ematos 39. eliosin 54. elmintas 71. edran 74. e (*artic. = ἦ*) 35. 39. 46 etc. (*sed* herpen 25 *propter*

herpetas). — *med. voc. dialon* 21. diebdomeonta 29. dieresin 18. poliemos 30. catapyrrusin 19.

haberi: si aegrotantes . . . leviores habeant cp 55 (*sed* si immobiliter se habeat aegrotus p 45, om. c). quartanarios oportet mediocriter et mite haberi *ib.*

habitus: habitudine corporis fortioribus (*opp.* debilibus) 71. cf. s. *καχεξία*. plena habitudo corporis 1 (= *πλεονεξία Gal. XII, 505*).

hemieranos: emigranios dolor 1. emigranei (g) *opp.* totius capitis 29. — *vid. s. ἡμιεράνιος, — ov.*

herpyllum (*sic et Cael.*): erpillum (*ἑρπύλλον*) g(cp), serpillum („a serpendo“ *Plin.* 20, 245) g^{pc} 1. herpillo g (p, om. c.) 33. *sed* serpillum cp 62 *et ib. mox* serpillon, *ubi* heripilion (*id est* erpillon) c. cf. *ind. ad Plin. med.* s. serpullum.

hiberno (*it. inverno, verno*) 33 *et (ubi hieme cp)* g 39 = hiemis tempore 34. 76. (cf. 42).

hic (*vel ille*) *pro is*: maxime in his qui ex plenitudine capitis laborant g 1 (*ubi mox* ab eis quae similiter implere caput noscuntur). eisdem g 35 (*ubi in hisdem p, om. c, sicut* his qui *pro is* = iis qui p 43, cp 48 *bis.* 66. cf. 46 de his c, *ubi ea al. p et tit. rec. p* 56 De hiis qui etc. eis cp 55. 71. ea quae 82. hii qui c 63 *ubi* his qui p. hiisdem c 75 *ubi* hisdem p, *sicut* cp 76). *ita sexcenties etiam* hae

quae in *Vitruvii codd. rec.* pro eae quae (*GH*) etc. nec minus reliqui omnes auctores Latini recentiorum usu corrupti etiam nunc leguntur. cf. *Spengel Emend. Varron. Spec. I Mon.* 1830 p. 10. nom. sg. his qui curabitur (pro is qui) *gc* 31. item is qui *g* (his qui *cp*) 36. illis quibus 71. illi qui 72 etc. v. s. ille. hoc est scribitur (1. 17. 21. 29. 37. 67. 82 etc.) sed ubi compendio utuntur codices, semper ponitur *i*. = id est (etiam *g* 21. 23. 29. 30. 34. nisi quod *id* = id est — ut tamen in rasura sit *d* — legitur *g* ubi hoc est *cp*). cf. *Diez Altröm. gloss. p.* 59: „*id* (*i. e.*) hoc“. post haec (pro postea) saepissime (8. 16. 24. 29. 34. 36. 40. 43. 48. 54. 59. 61. 62. 63. 66). item dehinc (pro deinde ut apud *Caelium*) 29. 32. 34 (ubi deinde *cp*). 35. 37. 38. 39. 42. 44. 61 etc.

holera *g* (olera *cp*) 1. 33. olera *gcp* 21. — olerosis (cibis) *cp* 71.

hora: sub hora 19 = ad horam 20 bis. 42.

hortinus (= hortensis, domesticus *opp.* silvestris, agrestis): violae hortinae (ortinae *g*, ortice *cp*) 29. feniculi hortini (ortini *gp*, *om.* *c*) 29. pastinacae hortensis 44. 76. cucumeris hortini (= domestici *Alex.* 2 188) 45. rutae hortinae 49 (ubi ortice *cp*) 67. 71 (bis). 76 (silvestris 67). herbam papaveris hortini 62 (agrestis 62).

humor: sic semper etiam *g*.

attamen sine *h* apud hunc etiam scribendum esse videtur indicare corrupta lectio *cp* 7 et tumorem (7 tumorē ex & tumorē) pro vero et umorem iterumque et hūor *cp* pro vero et tumor *c.* 44. cf. ad *Plin. med.* p. 17, 20 (et humores, ubi et tumores *d*). 102, 14 (utiliter humores *codd.* pro tumores). — item humectare, humectatio semper.

humorosas urinas 46 (cf. *Anthim.* 62, *Cael.* etc.).

hydrelaeon (idreleon vel ydreleon *c*, ydroleum *p*) quid sit 54. 65.

hydropismus 46.

i = *gr.* *v*, ut vulgo ex rec. consuetudine, ita etiam in glossis his (vid. *lex. gr.*) *g*: ambliopia, amicas, griposim, diaton carion, diacodion, diapitiron, diasimphitum, diaquilon, dispnia (sed dyspsin pro dyspepsin *g*), ectilotico, empiemata (sed empyoticis), herisipelatodes (vel heresip.), euximon, cacoquimiam (sed cacocymis), catasinfisin, microsfixian, nauticon mielon, oxidorcion (sed oxyrodion), pitiriasin, platicoriasis, tigmate vel ptigmate, stafile, simpepticon, sinecim, ipopia, hiposfaumata (sed ypotheton, ypocapniston, catayporrusin, ut yperoas, yperechriston), chyromilon, psillion. — contra (*praeter superius mem.*) myrmetias, sycosin, tymi, cygnos etc. — sed *gr.* *v* = *lat.* *u* *g*: cuminum 9, murra (et myrra) murta (et myrta), luci (= lycii) 48 et = *lat.* *o*: coma (cyma)

storax (cf. *Storax nom. propr. Plaut.*), lipotomian 21, isopo 14.

= *gr. α:* inanti 42 (*oenanthe Plin. Aug.*, *oenantes cod. Cass.*, *ynantes Vrat. Apul.* 54), inomeli 49, finigmon 1, finicene 39. 40. 46 (*dia finicon* 48), chiradas 26, catereon (= *catarian*) 34 (*diarria* 47), dispnia 41 (*sed ib. disпноicis*), ortopnia 41, squinuant 1. 42 (*Schuch.* II, 284), quino-tetarum 18 (*isopo pro oesypo* 14, *ciliacos* 48, *psiadica* 53, *ipnopion* 66, *idema* 75). cf. *cynae ennyae Gromat. et sim. Schuch.* II, 283 sqq. 290 sqq. (*patetoe?* 33).

= *gr. η:* *triccocollima* 29 (*sed anacollemma* 13 *et bis* 29 *ubi semel* — *ima c.*) *sinecim* 37 (*saepius ex rec. litt. i et e commutatione cp. ut effimeras vel efemeras* 60, *litargici* 63, *lixi— vel lexiperiton* 61, *uriticus p* 51, *effilidas p* 9 *et c* 73, *sagapini* 73). — *sed vulgo η = lat. e, ut e art. (ἡ), colle(c)ticiis, —cam, xero-ptalmia, aplen etc.*

= *gr. ε:* *alopicia, erisipilas, asfodilus* (44), *apozima* (57) *et semper gcp epithima.*

= *gr. σ:* *chile, chiromilon, ileos, nileos, alimma, lichenas, dialiponta, lipotomian, aizon, ceratoide (sed herpen g, herpin c* 25. cf. *apud ucalin = ἀπό τοῦ καλεῖν cod. Polem. Silv.)*. *enfraxis, chemosis, proptosis acc. pl. gr.* 29, *sitodis et laconodis* 71 (*sed octodes* 73 *et simil.*), *encata-*

calypsi 21 (*ut embasi Gromat. p.* 190, 10).

i in abl. III decl. adiect. comp. (—ori) frequentius: in inferiori parte 21. in anteriori et posteriori parte 42. *defusa priori (aqua)* 29. 34. in calidiori *item* in frigidiori 52. calidiori lavacro 57. sub frigidiori flegmate 58. acriori clystere 24 (*ubi acriore cp.*) 36. 37. 42. 51. 55. 63. *contra clystere acriore* 22 (*ubi acriori cp.*) 33. *ampulla minore* 29. in anteriore parte 38 (*ubi —ri p.*)

in abl. partic. praes. (—enti) sufficienti modo 39. 42. 51. ex oleo sufficienti 51. cum sufficienti oleo 61. cum melle sufficienti 63. sufficienti cimino 75 (*contra sufficiente modo* 40. cf. 52 *ubi —ti p.* cum sufficiente melle 33 *ubi —ti cp.*) cum competenti dolore *cp* 17 *et adiecto passo competenti* 45 *etc.* ex antecedenti (*dolore, perfrictione etc.*) 28. 29. 34. 41. 47. 51. 60. 64. 73. 74. 82. ex aqua irruenti 28 (*irruente lapide c* 46 *ubi —ti p.*) in aetate ferventi 28. 61 *ubi —te c* 73. ex saniola fluenti 28. in aetate vergenti 48. non presenti vero rosaceo 61. in presenti 67. calenti anagargarismate 83. cf. *de repentis g* 37 (*ubi —te g^c cum c.*)

ibiscum: *ivisci g (c, hibisci p)* 9. 7 *visci (pro evisci) p* 81. cf. *ind. Plin. med. s. eviscum p.* 121.

identidem (= item) 34. 35. *ignoranter* 68.

iliaca passio (i. e. ileatica = ileos) 51.

ilium (*Isid.* XI, 1, 100): a sinistro ilio 50. (ilia utraque 63). iliorum (pro ilium) p 46 (cf. *Cael.* p. 235 etc. iliis *Cels.* p. 122, 35 *Dar.*).

ille (ad articuli significationem descendens): et maxime illos lavacrorum amatores 57. et illae magis quae 18. maxime illis . . . qui 17. ut . . . dentes cavernentur, maxime illi maiores vel molares qui . . . 31. et illos maxime qui 60 etc.

imbrilis (aqua = ὕδαρ ὑμβριον): aqua imbrili (umbrili p) id est (ex usu lat.) caelesti colligitur g(c) 29 (ubi in seqq. modo imbrilis ponitur modo caelestis). cf. *Cael.*

in vel additum vel omissum: bis in die 2. ter in die 20. bis in die et semel in nocte 22. 24. 52. in una die XII 48. in mense 43. ipso in tempore 10. in scemate foliorum lauri . . . chirurgia uteris cp 17. — in ipso initio 21.

in cibo accipiat 68. quae in sorbitionibus (i. e. sorbilia) accipiuntur 61. in pulmento dabis 40 et saepe in cibo dare 46. 47. 61 et in potione dare 40. 42 etc. (= potui dare, cf. potione una potui dabis 68. potione = potione dabis cp 67. 48. diurna potione vini dabis 76 etc.).

(in) collutione oris datum 32. (in) cacabo novo 33. (in) cyprino oleo molli pruna resolves 38. gallienus (in) libris peri craseon 39. solio descen-

dere (pro in solio = in solium) 1. loco proprio revocari (pro in loco = in locum) 77. — exinde . . . dabis avellanae magnitudinem 45 (δίδου καρύον πικτυκόν τὸ μέγεθος etc. *Gal.*) = in modum avellanae 44 etc.

includere (sacculo vel in sacculo), infundere aqua vel in aqua, inducere linteolo (33. 40. 66) vel in linteolo (aluta, carta, panno 31. 39. 43. 66. cf. in linteolo illinitum 72, immissis in ore pennis 42 ubi in os c, in ore inferre g 1 ubi ferre cp) etc. passim, ubi recentiorum est in cum abl. (pro simpl. abl. vel dat.).

in cum abl. (pro accusativo motus in quo tamen notandum est librarius idem esse -ū et -o) sexcenties (cf. *indd.* ad *Gargil.*, *Plin. med.* et *Antihimum* et metrica exempla *Commodiani* in indice ed. *E. Ludwig* I, 67. II, 38):

in uno = simul (ubi saepe errore rec. in vino) tundes 1. 32 (cf. haec omnia tundes in se 20). contundes 31. 42. contusis 72. commiscas 14. 21. 28. 34. 40. 61 (ubi in unum gc 1, p 51, c 52. 76). commixta 1. 9. 78. mixta 82. coques 34. 41 etc. cf. *Soran.* p. 226 *D.* ἢ τοῖς τεταῖς ὑψ' ἐν ἐψημένοις. . . coquunt (in unū c) 40. coquentur 42. decoques 6. 48. 76. tritis 46. 76. movebis 53. consolves 17. 28 (ubi in unū c). 29. 38 (in unū rediges c 45). cf. in unitatem tundendo cogi 76 bis.

in solio ut mergat 1. in ampulla minore adicies 29. in ipsa decoctione addes 84. in tribus partibus pollinis adduntur 40. in oculis inciderit 29. si in uno loco fuerit confixus dolor 21. in eodem loco cucurbitam figes 21. in quo linteolo sanguisugas proicies 21. membrum in quo talis influxerit sanguis 22. in humore purulento conversas 26 (*mox* in saniolam converti 26). aqua in ipsa caverna auditoria irruenti 28. in ipsis cavernis instillantur 28. in auribus accipere 28. fumum in ore excipiat 33. repones in vitreo vase (in vitreum vas c) 40. ovi album in oculis infusum 29 (suo in naribus infuso 32). in mortario refusa 76. mittis in fistula (— am c) 20. in girba (— am c 72) mittis 33. 76. mittes in caco fictili 35. mittes in gillone 42. in olla fictili crudos mittere 37. in ampulla(m p) mittes c 61 (in ipsam decoctionem mittes cp 43). in frigida aqua submissam 61. in ipsa decoctione miscebis 9 vel admiscebis 32. in lanis redactum (oleum) 43. 64. in ampulla(m p) rediges c 67. in ampulla minore adicies 29. *accusativus igitur in altera operis parte frequentiores subinde restitunt recentes (p, rarius c).*
in cum accus.: decoques in aquae calices tres 9. in latus (super latus) iacere 66. in cubiculum apposita 64. in utraque partes faucium se

infuderit 37. infundes in aquam (g, aqua cp) 40. in uvas passas (uva passa c) includes 12. — quae est in similitudinem lactis 12 (*et sic semper in similitudinem*).
in- (*sec. g*): imbecillitatem 21 (inbecillitas 41). imponis 1. 21. 42 (— nas) 19 (inponis 20 Iponis 21). imponderibus (*sic*) 29. impedire 20. 29. 33. impleri 1. impleat 35. impressae 12 (inpressae 27. inpinguaverit 29). immisso 19. immisissis 42 (inmutabis 21. imminere 29 cf. c 70, iminentem 24. immobiliter c 80). illigatum 35. illinis 1. 4. 5. 6. 7. 11. 12. 24. g^c 35 et 36 g. illimentum 35. illitum 20. (inlinis 11. 21. 24. 29. 35. 36. inlinies 36. inlinimentum 37). irruenti 28 (46).
incandidat (nigros dentes dentificium) 32.
incendiosus (doloris sensus) 28. (fervor) 52. febris incendiosa (= causos) 61.
incensoria (virtus) 13.
incessabilis (fluxus) 35.
incidere: novit enim crassitudinem flegmatis incidere 59. novit enim incidere omnem humorem 65 (cf. facit enim ad febrem calidam intercidentam 61).
incurabilis (passio) 29. 48 etc.
incursus (reumatis) 29.
indigent in cicatricem duci 45.
indigestio 47. 51. 54. 60. 66.
indignationes matricis 78.
inducere (cf. *sub in*): duos inductos facies 61. exinde in linteolo densum induces 66. et linteolo densum inductum

66. sucum . . . inductum ap-
pones 68. *cf. Cael. ox. 2, 216*
cataplasmatum atque in-
ductionum.
- infantilis** (*opp.* senilis) aetas 37.
- infectio**: ex infectione fellis
pallor corporis 49.
- influxio** humoris 23.
- informare** trociscos 24. 39.
46 *etc. (ut simpl.* formare col-
lyria 20 *etc.)*.
- infrigidare** 30. 61. 66. — cum
infrigidaverit 2. 18. 61. di-
mittes ut infrigidet 35. donec
infrigidet (infrigidet *g*) 40.
- infundere**: sacculo calido aqua
infuso 1. radices in oxymelle
infusas 1. linteolis in mulsa
calida infusis 18 (*cf. lanas* 62.
78. ptigmata 18. 61. 62). pa-
pirum in aceto salso infundes
20. panis posca infusus 18.
24 *etc. saepe (et absol.* panis
infusus 22. radicibus pridie
infusus 34. species pridie in-
fusas 42).
- infusio** (ἐγγυσα) in nares 31.
infusio salis candidi (= aqua
salsa) 29. absinthii infusione
potabis 44. infusiones ex feni
graeci suco 29. — flegmatis
infusio 34. ex infusione hu-
moris 43.
- inglutire** (*ital.* inghiottire): ut
ipsum humorem inglutiant 44.
- inhibito** vino 1.
- inietorius** (trociscus) 51 (*p*),
inietatorius *c*, *sicut ib.* in-
iectionibus *p*, iniectionibus
c.
- initiare**: doloriuxta umbilicum
initians 51.
- inlimentum** (*c*, illimentum
gp) 35. (*g*, illimentum *p*) 37.
- item* inlinere et inlinire *pas-
sim (cf. sub linere)*.
- immutatio**: egestio sanguino-
lenta aut fellita et alia im-
mutatio humoris 48. — fre-
nesis immutatio mentis 62.
- inordinatae** (febres) 21.
- impensas** recentes 33.
- inpinguare**: (*intr.*) cum in-
pinguaverit 29.
- in primis** id est in praesenti
67 (*et sic saepe*).
- insensibiliter** 46.
- insensibilitas** 65. 71.
- inseccio** (ἐγκαθάρσις) 46.
- insomnietas** 71.
- inspicientis** (*codd.* inspicienti-
bus) digitis 66. inspicientis
palma pulsatus (venter) 76.
- insufflare** (medicamentum) na-
ribus calamo 30. per cala-
mum insufflabis 31. *cf. Veget.*
etc. Rösch It. 208 (insuf-
flatio *R. 81*).
- insumere** (= consumere) vires
47.
- insumptio** corporis 49.
- insurrectio** (in splene) 43.
(ventris) 76.
- interanea**: ex respiratorio in-
teraneorum (*c*, interiorum *p*)
membro 39. ventris et sto-
machi ac pulmonis et omnium
interaneorum reumatismum
48 (*cf. Dies Altrom. Gl. 24.*
100).
- intercapedinata** (*opp.* iugis)
febriola 40. *cf. Cael.*
- intibo** (*gc*, intubo *p*) 22.
- inula** (enula *p*) campana 44
(enule *p*, uelle *c et iterum*
inula *p*, enula *ips. corr. p*, i
ulle *c*).
- inviscare**: cum inviscaverit 18.
- involuntarie** (urina exclus

46. involuntario lapsu urinam emittunt *ib.*
- involutio:** intestinorum verticula sive involutio (*p.*, involutio *c*) 51. lanarum mundarum ex oleo camaemelino involutionem adhibebis 65.
- irisillirica** *uno verbo g* (ut stafisagria), *gen.* irisilliricae *g* 35. 40 *bis.* 41. 42 (*ubi semel* yreos illirice *c* 40, *ut cp* 44, *cf.* yreos radicem *cp* 66), *acc.* irisillicam *g* 34. 40 *ter.*
- iugis** febris (*σύννοσος*) 61. iugis, iugiter *saepe.*
- iusum** (*cp.*, iosum *g*, *sed supra corrector* in alio iusum) 19. — sursum et deorsum *cp* 47. *cf.* Rönsh *It.* 461. *ind.* *ad Anthim.* *s.* deiusum.
- laceraturae** (*cf. sub ἀμυχαί*) 18: oportet . . . crura levioribus ac multis laceraturis scarificare 75.
- lanuginositas** 29.
- lemniscus** 18. 20 *etc.*
- lenificare** 29. 48. 73.
- lenifica** (virtus) 34.
- lenis** et *lëvis* *saepe confunduntur*, *ut e. g.* leniter coques *cp pro* leviter *g* 34. leniter torrefactae *cp pro* leviter *g* 34. *cf.* 44 et leviter *t.* 66 *bis.* tanges leniter *cp* 56. leniter infrigidatis *cp* 66. leniter subassatas *cp* 48. — *item* *lëvius* confectum (*ubi* lenis *c*, lenibus *p pro gr.* *λειών, λειοτριβείν* *Alex. p.* 464 *etc.*) 48.
- lenticula** (*wärmflasche*) aerea vel testea calidâ repleta 51. 66.
- lenticulata** (herba) 24. 52 (= *Gal. XIV, 386*) = ὁ φακός ὁ ἐπὶ τῶν τελεμάτων *Diosc. 4, 87.*
- lentores** (leniores *gcp*) anomali 21.
- lepis** aeraminis (*χαλκοῦ*) 11.
- leptospathio** (lecto spacio *codd.*) 32 *et* (*ubi* lecto *gc*, leptospathio *cp*) 36. *est λεπτοσπάθιον, ὡς ξηροσπάθιον*
- licinium** 32. 36.
- limatura** (corali) 32. (cornu cervini) 72 *etc.*
- limositas** 32. (limosa qualitas 46.)
- linire** et *linere confusa* (*sec. cod. g*): linis 20. 24. illinis 1. 4. 5. 7 *etc.* inlinies 36 (*ubi paulo ante* inlinis). oblinies 1 *bis.* 10 *bis.* 29. linire 7. *cf.* Rönsh *It.* 285. *ind. ad Plin. med. s.* inlinere (*p.* 124 *cf.* 217), *Vitruv. etc.* — aliquid sorbibile quod humorem acrem et tenuem et asperum valeat obdulcare et crassificare et linire (*i. e.* lenire) 46.
- logici** (medici) 46 *in. cf. prf.*
- lucescere** die 73.
- maciros** (= *μάκρος*) corticis robusti quem profert India terra 42.
- madidata** (spongia) 67.
- magdalla** 66.
- magis:** et magis 46. 51. 52. 61. 63. 66 *etc.* (*ut saepe Alex. etc.*).
- malaxare** 66 (*cf. Alex. etc.*).
- malflunt** 41.
- malta**(?): (multi *c*, multi *p*, multi *p*) pollinem 44.
- manifestatur** (= ostenditur) esse 38. 39.
- manualis** (mola) 76.
- mappa** (= peritonaei membrana) 51. *cf. Cael.*
- marrubium** (*πράσσιον*) *g* (marrubium *cp*) 21. 40. 41. 66 *bis.*

masticare 31. 44 *etc.* masticatio 28. masticatorius 31.
masuca (*μασούχα* *Act., Alex.*) confecti de vitibus nondum mustariis (murtaveris *p*, mutariis *p^o*, *om. c*) 42.
maturus: mala cydonia . . . usque ad maturum (?) coques 48.
mederi *passive*: passiones vesicae difficili curatione medentur 46.
medietas (la moitié) capitis 1.
melanteria qua sutores utuntur 11.
melinum oleum 42. 47. cum vino melino i. granaticio 47.
melotis (melotida *fem. gcp*) 20. 30.
membrana de canna *quid sit* 14.
membranosis 22.
menstrualis (sanguis) 80.
meraca potio 29 *bis*.
mininga *nom. fem. cp* 71 (*ut* melotida *g. v.*, coloquintidae *gen.* 1. 49. 51. 53. 71 *etc.*, ypoquistidae 33. 34. 35. 48. 82 *etc. sed* ypoquistidis 33. 39, pomfoliga 29, lepidâ 20, ragadae *plur.* 74, emorroidae *gen.* 36, ebdomadis *abl.* 71, *item* reumam 29, apostema *nom. fem.* 21, epithimâ *abl.* 34. 42, simpasmâ 1, cataplasmâ 18. 42. 61 *etc.*
minuere (= minui): si dolor non minuerit *cp* 46 (*minuitur Petr.*).
mittere (*hincin-tun, mettre*) *saepissime*.
modicus *saepissime* (modicissimus 72 *bis.* 76), *velut* ex . . . modico rosaceo adiuncto et seminis lini modico 42. *cf.* 1: sin vero fuerit parva hoc

est modica ulceratio. — *adv.* modicum pungen (8), coques (29), haerentes (12), fervida (29), modicum retro (51) *etc. cf. Rönsch It. 334.*
mox: et in usum exinde potui dabis ciatum unum semis mox lotae 80. *cf. Oribas. VI, 42* utilis etiam est (lactis) si mane bibatur mox ut mulgitur.
mucil(l)paginosus 48.
mucillentus (humor) 7. (sucus) 78.
mucrones suilli (suini *c*) pedis 46.
mulinus: ungulae mulinae (marinae *cp*) 77.
murra (10. 35. 42 *ut* „veteres“ *Prisc. 1, 49. Plin. Aug. etc.*) *vel* myrra (29 *bis*) *vel* mirra (29 *quater.* 33. 37. 40. 41. 42) *g*, mirra (*vel* mira *c*) *cp qui frequenter confundunt mirte et mirre.* — mirrae *gcp* 37 *ubi* „vel murrae“ *g^e!*
murta (2. 10. 22. 33. 36) *vel* myrta (4. 9. 39) *vel* mirta (18) *g*, mirta *cp.* — *cf. Amman ad Cael. p. 271* „in hoc exemplari sic (murtae) perpetuo scribitur pro myrti“ (*μύρτος, μυρσίνη*, myrtus *fem. Plin. cf. ἡ μυρσίνη καὶ τὰ μύρτα Gal. XII, 471 sq.). cf. Schuchardt II, 267.* — oleum myrtinum (*μυρσίτινον, μύρσινον*) *g* 2.
murturias (?) lactucarum (*p. 150, 8*): lactucas cum muria (?) elixatas (lactucas mamas elixatas *c*, lactucarum murtururias — in alio murrurias — elixatas *p*) 61.
musculosus: musculosis *lar.* 18. 22. 27 (*et* membranc

22. (musculosis membranis)
26 etc.

mustarius 42 (v. s. masucas).

myxa (mixa cp, τὰ μύξα) 61.

72 (ubi nixarum p^o, cf. noxa-
rum Cael. p. 539. 541. μυξί-
λων pro μύξλων Alex. de
lumbr. ap. Idel. p. 307). cf.
Gargil. c. 59 de mixis . . .
Orib. syn. 6, 43 μύξλων τὰ
ὀστά = lat. (VI, 124) mixae
ossa (mixo ossa La).

nam *parenthetice pro relativo*
(ut apud Cael. chr. 5, 95 etc.
Oribas. lat. VI, 347 etc.): sim-
plici confectione divisuram
dabis, nam Graeci aplen
diaeresin vocant 18 et sic 21.
32. 34. 40. 41. quod corrigere
solet p et plerumque etiam c
itaque rarius fere in altera
parte libri et recentiore ser-
vatur, ut 46 (bis) et 71 tri-
ticeis et holerosis nutries, nam
(c, quod p) Graeci sitodis ce-
lacanodis dicunt. — cf. 33
(simpl. parenth. omissio nam)
palmulis calcatis, patetoe a
Graecis appellatur (pateton
— appellatum codd., nisi quod
appellatur p).

natio: plurima natione pul-
lulantes (scrofae) 26.

nativitas (carbunculi) 22.

natura (= penis): natura suo
officio privata 46. in capite
naturae 46 bis. in caput na-
turae incies 46.

necem praefocationis (ingerat)
37.

nefreticus, nefretica passio
g 21 (cp 45. 75).

nervositas membranae capitis

1. omni nervositati contraria
1. maxime a capite vel a

fundo cerebri unde omnia
nervositas infunditur 8. pa-
titur . . . omnis nervositas a
cerebro descendens 71 (cf.
Cael. ox. 3, 180 patitur enim
tota nervositas. chr. 1, 45.
5, 22 etc. est natura caput . . .
nervosum chr. 1, 38). — na-
tura vesicae nervosa iudicatur
46. nervosis in locis 27 etc. —
(nervi sensibiles 71.)

nigellus: olivae nigellae 1.
myrtae nigellae 4. 9. 39.
acacia nigella 29. vinum
nigellum 4. 42. 46. nigellus
sanguis (opp. flavus) 39 etc.

nigredo (dentium) 32.

nimietas 2. 21. 41. 47. 73. si
nimietas fuerit doloris 51.

nimum (= valde) 2. 21. nimie
aquatissimum 21. castrum
non nimis calcatus 35.

nivatae potiones 37.

noceri: vesica . . . ab humore . . .
nocetur 46. cf. 75.

novit (= valet, quo et ipso
passim utitur): novit enim
tale cataplasma imminentem
putredinem prohibere 24. cf.
21. 26. 29. 59. 65.

nucleus (simpl. = nucleus pini
vel n. pineus, ut 35. 76) 1.
45 (= nucl. pini Alex.). 46.
66. — cf. strobilus.

numero (nũo) ante numeros vel
numeralia addit g(c), semper
om. (rec.) p, ut per dies nu-
mero V gc 1 (ubi per dies V
p et sic semper).

obdulcare (Cael., Orib. VI 539
etc. cf. Rönsch It. 195 et in-
dulcare R. 193) 29. (humorem
acrum obd.) 46. 57. (ad ob-
dulcandam acredinem) 78.

obmittere (*p*^c, amittere *c*) animam 64.

obripilatio (*gc*, oripilatio *p*): dolores sentiunt aegrotantes cum obripilatione . . . *et mox cum dolore et obripilatione* 21 (*quod in eadem de internis collectionibus disputatione* cum rigore et torpore frigido ait *Cael. chr.* 5, 94. *cf.* 95 rigor corporis atque tremor). *cuius vocabuli non nisi medii aevi scriptorum exempla prostant apud Du Cange s.* obrepilatio *et s.* obripilatio, *confusi insuper cum horripilatione* (*Sap. Sirac.* 27, 14 loquela multum iurans horripilationem capiti statuet = *λαλιὰ πολυόρκου ὀρθώσαι τῆρας. cf. Du C. s. v.) quae est ὀρθοτριχία.*

observare (= abstinere): observandum etiam et a comestione lactis 1. observandum ab omnibus frigidis 31. observandum autem a carnibus 71. — observare aegrotum a vino 21, a salsamentis 54.

obtrusio (*ἐμφορᾷς cf. Cael.*): purgamentorum (in auribus) obtrusione (*g*, obtrusione *p*, ostrusione *c*, obstrusione *Petronc.*) facta 28. ad obtrusiones *sc.* aurium (*p*, ostrusiones *c*) *ib.* 28. ad conclusionem sive obtrusionem (*cp*, obtusionem *p*^c) epatis 44. vesica . . . obtrusa (obstrusa *cp*) 46. spongiā . . . podicem obtrudes *cp* 51. cavernas lana obtrudes (obstrudes *c*, obstrues *p*) 72.

obtunsio visus *g* 29. 42 (obtus visus 29, *ut* contusam *g* 40, *sed simpl.* tunsus *g* 29.

42, tunsus *cp*, *nisi quod* tunsus *etiam cp* 48. 55, obtusis *c* 63 ubi optusis *p*, pumicis tusi *gcp* 1).

obuncatio unguium 40.

ocallatus 7 (*cf.* occallescere *Cels.*).

oenomeli: mulsam ex vino melle temperato quam appellant Graeci *i(y p)nomel(l c)itos* 49. quod appellatur a Graecis cionomelitos (*descr.*) 61. (*cf.* vinum mulsum 49. 71 ubi *et* aqua mulsa *etc.*).

oesypum: cum oesypo (*ubi male isopo cp pro isipo*) 14. **omfacium** (*g*, —ceum *c*, —cū *p*) oleum (*ὀμφάκιον Gal. Orib.*) 1. ex oleo omfacio (*c*, omfacino *p*) 61. — omfacion (*gc*, omfatium *p*) in potione datum 42 (omfacium *cp* 47). — *ὀμφάκιον Gal. (eupor.) XIV, 315 (= Orib. eup. 4, 1 p. 685) = oleum gremiale Th. Prisc. II, 2, 1 p. 44^c. cf. ind. ad Anthim. 67. 68.*

operari (*wirken*) saepe, *ut* 40. mirifice operantur 44. magnifice operatur 48. mirabiliter operatur 76 *etc.*

operatio: (contingit) sine operatione effici (partes) 54.

oppressio subita 65. (oppressio stomachi 42.)

oppressus: cubiculum . . . oppressum (*opp. aestuosum*) 64.

oralis confectio 86.

orarium (*gesichtstuch*): orario velato capite dorsum ad solem ponat 1.

oryza: orizia (*pro oridia*) *gp* (*ubi oriza c*) 1. *cf.* oridie *cp* 48 (*et sim. di = z certitudines supra s.* cortizones 20, reuma-

tidiatō *gc* 40. hipediocotā 66.
gliquiritā, —ricia 83. 34 *etc.*).
os ventris (= τὸ στόμα τῆς
γαστρός *Gal.* XI, 40) 59.
os *gen.* ossi *gcp* 20 (*bis*). osso
(*gc*, osse *p*) 29. *cf.* *Oribas.* ab
osso VI, 175. in ossis 182
(*ib.* et ossibus, ossa) et *nom.*
sg. ossus.
osculatio (ἀναστόμωσις) vena-
rum 39.
ovillum (lac) *c* 6 et 15, *gp* 40 —
ovinum *p* 6 et 15, *c* 40.
oxymeli (oximel, cuius *con-*
fectio *conscribitur* 34. *cf.* 75):
acc. oximel *g* 34 (*ut cp* *semper*
43. 59. 65. 71. 75, *sed cf.*
exmelle c 34, oximelle *c* 43,
oximell' *c* 59 *pro* oxymeli).
abl. oximelle *g* 1 (*gen.* oxi-
mellis *cp* 9. 58). *ut* rodome-
c (*om.* *p*) 61 (rhodomeli
Pallad. 6, 16), cionomelitos
(= oenomeli) 61. — *cf.* acetum
mulsum salitum 11.
pala (*Cael.*) 66.
palmulae — *vid.* dactyli.
palumbus (φάσσα) 48.
papyrus *neutr.* 20. papyrus
vitriariorum *ib.*
passio (= affectus, πάθος, διά-
θεσις) saepissime.
passum Creticum (*i. e.* optimum
Plin. 14, 81) 76. 80.
pastillare: cum melle pastil-
lato 19. 20.
pediculosa *passio* 3.
peforante passione 40. 66. 76
(*cf.* *Cael.*).
pendigines (πόλποι *vel* sinus
ulcerum) 19.
pendiginosa (ulcera) 20.
penicillos (= cellos *cp*) frigidus
vel calidos (frigida posca,

calida aqua expressos) 29 (*ter*).
30. 34. 37. 75 *etc.*
penna (*sic semper*) gallinacea
1 *etc.*
percussura: in ipso punctu
percussurae (exictu scorpionis)
69 (*cf.* *Rönsch* 43).
percussus (*ubi rec.* — *p* — per-
cussura) 1. 29 *bis*. 32. 39. 66.
perfrictio (= frigor *g* 1,
ψῦξις *erkältung*) *semper g*, *ubi*
rec. (*p* et *plerumque etiam c*)
vitio *solemni* perfrictio (*vel*
perfrictio *p* 41. 42): perfrictio
capitis (*opp.* adustio) 1. 34.
cf. 28. 29. 37. 38. 41. 42. 44.
47. 48. 51. 64. sub ingenti
perfrictione (*ita hic cp*) aut
frigore 46 et *mox* ex frigore
aut profunda perfrictione (*sic*
etiam cp) 46. — quotiens dor-
salis medulla perfrixerit 38.
perniciēs: perniones a perniciē
(*c*, pernetie *g*, pernetie *p*) pa-
tientium locorum 10.
pessarium 46. 78. 80.
pessum (*c*, pessus *p*) 78.
petrosus: saxifragae petrosae
45.
ph: *in graecis semper fere*
scribitur f, *praeter* cephalea
(1. 41. dia coepheles 35.
caephalopodas 40. cephalico
19), staphisagria (3. 1, *ubi bis*
et stafisagria, *cf.* stafisagria
cp 32), simphitum (39 *bis* et
simfitum, *cf.* sinfisim 26), re-
sina colophonina 42, (iatro-
sophistae *c* 29). — *pro sph*
scrib. *sp* (*ut ital.*) *in* spera
42, sperula 28 (*et rec.* 76. 78,
sed sferula *ib.* 76). *sed* hypo-
sfaumata 29, diasfongon 39,
microsfixian 42. — *pro phth*
scr. *pth* (*pt*) *in* pthoes (φθόαις)

75, apthes 36 (ptiriasin 3, xeroptalmia, ptisica —ci, *ubi* rec. tysiçi, tisiica, ut tigmata, tipsane *pro g* ptigmata, ptisana).

pinalis (= pineus): resina pinalis (pinca *Petronc.*) 46. *cf.* 76 (r. pituina 1 *et s. πινύλην*).

planipedum (cubiculum) 30.

plenarium (emplastrum) 19.

plus: plus calidius oleum 42.

passio plus acutissima et molestior (*c* = plus acuta magis molesta *p*) 47. *cf.* mediocriter crassioris 40 *et supra s. nimium. cf. Cael. ox.* 2, 182 multo parvissime laesa *et similia saepe apud Alexandrum* (parum duriores *fol.* 6^b. adhuc magis pessimum 24^a. satis acutissima 63^b. valde utilissimum 69^b. satis utilissime 97^a. nimis utilissimum 98^a. satis rarius 123^a *etc.*) *cf. ind. ad Anthimum s. magis.*

polenta (pulenta *g* 42, pulenti *ib.* *g.* polentum *vel etiam* pulentum *cp* 15. 46. 47 *etc. cf. Cael. cit. Rönsch It.* 272) 15 (= farina hordeacea *Scribon.*) 48 *etc.*

pori (arthriticorum *ex quibus lapides* 52. *in eadem re Cael. chr.* 5, 33 poros quos nos transitus dicere poterimus (*confundens πόρους et πάρος*).

posca (*sic g et interdum c, rec. pusca cp*) *passim.*

potare (tränken *et trinken*): aqua calida potabis 1. ipsa decoctione ieiunum potabis 42. 44. 46 *etc.* — vinum potet 1. potatum 81.

potionare 72 (*cf. Rönsch, It.* 157).

praeterire: laborantes si hanc passionem curare praeterierunt 48. — praeteritus est (metus) 35.

pressius (caput detondere) 71.

pressura (sensuum *in leithargicis*) 63. *cf. Cael. ox.* 1, 17 pressura intellegitur contra naturam somnus.

primarius: pullum de primario fetu 71.

procuratum: dandum . . . aliquid sorbile ut est amyllum procuratum 46.

propungentes (= prominentes) capillos 1 (*ut Cael. chr.* 1, 36).

psilotrum medicinale *describitur* 1.

psittacium (psytacium *g*, psittacium *c* = ψιττάκιον *ex Scrib. Largo Gal.* XII, 764) emplastrum 21. *cf. c.* 17 sitacio (*p vel sutacio c*) emplastro. (psittacinum *Marc., Scrib.* „a colore ita dictum“).

ptisana (*sic gcp* 21. 39. 40 *etc.* grana ptisanæ 46.

puleium: poleii *g* (pulegii *cp*) 37. *sed* pulegii *et g* 40, *ut c* 40. 45. 66. 58 (*ubi* puleium *p*).

pulicinus (18) — *vid. s. ψύλλιον*.

pullinus: ex iure pullino 1.

pulsatur dolore (dentium laborans) 32. loca dolore pulsata 46.

pupula (κόρη) 29.

purgatorium (*sc.* medicamentum, καθαρτικόν) *passim.*

purpura sicca operies 42 *etc.*

pustula 25 (*bis*).

pustulescere: donec . . . pustulescant (partes) 53. *cf.* pustulari, pustulescere, pustulationem facere *ap. Cael. p.* 553 *etc.*

putor oris 32.

putrificatorius (*gcp*) 13.

pyriama (empirisma *gcp*) 33.

qu = c (k) *ante* a, o, u: scamula 20 et descamatae 34. *rec.* calitate c 29, aquatia c 29, cassatas c 32, licamine p 51 — quactiliarius (*g. v.*), dequoques *rec. p* 6. — secuntur 21 (et *rec.* 44. 72, sequuntur 76).

pro c (k) *ante* i: quimolia 1 *etc.* (item *rec.* 16. 17. 24 *cum* cimolia 73. 74 *etc.*). squilla 41 (ut *rec.* 15. 43. 73 et squillicus 43) *sed* scilla 10.

ante i = *gr. v.*: coloquintidae 1, ypoquistidis 33, 35, 39. diaquilon 38 (*rec.* diachilon), cacoquimiam 42 (*sed* caco-cymis 26). iusquiamus 32. 41. alquionium 11. gliquiritia 33. 34. (quiperi p 35. 49 et cp 42 ubi cyperi g).

ante i = *gr. oi.*: quinotetarum gc 18, squinuant squinantum 1. 42 (quiliaci p ubi ciliaci c 48, ut dequoques p 6). cf. quilen (= κολίην) *Cael. Aur. p. 479.* magister conquiliarius C. I. L. III no. 2115.

nam ci— (ti, di, j *ante* voc.) = z (ξ): reumatidiato gc 40 (ut iudaeidiant in *acrostichis Commodiani instr.* I, 37), oridie cp 48, hipediocota 66, gliquiritia (—cia) 33. 34.

quactile (quatile g), **quactiliarius** — *vid. s.* coactile *etc.* (aqua et iliario *codd.* = a quactiliario 42).

quam diu: tam diu quam (*g*, quam diu *g^c*, donec cp) talem colorem habeat flegma 33. hoc tam diu facies quam diu

(*gp*, donec c) 42. tam diu quam diu ad perfectum sanetur 68. — appones quam diu se scara levet 68. competenter... inflabis vel quam diu sibi... ventum sentiat 51.

quantitas: fabae aegyptiae magnitudo vel quantitas 41.

quartanarii (*qui sub quartana laborant*) 55.

quia (*quod*): ignorantes quia... sordidat potius quam depurget 29 (*cf. Anecd. I, 83—86.* traditur enim quod... attenuet et... deducat 43. differt a diarria quoniam... 47. differt podagricus ab artritico quia... 52.

quisque (omnis quisque): sic enim omnia quaeque (quaequae? *cf. Neue* 2, 181. 179. quaeque g, quaecunque cp) humida desiccantur 33.

quod sufficiat vel quod suffecerit (= ὅσον ἐξαρκεῖ) g 29. 34. 40 (quod suffic g 29 bis, sufficerit 36 et *ante* corr. 34 et bis 42, sufficit 32. 47), ubi quod sufficit (suffic) *semper fere cp.*

rapere folia 56. spiritum vaporis ad se rapere 34.

raptus membrorum (*in epilepsia*) 71. vehementi raptu interficiuntur (lyssodecti) 67. r. cucurbitae 71 *vid. s. v.*

raritas membrorum interiorum 46. — rarissimo cribro cernes 76.

rasuras (intestinatorum = ξύματα) emittunt 48. cum rasurarum egestionem 72. intestinatorum rasuram ex antecedenti malo effectam 73. — cucurbitae rasura 61.

raucedo aut asperitas arteriae 33. 34 (*cf. Isid.*).

recalefacis *gp* 42.

redarguentia (similem virtutem) 64.

redundantia (nigri fellis) 9.

referre: salutis periculum referunt (= significant *Petronc.* p. 199) 17.

reformare: febris . . . movetur . . . reformatur 55.

refrigerateria (sanatio, *opp.* calefactoria) 52.

reiactatio (sanguinis) 39 *bis*. 40. (flegmatis) 40. 66 (*ubi* reiactatio *c*, reiectio *p*, reiectatio *p*^c). reiectatio *g* 42 (*ubi* reiactatio *cp*). — reiectantur (lumbri) *c* (*ubi* reiact. *p*) 72.

relaxatorius 76.

renalis (passio = nefretica) 45 (*cf. Cael.*).

renes: renum (*in titulo medicamentorumque inscriptionibus*) 45. renium (*in textu*) *c* 46 (*ubi* renum *p*).

repulsare: ad repulsandam sitim 61.

respiratorium (membrum = ἀναπνευστικόν) 39.

reum (ῥῆμα, οἱ δὲ ῥῆγον καλοῦσι *Diosc.*, *ubi* 'Ρωμαῖοι ῥαπόντινον *add. recens. Vindob.*): reupontici *c*, reu pōtiō *p* 44.

reuma: cum largo reumatis incursu 29. ad reumata repellenda 29. ad reuma tenue 29. reuma crassescit 48.

reumatismus 29. 41 *etc. saepe* (arteriae et toracis 33, stomachi 42, ventris et stomachi 47, ventris et stomachi ac pulmonis et omnium intera-
neorum 48, ventris et in-

testinorum 50). sub aquoso et frigido reumatismo (*ubi* reumate *Petr.*) 53.

reumatizare: reumatizantibus gingivis 31. reumatizato pulmone 40. qui ex ventris passione . . . reumatizant 48.

riposus (ῥιθώδης): extantiae riposae (i. e. riposis verticibus prominentes) 73.

robustitas 35.

roscidus sudor 56 (*cf. Cael.*). **roseum** oleum (*pro* rosaceo) *apud recentes ex brevi codicum scriptura* ro. (*sic*) *natum fere videtur.*

rosmarini (*gen.*) 4 *etc.* (roris marini *Garg.* 45 *etc.*).

rus (ῥοῦς): coriariorum rus (*sic cp, gen.*) herbae viridis suco 73. — ros syriacum *acc. gcp* 39 (*pro* run syriacum, *cf. Plin.* 29, 50 *acc.* rhum). rossiriaci *cp* 42. 48 (*ut med. Plin.* 2, 4. roris siriaci *Gargil.* 41, *Alex. etc.*). *cf. Simon* s. ros siriacus *et* s. ruseritras *et* . . . rus eritru (rhus quae erythros *Plin. etc. Fraas fl. cl.* 84) . . . reperitur apud Paulum in multis locis. *et* est ros siriacus i. sumach. — rorem qua gotti utuntur *Alex. f.* 107^b.

rotula (ροτῆλον) 32 (*cf. Isid.* 4, 9, 10).

rustica potio (ad morsum canis rabidi) 67.

sabanum: calido sabano deterges 59. 66. 76 (*cf. Alex. f.* 14^b. 36^b *etc. Rönsch It.* 250).

sabina (herba): savina *gcp* 42 *etc.*

sacculus (*gp*, saculus *c*, ‘

etiam g 1): sacculo torrido sale repleto (28), sacculis salis torrefacti (31), sacculo calido (38) vaporare. *cf.* 41. 43. 44. 51. 66. 76. sacello calido *cp* 53. saccellorum vaporaciones 21. (*cf.* saccellare locum dolentem *i. e.* saccellum apponere *Escalap. etc.*).

saeta (*Plin. Aug.* 11, 208. 226. 264, *Sulpic. Veron. etc.*): seta *g* (seta *cp*) 20.

salitus (sallitus *gcp*) 11. acetum salitum (*vel* salsum 20) (= ὀξάλμη, ut ἄλμη aqua salsa *vel* salimuria *v. Anthim.*) 28.

samsucum (σάμψυρον): *sic semper g* (*cp*), ut *Plin. Aug.* 15, 29 (samsucum, at sampucho *sic* 15, 30) et *Cael.* (*Amman ad p.* 285) 1. 42. 53. epithima diasamsucu 42. 43. 44 *etc.*

sanguinare: fricabis (asperitates) donec sanguinentur 29. **sanguinosas** (gingivas) *p* 32 (*ubi* sanguinolentas *c*).

sanguisugae (sanguissuge *p*) *quomodo apponantur docet* 21.

saniare: antequam saniet apostema 21. sinendum ut sibi saniando scarae cadant 36.

saniola: cum coeperit durities in saniolam (*gc*, saniem *p*) converti 18 (*ubimox* ... magis ad nutriendam saniem declinare). cum saniolam effuderis *ib.* saniolam (*gc*, saniem *p*) 19. *item* 21. 28. saniolam omnes 21. 26. 28 *bis*.

saniosa urina 21. saniosus minctus 46.

saponis confectio (*in qua sa-*

ponis gallici *cf. Aet. p.* 821 *Lugd.*) 16.

saxietas (σάξιας): ad duritiam splenis vel saxietatem (*sic p*, sacietatem *c*) 43. saxietate (*p*, sanxietate *c*) 76. saxietas (*c*, anxietas *p*) *ib.* — saxitas *Cael.* *cf.* largietas, proximietas, tardietas, damnietas *Schuchardt Vokal. II*, 332.

scalpello (medicinali) 67. *cf.* 20 *etc.*

scamula — *vid.* squamula.

scarificare, scarificatio (*ubi rec. cp*, quod medii aevi est et corruptum, praebent scarificare, scarificatio) *saepe*. — scarificatio interdum etiam *g*, ut 34 (*sicut* scarificare *bis p* 75. pro scarificare *sic cp* 75 = pro scarificatione. scarificatio *p* 54). — *de re cf. Cael. ox.* 1, 76 *sqq.*

scema (*sic semper et g*) *saepe*, ut rotundo scemate 5. 11. scemate foliorum lauri aut myrtae 17. scema iacendi 18 *etc.*

scematizato ore (iacent) 72.

scilla (σύλλα): scilla (cilla *g*) *gc* (ut *Orib. VI*, 505 *Aa*, scylla *La*), *ubi* squilla *p* 10. *sed* squillae *g* 21. 41 (ut *semper cp* 15. 41. 43. 73). — cum aceto squilitico *cp* 43 (*cf. σκυλλιτικός*).

sciston: lac asinum aut caprinum sciston 48 (*cf. Anthimi ep.* 75 cum *ind. s.* petrae).

scrofae 26.

sefra (9) — *vid.* chamaeleon.

semicupium (*ital.* semicupio = ἡμισκύμα): etiam ex calida et oleo semicupio depositis

embasin adhibebis 51. et in calida semicupio depositum usque ad guttur embasi adhibita fomentabis 61. — semicupa *Anmian.*, σκάφη *Alex.* 12, 3 p. 696 *Bas.* ubi et σκαφολουτρεῖν ὃ ἐστὶ παρὰ Ῥωμαίοις τινὰ ἐμβαλεῖν (*lat.* 3, 20 f. 194^b scapha quam Romani tinam vocant. *cf. de tina Diez Altr. Gl.* 112).

sempervirens (herba = ἀνέλιξον) 56.

sensibilis: est enim stomachus multis nervis sensibilibus perplexus 71.

sentix: senticem viridem 39. *cf. Apul. herb.* 87 batos... Itali senticem alii rubum. *Sim. Jan.* s. sentix est rubus... s. batos. [*ad ypoquistide suci suprascripsit* g^o 36 id est rose hoc est sentica (*cf. Sim.* s. ypoquistidos et s. barba hyrcina)].

serpillum — v. herpyllum.

serpusculi (ἐρπητες) 24. 25. — *cf. s. ἔρπειν.*

sexus: per totam spinam usque ad sexum perungues 72. *cf. Plin.*

sibi: in vicina parte sibi 22. vicina sibi loca 24 (*ut suus sibi*). ut sibi saniando scaras cadant 35.

sibilatus (*Cael.*) 33.

sic: et sic saepe.

siccare: cum diligenter sicca-veris (siccaverit *intr. gcp*) 20.

silligo: in similitudinem grandiarum minutiarum (*sic g*, grandium minutarum *p*, granorum minutorum *c*) siliginis [quod gremiatum dicimus *add. p*] 36.

siliqua graeca (*pomorum genus sec. Plin*): siliquae *g* (silice *p*, ubi *supra* g^o id est prunae silvestres) 2. siliquas graecas dulciores 33. *cf.* 48. 82 (νεράτια ἑλληνικά *Alex.* vel ξυλοκέρατα *p.* 467 *Bas.*, ut etiam nunc vocantur *Fraas flor. class.* p. 65).

simila: tritici farinam crassam id est semilam (*c*, semela *p*) quam mola ceciderit 66.

simulare: cum rubore igni acro (*g*, ignis aqua *c*, igne sacrum *p*) simulante (*sic*) 37.

sin vero saepe retinet g, ubi si vero *rec. p* (*interdum etiam c*), velut si *cp* 22. 24. si *p* (*ubi sin etiam c*) 29 *bis*. 34 *ter.* 36. 37. 39. 42 *ter.* (45. 46. 51. 75). — si<n> vero (*ubi n in ras.*) *p* 53. siñ vero (*n del. corr.*) *p* 61. sin vero *cp* 71 (*ubi paulo ante si vero*). sin vero *cp^c* (*ubi ante corr. si p*) 72.

sinapis, sinapi: *gen.* (= *Ed. Diocl.*) sinapis *g* 5, *acc.* sinapem *g* (*male pro gen.* — *pis*) 21, *abl.* cum sinape *g* 5. — sinapi *semper c* (*nom.* 63, *gen.* 1. 5. 21, *acc.* 32. 53, *abl.* 5. 55). — modo cum *g* modo cum *c* facit *p*: *gen.* sinapis 1. 5. 21. *abl.* sinape 5, *sed acc.* (*nom.*) sinape (*pro* — *pi*) 53. 63 et sinapi (*pro* — *pi*) 32. *abl.* sinapi 55.

sinapismus docetur 1.

singillatim g (2. 34), *rec.* singulatim *cp* (1. 2. 34. 44. 48 nisi quod singilatim et *c* 34).

siquidem (= cum) plerumque cum coniunctivo *g* (*ubi ind. cp vel certe p*). *cf.* 10. 2^a

soli dabis (*opp.* repones) 61.

selatio (ἡλώσις) 54.

sordicula (aurium) 28.

sordidare 40.

spanum (oleum = ἔλαιον σπανόν *Gal. passim*): oleo spano *gcp* (*ubi* ispano *p*^o) 1. olei *yspani g* (*spani cp*) 4. olei *spani c* (*ispani p*) 17. olei *spani gcp* 42. oleo spano *cp* 51. 61. 72. olei *spani p* (*om. p*) 67. betonice *spane c* (*om. p*) 45. — *cf.* Spania *Schuchardt Vok. II, 367. Rönisch It. p. 469.*

sparto (*spato codd.*) ligare 51. **specularis** (*sc. lapis* = *germ. g*^o 39 *supra spat*) *ustus adhibetur in medicina* (τὸ διαφανὲς καυθεῖν *Gal. XIII, 668*): *specularis assati* 39. 73. *assi* 32.

sphaerula (*sperula*): *se in sperulas plicando g* 28. *lanam succidam in sperule (c, specule p) modum (συστέμμα τοῦ ἐρίου Sor. p. 125 D.) formatam* 78. *sperulas (τὰ σφαίρια Diosc.) cupressi* 76.

spica indica (= *νάρδος Ἰνδική, ναρδόσταχυς Gal.*) 29 *etc.*

splenetica *passio*, *splenetici* (*splenicon*) 43.

spondylus: *circa spondili (g, unde male spondilii c et spondiliorum p) locum* 34. 37. 41. *cf.* 62. 71 *bis*. — *spondilion (herba, σπονδύλιον Diosc.)* 62.

spumatio: *epilepsia . . . casus cum spumatione* 71.

spumosus: *spumosi flegmatis* 66. 71. *sputa tenuia et spumosa* 66.

squamilla, squamula: *squamillas (p, squamas c) canta-*

bro similes 6 (*cf. squamularum cantabri similium Cael. chr. 5, 64*). *corticosas squamulas (p, scamulas c)* 15. *scamulam (gp, scāmillā c)* 20. *cf. amygdalae descamatae (s. v.)*. *scabies scamea (cp) et scamosa (cp)* 15.

squiuanti (*g*, *squinanti p*, — *tis c, cf. acc. squinantum g* 42, *ubi* — *ti c*, — *tos p*) = *σχιόνιον ἄνθος* 1. *cf. Orib. VI, 508 scynanthus (Aa, scynanthus La, scinanthus Li).*

stagnatus *cacabus* 35. *c. aeneus stagnatus* 42. *in vase aeneo stagnato* 42.

staphisagria *v. stafisagria, gen. stafisagriae uno verbo g* 1 (*saepius*). 3 *etc.*

statuere (*vel confirmare* — *dentes*) 32. *statuit vel solidat ib.*

stellionis (*stelionis pro more c, ut Plin. RV, at stellio Pl. Aug.*) *oleum* 68.

stibi: *gen. stibeos g* (*cp*) 29 *bis* (*acc. pro gen. stibeum g, iscubii c, intube p alio loco* 29). (*Aristoph. Bys. fr. 51 στίμμις, non στίμμι*) [*cf. Plin. 29, 118 nom. stibis sed stibi* = *stimmi id. 33, 101* = *Diosc. 5, 99. stibio abl. (alibi stibi) Plin. 12, 43*].

stillaticium (*mel, opp. mel atticum*) 29. (*cf. resina stillaticia Plin. 16, 54. mellis sine fumo stillativi Med. Plin. Ro. 1, 18 et iterum ib. cum melle stillativo*).

stratoria: *stramina dura aut certe frigida stratoria sub-*

strictura saepe: stricturae

querelam relaxando mitigare 84.

strobilus: strobilos (pineos *gloss. p*) 40 (*ubi* exstrobilos *g*, scopillos *c*, stobilos *p*, —bilios *p*^e). *item* 41 (*ubi* strobilos *p*, —bilios *p*^e, scobili *c*).

styrax (*masc. Plin., fem. Isid.* *ubi* „latine storax dicitur“ 17, 8, 4 *cf. Plin. Aug. styrax. Orib. VI, 507 Styrax in tit. et mox Storax in tactu Aa, La*): optimus Isauricus (41. 51) *vel* calamites = καλαμίτης (42. 58). *cf. Gal. de antid. XIV, 79 στύρακα τὸν ἐν τοῖς καλάμοις φερόμενον ἐν Παμφύλῃ. in Cassii codd. modo storax legitur modo stirax modo masc. modo fem. cf. g 41 storacis isauricae* (—*ci cp*), *sed g 42 storacem calamiten optimum (ubi storaci calamite optime c). item c 51 stiracis optimi isaurici et c 53 stratis calamitte optimi (ubi storace calamite optime p). storacem malunt g et p, stiracem c* (storacis *g 41, storacem g 42 ter, sed stiracis g 42. — stiracis, —cem c 42 bis. 48. 51. 53. 77. 81 sed storacem c 41, 42 bis. 77. 78. — storacem semper p, nisi quod semel stirace p 81). fem. voluisse videtur g (cum Isid.), masc. cp (ut nunc ital. storace et hisp. estoraque).*

subacram (poscam) 67.

subalbidus 46. 52 bis. 66. 75.

subdeducendus erit (venter clistere) 71.

suberectio (praecordiorum) 77 (= ὑποχορδίων μετεωρισμός Sor.).

subfugium (matricis ad superiores partes) 77 (= ἀναδρομή Sor.).

subinanire ventrem 35.

subter perungues (totam pectus) 41. et subter perungues 76.

subtorrefacti 49.

suffire (ὑποθυμῆν): suffis (*p*, fuis *sic c*) 77. suffita, — tam 81.

suffragari: si tamen virium qualitas fuerit suffragata 42.

suffumigatorius (ὑποκαπνιστός) trociscus 21. 33. 41. 77. subfumigando 78 (*cf. subfugium cp 77*).

sui: iuvenilis aetas sui fervorem erigens 40.

suinus: a carnibus suis *c 71. suini* (*c*, suelli *sic p*) pedis mucrones 46.

sulphur semper (*non* sulfur) *g* (*et semper fere cp*).

summe facit 48 (= optime facit *ib.* 48. 76) = *summe* operatur 51. *summe* faciunt (= ἀκρῶς ποιοῦσιν Gal. XIII, 265) 72. hoc *summe* per urinas fel deducit 49. *summe* ducit cicatricem 74. (*magnifice* facit 42. *mirabiliter* operatur 76. *similiter* facit . . . *similiter* operatur 80).

summittere, summissus semper *g* 35. 42 *etc.*

summitates (ἄκρα) manuum ac pedum 30. 47. 48. 63. 71. digitorum 73. *summitas* gulae 37. *uvae* 35. *summitates* rubi (= *cymae, turiones q. v.*) 48. (*rutae p 71*).

super: super laneo stramine iacere facies 42. *super dolens* *latus scema* iacendi *h*

66 (*cf.* cum supra ventrem iacuerint 21). super umbilicum imposita 72. super carbonēs (*sic*) (exusta) 48. (coques) 48. (combures) 67.

superaddes 76. superaffert 75. superasperges 15. 17. 40. 42 *bis*. 66. superbibendas 76. supercomedendum 48. et sic super dabis 67. superdistensa 76. superinduces 30. super fertur (*ἀνω φέρεται*) 71. superimpones 32. 33. 51. 61. 74. supermittes 61. superpositae 76. superproicies 30. supervertere (= apponere *p*) cucurbitam 21 (*cf.* Röscher *It.* 210 —13).

superadustio 29.

superinsurrectio (= extantia *Isid.*) 25.

superinnectorium (*ὑπερἐγγχε-
στον g. v.*) 29.

superpositio (= *ἐπίθεσις g. v.*): superpositionis tempore 51 (*ut* *Cael.* *etc.*).

supradictus vel suprascriptus (*es*) *saepe*.

suspiriosi 41.

sympasma 6. 7. 8. 9 *etc.*

syringotomum: ex flebotomo vel syringotomo appellato 20 (*cf.* *Gal.* *X*, 415 τὰ καλούμενα σφουγγότομα . . . τῶν μαχαίρων).

tamarix: tamaricis (*c*, tamaraci *p*) seminis (= *μυρσίνης καρπὸν Gal. XIII, 241*) 43.

tardus (= inveteratus, *χρόνιος*) dolor 1 (*tit.*).

tempora (*cp*, tempora *g*) 1. 23.

tepere (*opp.* fervere): ut oleum ferveat . . . et cum ex parte oleum tepuerit . . . iterum plus calidius oleum infundes 42.

tenebratio (*cf.* *Cael.*) 1. 71.

terebintina (resina, *τερεβινθίνη g* 21. 42 *etc.* (*etiam* terebentina *g* 18. 41), terebentina *c*, terbentina *semper p*.

terrosa qualitas 29. 34. *cf.* arenosa.

testeus: in vase testeo 42. lenticula testea 51. 66 *etc.*

tetricus (odor) 64.

th gr. = *t semper g*, ut anetum, cyatus, tymum, torax, tapsia, esteseos, psilotrum, piretrum *etc. praeter haec fere*: diathesis 23 (epithesis 51), epithima 34. 42, anthera 35 *sed* anthera 36, absinthium 1 *ut rec. sed alibi semper* absentium *g. male* diaitheon, diacalcitheos *g* 39. *cf.* cy-methla *g* 10. — *add. rec.* epithimum 9, nothus 58, catheimerion 59, orthopnoicis 43 (*sed* ortopnia *g* 41), *ut solent fere recentiores aspiratam docte restituere.*

tibia iniectoria 48 (= auliscus *Cael.* *ox.* 3, 29).

tiltarium 17. tiltario locum calcabis 18.

tiltum: tilto locum calcabis 18. molli tilto (= *μότω τίλω Gal.*) vel strictorio ligabis 19 (*ib.* et 22 moto tilto). tenui linteolo subiecta lana et molli <tilto> ligabis 29. ferramento lincio involuto et moto tilto (melitincto *c*, molli moto *i*. tincto *p*) 32. levi ac tenui et tilto (trito *cp*) operimento operies 56.

tineae: *sic semper gcp* (= *ταϊνίαι*) 2 *etc.*

tithymalus: titimalus *gc*, *rec.* titimallus *p* 12.

torridum sal 28. 53. salis
torrefacti 31. 66. torrefacti
nitri 76 (*cf. Diosc. 5, 128*
extr.).

tortio (in ileo) similis torturae
chordarum 51.

tortus ventris 51.

totus: in toto 24. ex toto 46.
54. 67. per totum (crura
scarificare) 75. 76. dabis totum
bibere 51.

tractuosus: saniolam tractuo-
sam vel viscosam 19.

tubulus folliculi (tubulo i. ex-
sufflatorio *gloss. p*) 51.

tunsus — *vid.* obtusio.

turbiscus 76 (*vid. ind. gr. s.*
κόκκος).

turiones (κλῶνες): rubi virides
(—dis *gcp*) turiones <id est
cimae *g^c*> 2. rubi turiones
virides 32. summitates rubi
quas vulgo turiones vocant
48. absinthii viridis turiones
minores (= comam i. e. cymas)
76. lenticularum turiones vi-
rides 82.

tussem *g* (—sim *cp*) 33 (*tit.*).
34. 41. *sed* tussim *g* (—sem
cp) 21.

tussicula (= tussis, ut febric-
ula 40 *etc.*) 34. 39. 40. cum
ingenti tussicula 39. per
longam tussiculam 40. *plur.*
tussiculae 72.

tussicularia (= βηχικά) 66
(*cf. Cael.*).

tutare (*sic gc, ubi tubare semper*
p?) loca patientia (molli lana
etc.). 28. 34. 38. 42. 47. 51.
58. 66. 75. 76.

ubi (= quo *cf. Rönsch It. 408*):
usque ad locum ubi descen-
derit dolor 69.

unde (= quam ob rem): unde
admoneo *prf.*

unguere *g(c)*, ungere *p(c)*:
perungues *g* 38. 41 (*ut c* 42.
53. 61. perunges *g* 21. 42 (*ut*
semper p). inunges, inunge *g*
29 (*ubi inungues c*) *etc.*

urinam excludere = explicare
= egerere = emittere 46.

urinales viae 46. 51. urinalis
meatus 46.

usque: ventrem sub umbili-
cum (—co *c*, —cū *p*) usque
cooperies 72 (*cf. super* — sub
p — umbilicum imposita 72).
usualis: exercitationibus usu-
alibus 55.

ut quod (*proid quod*) antispasin
vocant *cp* 66.

utriculosa passio (ἀσκήτης
ὄδωψ) 76. utriculus *ib.*

uva lupina (*ut agria staphyle*
Apul. 74 = στεφύλλος) 24. *cf.*
Sim. Jan. s. „strignus...
vocatur uva vulpis ab arabis
et uva lupina etiam dicitur
morella vel maurella et aliis
multis nominibus a vulgaribus
per diversas partes secundum
ydyomata“. (*facit ad ignem*
sacrum Cassio ut Diosc. 4,
71 et Th. Prisc. 1, 21.) uva
lupina et apud *Alex.* „cap.
de cephaea“ (*ut cit. Sim.*
Jan. s. uva vulpis).

vaporosus: ex spiritu vaporoso
(= ἐκ πνεύματος ἀτμώδους
Gal. XI, 101) 75.

variolatus (*ut pustulatus Cael.*
p. 553) 22. *cf. adnot.*

vasa 42. *abl.* vase *gp* 40. 42.

venire in similitudinem vini 29.
venter: si venter (*sic legas,*
non ventrem, ut vulgo codd.)
non fecerit (-rint) 22. 33. 36

37. 55. 58. 61. 62. 66 *etc.* si venternon fuerit (fuerit *p*^c) 49.
- ventositas** (*ut Orib.* VI, 528) ventris (splenis *etc.* = inflatio) 1. 28. 42 *bis.* 43 *bis.* 51 *ter.* 55.
- vernali** (*c.* verno *p*) tempore 63. verno (= vere) autem et aestate 66. verno (*sc.* tempore) 71 (*cf. Rönsch It.* 120. 105).
- vernarium** (nitrum = *νίτρον βερνίκιον Gal.* XIII, 568 *cf. VI, 430 νίτρον τοῦ βερνικίου καλουμένου*) 49. *cf.* bernicaron *Orib.* VI, 239 = *βερνίκιον V, 431.*
- vertebrum** (*λαγίον*) 53. *cf. Cael. chr.* 5, 1 *sqq.*
- verticula** (*εἰλεός*): nimia intestinorum verticula sive involutione 56 *et ib. mox* supra memorata verticula sive involutio (*cf. 51 in.*). *item Cael. ox.* 3, 138. 142 intestinorum verticula (*ubi* 143 ventriculosi sive torminosi *male puto legitur pro* verticulosi).
- vesica**: *rec.* vessica (*ital.* vessica, *vessica, gall.* vessie) *g* 19. 21. 29 (vesica *g* 39, *ut semper cp, nisi quod* vescice *ter et semel* vessica *c* 46).
- vesicaria** herba (*φυσκαλῆς*) 45. 46 (= vesicago *Alex.*).
- vespera**: ad vesperam (*opp.* mane 39. 76. dabis ieiunis et ad vesperam 40 *ter.* 41. 66 (*cf.* 39)).
- veterescente** autem passione 52. antequam passio veterescat 82.
- veteri** *abl.* 29 (*item cp* 32. 43. 53. 63. 71. 74. *cf. p* 76 *pro gen.* —ris).
- vetustas**: poterit omnis stercoreum vetustas... excludi 51.
- vilicio** (= *ἀμμι*, *ami vel ammi Plin.*): ameos (*ita et* 48) id est seminis vilicionis 44. 48 (*cit. Sim. Jan. s.* Uilitionis semen).
- violaceum** (oleum, vinum) 72. *cf. Apic.*
- virosus** (virtuosus *cp*) vel mucilentus (humor) 7.
- viscosus** (humor) 2. (sucus) 35. (flegma) 34. 66.
- visu** carentia vel absconsa 21.
- vitalia**: usque ad vitalia 67 (vitalia viscera *Diez Altr. Gl.* 24).
- vitellum** (*ut Apic., vulgo* vitellus): vitella duo 29. vitellum unum 29. 74. 78 *ter* (ovi assi vitellum = *ὄου ὀπτοῦ λέκνθον Gal.* XIII, 315). — *cf.* ovi crudi medullam croceam 78.
- vitriarius**: papyrum vitriariorum 20.
- ysopum** (vel isopum) *semper g.* confectio dia ysopu (—ū *pro gen. graeco* —u, *ut semper, g*) 1.
- z** = di *cf. s.* qu (= c, qui = ci). *Pomp. comm. artis Donati p.* 108. *Ermenricus Elwang. ep. ad Grmold. abb. ed. E. Duemmler Hal.* 1873 *p.* 13.
- zaccarionem** (zaccariōs *p.* zaccariōs *c*) herbam 68.
- zernae** *vulgo* (*Isid.* 4, 8, 6 *s.* „impetigo est sicca scabies... hanc vulgus sarnam appellat“ = *hisp. sarna, unde sarnoso*) = impetigines 11.
- zernosus**: maculae zernosae 9 *bis* (*ubi altero loco cer-*

nosae g). cf. *Th. Prisc.* 1, 10 f. 11^b derbiosos (sic *cod. Brux.*, unde *ed. Argent.* 1532) vero oculos quos (quas *cod.*) nos impetigines (sic *cod.*) dicimus et asperitatum vitiis

laborantes. *quem locum illustrat Sim. Jan. s.* „serniosus. Theo. Pri. serniosos oculos quos nos impetigines dicimus habentes et asperitatis vitio laborantes etc.“.

Index III nominum propriorum.

Amythaonis malagma „id est Amythaonis patris Melampi“ 42. 43 (cf. *Philagr. ap. Alex. lat.* 2, 140 = *Gal. XIII*, 967 ex *Asclepiade*: τοῦτο τὸ φάρμακον τῶν παλαιῶν ἐστὶ καὶ ἐνδοξῶν).

Antipatri antidotum (ex *Gal. XIII*, 66) 41.

Bestiane antidotum 45 (cf. *Aet.* 10, 6).

Diospoliten medicamentum 55 (*Diospoliticum Gargil.* 3. *Gal.* VI, 430 etc. ὁ Διοσπολίτης *Orib.* V, 793).

Faustinianus trociscus 48 (cf. *Gal. XIII*, 296. *Aet.* 9, 49).

Galenus (quem *gallienus etiam* g 1. 2. 24. 39. *gallienus cp*):

Galenianum quod *piera* appellatur 1. *piera Galeni* 42. *Galenianum catharticon* diates *aloes* appellatum 1. *catapotia Galeni* 2. 24. 30. *finicine Galeni* 39.

Galenus in sua therapeutice hoc est libris curationum (i. e. *θεραπευτικῆς μεθόδου X*, 316) 30. — in diagnostice (i. e. *περὶ τῶν πεπονθότων τόπων VIII*, 264 et 391) 39. 44. —

libris peri craseon appellatis, in quibus de temperantia corporis scribit (*I*, 605) 39. — antidotum Antipatri ex cata topon (i. e. *περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους XIII*, 66) 41. — in libris emplastrorum quos cata gene (catagenes *cod.*, ut *Alex. f.* 29* *Archigenes* in cathagenis etc.) nominavit (i. e. *περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ γένη XIII*, 375) 44. — ad Glauconem scribens (i. e. in libris τῶν πρὸς Γλαύκωνα θεραπευτικῶν) ait 50 (ubi?). 55 (*XI*, 40). ad Gl. scribens primo libro edocuit 60 (*XI*, 6).

Herae trociscus (ad aures) 28.

Hermolaon staticon (*collyrium*) 29 (cf. *de collyriis* „*Hermolaus*“ — „*Hermolaus parvus, magnus*“ — *Aetius* 7, 102 ubi etiam de sistente *Oribasii simili*).

Hippocrates (ypocrates etiam g) senior dogmatum princeps in aphorismis 1 et 65. cf. Hipp. (senior) in aphorismis 29. 32. 38. 48. 73. 76. senior Hipp. in aphorismo . .

xisse ostenditur 55. — Hipp.
in prognostico 18. Hipp.
senior in suo prognostico 35.
Libianum (λιβιανόν) collyrium
(*Asclepiadae* sec. *Act.* 7, 105
ex *Gal.* XII, 762 cf. 730) 29.
Magni iatrosophistae expositio
(in *aphorismos Hippocratis*)
29. 76.
Maurarum feminarum stig-
mata 13.
Musa trociscus 22.
Nileos splenicon lexipyreton 53.
61 (cf. *Galen.* XIII, 182.
181. *Philagr.* ap. *Alex.* lat.
2, 132 etc.).
Philagrius: epithima diasper-
maton *Filagrii* 42 (= *Philagr.*
de *splene* ap. *Alex.* lat. 2, 146 f.
131^a cf. 2, 145 extr.). — tro-
ciscus ex *Filagrio* conveniens
spleneticiis 43 (cf. *Philagr.*
Alex. 2, 145). — antidotum
quod *Filagrius* sinpepticon
lexopireton appellavit (vel
antid. *filagricum* s. l. appel-
latum?) 55. — epithima *Fi-*
lagrii conveniens *hydropicis* 76
(cf. *Philagr.* ap. *Act.* 10, 22).

Philagrii epithima ad sple-
nem citatur in Oribasio latino
(synops. VI, 322 Dar. =
Philagr. ex Asclepiade apud
Alex. lat. 2, 140). de Phi-
lagrii fragmentis (ex Oribasio)
Alexandro latino insertis vid.
Th. Puschmann, Alexander
von Tralles (Wien 1878) I,
104 sq.

Philonium antidotum 42. 51
(cf. *Gal.* XIII, 267. *Alex.*
lat. 2, 213. 287 etc.).

Vespasiani meline (apud alios
melinon) 21. 26 (cf. *app. cod.*
p f. 86^a 1 in.).

Vindicianus Afer: *physicum*
ad *dolorem malae* de *Vin-*
diciani Afri 32. — ad vomit-
tum constringendum de *Vin-*
diciani Afri 42. — *ficicum* de
<*Vindiciani*> viri illustris 69
cf. *Anecd. graecolat. II, 177*
et *diss. meam „Ueber die*
Medicina Plinii (Hermes t.
VIII) p. 42.

Zoili collyrium 29 (cf. *Gal.*
XII, 171).

Signa pond. medicin.

lib (libra) g, l' cp.

÷ vel unc (uncia) g, ÷ cp.

2 vel 2 vel dr̄, dr̄g (dragma) g = 3 cp.

3 vel 3̄ (sc̄l, scr̄p 35, script g 42) gc, 3 p (3 p^o).

obolus 29. 41. 51. obolis duobus i. scrupulo uno 38.

sextarius g = 55 c (76, 55 p 80).

Specierum nomina quas accipit vel recipit medicamen-
tum in accusativo saepe iuxta posita ponderibus ex compendiis
archetypi diverse lectis male habet cod. g. ego ubique cum casu
genitivo coniunctionem restitui.

Celsus, H. C.

A. CORNELII CELSI
D E M E D I C I N A
LIBRI OCTO.

AD FIDEM OPTIMORUM LIBRORUM

DENUO RECENSUIT

ADNOTATIONE CRITICA INDICIBUSQUE INSTRUXIT

C. DAREMBERG

BIBLIOTHECAE MAZARINAE PROCURATOR



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

MDCCCXCI.

LIPSIAE: TYPE B. G. TRUBNER.

SALVATORI DE RENZI

NEAPOLITANO

ALBERTO DES ETANGS

PARISIENSI

VIRIS DOCTISSIMIS AMICISSIMIS

DE CELSO OPTIME MERITIS

D. D. D.

CAROLUS DAREMBERG.

PRAEFATIO.

Compluribus causis eo adductus sum ut peculiari studio in Celsi tractatum de medicina mentem adverterem. Primo quod doctissimus Des Étangs egregiam edidit horum librorum interpretationem vernaculam, adjunctis ipsius Celsi verbis, qualia apud Targam leguntur*). Deinde idem de medicina opus retractavi, ideo quod admodum eruditus de Renzi Neapolitanus publici juris fecit majorem hujus scriptoris editionem**). Quo saepius autem Celsum perlegebam, eo magis me detinuit cum dicendi nitor ac brevitatis tum perspicacitatis judicii sensusque verax et ad agendum accommodatus, quibus omnibus genuinam nobis repraesentat civis Romani imaginem. Nec facile dixerim magisne tamquam medicum an tamquam literarum studiosum me delectarit. Quodsi rem naturalem ac medicam spectes, permultis sane additamentis augeri possit opus Celsianum, vix tamen pauca quaedam reperiatur quae resecanda sint. Immo parum abest quin hodie pro compendio rei medicae adhiberi possit. Utique clarissimis linguae latinae monumentis accensendum est, sed eheu! vix alium novimus librum qui pejor a librariis habitus sit atque in quo plura emendanda restent. Ecce argumenta, L. B., cur virum probum et strenuum B. G. Teubnerum adii eumque permovi, ut Celso locum concederet in corpore scriptorum classicorum cum graecorum tum latinorum, quod

*) Paris. 1848. 8º majori; pertinet ad corpus scriptorum latinorum auctore viro ornatissimo Nisardo editum. Prostat etiam separatim apud Didotos.

**) Neapoli 1851, Vol. II. 8º. Continet editio illa praeter ipsius Celsi verba e Targae editione anni 1810 petita adnotationum ejusdem editoris bonam partem, Morgagnii epistolas, dissertationes Rhodii et Kühnii, lexicon Celsianum, interpretationem italicam, pharmacopoeam Celsianam, cet.

multis jam abhinc annis edere aggressus est. Cui viro, quum brevi postea diem supremum obierit, non possum quin hic, occasione data, pro egregia in me benivolentia publice gratum animum obtester: nec minores gratiae mihi agendaee sunt hujus viri generis, qui jam, socero vita defuncto, opus quod ille inchoarat summo studio absolvere pergunt.

Vereor tamen ne hisce conatibus admirationis, qua jamdiu Celsum colui, majorem rationem habuerim quam virium mearum exiguitatis. Jam olim, quum de interpretatione Celsiana a doctissimo Des Étangs edita verba facerem, jure optimo summis laudibus extuli egregia in Celsum merita viri clarissimi Targae, qui, quamvis saepius morborum taedio vel rerum publicarum vicibus ab incepto distractus, nihilominus per totum fere vitae curriculum, quod ei satis longum obtigit, summam operam dedit ut e Celsi contextu expungeret menda innumera quibus conspurcatae erant omnes editiones antiquiores. Tunc temporis affirmare ausus sum, etiam post laborem a Targa exantlatum, immo post curas renovatas, quas idem vir in novissima sua editione*) Celsi anno 1810 4to Veronae edita publici juris fecit, multa adhuc emendanda superesse; posthac saepius denuo eundem Celsum retractavi, atque in ea re magis semper magisque mihi persuasi me non frustra olim haec affirmasse. Recte sane agnovit Targa quibusnam in rebus reprehendenda esset editio Lindenii, qui nimia temeritate, ne dicam audacissima protervitate, Celsi verba emendare conatus est; recte perspexit idem quanti aestimandi sint duo antiquissimi codices hunc scriptorem exhibentes, nimirum Med. I et Vat. VIII; nihilominus tamen Lindenium passim sequi maluit, ubi me iudice hisce egregiis instrumentis fidem habere debebat. Quod vero semper in edendis priscis libris summum habui praeceptum, id nunc quoque

*) Exstat sane editio tertia curante Targa quae Paduae 1815 12^o prodit; de hac editione tamen, quae perraro obviam fit, tacent bibliographi, nec aliud quid continet nisi repetitum editionis Veronensis contextum, etiamsi typographus in monito praemisso lectores certiores faciat se in usum suum convertisse novissimas emendationes quas exemplari editionis anni 1810 subjecerat Targa qui nonagenario major mortuus est.

tenendum esse censui, praeceptum dico quod codices mss. presso pede sequi jubet; numquam a codicibus Med. I et Vat. VIII discessi nisi ubi insanabili laborabant ulcere; quantum potui, sedulo abstinui a conjecturis; ubivis suspectas habui emendationes Lindenii, quotiescumque saltem earum necessitatem non probabat vel rerum, vel verborum, vel syntaxeos ratio. Ceterum infra (in *Adnot. critica*) subjunxi indicem omnium locorum, quibus aliquid in contextu anno 1810 a Targa edito immutavi, additis argumentis quibus permotus ita agere decreverim. Praeterea duabus inprimis de rebus lectores monitos esse volo: primo praecipue loco operam dedi ut aliquatenus saltem semper iisdem literis exararentur eadem vocabula, non solum quod ad voces attinet quarum recta scriptura e codicibus petenda erat (cf. *Adnot. criticam*), sed etiam ubi major fides habenda est praeceptis quae observari jubent viri linguae latinae peritissimi, de qua re nullam mentionem esse faciendam in *Adnot. crit.* censui. Verumtamen, etiamsi sedulo ad hanc rem animum attenderim, neque admodum prolixum sit Celsi volumen, denuo schedulas a prelo madidas relegens incidi in anomalias nonnullas (ex. gr. ubique legas *ceteri*, non *caeteri*; *circuitus*, non *circumitus*; *demptus*, non *demptus*; *promptus*, non *promptus*; *exemptus*, non *exemptus*, cet.; ceteroquin de anomaliis gravioribus videsis *Adnot. crit.*) huc pertinentes, quas, Deo adnuente, posterius tollere mihi licebit.

Arcto vinculo cum recta vocabulorum latinorum scriptura cohaeret quaestio quae spectat rationem repraesentandi graeca. Qua in re notandum est utrumque codicem antiquissimum exhibere voces graecas easdem modo graecis literis exaratas, modo latinis, si Targae fides habenda est: unde vix fieri potest ut regulam statuas ad quam omnes dirigantur. Voces graecas fere semper ubi graecis literis apud Targam, qui ipse Lindenium secutus est, exaratae erant, eodem modo in contextum meum transcripsi, vel Targa duce emendatas, vel a me ipso ad linguae graecae leges exactas. Attamen sunt quaedam vocabula graeca adeo frequenter in libris Celsianis obvia, eaque latinam scribendi rationem imitantia (cf. ex. gr. pp. 171, 27; 192, 21; 194, 28, 29; 195, 26; 199, 15; 209, 25; 211, 12, 18; 217, 14, 22, 23, 24, 25,

28; 221, 29; 229, 2; 231, 28; 234, 13, 36; 236, 23, 31; 246, 37; 251, 12; 258, 18. — vide praeterea *Indicem vocab. graecorum*), ut iis, exceptis nonnullis locis sat facile circumscribendis, servari possit habitus ille latinus; sunt vero alia quae literis graecis exarare jubet ipse orationis contextus.

Ceterum haec quaestio mihi in mentem revocat aliam magis generalem, qua inquirendum est quatenus Celsus sermonem suum latinum vocabulis graecis variet. — Certo constat, uti recte doct. Des Étangs, consentientibus omnibus viris doctis, in *introductione* sua animadvertit, Celsi aetate parum abfuisse quin Romae universa medicina penderet a medicis graecis seu liberis, seu servis. Constat item, Celsum opere suo medicinam a peregrina servitute liberare Romanosque ipsa hac disciplina erudire voluisse; nostri enim tractatus omnino ita se habet, ut vix tamquam nudum bene dicendi exercitium vel otii eruditi fructus venditari possit. E libris graecis haud dubie haurire coactus est Celsus cum ipsam disciplinam medicam, tum permultas locutiones artem medendi spectantes, quibus nulla linguae latinae vocabula respondebant. Verum Latinos sibi quaerebat, non Graecos lectores, Quiritium sermonem graecae scientiae accommodare volebat; nec carebat oratio vernacula locutionibus verborumque circumscriptionibus sat multis artem salutarem spectantibus iisque jam olim usu receptis, quas scilicet vel plebeja quaedam medicina indigena vel adsiduum cum erudita Grajorum arte commercium invexerat. Nec dubium quin hasce dictiones locutionesve avide capessiverit Celsus, quotiescumque vel res ipsas vel sua de hisce rebus cogitata accurate repraesentarent. Haud mirandum igitur quod Celsus non infrequenter graece locutus est; cave credas tamen eum vel temere, vel saepius quam ipsa rerum ratio jubebat ad graecum sermonem confugisse. Neque arbitrari licet, si certe codicibus mss. fidem habeas, eum interdum genuinas dictiones graecas ignorasse; insuper mirandum est verba graeca desiderari quum potissimum expectentur: v. gr. ubi de calvariae suturis agitur (VIII, 1), et eo loco ubi leguntur illa (p. 264, 16): *Id antiqui tunicam nominabant*; in mente enim Graecos, non Romanos certum est Celsum ha-

buisset, ideoque hic: *quam Graeci χιτῶνα vocant* aptissime inseruisset. Itaque quid unoquoque loco scripserit noster eruere constitui, atque hac ratione omnia quae aperte glossematum speciem referunt, e Celsi contextu, id quod jam ante me sat frequenter facere aggressus est Targa, expellere conatus sum. Proponam insuper locos nonnullos ubi verba graeca aliunde invecita esse vehementer suspicor, subjunctis argumentis cur ita sentiam.

Glossemata haec certo satis antiqua sunt, quum exhibeantur et a cod. Vat. qui saec. X scriptus est, et a Florentino qui XII, et a Parisino n°. 7028 qui XI. Ni fallor, saeculo VII, VIII, vel IX originem debent profecta sunt ex illis Latinorum ludis literariis, quorum magistri eo usque saltem linguam graecam callebant, ut vel libros graecos qualicumque tandem modo latine interpretari, vel orationem vernaculam inspersis vocabulis alienigenis corrumpere valerent, adeo ut codicum margines ultimum essent eruditionis refugium, quae jam a plerisque inutilis habebatur, nec aliud quid nisi rerum obsoletarum studium prae se ferebat*).

Praeter haec glossemata graeca, quibus refertum est opus Celsianum, multo maiorem etiam continet copiam glossematum latinorum, additamentorum denique interpretationumque cujuscumque generis. Istorum additamentorum nonnulla integra resecurit Targa**); maximam vero partem uncis inclusisse satis habuit. Sed hac in re nimia usus est cautela; immo ego ipse, licet multa quae supervacanea videbantur ultro deleverim, jam video me non omnia praestitisse quae praestari potuerint; diuturnus enim orationis Celsianae usus me nunc vetat quominus obelisco non adjecto in edi-

*) Quum permultos codices inde a saec. VII usque ad XII exaratos tractaverim, satis compertum habeo quanta ostentatione latinos libros transcribentes graece loqui tentent hujus aetatis librarii.

**) Ex. gr.: p. 33 l. 1: *quando sane ad sanitatem venit*, post *anitur*; — 72, 15: *et quae tertio libro*, cet., post *nuclet*; cf. *Adn. crit.*; — 147, 20: *quod χολινόν nominatur*, post *verbum comparatum*; — 203, 23: *quod sit scrupulorum III. S.*)-(I, post *vocem laser*; — 300, 11 *super vesicae cervicem*, post *verbum incidi*.

tionem meam recipiam locos sat multos, de quorum genuina origine partim dubitabat Targa, partim nihil suspicionis habebat. *Adnotatio critica* resarciat quae nimia codicum reverentia permotus facere omisi. Non est, credo, cur nos retineat codicum auctoritas, immo ne consensus quidem; qui enim antiquas membranas tractare solitus est, ipsum orationis contextum quem exhibent ad artis criticae leges exigit, utpote quum contextus ipse adminicula suppeditet quibus discerni possit qui loci genuini sint, qui non sint. Hujus artis decreta in ejusmodi rebus haud dubie aliquatenus oppugnari possunt, nec semper ab iis aliena est propria cuiusvis editoris sentiendi ratio: quamobrem modus adhibendus est huic artis criticae usui, rationesque ubivis reddendae, id quod numquam facere neglexi, cur ita nec aliter feceris.

Totidem fere exstant codices Celsum exhibentes quot hujus scriptoris editiones; longe tamen abest ut omnibus idem pretium eademve auctoritas sit tribuenda. Primo loco monendum est omnes hosce codices ab eodem prototypo profectos esse; nam omnes, verbi gratia, magnam referunt lacunam (pag. 154, 6 meae editionis) aliasque aliquanto minores (pag. 144, 35; 153, 26; 154, 6; 212, 17; 238, 3; 292, 25; 305, 26 et 362, 4) obvias. Omnes praeterea eadem habent glossemata cum graeca tum latina, ut supra jam notavi. Quod ad aetatem attinet, in duas classes distribuendi sunt, quarum altera constat Vat. VIII, Med. I*) et Paris.

*) „Cod. Mediceus primus Plut. 83, Florentiae in Bibliotheca Medicea asservatur. Idem ille est Mediceus codex quem Rhodius Cocchiusque laudarunt. Scriptus fuit saeculo XII ineunte. Bapt. Pallavicinus Regiensis Episcopus illum emendandum suscepit; in quo tantum sibi licere voluit, ut alium plane fecerit. Usus est autem vetustissimo et corruptissimo, ut ipse ait, exemplari; ex quo colligi potest, nonnulla ipsum ex conjectura immutasse. Ceterum id exemplar ei perquam simile videtur unde Medicei (II—VII) ceteri derivantur. — Octavus Vaticanus (Vat. VIII = N^o 5951) scriptus fuit saeculo X, non tamen eadem manu. In hoc cod. ut in Med. I librorum in capita divisio nulla est; sunt tamen, ut in illo, plures tituli margini adscripti.“ Targa. — Desinit his verbis lib. VIII cap. 21 (p. 360, 27) *et in interiorem et in,* certiorum me fecit vir amicissimus abundans doctrina, nunc te degens, Du Rieu; non autem in his: *Genu vero et in,* ut

7028*) qui manifesto eidem familiae accensendus est cui duo priores. Vix est quod moneam, orationis Celsianae contextum constituendum esse tribus his codicibus, quippe qui reliquis longe plures continent egregias lectiones multoque paucioribus deturpati sunt mendis. Qui duos priores excussit, Targa, satis bene munere suo functus esse videtur; nihilominus tamen multum interest ut denuo inspiciantur, adhibita omni illa accuratatione ac cautela quam hisce rebus impendere solent nostrae aetatis viri docti (de qua re praecipue videsis Rothium v. dd. in eximia praefatione ad Suetonium). Nec omni spe destitutus sum fore ut aliquando nanciscar novam horum codicum collationem omni qua hodie opus est cura peractam. Reliqui codices, non excepto Paris. 6864, ad saec. XV vel XVI**) referendi sunt, et qui hosce codices exararunt librarii

volebat Targa. Cum Mediceo I consentit. In Med. I post haec verba: *supra summum ventrem* (IV, 20; p. 146, 24) sequuntur illa: *subjicienda sunt* (IV, 27; p. 154, 6) quasi nihil desit. Suppleta est lacuna ea a Nicolao Nicolo. In codd. Med. I et Vat. VIII desunt haec verba: *ne succurrere quidem statim sibi possunt* (V, 27, 11; p. 204, 13) usque ad illa: *insanabiles reperiuntur* (V, 28, 12; p. 213, 21).

*) Hic codex numquam antea excussus erat, etiamsi doct. Des Étangs eum perlustravit; varietatem tamen lectionis notare neglexit. Dolendum est revera quod tantummodo lacinias vel selectos e Celso locos continet, etiamsi multo major sit harum laciniarum copia quam e notitia catalogi Biblioth. regiae colligere licet. Modus quo haec fragmenta se invicem excipiunt omni ordine caret, atque insuper nonnulla ab aliis capitulis avulsa sunt, aliis subiecta. Quamvis easdem exhibeant lacunas ac codices integros Celsi libros continentes, nihilo minus magni faciendae sunt hae laciniae; summa cura in omnibus locis dubiis inde excerptis varias lectiones. Cod. Bodleyanus 724 (Laud. E 55) saec. XIV scriptus est. Continet tantummodo partem operis Celsiani quae chirurgiam spectat, ac plerumque cum inferioris notae codd. consentit.

**) Immo nonnulli e libris typis expressis transcripti esse videntur. Inde a renovato saec. XV literarum studio multos lectores habuit Celsus; per integrum vero medium aevum fere abjectus jacuit. Affirmare quoque licet hunc scriptorem oblivioni deditum esse simulatque opus suum conscripsisset; adeo magna apud Romanos, regnantibus imperatoribus, pollebat auctoritate medicina graeca; ipsa etiam rerum ratione favente perstitit labente imperii Ror

plerique inter calligraphos fortasse, minime vero inter eruditos numerari possunt. Et enim nullum ex iis emolumentum ad orationis contextum constituendum petere licet, quum solis literarum ductibus et paginarum proportionibus eleganter componendis operam dederint. Ceteroquin mendis scatent iisque longe praeferendae sunt editiones antiquae (inprimis ed. princeps Florentina anni 1478 et Aldina a. 1528), quantumvis impuri fuerint fontes e quibus profluxerunt fere omnes: nam duos codices magni faciendos, Vaticanum dico et Florentinum, nemo in usum suum convertit editor antiquus. Praeterea mihi praesto fuit, favente egregia doctissimi Gersdorf, qui Bibliothecae Paulinae apud Lipsienses praeest, benivolentia, ingens omnis generis schedularum farrago diversarumque editionum Celsi exemplaria adnotationibus plena, quae omnia debentur eximiae doctiss. Kühnii diligentiae, qui novam editionem Celsiani operis moliebatur. Verum enim vero parum abest quin hisce collectaneis examinandis oleum et operam perdiderim.

Libri Hippocratei, quibus multa debuit Celsus, mihi saepius opem tulerunt ad emendandos locos a librariis male habitos. Quod ut agnoscas, inspicere, sodes, *Adnotationem criticam*. Plurimi editores Celso subjungunt indicem locorum Hippocrateorum a nostro adlegatorum; nec aliter mihi agendum esse duxi. Unumquemque locum denuo cum Hippocrate sedulo comparavi qualis a Littré, viro summo, editus est*). Quos locos jam suppeditant editiones priores, iis complures nunc demum addidi (cf. *Indicem locorum Hippocratis et Celsi inter se comparatorum*).

Non fugit me universum in Celsum exantlatum laborem eo tantummodo me perduxisse ut, duce Targa, immo meliore jure quam ille, fateri cogar: „Quo magis Celsianae emen-

splendore eadem auctoritas. Nec mirandum igitur quod adeo pauci reperiuntur codices antiqui Celsi opus continentes.

*) Secutus sum librorum Hippocrateorum in paragraphos distributionem a doctissimo Littré propositam. Qua solet benivolentia mecum communicavit vir omni doctrina ornatissimus schedas quarum ad exemplar edetur IX Operum Hippocratis volumen, quod paucis mensibus in lucem prodibit; unde mihi licuit Lib. II *Prorrheticorum* quasi ex ipsa hac editione citare.

dationis opus ad finem perducere festinamus, eo plures majoresque difficultates offendimus quae nos longius quam sperabamus morantur“ (Targa Morgagno; p. 489 in ed. Veron.).

Prae ceteris librum V, VI et VIII male habuerunt librarii; quibus interpolationibus autem pravisque lectionibus obsiti sunt duo priores, earum facile tibi rationem reddes considerata praescriptionum medicinalium multitudine quae in iis inveniuntur. At contra liber VIII idcirco potius depravatus est quod librarii eum transcripserunt, non intellectis rebus de quibus Celsus verba facit.

In votis est ut aliquando in lucem edam quae de vita scriptisque Celsi comperta habeo, subjectis operum deperditorum fragmentis, quae jam olim e libris cum manuscriptis tum typis expressis collegi. Verum quae his de rebus literis mandavi nondum eo perducta sunt ut jam prelo subdi possint.

Quodsi post egregia doct. Targae in Celsum merita aliquot additamentis augere mihi licuit hujus viri labores, susque deque non habebunt, spero, meorum conatuum paucitatem quicumque lectores non ignorant quantum desudandum sit editori qui mendis expurgare interpretarique constituit opus scriptoris tam varia tamque difficilia pertractantis argumenta. Illam vero inprimis eorum quae praestiti mihi exopto mercedem, ut excellentissimi quique philologi majore studio quam ad hunc usque diem in Celsum mentem advertant, hodie scilicet nimis ab iis neglectum. Ego quidem labori non parcam quo novis emendationibus expolire possim Celsianae orationis contextum, spe ductus fore ut faventibus lectoribus, divenditis omnibus hujus editionis exemplaribus, alteram moliri velit honestissimus editor.

Scribebam Lutetiae Parisiorum, Kal. Januar., 1859.

Car. Daremberg.

SIGNA PONDERUM.

P: *pondo* si junctum est cum notis aliorum ponderum quae eandem semper quantitatem significant, nec ad alia referuntur.

P per se: 1 *libra*.

)-(: 1 *denarius*.

z, seu =, seu \neg : 1 *sextans*.

zz, seu ==: 1 *triens*, seu 2 *sextantes*.

—: $\frac{1}{2}$ *sextantis* sive 1 *uncia*.

s: *semis*.

ADNOTATIO CRITICA *).

* P. 2, l. 32; item 5, 18: ἐμπειρικούς, Targa. — *empiricos* codd. Ea lectio servanda erat. Item 160, 5 fortasse *empiricos* legere debueram. Vox *empiricus* jam reperitur apud Ciceronem, *Acad.* II, 39. 7, 4 *neque [ad rem pertinere] quomodo*, Targa. — Voces *ad rem pertinereat* (... *pertinere* Med. I, Vat. VIII) glossemate additae sunt; ideoque eas sustuli. Membrum *neque, etc.* pendet non a superiore infinitivo: *pertinere*, ut voluit Targa, sed a verbo *intersit*. * 10, 7 *quam μέθοδον Graeci vocant*, Targa. — Vox *Graeci* in Med. I et Vat. VIII desideratur et expungi debet; nam, ut Targa ipse animadvertit, medici qui aut ex Graecia erant, aut ex iis regionibus ubi graece loquebantur, vocem *μέθοδος* seu *methodus* in promptu habebant. — Item 2, 2 dele voces [*apud Graecos*]; adverbium *olim* non solum ad Graecos, verum etiam ad Romanos referendum est. * 10, 21 *efficiunt*, libri omnes; *efficiunt lege*, et cf. p. 63, 2. 16, 1 *genera [et sexus] et aetates*, Targa. — Duae hae voces *et sexus* additae sunt ab aliquo sciolo. Quae in hoc ceterisque hujus libri capit. praecipiuntur omnia ad mares et feminas aequae pertinent. In hoc enim libro, ut Targa ipse monet, non de aegrotis sed de imbecillis hominibus sermo est; atque ideo observationes quas varia eorum corpora desiderant, maribus et feminis communes sunt. 16, 7 *continenter*, Targa. — *incontinenter* Med. I, Vat. VIII; et recte quidem. Targae *continenter* ex aliis codd. revocare placuit; sed perperam. Vide de hoc loco dissertationunculam quam Diario *J^{al} général de l'Instruction publique* (3. Martis 1847) inserui. * 16, 21 *paululum*, Targa. — *paulum* revocari debet ex codd. Med. I, Vat. VIII. cf. l. 33; p. 241, 35 et alibi. 18, 18 *somnus nimium vel brevis vel longus, lectus per*

*) Asterisco * notavi locos ubi emendatio nova, vel certa, vel verisimilis in meum textum reponenda est.

aestatem terra, hieme durum cubile. — Verba illa inepta: *lectus* *hieme* licet suspecta habuerit Targa, in textum tamen recepit; *lectus, terra et hieme* in codd. Vat. VIII et Med. I recenti manu addita sunt. In cod. 7028 (ubi hoc membrum bis reperitur, fo. 14 et 146) legitur ... *vel longus per aestatem. Durum cubile.* Unde apparet glossema *per aestatem* ad vocem *somnus* pertinere, idque comprobatur codd. Vat. VIII et Med. I. — Apud Hippocratem, unde hic locus manifeste desumptus est, solummodo legitur: *σκληροκοιτέειν*. Contextus denique demonstrat hic Celsum nullam distinctionem inter aestatem et hiemem in animo habuisse. 18, 21 *perfrigidi* codd. omnes quos Targa inspexit. Ego vero auctoritate permotus cod. Paris. 7028 ubi *prae-frigidi* reperitur, et Celsi ipsius qui bis voce *prae-frigidus* utitur (p. 72, 4; 136, 26), *prae-frigidi* loco *perfrigidi* recepi. Hippocrates (loco in textu laud.) *μη σφόδρα ψυχρόν* exhibet. 22, 6 ad *cullem* *tonderi* [utileque lunam vitare, maximeque ante ipsum lunae solisque occasum] *sed numquam post cibum*, Targa. — Verba uncis seclusa deliramentis astrologiae referta, ab aliquo sciolo ad marginem inepte scripta, ineptius in textum a librariis recepta sunt; et quum membrum hoc insititium miro modo consecutionem verborum turbare videretur, manus sat antiqua in cod. Med. I verbum *progredi* addidit post *cibum*! 23, 26 *omnia denique deinde fugere quae tarde concoquuntur*. Ita legitur in omnibus libris et manu scriptis, et typis mandatis; *denique* pro *deinde* et *sumere* pro *fugere* Lindenius recte legit. Hoc membrum additum esse ab aliquo sciolo Targa affirmat; ego vero non ita censeo si cap. 28 libri II, p. 70, 24—25, spectro, ubi fere eadem dicendi ratio occurrit. *24, 1—2 *uva ex olla vel ex defruto*. Ita codd. Med. I (qui prima scriptura *ollea*, secunda vero, sed antiqua, *olea*), Vat. VIII. „Ego censeo Celsum scripsisse *uva ex olla, vel olea ex defruto*; Celsus enim *uvae* ex olla et *oleas* ex pasto defrutove servatas inter res stomacho aptas (II, 24) adnumerat; *uvae* autem ex defruto neque ipse usquam memorat [quod non me movet si Columellam l. in textu l. spectro]; et Plinius (XXIII, 1, 7) atque Dioscorides (V, 3) stomacho inutiles esse tradunt“ Targa. — Revera apud Dioscoridem legitur: *Αἱ δὲ ἐκ τοῦ ἐψηματος καὶ γλυκέος (ex defruto) κακοστομαχώτερα*, et apud Plinium: „Quae in vino aut in dulci (videl. *ex defruto*) conditae fuere

caput temptant.“ cf. Gal. *Alim. facult.* II, 9, t. VI, p. 577, ubi eadem iisdem fere verbis leguntur. Insuper ex varietate lectionis cod. Med. I colligi potest Celsus scripsisse, ut voluit Targa, et veram lectionem depravatam esse ex similitudine verborum *olla et olea*.

24, 8 *At si laxius intestinum dolere consuevit quod colum nominant*, Targa. — Verba *quod colum nominant* suspecta videntur Targae; idque recte. Celsus enim qui saepius (cf. praesertim IV, 1, ubi agitur de interioribus corporis partibus) hujus intestini meminit, *latus* aut *laxius*, aut *crassius*, aut *plenius*, denique *majus* (p. 57, 4 ubi: *quod Graeci κόλον nominant* delendum nunc censeo) id vocat; nusquam vero (si locum supra laudatum eumque valde suspectum excipias) voce *colon* vel *colum* utitur. Insuper hoc membrum *quod colum nominant* eo loco ubi positum est, consecutionem verborum turbat; idque propterea in meum textum non recepi.

25, 8—9 Verba: *quod in podagra chiragra esse consuevit* suspecta sunt Targae, cui non possum assentire si cap. 7 lib. II, p. 39, 35 sqq. respicio — cf. II, 8 p. 45, 37—38; III, 27, 2, init.; IV, 31, init. 28, 17 *sed priores morbi quoque*, libri omnes. Targa recte censet vocem *priores* delendam esse. Emendatio manifesta est si vexatus hic locus conferatur cum Hippocratis textu quem Celsus fere ad verbum ex sermone graeco in latinum transtulit. Non agitur de morbis praegressis sed de iis qui oriuntur tempestatibus bene ordinatis. Praeterea notandum est codd. Med. I et Vat. VIII atque 7028 exhibere *prior*.

*28, 29 *pustulae*. — *pusula* ubique Vat. VIII pro *pustula*, Med. I et 7028 fere semper, ceteri codd. et edd. modo *pustula*, modo *pusula* exhibent; in meo autem textu (ex. gr. p. 28, 29; 44, 11; 110, 15) ubicumque *pustula* legitur errorem typosethetarum habeas.

28, 29 *abscessus corporis*, Targa. — Vocem *corporis* hic et saepius (cf. p. 98, 4: *imperari corpori potest*; 106, 23: *si imperata sunt corpori*; 252, 33: *quae manu corpori adhibetur*) inepte ad marginem scriptam sustuli, monente Targa. — Praeterea notandum est apud Hippocratem, quem hic excerptis Celsus, *φύματα*, non *ἀποστήματα*, reperiri, unde suspicari possis voces *quae ἀποστήματα Graeci nominant*, ex glossemate profectas esse. Denique verba *quam μελαγχολίαν appellant* l. 30 hic prorsus inutilia mihi videntur licet a Hippocrate legamus: τὰ μελαγχολικά. 29, 3 *tabes*, q

CELSUS.

b

Graeci φθίσιν nominant; haec interpretatio inutilis, vox enim *tabes* apud auctores latinos usitatissima; quin etiam falsa, nam apud Celsum ipsum (III, 22) *tabes* pro genere morbi habetur, cuius *φθίσις* species est. 29, 11 *exerceant*, libri omnes. *exercent* scripsi efflagitante sententia. 30, 6 et 98, 13 *φρένησιν*, Targa — *φρενῶν* ex Hippocrate ceterisque auctoribus graecis revocavi. *phrenesis* Latini vertunt (videsis ex. gr. Senec. *De ira* I, 13) unde colligere licet librarios, non Celsum, hanc vocem literis graecis scripsisse. 31, 33 *emacuit*, Targa. — *emacruit* ex plerisque codd. et edd. antiquis vulgavi, item p. 34, 13; 51, 4; 353, 3. 33, 2 *sternumentum*, Targa et ego. „Codd. Med. I, Vat. VIII hic et alibi habent *sternumentum*, alicubi *sternutamentum*; sed syllaba *ta* eadem manu, aut certe veteri atramento expuncta fuit“ Targa. Ideoque ubi in meo textu, sicut apud Targam ipsum, *sternutamentum* legitur (ex. gr. p. 39, 5; 46, 29 et 34; 47, 10; 126, 9 et 11; 180, 24; 337, 17; 343, 14), *sternumentum* reponendum est. — Modo *sternutamentum*, modo *sternumentum* exhibet cod. 7028. 34, 18 *Longas febres hunc fastidire*, Targa. — Vox *hunc*, me iudice, redundat. Item p. 36, 26, ubi Targa legit *is deorsum*, vocem *is* sustuli. 34, 20 *febres eas*, Targa. — *eas febres* scripsi cum codd. Med. I, Vat. VIII, et cum Celso ipso qui sexcenties hac ratione dieendi utitur; ex. gr. p. 93, 20; 119, 14; 130, 8; 215, 31; 277, 36; 328, 6. 39, 27 *jocinoris* — modo *jecinoris*, modo *jocinoris* exhibent codd. et edd.; scripsi *jecinoris*. Charisio enim (I, p. 48, 20 ed. Keil) si fides habenda est, haec forma usitatissima videtur; quidam, ait, dicunt: *iocinus*, *iocinoris*. 40, 7 Vocem *capitis*; item 40, 19 voces *vel hirudo* quae in codd. et editt. desunt, revocavi ex Hippocrate *Prorrh.* II, 42 et 17. Haud dubie omissae fuerunt a librario qui archetypum codicem descripsit — cf. quae notata sunt ad p. 49, 38. 43, 31 *Infra transversum septum fit abscessus* [quod *διάφραγμα* Graeci vocant], Targa. — „Plerique codd. pro *διάφραγμα*, *στέβλων* (!) exhibent. Ex ea lectionis varietate facile apparet membrum hoc quod *διάφραγμα* Graeci vocant esse addititium“ Targa, cui plane assentio. Insuper, saltem me iudice, consecutioni verborum repugnet, si post verbum *abscessus* ponatur. Fortasse idem glossema in textum irrepsit prooemio libri I, p. 7, 33; Celsus enim IV, 21, p. 121, 7 sqq. et saepius alibi *septum transversum* memo-

rans nusquam voce *διάφραγμα* utitur. 49, 22 *tormina vetera esse coeperunt*, Targa. — Vocem *vetera* ex margine irrepsisse manifestum est; ubique enim vox *tormina* simpliciter a Celso usurpatur; insuper in vexato hoc loco *vetera* repugnat verbo *coeperunt*. 49, 38 *si et cibi cupiditas non est*, Targa, qui in notis: „Particula *et* videtur redundare.“ — Codd. Med. I, Vat. VIII ita habent: *si cibi et cupiditas non est*. Particula *et* non redundat, ut censet Targa; codd. antiqui vestigia genuinae lectionis retinuerunt. Vocem *ambulationis* revocavi ex Hipp. *Prorrh.* II, 23, unde hic locus desumptus est. Ibi enim legitur: *ἐσθλείν τε ἀδύνατοι γίνονται οἱ ἀνδρες καὶ τῇσι περιόδοις χρῆσθαι*. Cf. quae notata sunt ad p. 40, 7. 55, 7 *adverso*, Targa. — *averso* reposui ex codd., quod sensui optime congruit; nec capio quomodo Targa dicere potuerit hanc lectionem esse mendosam. 56, 2—4 *In morbis longis quamvis jam et iis spatium aliquod accessit, in acutis quoque quibusdam si et levare corpus debet*, Targa. — Hic locus miro modo a librariis depravatus est; quid enim sibi voluit Celsus dicendo: *in morbis longis . . . quamvis jam et iis spatium aliquod accessit*? Emendatio manifesta omnes fugit editores, quod sciam: omnia bene habent si verba transponuntur; ideoque particula *et* minime redundat, ut Targa arbitratus est. 57, 26 *Vel malva decocta sit [si, reprimendi causa, ex verbenis]*, Targa. — „Hoc membrum *[si . . . verbenis]* insilitium esse puto, et quia mutatur constructio et quia agitur de alvo ducenda . . . ita ut reprimentia locum hic habere non possint“ Targa, cui plane assentio; itaque hoc membrum sustuli. Notandum est praeterea cum Morgagnio in cod. Foroliv. supra vocem *leni* (l. 25) scriptum esse *leniendi causa*. 59, 34 *si minus*, Targa, cum codd. Med. I et Vat. VIII, — *minus* ceteri codd. et edd.; *sin minus* legi cum Lind. cf. ex. gr. p. 207, 22; 226, 17. 60, 8 *potest ducenties [esse faciendum]*, Targa. — Ex contextu manifestum membrum *esse faciendum* ineptum esse glossema. 61, 7 *vel in alto [mari, navi]*, Targa. — Quis non videt voces *mari navi* ineptam esse adnotationem margini adscriptam? Nec volui sane *mari* cum Krausio retinere; Celsus enim (cap. 18) more Latinorum *alto* pro nomine utitur. 62, 2 *sint*, Targa. — s. Vat. VIII, *sunt* Med. I, eaque vera est lectio, cf. quae supra posui ad p. 10, 21. 62, 13 et alibi *murtetum*. non *myrtetum* cum libris optimis dedi. Item *myrrha*, non *miri*

ut saepius Targa. * 62, 32 *si eae sunt lentae levesque jamdiu male habent*, Targa. — *lenes* Med. I, Vat. VIII; *lienes* ceteri. Lubenter hic sequeremur lectionem codd. deteriorum, nisi male quadrare videretur cum iis quae leguntur l. 33 sqq. et IV, 16, init. Verisimilius igitur habemus *lentae* esse glossema vocis *lenes*, legendumque esse *si eae sunt lenes et jamdiu male habent*. 65, 5—6 *vel quae radícula [specialiter] appellatur*, Targa. — Vox *specialiter* Celso inusitata, ex margine in textum migravit. Vocem *radícula* κατ' ἐξοχήν saepius usurpat Celsus, ex. gr.: p. 19, 23; 67, 30; 73, 13. Praeterea notandum est in cod. 7028 hoc glossema sic exhiberi: *pastinaca vel specialiter radícula*. 65, 13 *grandiores [aves]*, Targa. — Vocem *aves* glossema quis dubitet? 65, 20 *gravissimi sunt ex quibus*, Targa. — Vocem *ii* quae ab omnibus codd. abest inserui, monente ipso Targa; scripserunt enim oscitanter librarii *deinde ii* (l. 21) in codd. Vat. VIII et Med. I, et 7028 (*hi*); ibique redundat. 65, 27; 70, 22; 71, 13; 249, 20: primo loco *lactens* Targa, alii *lactans*, praeter cod. 7028 in quo legitur *lactens*; secundo vero et tertio loco *lactantia* Targa; *lactentia* Med. I et Vat. VIII secundo loco, *lactantia* vero tertio; quarto *lactens* Targa, *lactans* Med. I, Vat. VIII, 7028. Si revera *lactens* significat qui lac sugit, *lactans* autem qui lac continet aut praebet, Targa recte lectionem codd. emendavit, et in meum textum p. 249, 20 *lactens* reponi debet. Non negandum tamen apud optimos auctores, saltem quales hodie typis exarati sunt, utroque sensu modo legi *lactans*, modo *lactens*. Verum, ni fallor, nondum tam accurate excussi sunt codd. msti, ut certum de his rebus iudicium ferri queat. Arbitror itaque maiorem fidem esse habendam antiquis grammaticis; sic in vetustissimo glossario S. Germ. Paris. legitur *lactans* id est *qui lac praebet*, *lactens* cui *lac praebetur*, cf. Fl. Caprum *De orthogr.* p. 2242. 67, 4—5 *quas εὐχύλους vel κακοχύλους Graeci vocant*, Targa cum plerisque codd. et edd. — *Εὐχύμους* et *κακοχύμους* reposui auctoritate Galeni. Vid. Orib. T. I, p. 567 adn. paginae 32, 2. Ceteroquin hoc membrum, Targa ipso iudice, pro glossemate potest haberi. 67, 20—21 *malva cucumis cucurbita*. — Vox *cucumis* ut Targa ipse animadvertit delenda est. Celsus enim *cucumerem* inter cibos mali succi recenset (p. 68, 2) idque recte, ut apparet ex Orib. III, 16; T. I, p. 220, 3. Verisimile est

cucumis glossema ineptum esse vocis insequentis *cucurbita*. Eaque conjectura firmatur cod. 7028 ubi non *cucumis* sed *cucumeris* prima manu scriptum, secunda deletum est. 69, 10 et 15—16 *vel punicum*; *Absinthium*, *murices purpureae cochleae* *pectines*, *murices*, *turtures*, *nuclei pinei*, Med. I, Vat. VIII, 7028 qui *pinei* omittit. Lectionem Targae nec non ceter. edd. recepi. Opinor autem in optimorum nostrorum codd. prototypo inter *punicum* et *uvae* (l. 10) nihil intersertum fuisse, post *pectines* vero hunc codicem exhibuisse *murices turtures*, *nuclei*. Ad hanc lectionem vitiosam emendandam margini adscripsit nescio quis, *murices*, *purpureae cochleae*. Qui vero primus hunc codicem exscripsit lectionem vitiosam loco suo reliquit, emendatam vero alieno loco in textum transtulit. Vox *pinei* quae cod. 7028 deest profecta est a quodam sciolo non intelligenti vocem *nuclei* vel *noclei* nihil aliud esse nisi vocem *cocleae* corruptam, quippe quae idem fere sonet. 69, 15 *cibi*, *potionesque vel frigidae vel ferventes*; *absinthium*, Targa. — Vocem *cibi* valde mihi suspectam in *cybium* mutavi. Apud Xenocratem (cf. Orib. II, 58; t. I, p. 255, 7) legitur. *Κύβιον πηλαμὺς μετὰ τὰς τεσσαράκοντα ἡμέρας ἀπὸ Πόντου ἐπὶ Μαυῖτιν ἡλμυρὴν ὑποστρέφουσα εὖστομος, εὐχνημος*. cf. Festus voce *Cybium*. Quid autem sibi voluit Celsus dicens: *cibi frigidi vel ferventes*? — Vocem *absinthium* (l. 16) expungere jubet Targa, cui non possum plane assentire. Quum optimi codd. eam post *punicum*, recentiores vero ad calcem capitis exhibeant, fieri potest ut in cod. archetypo margini adscriptum fuerit hujus herbae nomen, quod librarii deinde alii huc, alii illuc in textum transtulerunt. Notandum tamen Oribasii caput (III, 19), quo eodem modo res stomacho idoneas recenset, terminari verbis: *ὥς ἐν φαρμάκῳ ἀψίνθιον*. 69, 22 *vel ex hordeo [oleum] radices*, Targa. — *Oleum* aut glossema est vocis *pinguia*, aut lectio depravata vocis *olerum*; deest saltem in cod. Vat. VIII; *oleo* autem scribitur in 7028. 70, 6 *conchiliis*, Targa. — *conchylis* scripsi ut Graeci sermonis leges tenerem. *71, 27 *grus*, *omnes aves quae magis currunt*, Targa. — *grues*, Vat. VIII, 7028 (in eo legitur *grues*, *omnesque aves quae*, etc.); *graves* Med. I. Ea lectio, quae non est spernenda, Aristotelis auctoritate firmari videtur. Cf. Meyer *Arist. Thierkunde*, p. 295. Attamen *grus* a Celso (II, 18, p. 64, 21) recensetur inter grandes aves quae sunt generis *valentissimi* i

plurimum alimenti est. Denuo hunc locum perlustrans legendum esse censeo cum cod. 7028 *grues, omnesque aves* etc. 71, 30 *quam in [caseo] transmarino*, Targa cum plerisque codd. et edd. — *quam in eo transmarino* Med. I, Vat. VIII, 7028. *Caseo* glossema est; itemque *eo*, ut Targa ipse notat. 72, 15 *nuclei pinei et quae tertio libro ydropi enumerantur titulo XV* [in edd. cap. 21], Med. I, Vat. VIII, 7028. Verba *et quae* etc. nil nisi adnotatio margini adscripta, ut Targa ipse animadvertit. cf. quae notata sunt ad pag. 163, 18—19. 72, 26—27 *constant . . . opitulantur*, Targa. — *constent . . . opitulentur* scripsi cum codd. Med. I, Vat. VIII, 7028. 73, 7 *herba muralis, παρθένιον vel παρόλιον appellant*, Targa. — Lectionem quam recepi, etiamsi repugnante Morgagnio, firmare mihi videtur Plinius. Apud hunc enim auctorem legitur: „Parthenium alii leucanthes, alii amaracum vocant, Celsus apud nos *perdicium* et *muralem*“ (XXI, 30, 104 ed. Sillig.). *73, 29 et 221, 2 *git*, Targa. — Scripsi modo *git* modo *gilh*; sed perperam ut apparet ex Plinio (XIX, 7, 167) ubi vide Sillig. cf. etiam Charisium p. 131, 7 sqq. ed. Keil. In vetustissimo glossario S. Germ. n°. 12 *git* reperitur. 76, 32—33 *si paulo graviora [facile sit]*, Targa. — Verba *facile sit* glossema quod expunxi; membrum enim: *si paulo graviora* pendet a: *satis sit* (l. 31). 77, 28 *aut nihil remittunt [sed continent]*, Targa. — *Sed continent* alicujus scioli adnotatio marginalis est, Targa ipso iudice. 80, 8 *neque imbecillitatem fame prodat*, Targa, qui vocem *imbecillitatem* deleri, et *perdat* pro *prodat* legi iubet. — Ego vero lectionem codd. retinui; neque verbum *prodat*, neque vox *imbecillitas* hic repetita sermoni Celsiano repugnare mihi videntur. 80, 26—28 [*adèo ut Hip-pocrates . . . sit solitus*] — Enarratio margini adscripta quae in textum migravit. In codd. vero et in edd. inserta fuit post verbum *darent* (l. 34), ubi satis male cum praegressis cohaeret; saltem post *nominabant*, Targa ipso docente, transferenda, vel potius, me iudice, omnino expellenda est. 83, 13 *remissio est [aegro]*, Targa. — Vox *aegro* (*aegris* nonnullae edd.) glossema est. Codd. Med. I, Vat. VIII habent: *remissior est aeger*. Unde fluxerit varietas lectionis facile intelligi potest. 86, 29—30 *qua [male — mole Lind.] plerique aegros in ipsa febris impetu [potissimeque i febris ardens est] male habent*, Targa. — Verba uncis inclusa

e margine in textum migrarunt. Vocis *male* iteratio hanc opinionem firmat. *89, 38 et 90, 1 *non defectio, non dejectio, non profluvium alvi fuit*, Med. I, Vat. VIII; *non dejectio non profluvium alvi fuit* ceteri codd., editionesque et Targa, qui verba *non profluvium* expellenda esse censet. In cod. archetypo scriptum erat ni fallor *defectio*, idque seu a primo, seu ab altero librario in vocem *dejectio* mutatum est. Postea haec vox *defectio* in textum juxta alteram *dejectio*, quae non erasa erat, recepta est. Insuper *profluvium alvi* adscriptum videtur ad interpretandam vocem *dejectio*. — Nonne *defectio* (videl. *animi*) hic aptior esset quam *dejectio*? 90, 9 *decessionibus* [ut aliud morbi genus videri possit], Targa. — Verba ut possit, glossema est suo loco motum; pertinent enim ad ea quae leguntur l. 10—11: *ut quod idem est non idem esse videatur*. 92, 3 *pitacia*, Targa. — *pitacia* edidi; graece enim *πύττασις* scribitur. *93, 13—14 foetoremque quemdam oris quem ὄξην Graeci vocant, omnes. „Verba haec ab aliquo sciolo addita videntur. Mulliculae aiunt ex pravo quodam odore quem aliquis ab ore efflat se noscere hominem febricitare“ Targa idque recte. praeterea notandum est, si fides habenda *Thesaurus linguae gr.*, hanc vocem ὄξην nusquam alibi reperiri; saltem scribendum erat ὄξαινα ὄξαινα autem non oris sed nasi apud auctores Graecos foetorem designat, unde patet membrum: *quod genus Graeci ὄξαιναν appellant tollendum* etiam cap. 8 lib. VI, p. 244, 26; cf. VII, 11, p. 286, 19 ubi haec vox recte usurpatur. 93, 15 *quotidie* [parum] *cibum dandum*, Targa. — Vox *parum* inepte addita est; Celsus enim praecepit non qui modus cibi, sed quo die dandus; insuper nusquam dixit *cibum parvum* sed *exiguum*: ex. gr. II, 12, p. 57, 28. — cf. tamen quae notata sunt ad p. 140, 24. 95, 17 *ut hoc* [ipso] *ordine*; Targa. — Vox *ipso* tollenda est; ordo enim non antecedentia sed sequentia spectat. 95, 23 *postero die* [qui vacat], Targa, Med. I, Vat. VIII. — Voces uncis inclusae certo spuriae sunt; quis enim non intelligit in tertia, quae ex toto intermittit, alterum diem esse integrum? Ceteroquin cf. III, 3. Ceteri codd. verbis *qui vacat* substituerunt *quo cibo vacat*, ut probabilior inde sensus emergeret. 97, 1 *subsistendum*, Targa. — *sistendum* e codd. Med. I et Vat. VIII revocavi. 100. 26 Post verbum *inducunt* in omnibus et codd. et edd. legitur:

nomen (videl. *sycamini lacryma*) apud medicos reperio; sed cum Graeci morum *συκάμινον* appellent, mori nulla lacryma est. Sic vero significatur lacryma arboris in Aegypto nascentis, quam *μορόσυκον* appellant. Plurimi decoctis papaveris corticibus, ex ea aqua spongia os et caput foveant. — Nullus quod sciam editor animadvertit haec verba nil nisi scholion esse, miro modo contextum depravans. cf. p. 236, 26—31. 102, 29 quod genus insanientium specie simile, similique victus genere curandum est, Constant. Lind. Targa, — specie similique libri antiqui omnes. Locus hic a librariis certo depravatus est; si codicum lectio servatur, sensus non constat. Si legitur *specie simili*, vox *species* pro medicamento a Celso usurparetur, sed nusquam alibi, quod sciam, hoc sensu occurrit; si autem *genus* simile legamus, minus elegans dicendi ratio videtur. Fortasse, ut Targa censet, vox *insanientium* vel tollenda (cf. III, 12, p. 113, 16 et IV, 12, p. 137, 1) vel mutanda in *insaniae*, ideoque legere maluerim: quod genus *insaniae simili victus genere curandum est*, voces *specie simile* seu *simili*, et particulam *que* pro glossematibus habens. 104, 24 quodlibet aliud [haec enim cum comburentur odorem foedum movent], Targa. — Membrum uncis inclusum glossema videtur loco suo motum; pertinet enim ad verba *galbanum ... pilos ... cornu cervinum*. *105, 29 Verba *ὄδωρα* Graeci vocant, si locum quem tenent spectas, glossema videntur. 107, 2 sudationes sunt [quales super Baias in murtetis habemus], Targa. — Haec verba *quales* habemus, ut docet Targa, ab aliquo enarratore ex cap. 17 libri II margini adscripta fuerunt, et inde in contextum irrepserunt. *118, 27 *lactucae marinae quae grandis juxta mare nascitur*. Non dubito quin verba: *quae* nascitur addititia sint; ideoque tollenda esse judico (cf. Plinius XXVI, 8, 39). Targa dubitat an Celsi haec verba sint necne. 112, 18 *praecipueque [vel ex prima — ex pruna Med. I, Vat. VIII, 7028] cerebellum*, Targa. — Verba *vel ex prima* seu *pruna* scholion sunt loco suo motum; pertinere enim videntur ad voces: *ex media*. Morgagnius putat sub mendo latere nomen cuiusdam animalis; idque sane suspicari possis. *112, 26—27 *quas ὠμοπλάτας Graeci vocant*. Dubito an haec verba quae prorsus hic inutilia videntur, sint Celsi necne. De graecismo autem *quas* cf. p. 788, 24 et quae notavi ad p. 171, 12. 113, 5 et *mellis pars*

altera [praecipua tamen ex his omnibus sunt victus, vehiculum et navis et sorbitio], Targa. — Omnia verba uncis inclusa inepta, ut Targa ipse docet, ineptius etiam e margine in textum migrarunt. Praeterea notandum est vocem *vehiculum* (de quo Celsus nullam fecerat mentionem) desiderari in codd. Med. I et Vat. VIII. Haud dubie hoc scholion, loco suo motum, pertinet ad verba: *adjicere debet exercitationes* etc. l. 7—8. 115, 32 *utique*, Targa cum Lind. — *Ubique* reposui ex codd. et edd., licet fere eodem textu saepius *utique* a Celso usurpetur, ex. gr. p. 104, 32; 113, 5; 144, 33; 197, 25; 230, 14; 273, 37; 319, 16; 341, 9. 116, 12—13 *imposita*, Targa. — *superimposita* ex codd. Med. I, Vat. VIII revocavi. *117, 6 Verba ἀποπληξίαν hunc Graeci vocant, certo e glossemate profecta sunt, Hippocrates enim unde locus iste descriptus est voce βλητός utitur. 119, 15 *digerunt ut dissipetur*, Targa. — *digerunt, dissipetur*, Med. I, Vat. VIII, *digerunt ut dissipentur*, alii. Ideoque *digerunt, dissipentur* (videl. *suppurationes*) scripsi; conjunctio ut a qua pendet verbum *dissipentur* e particula *ne* (l. 13) petenda. 119, 24 *avellanae*, Targa. — Cum codd. Med. I, Vat. VIII *avellanae* scripsi. *123, 11 *quam κεφαλαίαν Graeci vocant*, omnes. Haec verba ex glossemate addita videntur; Galenus enim ceterique auctores *κεφαλαίαν*, non *κεφαλαίαν* morbum hic a Celso indicatum nominant. 125, 6 *os cum motu quodam pervertitur [ideoque nihil aliud est quam distentio oris]*, Targa. — Membra uncis inclusum nihil aliud est quam scholion margini adscriptum ad interpretandum: *os cum motu* cet. Insuper, ut Targa ipse animadvertit, *distorsio*, non autem *distentio oris* Celsus scripsisset. 125, 15 *calida [vel] marina*, libri omnes et manu scripti et typis exarati. Particulam *vel* expunxi, monente Targa. cf. III, 27, 1, p. 18, 9; IV, 2, p. 124, 11—12. 130, 7 *circa*, Targa. — *citra* scripsi cum codd. Med. I, Vat. VIII, 7028, et fere omnibus aliis; sensus idem manet si lectio antiqua servatur. *131, 24 *vulpinum . . . pulmonem . . . sed sine ferro coctum*, Targa cum omnibus libris et ego; — . . . *tamen sine ferro coctum* 7028. Plinius (XXVIII, 197 ed. Sillig) scribit: „Jocur quoque volpinum aut pulmo in vino nigro . . . laxat meatus spirandi“. Cf. Sextus Placitus cap. 3 § 5. Quid autem Celsus sibi voluit dicens *sed sine ferro coctum*? ex Marcello Empirico intelligere licet. Apud hunc enim auctorem (cap. 17) legitur: „Profuit

ad suspirium, vel dyspnoeam depellendam pulmo vulpis, vel jecur in olla fictili exustum, atque ad cinerem redactum.“ Itaque si-
grum interrogandi post ferro positum dele. 137, 7 *Simbruinarum*, Targa cum fore omnibus codd.; — *Simbruinarum* scripsi;
cf. Tacit. *Annal.* XI, 13 et XIV, 22. 138, 6 [*Et*] *initium*, Targa.
— Particula *et* redundare videtur, ut Targa notat. * 138, 10;
139, 26; 140, 32 verba *πλευριτικός — περιπνευμονικόν — ήπα-
τικόν* mutanda sunt, ni fallor, in *πλευρίτις — περιπνευμονίαν —
ήπατιτιν*. * 139, 4 *danda sint ex ratione [vel adjectae vel] le-
vatae febris apparebit . . . cum eo tamen*, Targa. — Vox *adjectae*
hic monstrum est, ut jam monuit Lindenius qui *adauctae* legere
jubet; sed nec *adjectae* nec *adauctae* retinere volui. Quum enim
Celsus dicat, quibus temporibus cibi dandi sint, ex ratione levatae
febris apparere, eosque in maxima remissione dandos esse jubeat,
inepte interjiceret seu *vel adjectae* seu *vel adauctae*. Praeterea
notandum est voces *vel adjectae vel* in cod. 7028 desiderari. in eo
enim legitur: *danda sint usquedum levatae febris apparebit cum eo
tamen ut*, omissis verbis *sic ut . . . dentur*; quae ex glossemate
explicandi causa addita videntur. * 140, 24 *purum aerem*, Targa
et ego. — Hoc autem loco denuo perlustrato vox *parvum*, quam
exhibent codd. Med. I, Vat. VIII et 7028, nunc anteponenda mihi
videtur. cf. tamen quae notata sunt ad p. 93, 15. * 142, 16 scri-
bendum est *intubique ex eodem, betae ex sinapi, asparagus, et*;
cf. Plin. XIX, 133, ubi legitur: „ . . . ut lenitas (betae) excitetur
acrimonia sinapis.“ 142, 30 *Fit ex unguento et palmulis [quod
μυροβάλλανον Graeci vocant]*, Targa. — Quae verba uncis inclusa
sunt vel reliquis glossematibus ineptiora, ut Targa ipse do-
cuit. * 143, 31—32 verba: *Ergo eo nomine morbum hunc χο-
λέραν Graeci nominarunt*, sunt mihi valde suspecta. *χολέρα* enim
non a *χολή* sed a *χολάς* provenit (cf. Alex. Trall. VII, 14 et
Orib. T. II p. 836); temporibus tantummodo vel recentibus vel
recentissimis voce *χολέρα* seu pro bile, seu pro bilis effu-
sione usi sunt. 144, 7 *ob omni*, Targa, haud dubie typo-
thetarum σφάλματι. Scripsi *ab omni* cum codd. et edd. * 144,
34—35 *paulatim se cibo reficere somno quisquis facile acquiescit
(acquiescere, 7028) itemque lassitudine et frigore*, omnes libri an-
tiqui et Targa, qui notat aliqua deesse post verbum *acquiescit*.
Nec sensus ex his verbis elici potest, nec ordo verborum constat.

In margine Constant. legitur ... *somnoque qui facilis acquiescit, vilataque lassitudine et frigore.* apud Lind. autem: *somnoque quisquis facile acquiescit; vilatque lassitudinem et frigora.* — Apud Philumenum (Aëtius IX, 12, p. 450, c. ed. Steph.) reperitur: *somnus procurandus et quies omni modo.* Nonne verba somno ... *acquiescit* glossema sunt pertinens ad: *dormire oportet* l. 33, et itemque *lassitudine et frigore* transferri debent post verbum *abstinere?* 145, 31 *vinum [vel aquam] bibere*, Targa. — Duae voces *vel aquam* tollendae sunt. Celsus enim jubet pluvialem aquam decoctam potui dari, altero vero die vinum.

147, 5 *et sive frigus subit*, Targa. — *et sive quum (cum codd.)* ex libris antiquis revocavi. *147, 28 Verba *ὄνσεντεπλά* Graece vocatur, ex glossemate profecta esse videntur; supra enim jam saepius (cf. ex. gr. p. 29, 29 et 35; 43, 1; 49, 22; 149, 3; 150, 22 et 35) vocem *tormina* adhibuit Celsus, nulla interpretatione addita. Nec minus Cato (R. R. 156, 5; 157, 9) eodem sensu hoc vocabulo usus est. Notandum praeterea nullam interpretationem adhibitam fuisse cap. 23 huius libri, ubi de levitate intestinorum agitur. 148, 12 *vel ex dura muria edisse [cibos potionesque eas quae astringunt alvum]*, Targa. — Membrum uncis inclusum nil nisi scholion loco suo motum; pertinet enim ad sequentia: l. 21—22; 26—28. — cf. l. 36—37. 148, 36 *quae supra comprehensa sunt. [Valensque est etiam adversus cancerem intestinorum minii gleba cum salis hemina contrita, si mixta his aqua in alvum datur]*, Targa. — Adnotatio margini adscripta, ut Targa ipse notat; nec meminit enarrator Celsum non *cancerem* sed ubique *cancrum* scripsisse. *150, 7 *duas potiones sumat. At aquae, vel muriae durae sit adjecta*, Targa cum plerisque codd. — *duas potiones sumat aut aquae vel muriae durae sic adjectae*, Med. I et antiq. edd. Legere jubet Targa: *duas potiones sumat aquae cui sal vel tertia pars muriae durae sit adjecta* (videl. ad purgandum). Emendatio, me iudice, minime apta; hoc enim membrum *At aquae*, etc. mihi videtur respondere ad ea quae leguntur p. 157, 23. Fortasse addendum erat *marinae* post *aquae*.

*150, 35 *in torminibus*, Targa cum Constantino qui docet Celsum alibi eodem modo loqui, ex. gr. IV, 12, p. 136, 22; VII, 33, p. 322, 17. *in tormina* libri antiqui, quae lectio servari potest; sermoni enim Celsiano non repugnat. 152, 5—6 *pira tarentina* ...

mala scandiana, myrapia codd. et Targa qui legere jubet: *pira tarentina* *vel myrapia, mala scandiana*. Ego malui ordinem verborum non mutare et [*pira*] *myrapia* scribere. 152, 30 *vel rubi decocti sint [polata]*, Targa. — Vox *polata* inepte sensum turbat. Notandum etiam, Targa ipso monente, Celsum *potus*, vel *epotus*, sed nusquam *potatus* scribere. 153, 12 *si parum [est]* et ibid. l. 32—33 *ex rosa [fiel]*, Targa. — Voces *est* et *fiel*, hic sermoni Celsiano repugnantes, tollendae sunt. 155, 21 *comprimentibus* codd. „Malim *reprimentibus* [cf. III, 18, p. 99, 29—30; IV, 31, p. 158, 12], sed cum Celsus cap. 22 huius libri scripserit: ‘subluere aqua calida in qua decoctae verbenae sint’ hic vox *comprimentibus* [vel *reprimentibus*] videri potest ex glossemate addita“ Targa, qui et *reprimentibus* et *comprimentibus* tolli jubet, quia, ni fallor, verbenam peculiarem stirpis speciem habet; sed perperam. 156, 33—34 Verba: *quae in podagris chiragrisve esse consuerunt*, Targa suspecta habet. Vid. tamen I, 9, p. 25, 8—9 et quae ibi notantur; II, 8, p. 45, 37—38. 158, 18; 163, 11; 175, 21; 236, 24 *lapis asius*, Targa; *lapis assius* scripsi. Graeco enim sermone dicitur ἄσσιος (ἐν ἄσση γεννώμενος) λίθος. cf. Diosc. V, 141; Gal. *Simpl. med. facult.* IX, 11 § 9, t. XII, p. 202. 159, 2 *negotiosa cogitatione [vel actione]*, Targa et plerique codd. — *negotiosa actione* Med. I. *Vel actione* glossema mihi videtur quod in Med. I textum genuinum expulit. Quid enim sibi voluisset Celsus dicens *actio negotiosa in ambulando?* *Negotiosa cogitatio* solum, Targa ipso iudice, ferri potest. 162, 7—8; 11; 13 *auripigmentum, quod ἀρσενικόν a Graecis nominatur [huic autem et sandarachae in omnia eadem vis, sed validior est] bdellium [quod in omnia idem quod ammoniacum potest, sed valentius] coagulum ... leporinum [cui eadem quae ceteris coagulis facultas, sed utique validior est]*, Targa. — Tria membra uncis inclusa eandem speciem eandemque originem habent, et ordinem quo medicamenta simpliciter enumerantur, miro modo turbant; ideoque pro adulterinis habenda sunt. Ceteroquin vide quae Targa ibi notavit, p. 216. — Praeterea voces *quod ἀρσενικόν* etc. addititiae videntur; cf. p. 161, 23 ubi rectius has voces Celsus scripsit. * 162, 30—31 *resina*, Targa et ego. Haec vox delenda est vel quia alieno loco inter semina inseritur, supra jam resinae speciem memoravit Celsus. — Saltem

legendum est *resina arida*, quum superius (l. 24—25) legatur *resina terebinthina humida*. — Item vox *fel* vel eradenda, quum l. 29 de felle taurino loquatur, vel mutanda est in *sol*, ut legitur apud Constantinum. — Denique voces [*soleumque earum*] post *nuces amarae* positas recipere nolui, quum jam superius (l. 27—28) *oleum ex amaris nucibus* Celsus scripserit. 163, 6 *eruca*, Targa. — *cicuta* libri omnes quos sequor. Si enim *cicutae* semen rodit (vid. p. 162, 30), cur non exedere potest? Atqui *cicutae* semina inter ea quae molliunt a Celso adnumerantur (cap. 15, p. 165, 8), Celsus autem ipse scribit II, 33 p. 73, 3 „*quae calefaciunt et digerunt, emolliunt*“. cf. Diosc. IV, 79; Plinius XXV, 151 sqq. 163, 7 *calx [acetum]*, Targa. — *acetum* infra ponitur post *vinum*, idque aptius, ut Targa censet. Fortasse haec vox, seu post *calx*, seu post *vinum* posita, glossema est. *163, 8 quae *τιθύμαλλος* a Graecis nominatur, Targa. — Glossema ineptum lactucae marinae, quae herba, nisi fallor, graece vocatur: *φῦκος θαλάσσιον*. Cf. II, 12, 1, p. 56, 19—20; III, 21, p. 108, 27; V, 18, 13, p. 169, 10, ubi nulla fit mentio Graecorum; ideoque haec voces tollendae sunt, Targa ipso monente. *163, 18—19 *lac utrumque* (videl. lac caprifici, et lactucae marinae) *quod proximo capite supra comprehensum est*, Targa. — Verba literis inclinatis exarata, quae nullus editor, quod sciam, obelo notavit, mihi valde suspecta sunt; nusquam enim video Celsum in capita, sed in volumina (sc. *libros*, ex. gr. cf. p. 263, 23) opus suum divisisse. Semper hac dicendi ratione utitur: *quae supra posui*, seu *proposui*, seu denique *scripta sunt*. Saltem verba *proximo capite* delenda sunt; cf. quae notata sunt ad p. 72, 15, ubi de glossemate recte iudicavit Targa idque omnino expulit. *164, 26 *ochra attice mel asteriae*, Targa qui *mel erythace* coniecit cum Caesario vel *astyrice* seu *astirice* codd. vel *asteracae*, edd. antiquae; vel *asterica*, Manutianae. Hoc loco denuo perlustrato nec Targa conjecturam nec textum Caesarii servandum esse censeo. Equidem puto nomen regionis unde altera ochrae species petita est, sub mendo *astyrice* latere; praeterea legendum est *ochra attica* (item p. 170, 2 *ochra quae attica nominatur*. — Cf. Plinium). *165, 8—9 *σκόριαν μολύβδου* Graeci vocant. Nonne haec verba ex glossemate? Eadem reperiuntur p. 176, 24, ibique a Targa obelo notantur. 166, 2 *in sex partes [id est sextantes]*, ut

idem in sextante denarii habeam, Targa cum Lind. — *In sex partes, id est sex uncias ut idem in uncia denarii habeam* inepte codd. et fere omnes edd. Haud dubie in cod. archetypo scriptum erat sicut edidi; interpres quidam contra vocem *sextantem*, in *sex partes*, margini adscripsit, alius autem ineptius: *in sex uncias* — utraque interpretatio in textum irrepsit, veramque lectionem expulit. Insuper vid. p. 175, 21. 166, 6—7 dubito an sint Celsi verba quos *τροχίσκος* Graeci vocant, necne. Vox enim *pastillus* saepe apud auctores Latinos Celso antiquiores eo sensu reperitur. 167, 5 *ut in hydropico et in lateris dolore* Targa. Duae voces in *hydropico*, licet alibi (ex. gr. VII, 15, p. 292, 15) Celsus voce *hydropicus* utatur, Targae suspectae sunt; quae enim sequuntur omnia morborum sunt nomina, non agrotorum. 167, 29 *et lieni [abscessibus et strumae, parotidibus, articulis calcibus quoque suppurantibus aut aliter dolentibus, etiam concoctioni ventris]*, Targa. — Omnia verba uncis inclusa inepta sunt, ut Targa ipse notat, atque praeterea Celsiano sermoni repugnant. Ubicumque enim eadem medicamenta composita Celsus exhibet ac Galenus, omittere solet prolixas *ἐπαγγελίας*, quae saepius apud hunc auctorem descriptiones eorum inchoant. *168, 10—11 *sycamini quam alias sycomorum vocant*, Targa. — Verba uncis seclusa mihi aequae ac Targae suspecta sunt, et quia desunt etiam apud Galenum loco in textu laudato, et quia interpretatio minus recta videtur. 168, 26 *crocomagmatis [quod quasi recrementum ejus est]*, Targa. — Verba uncis inclusa addititia esse videntur, ut Targa ipse probavit. *169, 11 *quod ἄντρον Graeci vocant*, Targa. — Haec verba ex glossemate addita mihi videntur, et quia prorsus inutilia, et quia in cod. 7028 desiderantur. Praeterea notandum est hunc codicem aliam ac ceteros eamque aptiorem hujus capituli divisionem exhibere. Post verba: *sulphuris ignem non experti legitur: pares portiones. Hoc autem quod Niconis est: faecis aridae aceti . . . salis ammoniaci cardamomi (vox sinapis deest apud Galenum) . . . contunduntur*. Revera apud Galenum loco in textu laud. (t. XIII, p. 343—344) duae medicamenti compositiones inveniuntur quae divisioni cod. 7028 apprimè respondent: ideo vox *resinae* (l. 13) quam abundare Targa putabat, recte se habet. Lindenius eandem hujus capituli divisionem habet, sed unde

eam petierit, ignoratur. cf. quae notata sunt ad p. 247, 35. 169, 16—18 verba *Expediit* *portiones* cod. 7028 omittit ibique legitur: *Alia* (aliud) *in quo* etc., idque fortasse recte. Vix dubium certe quin sub lectione corrupta *seminis* vel *simini*, ut habent codd., lateat nomen animalis cujus stercore ceteris medicamentis simplicibus addere jubet Celsus. 169, 22—23 *orientia tubercula* [quae *φύματα* vocantur]; Targa. — Voces quae *φύματα* vocantur tollendae sunt, ut Targa ipse docet, nam apud Celsum *φύμα* est peculiare genus tuberculorum (cf. V, 28, 9 *init.*). Item p. 170, 5 membrum quod *φύμα* vocatur, post *tuberculum* et l. 18 vocem *φύματα* post vero delevi. Obiter notandum est cod. 7028 ut Lind. *carcinomata* non *καρκινώδη* exhibere. Cf. quae notata sunt ad p. 247, 35. * 169, 33 *μελικηρία* (lege *μελικηρίας* et vide *The-saur. ling. gr.* sub voce, — cod. *melicera*) [id est *favi*, vel *φύματα*], Targa. — Legi *μελικηρίδας* cum Lind., sed perperam; quodsi verum est Celsum tentatum hunc locum in mente habuisse, quum de favis, seu *κηρίδες* agens (V, 28, 13, p. 216, 25) scripsit: *aut quae proprie huc pertinentia supra posui*, nec *μελικηρία* (seu rectius *μελικηρίας*) nec *μελικηρίδας*, sed potius *κηρία*, ut Targa censebat, vulgare libet. Celsus enim *κηρία* a *μελικηρίδι* ipse discernit (cf. V, 28, 13 et VII, 6). Praeterea monendum est voces id est *favi*, vel *φύματα* vel inutiles, vel ineptas esse, ut Targa ipse docuit. cf. quae notantur ad p. 169, 23—24. 169, 37 *panum*, Targa. — cod. Med. I, 7028 *panem*; cet. *panum* seu *pan-num*; p. 211, 27 *panum*, Targa; *panem*, codd., p. 265, 10 *in pane* Targa cum codd. — Ubique *panus* reposui. Cf. Non. Marcellus sub voce; Varr. *Ling. lat.* V, 22, p. 108 ed. Spengel; Plinius passim, et ea quae de hoc verbo disserui in diario *Gaz. médicale*, 1847, p. 43. 170, 29—30 *στοματικά*, Targa cum codd. et edd. — *ἀναστοματικά* Lindenio duce, reposui cum Galeno. * 171, 3 *Ad ossa*, omnes; *Ad spissa*, 7028. Ea lectio non est spernenda; multa enim in hoc cap. medicamenta quae discutiunt vel digerunt, vel denique resolvunt, reperiuntur. Quid autem his verbis *ad ossa* simpliciter positus, Celsus sibi voluisse potest? 171, 6 ante voces *ficus aridae*, in cod. 7028 legitur: *In alios emplastrans*. Fortasse hic nova inchoat praescriptio, ideoque legendum est *In alio: emplastrum: ficus aridae*, etc. * 171, 12 quae *ἀγχύλις* Graeci nominant, Targa. — Scribendum erat *quos*, vel potius more Grae-

corum *quas* (cf. ex. gr. p. 112, 26—27 et quae ibi notavi; — 176, 18; 288, 13. 14. *quas* in cod. 7028. Dubium est haec verba sint Celsinum necne. Hoc capitulum sicut et capitula 29 et 22, ni fallor, male habuerunt librarii. 171, 23 *Cleophantis* loco *Ctesiphontis* 7028, sed perperam si Galenum (loco in textu laud. t. XIII, p. 936) spectro. 172, 22 *ἀλλκαινα*, Targa. — Cum Constantino *alipenae* ex codd. revocavi. At si fides *Thesauro ling. gr.* habenda est, haec vox *ἀλλκαινα* nusquam alibi reperitur; *ἀλιπῆ* Galenus, *ἀλλκαντα* Aëtius scribit. 174, 13—14 *aceti sesquicyathos olei minus cyathos*, Targa. — *sesquicyathos* (—thi 7028) *cyathum* libri antiqui. Quam edidi vera lectio videtur. Cf. VI, 7, 1, p. 240, 16—17. 174, 14—15 [*τεθεραπευμένα* *Graeci appellant quae*] *curata vocant* *exemptae sunt [ex alio medicamento]* Targa. — Quae ante *curata* leguntur nexum verborum turbant; ex altero vero glossemate nullus sensus elici potest. Haud dubie in margine scriptum erat ad verba *ex sevo*: *aut ex alio medicamento*. 174, 17 *quae ipsa quoque ἐπισπαστικά nominantur*, cf. § 9 p. 173 et 167, 2. *175, 35 *spuma argenti concoquitur*, omnes. Nonne adnotatio est margini adscripta quae pertinet ad primam vel ad secundam compositionem hujus capituli et quae ex § 24 petita est? *176, 8 *sunt etiam alba lenia*, *λευκά Graeci vocant*, Targa. — Alia sunt alba, alia vero lenia emplastra, ut appareat ex Galeno, nec non ex Celso ipso (cf. § 25); ideoque, me iudice, *lenia* profectum a voce *λευκά* literis latinis scripta, delendum est; membrum autem *λευκά Graeci vocant* textui restituendum est. Cf. l. 18—19. 176, 16 *percandida compositio [quae supra posita est]*, Targa. — Tres ultimae voces, ut ordo ipse verborum indicat, miro modo sensum turbantes, inepte in margine adscriptae, ineptius in textum translatae fuerunt. 177, 9 *illinere*, Targa. — *illinere* scripsi cum codd. et edd. 177, 34 *sanguinem [vel cancrum]*; Targa. — *Vel cancrum* sustuli eo quod nulla hujus vitii fit mentio apud Galenum (loco in textu laud.). — Item p. 180, 18, voces *[vel ad cancrum]* post *ad ignem sacrum* addititiae videntur, Targa ipso iudice. 178, 9 *Haec tria compositionum genera [id est, quae in malignatis, pastillis emplastrisque sunt]*, Targa. — Membrum uncis inclusum nil est nisi adnotatio in margine adscripta, ut Targa ipse notat. 181, 7 *malobathri* Targa. — *malabatri* 7028, *malabathri* Med. I, Vat. VIII; idque

recte, auctore Chr. Lassen (I, p. 281). * 181, 9—10 Post vocem *petroselinum* etc. delendum est *trifolii p.*)-(*V.* In codd. enim Med. I, Vat. VIII, 7028, loco *trifolii* legitur *folii*, unde facile conicias haec verba loco suo motum glossema esse vocis *malabathri* supra (l. 7) inveniundae. Ceterum in contextu idem est pondus *malabathri* quod *trifolii*. Item (l. 37) haud dubie tollendum est *folii* post *malabathri*; idque nullus editor, quod sciam, animadvertit. 182, 32 *Vinum* [et id quod specialiter sic vocatur] et *murteum*, Targa. — Verba uncis inclusa ineptum glossema sunt; Celsus enim non de vino murteo sed de oleo murteo agit, ut Targa ipse notat (cf. V, 22, 2 et VI, 8). Insuper vox *specialiter* apud Celsum inusitata est. 182, 32—33 *conficiantur*, Targa; *conficiantur* revocavi e codd. 183, 17 *sive lippitudo* [sive *dentes*], Targa. — *sive dentes* omittit cod. 7028, idque recte; his enim vocibus aegritudinum enumeratio turbatur; saltem aptius esset si ante *sive coxa* hae voces traductae fuissent. 183, 30 *manipulus* [qui manu comprehendi potest], Targa. — Quis non videt membrum uncis inclusum glossema esse vocis *manipulus*, ut Targa ipse notat? 184, 1 *adjecto*, Targa. — *adjectis* e codd. revocavi; item *succo* codd.; *succi* autem cum Targa legendum est. 186, 9 *in difficili rem esse*, Targa. — *spem* loco *rem* habent Med. I, Vat. VIII, 7028; itaque nil mutandum erat. 187, 31 *rubens*, Targa. — *rubet* Med. I, Vat. VIII, 7028, quod servandum erat. 188, 1 *biliosus vomitus*, Targa. — *bilis vomitus* e codd. Med. I, Vat. VIII, 7028 revocavi, cf. l. 12 et 26. Item p. 194, 2 *vomitibus bilis* cod. 7028 exhibet, ubi *vomitibus biliosus* ceteri omnes habent. Nonne hic quoque *bilis* loco *biliosus* scribendum erat? cf. tamen p. 40, 33 ubi libri omnes *vomitibus biliosus* habent. 188, 27 *id redditur cito* Lind.; idque recte, ni fallor; [ea] *redditur cito*, Targa qui *id* vel *ea* (ut habent codd.) abundare censet. * 188, 34 *percussa*, Targa. — *discissa*, Lind. et ego (cf. p. 7, 31; 302, 25; 334, 15); *discussa* codd., quae lectio servari poterat. 189, 13 *sanies* [est], Targa qui recte vocem *est* eradi volebat. 189, 16 (cf. l. 38) *μελικήρα*, Targa. — *melicera* Med. I; *μελικήρα* Ruellius; ceteri *melitera*; idque recte; vocem enim *μελικήρα* seu *μελικηρία* quae nusquam alibi reperitur librarii finxerunt; eaque non recipi debebat in *Thesaurum ling. gr.* Haud dubie Celsus *μελιτηρά* seu *melitera* scripsit. Cf. quae notata sunt a

169, 33. 189, 36 *acer*, Targa et ego; *ater* Med. I, Vat. VIII omittit 7028; idque fortasse recte si scribitur *ater*; haec enim vox alionus scioli glossema esset adversus *sublividus* vel *suppallidus* margini adpositum. 190, 37 *a diversa*, Targa et ego cum codd. Med. I, Vat. VIII, 7028; *adversa* ceteri. Fortasse legendum est *diversae parti* (cf. II, 11 p. 55, 35). 193, 21 *abstinere* *a cibo debet*, Targa. — *abstinere* *cibo debet* Med. I, Vat. VIII, 7028, idque recte; sic legitur apud Livium VIII, 24, 18 „*abstinere direptione praedaque*.“ 194, 10 *detergenda*, Targa. — *tergenda* Med. I, Vat. VIII, 7028 quorum lectio non erat mutanda. 194, 16 *rubicundum esse [ulcus]*; p. 197, 27 *purum [ulcus]*, Targa. — utrobique *ulcus* ex glossemate. 196, 16 *pericula*, Targa. — *periculosa* Med. I, Vat. VIII, 7028, eamque lectionem retinendam censui. * 197, 9 *accedit*, omittit 7028 idque fortasse recte, sermonis Celsiani ratione habita. 197, 25 *magnum*, Targa, 7028; *majus* Med. I, Vat. VIII; quae lectio servanda est. 197, 31 *lenticula*, Targa, 7028; *lenticulam* oet. codd.; idque mihi anteponendum videtur, cum propter sensum, tum propter verborum nexum. Cf. Gal. *Meth. med.* XIV, 3, t. 10, p. 961. 198, 7—8 *superponenda sunt quae crustas a vivo resolvant [εσχαράς Graeci vocant]*, Targa. — Haec verba margini adscripta erant contra vocem *crustas*; loco autem quem tenent non ad crustas, sed ad medicamenta quae crustas resolvunt pertinent; ideoque Constantinus alique editores scribunt *εσχαρωτικά*, sed perperam; *εσχαρωτικά* enim non crustas solvant, sed inducunt. Unde facile apparet voces *εσχαράς* cett. insititias esse, ut Targa ipse iudicavit. 198, 35 *ac tum plenioribus quoque cibus uti*, Targa. — *ac tum quoque plenioribus cibus uti* cum plerisque codd. scripsi. *ac tum quoque ut plenioribus* 7028, ubi *ut* praeoccupata iteratio vocis *uti* videtur. 199, 13 *qualis lipara*, Targa. — *quale* scripsi cum codd. Med. I, Vat. VIII, 7028. 200, 3—4 *Unguenti p.)-(VII, Targa*, qui recte iudicat deesse epitheton voci *unguenti*; quid autem sit hoc epitheton nescio. Praeterea notandum est cod. 7028 exhibere: *unguenti*)-(IV quod verisimilius videtur. Ea lectio facile mutari potuit in VII ex antiqua scriptura *στοιχείου* u. 200, 31 *si [manus] vulneri imponitur*, Targa. — Vox *manus* glossema ineptum, quod verisimile est contra verba *duobus digitis* in margine adscriptum fuisse. 202, 12—13 *Illud*

interea, Targa cum Lind. — *Illud ne intereat* recepi ex codd. et cet. edd.; idque optime sensui congruit. 203, 26 et 23 *ex aceto coactum* — *ex aceto coacti*, Targa. — *coctum ... cocti vel coctae* codd. et edd. — Primo loco *coactum* servavi (cf. p. 166, 25; 177, 30; 264, 12); secundo autem loco *cocti* scribendum esse censui; quid enim sibi voluerit Celsus dicens: *furfures ex aceto coiere*? 206, 11 *excidal* [*qua huiusce rei medicamen exest*]. Verba uncis inolusa addititia sunt, ut Targa ipse docuit, item l. 18 post verba *mammas feminarum* [*et in jecore autem aut splene hoc nascitur*]. 207, 1 *ulla*, Targa. — *ulli* recepi ex codd. Med. I, Vat. VIII. 207, 9 *nemo statim potest*, Targa. — *nemo scire potest* codd. et pleraeque edd. Ego *scite* credo legendum esse. 208, 10 *oenanthe*, Targa et ego; *aloeanthe* codd. Celsus ipse *oenanthe* (V, 8) inter adurentia adnumerat, et apud Dioscoridem (V, 5) legitur *oenanthe* prodesse in oris et pudendorum ulceribus depascentibus; Galenus autem (*Sec. gen.* IV, 10, t. XIII, p. 732) adversus ulcera putrida vel nomas scribit: ἡ θαλλὰ ἐν οἴνῳ ἐφθῆ μετὰ μέλιτος κατὰπασσε ἢ χαλκίτιν κατὰπασσε. 209, 8—9 *infra ulcera locum caedi*, Lind., Targa. — *infra* *ulcerum laedi* revocavi ex codd. ceterisque edd. antiquis. Locus utique depravatus ut videtur; quae autem sit medicina, nescio. 210, 25 *et in inguinibus* [*lateribus*], Targa. — Manifestum est vocem *lateribus* ab aliquo sciolo margini adscriptam esse ad interpretandum *inguinibus*, nexumque verborum et sensum turbare. *211, 1 *apparet*, Targa. — *superapparet* codd. et edd.; idque erat retinendum; furunculo enim aperto pars carnis in pus versa (gallice *bourbillon*) intra vulneris labia prominet et *superapparet*. *211, 36—37 *magisque nocenter adolescit*, Targa cum Const. — *magisque inde venter indolescit* supplem. Med. I, *magisque innocenter indolescit* cet. codd. et edd., *magisque nocenter indolescit* ego. Locus a librariis depravatus. Fortasse legendum est: *magisque inde nocenter indolescit*. 212, 31 *si [una] plaga*, Targa. — *si ima plaga est* Constant. Nec *ima*, nec *una* sensui apta sunt, ideoque *supervacanea* videntur. 213, 17 *aliae rectae*, Targa. — *aliae recte* codd. Vix tamen hic aliquid affirmare ausim, quia his in rebus parva fides habenda est lectionibus in codd. repertis, nisi saltem admodum sedulo sint excussi. 213, 37—38 *si vero os . . . penetraverit et quatenus nocuerit*. Locus in codd. depravatus, in

aliis autem aliter. Targa, me iudice, recte emendavit; solummodo *penetraverit* loco *pervenerit* scripsi, eo quod Celsus saepius, ibi et passim verbo *penetrare* (ex. gr. l. 17, 31 et p. 214, 19) hoc sensu utitur, verbum autem *pervenio* (l. 35) usurpat ubi de specillo agitur; forsitan legendum sit *penetrarint*, quae dicendi ratio saepe apud Celsum invenitur (ex. gr. cf. p. 214, 19). Ceteroquin in Med. I, Vat. VIII et 7028 legitur: *si vero os in vicino est id quod disci potest si* (om. 7028) *jam hinc ne eo fistula pervenerit penetrarit (penetrarit vel pervenerit 7028) quatenus nocuerit*, unde facile patet *pervenerit* glossema esse verbi *penetraverit*; adverbium autem *hinc* seu interpretatio vocis *eo*, seu corruptela particularum *nec* *ne* videtur.

* 214, 17 *tenuius et minus* codd.; *tenuius* Targa, qui *et minus* pro glossemate habet. Nonne servanda erat lectio codd.? *et minus* enim respondet voci *copiosius* (l. 15). 216, 15 *raro fit nisi in capulis* (sic) cod. 7028; sed perperam, ut apparet e Galeno ceterisque auctoribus. 216, 29 *pars quarta [fisco adjecta]*, Targa. — Hae duae voces ex glossemate margini adscriptae fuerunt, ut patet ex verbis supra positiss (l. 23) *et fucus* etc.

216, 31 *oportet*, Targa et 7028; *oportebit* scripsi cum codd. Med. I, Vat. VIII. 216, 37 et 217, 6 *infra tenue ad cutem latius* — *ad cutem tenue supra latius*, Targa cum codd. Loci a librariis turpiter depravati; acrochordon enim est tuberculum angustam obtinens basim, caput autem orbiculosum (ἐκφυσίς περιφερῆ τε καὶ διάστένον ἔχονσα βάσις Gal. Def. med. def. 500); itaque scripsi *supra latius, ad cutem tenue*. Thymus vero e contra, ut edidi, *ad cutem latius supra tenue*, quod jam Lindenius animadverterat. 218, 9 *maiores [pustulae]*, Targa. — Vox *pustulae* (seu *pusulae*) ex glossemate in textum irrepsit.

* 219, 5 *donec mellis crassitudo fiat*, Targa. — *dum (donec 7028) mellis crassitudo ei fiat* Med. I, Vat. VIII, 7028. Hanc lectionem servavi; hic enim et alibi (ex. gr. p. 232, 31; 247, 35; 251, 29) *ei* exhibent codd. idque nec sensui nec grammaticae repugnat; errore typothetarum p. 232, 31 *ei mellis* scriptum est loco *mellis ei*. Non dubito quin pronomen *ei* inseri debeat ante verbum *fiat* l. 23. 219, 9 *scabies vero est aspritudo cutis*, Targa; eo quod *aspera cutis* apud Columellam VII, 5; *τραχυμὸς τῆς ἐπιφανείας* apud Paul. Aeg. IV, 2 legitur. *Durior* ex codd. Med. I, Vat. VIII revocavi; hic enim auctoritas codd. me magis movet. 219, 15 *ἀγέλαν [id est fe-*

ram], Targa. — Hae tres voces manifeste ab aliquo enarratore profectae sunt. 220, 3 *decidunt*, Targa. — *descendunt* Med. I, Vat. VIII, 7028; *discedunt* cet. codd. quos secutus sum. Ἀφίστανται καὶ αἱ λεπιδες τοῦ δέξματος Galenus (in Hipp. De alim. Comm. III, § 22) qui tantum duas species impetiginis distinguit. 224, 20 *ex his aulem* [quae supra proposui], Targa. — Voces uncis inclusae hic minime aptae sunt, nec a Celso scriptae; additae sunt ab aliquo enarratore qui animadvertit saepius verbis *ex his* apud Celsum subungi membrum quae supra posui seu proposui. 224, 21 *species est quam semion Graeci vocant.* „Ita in codd. mss. sed mendose“ Targa. Cur mendose? Nonne haec vox *semion* respondet Graeco σημεῖον (gallice *un signe*, ut recte vertit Des Étangs)? Licet nusquam alibi neque σημεῖον, neque *signum* apud auctores vel in glossariis reperire potuerim eo sensu quo hic a Celso usurpatur. *226, 24—25 *neque tamen in lippientibus*, Targa et ego. Vox in (quae a cod. 7028 abest) abundare mihi videtur. Haec ratio dicendi nusquam, quod sciam, apud Celsum reperitur. *228, 34 *κυθιον*, Targa. — *cythium* e codd. revocavi. Item cum codd. legendum est *tephrion* loco τέφριον (l. 34) — vide Praefat. p. VII. 229, 2 *trigodes*, Targa. — e codd. Med. I, Vat. VIII revocavi *trygodes* quod Graeco respondet. *229, 15 *leniter*, Targa. — *leviter* edidi ex codd. Med. I, Vat. VIII, 7028, qui conjunct. *ex* ante *oleo* omittunt; quae lectio non est aspernanda. *229, 19 *cibo paulo pleniore quam ex eorum dierum consuetudine uti*, Targa cum codd. et antiq. edd. Vox *dierum* vel mutanda est in *priorum* (cf. p. 226, 24—34), vel potius tollenda cum cod. 7028. 230, 8—9 *aliquando serius*, Targa cum Lind. — *aliquanto saepius* revocavi ex codd. Med. I, Vat. VIII, 7028; idque sensui aptissimum esse videtur. *230, 13—14 Verba: *πρόπιωσιν id, quoniam oculi procidunt, Graeci vocant*, prorsus inutilia videntur, *procidunt procedentes* ... 7028. *230, 21—22 *singulorum*)-(I, 7028 idque rectius, ni fallor, quam lectio vulgata. 230, 33 *admovenda est*, Targa, qui se refert ad V, 26, 21 (p. 290, 37); ego vero *adhibenda* scripsi cum codd. Med. I, Vat. VIII, 7028; hac voce, eo sensu, saepe Celsus utitur. *231, 12 *modo ab interiore, modo ab exteriori* codd., vocem *parte* supplevit Targa cum Lind. Fort. legendum: *modo ab interiore parte, modo ab exteriori*. 231, 25 *prohibet*, Targa. —

— *inhibet* reposui ex codd. Med. I, Vat. VIII et 7028. Targa hic textum mutavit, eo quod vox *inhibet* est apud Celsum ἀπαξ σημαίνον, quae ratio non praevalet contra auctoritatem codd. mss.

*231, 26 *Philalethos*, Targa. — Legendum est vel *Philalethes*, si de nomine medicamenti sermo est, vel *Philalethae*, si de auctoris. Item p. 234, 13. *231, 28 *huic*, codd.; *huc*, Targa; idque recte, eadem lectio revocanda erat p. 233, 32 et 237, 14, ubi modo *huc*, modo *hic*, vel *hoc*, vel denique *huic* codd. exhibent; ideoque p. 259, 25 lege *huc* pro *hic*, quod perperam, ni fallor, servavi.

233, 2 *sed et ea*, Targa. — *sed ea* scripsi cum codd. et plerisque edd. 233, 10—11; 246, 13 *cornu*, Targa. — *cornus* ex codd. revocavi. *235, 11—12 *maximeque eo, quod σπαισλον nominatur, quod (quia Med. I, Vat. VIII, 7028) lapidem haematitem vocant*, Targa. — Si in mentem revoco quae scripta sunt initio sect. 21 huius capitis, verba *quod . . . habet* tollenda esse censeo. Quodsi enim *quod* pro pronomine habetur, insititia sunt haec verba, et quia supra jam dixerat Celsus σπαισλον lapidem haematitem continere, et quia haec dicendi ratio sermoni Celsiano repugnat; si vero pro conjunctione, inepta sunt, quippe quum σπαισλον alia de causa ita vocetur, de quo Targa ipse monuit.

236, 10 *perfricare*, Targa. — *defricare* codd. et plerique edd.; idque congruum videtur. Cf. V, 28, 18 et 19, p. 220, 32; 221, 36. 236, 18 *potest prodesset* *ψυλον* [id quod supra posilum est], Targa. — Verba uncis inclusa mihi, sicut Targae, addititia videntur.

236, 25—26 *psorici p.*)-(III, 7028; quod verisimilius videtur. *236, 26—31 Verba: *Nulla autem per se materia est . . . et sic appellatur*, valde mihi suspecta sunt; non dubito quin e margine in textum irrepperint; sermoni enim Celsiano prorsus repugnant; nusquam enim alibi apud hunc auctorem talis enarratio, si non inepta, saltem inutilis, reperitur. In codd. 7028 verba *Psorici compositio. Habet chalcitidis . . . in vas fictile additum et contextum ex foliorum ficis sub terra reponitur diebus XX et rursus sublatum leritur et sic appellatur psoricum* in textu scripta sunt, in margine autem invenitur: *nulla per se materia est quae psoricum appellatur*. Quodsi membrum: *verum de (in codd.) basilico . . . curantur* servari debet, de qua re etiam dubito, legendum est, ut mihi videtur, *De hoc quoque* etc. Reliqua certo ex praecedenti glossemate profecta sunt.

*237, 30—31 Verba *quam*

παράλυσιν Graeci vocant, fortassis hic delenda sunt; Celsus enim, ubi (p. 117, 15) de resolutione nervorum in universum verba facit, jam de nominibus quae a Graecis usurpantur ad diversas *paralysis* species designandas, disserit.

238, 3 *ac poene* ** *difficillime genus* codd. omnes; *poene caligat*, Targa cum Lind.; *caligatur* Const. Apud Aëtium (VII, 54) legitur: *πλανύτερα πολλῶ τοῦ κατὰ φύσιν ὥστε καὶ ποτε ὁλοσχερῶς ἐμποδίζειν τῇ ὁρᾷ· ποτὲ δὲ ὁρῶσιν, ἀμυδρῶς δέ, καὶ τὰ ὁρώμενα αὐτοῖς δοκᾷ πάντα μικρότερα εἶναι*. Fortasse legendum: *ac poene omnino caligat*, si ratio habenda est verborum Aëtii. Cf. Pseudo-Gal. *Introd. seu med.* t. XIV, p. 775.

238, 4 *In utraque vero* [id est et *paralyssi et mydriasi*] *pugnandum est*, Targa. — *id est* etc. interpretatio est quae ex margine in textum irrepsit, ut Targa ipse coniebat.

240, 23 [specillo] *teritur*, Targa. — *specillo* glossema videtur. Lind. legit *pistillo*; Celsus autem nusquam dixit seu *specillo* sive *pistillo* torenda esse medicamenta.

* 241, 5 *Ptolemaei* [chirurgi], Targa, qui vocem *chirurgi* tolli jubet eo quod (V, 28, 7, p. 210, 26) eadem vox *chirurgus* post *Meges* a codd. Med. I, Vat. VIII abest; sed haec ratio nunc non me movet, ideoque haec vox in meo textu reponenda est.

241, 32 *aceto dilutum* [eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est Polybi sphragis ex dulci vino liquata quae compositio priori libro continetur], Targa. — De hoc glossemate satis habeo ad Targam ipsum lectorem remittere.

242, 25 *ad idem proficit*, Targa cum Lind.; *idem proficit* codd., quod recepi.

244, 18 *Nares vero intus exulceratas*, Targa. — *intus* omisi cum codd. Celsus enim voce *nares* utitur ad interiora nasi indicanda.

244, 26 *quod genus Graeci ὄζαναν appellant*, vid. quae notavi ad p. 93, 13—14.

246, 28 et 247, 2 *ficorum partes*, Targa et ego cum codd. Uterque locus corruptus, ut Targa ipse censet; sed quae sit medicina, nescio.

* 245, 24—25 *Membrum: quae fere κακινώδης est, itaque attingi non debet*, miro modo sensum turbat; nusquam enim, quod sciam, apud antiquos auctores polypus pro carcinomate habitus est. Ideoque glossema videtur suo loco motum; transferri debet, ni fallor, contra: *Has curare oportet medicamentis* etc. (l. 16), ibique non minus ineptum est.

247, 35 *leni igne coquitur*, Targa et ego; *in leni igne coquitur* codd.; *ad lenem ignem decoquitur* Lind., *ad leni ignem decoquitur* 7028. Nescio cur saepius cum cod. 7028

consentiat Lindenius (v. ex. gr. p. 341, 19; 342, 15); an putandum ei praesto fuisse hunc ipsum codicem vel potius alium illi simillimum? *249, 20 *Ac miserius . . . quo minus*, omnes et ego; fortasse legendum est *Ac eo miserius*. Saltem minor interpunctio post *infans est* reponi debet. 251, 8 *evenire*, Targa. — *venire* e codd. revocavi. 251, 31 *Quod si inflammatio*, Targa. — *Quodsi ea inflammatio* ex codd. Med. I, Vat. VIII reposui. Cf. p. 246, 4, ubi Targa recte legit: *si gravior is tumor* cum plerisque codd., invitis eisdem codd. Med. I, Vat. VIII qui pronomen *is* omittunt. 251, 35—36 *gargarizandum quoque est [quae vel cum lasere, vel sine eo hac ratione vvae subjecta est]*, Targa. — Membrum uncis inclusum adnotatio est in margine adscripta, pertinens ad verba *laser terere* etc., l. 32. 252, 28 *ejici*, Targa. — *refigi* legi cum Const. et Lind. Codd. Med. I, Vat. VIII *refici* habent, sed prorsus mendose. 253, 16 p.)-(IV, Targa; p.)-(VI e codd. Med. I, Vat. VIII reposui. 254, 36 *comprehensa sunt [curant]*, Targa. — Verbum *curant* inepte e margine in textum translatum fuit, et minime aptum sermoni Celsiano videtur. *256, 27—28 *donec ex ipso crustae leniter resolvantur*, Targa. — Plerique codd. et edd.: *donec ex ipso crustae purae* etc., exhibent. In codd. Med. I, Vat. VIII legitur *donec ex ipso purae leniter* etc.: quae vera est lectio, ni fallor. Vox *crustae* addita fuit ad explicandum *purae*; ideoque in meo textu scribas *purae* loco *crustae*. 264, 23 *maturius*, Targa cum plerisque codd.; *maturiore* Med. I, Vat. VIII, 7028; *maturior* ceteri quos secutus sum. 264, 26 *sed ut*, Targa, me iudice, mendose; et ut scripsi cum Med. I, Vat. VIII, 7028, idque consecutioni verborum aptius videtur. *265, 9 *itemque*, Targa cum plerisque codd. — *jamque* Med. I, Vat. VIII, 7028, idque erat servandum, ni fallor. 265, 20 *totius corporis habitus*, Targa et 7028. — *lotus corporis habitus* Med. I, Vat. VIII, quod recepi. 266, 24 *et foveri [vulnus] pari portione*, Targa. — Vox *vulnus* addititium videtur; librarius enim non rite intellexit verbum *foveri* absolute proferri. 268, 2 *sui non potest [qua quasi membrana quaedam finit abdomen, quam περιτόλαιον Graeci vocant]*. Targa. — Haec adnotatio petita ex IV, 1 et VII, 17, ut Targa ipse docuit, nec sensui nec consecutioni verborum congruit. 268, 15 *agere*, Targa. — *gerere* e codd. Med. I, Vat. VIII, 7028 reposui. *268,

28 *ut cutis hoc ipso extenuatur*, Targa. — *ipso* omittunt codd. Med. I, Vat. VIII, 7028, quae lectio verisimilis videtur, vox enim *ipso* pro glossemate haberi potest. 268, 35 *excidatur*, Targa. — *adiciatur* Med. I, Vat. VIII, 7028; *dedi ejiciatur* cum cet. codd. 270, 7—8 *si retro trahuntur*, Targa. — *si retrorsus eximatur* codd. Med. I, Vat. VIII; *si retrorsus trahitur* 7028. Nescio nec qua de causa nec quo auctore Targa codd. Med. et Vat. textum mutaverit; *trahitur* quod 7028 exhibet interpretatio videtur verbi *eximatur*. 272, 3 *omnia autem*, Targa. — *omnia vero* codd., ubi nil mutandum erat. 273, 28 Verba: *ideoque χαλάρια Graeci vocant*, fortasse e glossemate addita sunt; nec enim *χαλάρια* vocantur, quia facile huic illuc impelluntur, sed quia grandini similia sunt. 274, 38 *sicut in vulneribus [et fistulis]*, Targa. — Hae duae voces *et fistulis* addititiae sunt; *in fistulis* enim, ut Targa ipse notat, nullus dies urget sicut interdum in vulneribus. 275, 15 *abscindatur*, Targa. — *abscindat* codd. Med. I, Vat. VIII quod recipiendum est; verbum enim ad chirurgum referri potest. *276, 9 *usque ad nares*, Targa et ego; *usque nares* codd. Med. I, Vat. VIII; quae lectio servanda erat; Celsus enim saepius hac dicendi ratione utitur. *276, 18 *difficilior est*, Targa et ego. — Cod. autem Med. I, Vat. VIII *difficiliorem* exhibent; quae lectio nunc mihi anteposenda videtur. 278, 2 *laxanda sutura*, Targa et ego. Locus a librariis depravatus. *Laxandas utraque* Med. I, Vat. VIII; *laxandos utroque* ceteri; *laxanda utique* ex Palavicino libri vulgati. Targa recte emendavit, legitur enim (idque ipse non animadvertit): *orae vulneris inter se simplici sutura committendae* (p. 277, 38). Praeterea notandum est in cap. 16 hujus libri (p. 293, 34) *utraque* in plerisque codd. loco *sutura* reperiri; quae mutatio facile intelligi potest. 280, 27—28 *caput eius [qui curabitur] — oculus [qui curabitur]*, Targa, qui non vidit voces *qui curabitur* ab interprete scriptas esse. *280, 31—32 *tum acus admovenda est acuta sed non nimium tenuis eaque recta dimittenda est*, Targa. — *tum acus admovenda est sicut aut foret non nimium tenuis eaque demittenda est sed recta est*, codd. Med. I, Vat. VIII; *tum acus admovenda est aut acuta ut forte nimium* (non nimium edd. antiq.) *tenuis* codd. reliqui et edd.; *tum acus admovenda est acuta ut foret, eaque demittenda est recta*, ego. Denuo autem hoc membrum percensens, loco ut po-

tius legendum esse putavi *sic, ut*. Quodsi enim sic legas, codd. lectionem presse secutus, contextus eo ipso sensum subministrat ratione habita artis medicae quam maxime probandum. 281, 30 *emittant*, Targa. — *mittant* codd. Med. I, Vat. VIII, quae lectio servanda est. 282, 17 *rectas lineas*, Targa cum plerisque codd.: *rectas eas lineas* dedi cum Med. I et Vat. VIII. 283, 24 *vel a primo natali die*, Targa cum Caesario. Revera vox *natali* omissa est in codd. Med. I, Vat. VIII, sed cf. VII, 12, 4; p. 288, 35—36. *284, 14 *eandemque etiam curationem*, Targa. — *eandemque etiam rationem* edidi cum codd. Verba autem in meo textu literis inclinatis exarata tamquam inutilia delenda sunt. Fortassis legendum est: *rationem curationis*, sic ut scribitur p. 284, 31. Ceteroquin voces *curatio* et *ratio* modo inter se mutantur (ex. gr. l. 8 *curatione* pro *ratione*; cf. Targa p. 337, not. 8), modo se invicem expellunt. 284, 30 *et difficilius*, Targa. — *aut difficilius* lego cum codd. Med. I, Vat. VIII. *285, 4—5 *quod non vi cogendum, sed ita adducendum ut ex facili subsequatur*, Targa qui nullam hujus emendationis rationem profert. — Ego vero cum codd. Med. I, Vat. VIII scripsi *quod non est cogendum, sed ita adducendum* (*ducendum* codd.; idque fortasse servare debebam) *ut facile subsequatur*. 287, 12 *eadem facienda*, Targa. — Scripsi *eaque facienda*, ut habent Med. I, Vat. VIII ceterique codd. 287, 31 *sed imponendum*, Targa. — *sed* delevi cum codd. Med. I, Vat. VIII; haec enim particula hic non apta videtur. *288, 16 *ἀντιάδες* autem a Graecis appellantur. Dubito num hoc membrum sit Celsi necne; quodsi enim refertur ad tonsillas inflammatione induratas, falsa est interpretatio; Graeci namque, ni fallor, *ἀντιάδες* non tonsillas morbo affectas, sed sanas nominant; si simpliciter ad tonsillas, consecutio verborum turbatur. 291, 5 *Humorem quidem vel inciso* codd. et edd. „Particula *vel* prorsus vacat. Forte deest alterum membrum ab eodem *vel* incipiens“ Targa, sed perperam; hoc enim loco *vel* sensu intensivo usurpatur, idque saepius apud Celsum ipsum occurrit. 293, 30 *et spissior*, Targa. — *spissior* lego cum codd. Med. I, Vat. VIII. 297, 5 *scrotum [ipsius]*, Targa. — Vox *ipsius* glossema ut Targa ipse judicat. 298, 5 *triduo*, Targa. — *triduum* codd. Med. I, Vat. VIII, quos sequi placuit. 298, 16 *id*, Targa cum Constant. et ego; *eum* libri omnes. Recte

eum expangere volebat Morgagnius, vel *ad* scribere. 298, 34 *rursum*, Targa. — *sursum* recepi ex codd. Med. I, Vat. VIII. 299, 29 *incidenda*, Targa. — *excipienda* lego cum codd. Med. I, Vat. VIII; idque sensui multo melius aptari mihi videtur. 307, 2—3 *Homo tum resupinus [eo modo quo in curatione ani figuratur]*, Targa. — Verba uncis inclusa addititia esse jam monuerat Morgagnius. 307, 11 *exhibet*, Targa cum Const. — Ego vero *exigit* e codd. Med. I et Vat. VIII revocavi, forte abundat *sed* ante *aliquanto*. 307, 29 *jam*, Targa et ego; *eam* Med. I, Vat. VIII; fortasse legendum est *etiam*. 308, 9 Deleas voces *qui curatur*. 309, 17 *Loco ῥυάδα*. Sic certo legendum est, expulsa plerorumque codicum lectione *ρορυάδα*, cui ansam dedit repetita ultima vocis loco syllaba. In altera editione idem sensit Targa, etiamsi magis hariolando hanc lectionem recepiasse videtur quam ratione sibi reddita cur ita scribendum esset. Est autem ῥυάς (a ῥέω), vel forsán et ῥοιάς (a ῥεῖω), quaelibet quorumcumque excrementorum corporis per meatus naturae congruos ejectio, quae scilicet invito aegrotó obtinet. Hujus rei exempla leguntur, quod ad lacrimas attinet, apud ipsum Celsum infra VII, 7, 4; Gal. *Us. part.* V, 3; t. III, p. 811; *Diff. morb.* 10; t. VI, p. 870; *Meth. Med.* XIV, 15; t. X, p. 1002; *Sec. loc.* IV, 7; t. XII, p. 774; *Comm. in Hipp. Epid.* VI, II, 36; t. XVII, p. 966; Alex. Trall. II, 8; Aët. VII, 88; Paul. Aeg. III, 22 et VI, 17, quod ad urinam, apud Aretaeum *Sign. Chron.* II, 4; Pseudo-Gal. *Introd. seu med.* 19, t. XIV, p. 797; Oribasium *Coll. med.* XLV, 7 et L, 4; Aët. XI, 9 et 14; quod ad alvi proluviem, apud Oribasium ib. XLIV, 13 et Aëtium XIV, 10. — Ceteroquin cf. p. 274, 24, ubi et Targa ipse ῥυάδα scripsit, invitis codd. qui ῥυνάδα seu *rhifada* exhibent. 309, 1, 5; 336, 7 vocem *ejus* post *manus*; 327, 32 post *vertice* codd. exhibent, sed pro glossemate habetas; item p. 336, 7 eadem vox tollenda est, ni fallor. 309, 37 *proposui*; Targa. — *posui* revocavi e codd. Med. I, Vat. VIII; cf. ex. gr. p. 334, 5. *310, 2 *attrahitur*, Targa. — *attrahatur* Med. I, Vat. VIII et plerique alii codd.; idque revocandum est; hoc enim verbum ad conjunctionem *ut* referri debet. *311, 24 *urina postea promoveatur et excidit*, Targa. — Nonne legendum est *promovente, excidit*, ut habent Med. I et Vat. VIII? 312, 17 *metus excipit [remotis medicaminibus]*, Targa. — Verba uncis in-

clusa insititia esse Targa ipse censet. *312, 25; 316, 22 *vulnus* *vulnera*, Targa. — *ulcus* — *ulcera* scripsi cum Med. I et Vat. VIII. — Item p. 313, 27 et 29 *ulcus* reponere debebam cum iisdem codd. Vocem enim *ulcus* Celsus usurpat sicut Graeci vocem ἔλκος. *313, 24 *si quid urinae rodit*, libri omnes et ego. Nonne melius legeretur *si quid urina rodit* vel cum 7028 *si quid urina id rodit?* cf. l. 26 et 34. 313, 26 Post: *rosa temperabitur* codd. et edd. habent: *Huic curationi aptissimum videtur enneapharmacum emplastrum. nam et serum habet ad pus movendum et mel ad ulcus repugnandum, medullam etiam maximeque vitulinam quod in id ne fistula relinquatur praecipue proficit.* Quae verba insititia esse Targa ipse notat. *313, 35 *excidunt*, Targa. — *exedunt* legi cum codd. Med. I, Vat. VIII; praeterea notandum est loco *si ante* Med. I et Vat. VIII exhibere: *similiter* Med. I, Vat. VIII *similiter ante* cet. codd., *si similiter ante* Palavicinus. Emendationem Targae sequi placuit, quamvis non sit certa. Fort. legendum est *si simul ante*. 319, 23 *inflammationi*, Targa cum Lind. — *inflammationis* e codd. Med. I, Vat. VIII revocavi. 319, 28 *exciditur*, Targa. — *praeciditur* scripsi ex codd. Med. I, Vat. VIII. *320, 19 *coxendices*, Targa cum libro Guilandini. — *cervices* codd. ceteraeque edd. Fortasse legendum est *coxas* more Celsiano. 320, 29—30 *venularum*, Targa. — *venarum*, ut scripsi, Med. I et Vat. VIII. 321, 24 *durum* loco *curvum* Med. I, Vat. VIII, sed mendose, ni fallor. *324, 2—3 *sub iis* *continent*, Targa cum Morgagnio. *sub iis* ... *continent*, Const.; *sub his connectunt* Med. I, Vat. VIII. Ideoque *connectunt* scripsi; *his* pro *iis* forsitan cum iisdem codd. legere debuerim. 324, 30 *ζυγῶδες*, Targa, sed mendose; ζύγωμα scripsi, ut jubet sermonis graeci ratio; saltem ζυγοειδές (subaud. ὁστέον) legendum erat cum Pseudo-Gal. *Introd. seu med.* 12, t. XIV, p. 721. Cf. *Thes. ling. gr.* sub voce. *325, 27—28 *Secunda superiori parti inferiori* *pars summa*, Targa et ego. Locus haud dubie a librariis depravatus. Nonne legendum *secunda superiorem* (subaud. *sustinet*) *parte anteriore*, seu potius ut Morgagnius censebat *secundae pars summa* omnibus reliquis deletis? 326, 22 *Ea in summis*, Targa et ego, invitis codd. qui omittunt *in*. Cf. p. 327, 22. *328, 15 *rursus ab inferioribus quoque capitibus*, Targa. — *Vox inferioribus* mihi videtur orta esse a *capitibus*, ideoque *inferiori* (vid.

parte) legere maluerim. *330, 9—10 *Sin autem nigrities est aut si caries ad alteram quoque partem excidi [atque idem quoque in carie ad alteram partem ossis penetrante fieri potest]*, Targa. — Voces: *aut si caries* cet. videntur e margine in textum irrepsisse, et denuo occasionem prae buisse novae adnotationi quae uncis includitur. Celsus de *carie* jam locutus erat, nec opus erat ad eam reverti. *331, 18—19 *Vix unquam nigrities, caries saepe totum os perrumpit*, Targa. — *Vix unquam nigrities integrum caries per totum os perrumpit* codd. et edd. Locus a librariis depravatus. Celsus, ni fallor, scripsit: *Vix unquam nigrities, interdum caries, totum os perrumpit*. Vox *interdum* loco *interdum* ex praecedenti membro oscitanter a librario repetita est. *per* seu glossema est, sive potius provenit e verbo *perrumpit* praeoccupato. 331, 25 *id quoque [signi] specillo*, Targa. — Vox *signi* ex glossemate. Saltem interpres *signo specilli* scribere debebat. 332, 2 *suspendendaque manus sinistra est*, Targa cum Med. I, Vat. VIII. — Ego vero scripsi *suspendendaque magis sinistra manus est*, cum ceteris codd. et edd. Targaque ipso in ed. Patav. 1815. 332, 31 *expellit [eaque fere quia testa tenuis et angusta est λεπτός, id est squama, Graecis nominatur]*, Targa. — Membrum uncis inclusum interpretatio est alicujus scioli, loco suo mota; vox enim *λεπτός* non ad carunculam, sed ad os referri potest; haud dubie scripta fuit haec interpretatio contra: *os adustum* etc., l. 29. 333, 5 *percutta est*, Targa. — Verbum *est* omittunt codd. omnes: quae lectio nunc anteponenda mihi videtur. — Item *est* post *fronte* p. 323, 9 a cod. 7028 abest. *335, 12 *Nonne verba curare usque ex glossemate sunt?*

336, 9 *nihil latens in eo ossis caro est*, Targa. — *nihil late sine osse cavum est* codd. Med. I, Vat. VIII. Cocchius novam lectionem proposuit quam recepi; fortasse, ut minus ab optimis codd. recederem, tollere debebam *eo*. 337, 30 *eaque [carni]*, Targa, qui notat vocem *carnis* ex glossemate in textum receptam fuisse. 338, 34 *nihilominus [extrinsecus]*, Targa. — Adverbium *extrinsecus* (saltem scribendum erat *intrinsecus* jubente Lindenio) perperam repetitum est e periodo sequenti. 339, 29—30 *primis temporibus*, Targa. — *primi temporis* e codd. et edd. antiq. revocavi. *341, 3 *tricesimum [diem]*, Targa, qui pro glossemate habet vocem *diem*. Hanc vocem post *quadagesimum* (l. 5) cod.

7028 exhibet, idque Targae opinionem firmat. Ceteroquin in hoc cod. totum hoc membrum depravatum est; solummodo *at pro et ante vicesimum* (l. 4) habet, idque si *ac* legitur, fortasse anteponendum est. 341, 19 *subsistente*, Targa et ego cum omnibus quos ille vidit codicibus. *consistente* Lind. et 7028. Vide quae notavi ad p. 247, 35.

341, 20 *sub id*, Targa. — *subit* scripsi cum codd. 7028, Med. I, Vat. VIII, idque optime sensui congruit.

* 342, 15 *sub ala sua*, Targa, codd. et plerique edd. — Quid autem sibi voluerit Celsus voce *sua*? Scripsi *sub ala sana* quod sensum maxime probandum exhibet. Fortasse etiam pro *fascia dari* ex Constant. recepto legendum est *fasciare*, vel potius *fasciari* cum codd. 342, 15 *de costa* *viscera est*, omnes praeter Lind.

atque cod. 7028, in quibus legitur *de costis* *viscera sunt*. Cf. quae notavi ad p. 247, 35. 343, 17 *Post sequitur*, codd. et edd.

habent [*et sanguis spuitur*], quae verba Targa tamquam glossema repudiavit, idque recte. Quid enim erat addendum post *vltae periculum*? Saltem haec adnotatio in margine scripta, post *graves inflammationes* inseri debebat. 343, 27 *ex [herba] stoechade*,

omnes. Vox *herba* tollenda est, in margine scripta fuit ad *stoechas* interpretandum. * 345, 1—2 *pejor ubi obliqua*, atque

ubi multa fragmenta, Targa et ego; *pejor ubi multa fragmenta*, atque *ubi obliqua*, codd. Med. I, Vat. VIII, 7028, ibique nil mutandum erat. Idem codd. *pessimum* habent pro *pessima* (l. 2), quod fortasse tolerari potest, licet haec lectio minus idonea videatur.

345, 17 *quodque*, Targa. — *quoque* cum codd. scripsi. 345, 22 *cruribus [evenit]*, omnes. Vox *evenit* repugnare videtur sermoni Celsiano; ideoque eam expunxi. 345, 30 *prima brevissima [adhibenda]*, omnes. Vox *adhibenda* ab aliquo sciolo inepte addita et sensum et verborum nexum turbat. 346, 4 *ex cervice ipsius [qui laesus est]* — l. 10—11 *inter femina ejus [qui curatur]*, Targa, qui ipse verba *qui laesus est* ... *qui curatur* tamquam glossemata expellere jubet. Ceteroquin in hoc capitulo turpiter a librariis depravato emendationes Targae secutus sum

fusiusque de universa hac re disserui in *Diario Gazette méd. de Paris*, 1847, p. 126 sqq. 347, 19 *sic inclinandum est*. Post hoc membrum nonnulla deesse censet Targa; requirit enim aliquid quo referri possit particula *sic*. At, me iudice, ex universa intentionis enarratione satis colligere licet quomodo inolinandum

sit brachium; nec opus erat Celso ut repeteret quae jam antea ab eo, etiamsi non disertis verbis expressa, tamen satis aperte indicata erant. Eodem sensu particula *sic* usurpatur p. 348, 1. 349, 18 *senserint*, Targa cum Lindenio et 7028 (cf. quae notata sunt ad p. 247, 35). — *senserunt* ceteri omnes, quae lectio servanda est. *349, 21 *humerus [vero] quoque*, Targa. — Vox *vero* quam iubente Targa perperam delevi in meo textu repouenda est. Haec particula enim conjunctioni *quidem* (l. 23) apprimè respondet. *quoque* omittitur in cod. 7028, sed mendose, ni fallor. 349, 33 *adjectum sit [cetera eadem]*, Targa. — Voces *cetera eadem* sensum turbant; ideoque tollendae sunt. Librarius, ut Targa ipse docuit, a praecedentibus *adjectum sit* transiit ad *cetera eadem* (p. 350, 2); quum autem animadverteret lapsum se esse rediit ad membrum *deliganda* cet.; verba vero *cetera eadem* eradere aut punctis subpositis notare neglexit. — *paululum* loco *paulum* (l. 32) habet 7028. 350, 36 Vox *plagae* deest in codd. Reperitur in margine edit. Constant.; prorsus necessaria videtur. 350, 37 *vulnere*, Targa. — *ulcere* alii omnes, idque servandum erat. — Item p. 351, 2 reposui *ulcus* pro *vulnus*. Cf. quae notata sunt ad p. 313, 27. 351, 11 [*ut aliquid laedatur*] *ossa*, Targa. — Verba uncis inclusa margini adscripta fuerunt ad explicanda: *ut concurrendo exasperentur* (l. 12). 351, 37 *in alterum [par] membrum*, Targa. — Vox *par* in Med. I addita videtur ab aliquo sciolo; sine ea enim sensus constat. 352, 20 *vertebrae*, Targa. — *vertebra* scripsi cum codd. Ceteroquin cf. l. 32. 352, 24 [*et in posteriorem et in anteriorem*] Duce Targa hoc membrum recepi ex Lindenio. Vid. p. 359, 1. Particula *et* ante *in anteriorem* omittitur a cod. 7028. 353, 10 *laccendum non est*, Targa cum Constant. — *nunc* (sic edd. antiq.) *classendum* est Med. I, Vat. VIII, 7028, qui verbum *est* omittit, idque fortasse recte, dummodo legatur ut edidi quo minus a codd. recederem: *non laccendum*. 353, 25 *Tunc frictionem ei membro adhibere; cibus uti bonis; vino modice*, Targa, qui uti repetitum ante *vino* tamquam glossema recte expellere jubet. *Tunc infractionem* (sicut cet. codd.) *eidem membro adhiberi vino modico cibus uti bonis*, cod. 7028 qui, licet sit in ceteris mendosus, emendationem Targae confirmat; nec forsitan aspernanda sit lectio *vino modico*. 354, 16 *digiti [medici — modici digiti 7028] pollices*,

Targa, qui recte iudicat vocem *medici* addititiam esse; idque varietate lectionis cod. 7028 firmatur. *359, 2—3 *At id quod in latus elapsum est digitis restitui*, Targa cum plerisque codd. et Morgagnio, qui me iudice optimam praebeuit emendationem; *atque ita in latus cet.* Med. I, Vat. VIII, *atque ita in latus unde lapsus est digitus restituitur* 7028 et Lind. qui locum pro *latus* reposuit (cf. quae notavi ad p. 247, 35), eaque lectio revera sensum idoneum exhibet; membrum praegressum tamen (*qui vel in priorem cet.*) satis manifeste indicat adhuc expectandam esse alius luxandi rationis enarrationem. 359, 14 *valgius*, Targa cum Lind. — *valgium* cod. Constant.; *vatum* Med. I, Vat. VIII; *varum*, sed inepte 7028; *vastius* edd. ant. et plerique codd; *vatium* reposui iubente Targa. 359, 34 *Heraclides aliique quidam*, Targa et ego cum Cocchio et Morgagnio; sed perperam, ni fallor. Codd. plerique habent: *Heraclides, faber quoque quidam (quid quovis Vat. VIII, — Heraclides quicquam 7028)*. Certe apud Oribasium (ex. gr. lib. XLIX, 24 sqq.) saepius hujus fabri fit mentio tanquam machinamenti auctoris, etiamsi nomen ejus ignoratur. 360, 14 *ea [etiam] inferior*, Targa. — *et etiam inferior* Med. I, *etiam inferior* Vat. VIII, *et jam interiora qua* (quae corruptela facile intelligi potest) *recessit*, 7028. Fortasse legendum est ut scripsi, duce Targa, *ea inferior*, vel cum cod. 7028 *et jam inferior* (omisso *ea*), quae lectio ceteroquin reliquorum atque optimorum codd. vestigia premit. 360, 21 *minister idem contra coxam*, Targa. — *minister contra idem coxam* Med. III et VI, *minister contra coxam* 7028 et Lind. (cf. quae notavi ad p. 247, 35); *minister contra inde coxam* Med. I, Vat. VIII quos, ratione habita chirurgiae, sequi convenit. 362, 17 *aut in inflammatione*, Targa et 7028. — *aut inflammationem* Med. I; alii *ante inflammationem*. Legendum est *aut ante inflammationem*. Quid enim sibi voluerit Celsus dicens: *ossa digitorum reponenda esse in inflammatione?* Apud Hippocratem (*Art.* § 67, t. IV, p. 278) legitur ἐμβάλλειν δὲ καὶ αὐθιμερόν, ἢ τῇ ὕστεραι, τριταίῳ δὲ ἢ τεταρταίῳ — ἥκιστα· τεταρταία γὰρ ἐόντα, ἐπισημαίνει τῇσι παλινκοτῆσι μάλιστα. Reliqua vero ut Celsus.

A. CORNELII CELSI ARTIUM LIBER SEXTUS

IDEM

MEDICINAE PRIMUS.

PROOEMIUM.

Conspectus historiae medicinae. Quae ratio medicinae potissima sit.

Ut alimenta sanis corporibus Agricultura, sic sanitatem aegris Medicina promittit. Haec nusquam quidem non est: siquidem etiam imperitissimae gentes herbas, aliaque promta in auxilium vulnerum morborumque noverunt. Verumtamen apud Graecos aliquanto magis, quam in ceteris nationibus, exulta est; ac ne apud hos quidem a prima origine, sed paucis ante nos saeculis; utpote quum vetustissimus auctor Aesculapius celebretur. Qui, quoniam adhuc rudem et vulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in Deorum numerum receptus est. Hujus deinde duo filii, Podalirius et Machaon, bello Trojano ducem Agamemnonem sequuti, non mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt. Quos tamen Homerus (*Il.*), non in pestilentia, neque in variis generibus morborum aliquid attulisse auxilii, sed vulneribus tantummodo ferro et medicamentis mederi solitos esse, proposuit. Ex quo apparet, has partes medicinae solas ab iis esse tractatas, easque esse vetustissimas. Eodemque auctore disci potest, morbos tum ad iram Deorum immortalium relatos esse, et ab iisdem opem posci solitam. Verique simile est, inter nulla auxilia adversae valetudinis, plerumque tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos neque desidia, neque luxuria vitiant: siquidem haec duo, corpora, prius in Graecia, deinde

apud nos, affligerunt. Ideoque multiplex ista medicina, n olim [apud Graecos], neque apud alias gentes necessaria aliquos ex nobis ad senectutis principia perducit.] etiam post eos, de quibus retuli, nulli clari viri medic exercuerunt; donec majore studio literarum disciplina ag coepit, quae, ut animo praecipue omnium necessaria, sic pori inimica est. Primoque medendi scientia sapientiae habebatur, ut et morborum curatio, et rerum naturae con platio sub iisdem auctoribus nata sit: scilicet iis hanc ma requirentibus, qui corporum suorum robora quieta co tione, nocturnaque vigilia minuerant. Ideoque multos e pientiae professoribus peritos ejus fuisse accepimus; cl simos vero ex iis Pythagoram, et Empedoclem, et Dem tum. Hujus autem, ut quidam crediderunt, discipulus Hi crates Cous, primus quidem ex omnibus memoria dignis studio sapientiae disciplinam hanc separavit, vir et arte cundia insignis. Post quem Diocles Carystius, deinde Pi goras et Chrysippus, tum Herophilus et Erasistratus si tem hanc exercuerunt, ut etiam in diversas curandi vias cesserint. Iisdemque temporibus in tres partes medicin ducta est: ut una esset, quae victu; altera, quae medica tis; tertia, quae manu mederetur. Primam *διατητικήν* cundam *φαρμακευτικήν*, tertiam *χειρουργικήν* Gi nominarunt. Ejus autem, quae victu morbos curat, longe rissimi auctores, etiam altius quaedam agitare conati, r quoque naturae sibi cognitionem vindicarunt, tamquam ea trunca et debilis medicina esset. Post quos Sera primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam perti ad medicinam professus, in usu tantum et experimentis posuit. Quem Apollonius, et Glaucias, et aliquanto Heraclides Tarentinus, et alii quoque non mediocres vir quuti, ex ipsa professione se *ἐμπειρικούς* appellave Sic in duas partes ea quoque, quae victu curat, medicin visa est, aliis rationalem artem, aliis usum tantum sibi v cantibus: nullo vero quidquam post eos qui supra com hensi sunt, agitante, nisi quod acceperat, donec Asclepi medendi rationem ex magna parte mutavit. Ex cujus suc oribus Themison nuper ipse quoque quaedam in sene

deflexit. Et per hos quidem maxime viros salutaris ista nobis professio increvit.

Quoniam autem ex tribus medicinae partibus, ut difficillima, sic etiam clarissima est ea, quae morbis [sc. *victu*] medetur, ante
 5 omnia de hac dicendum est. Et quia prima in eo dissensio est, quod alii sibi experimentorum tantummodo notitiam necessariam esse contendunt, alii, nisi corporum rerumque ratione comperta, non satis potentem usum esse proponunt, indicandum est, quae maxime ex utraque parte dicantur, quo facilius
 10 nostra quoque opinio interponi possit. Igitur ii, qui rationalem medicinam profitentur, haec necessaria esse proponunt: abditarum et morbos continentium causarum notitiam, deinde evidentium; post haec etiam naturalium actionum; novissime partium interiorum. Abditas causas vocant, in quibus requiritur,
 15 tur, ex quibus principiis nostra corpora sint, quid secundam, quid adversam valetudinem faciat. Neque enim credunt, posse eum scire, quomodo morbos curare conveniat, qui, unde hi sint, ignoret; neque esse dubium, quin alia curatione opus sit, si ex quatuor principiis *) vel superans aliquid, vel deficiens adversam valetudinem creat; ut quidam ex sapientiae professoribus dixerunt: alia, si in humidis omne vitium est, ut Herophilo visum est; alia, si in spiritu, ut Hippocrati [in libro de Flatibus]; alia, si sanguis in eas venas [sc. *arterias*], quae spiritui accommodatae sunt, transfunditur, et inflammationem, quam Graeci *φλεγμονήν* nominant, excitat, eaque inflammatio talem motum efficit, qualis in febre est, ut Erasistrato placuit; alia, si manantia corpuscula, per invisibilia foramina subsistendo, iter claudunt, ut Asclepiades contendit; eum vero recte curaturum, quem prima origo causae
 25 non fefellerit. Neque vero insitiantur, experimenta quoque esse necessaria; sed ne ad haec quidem aditum fieri potuisse, nisi ab aliqua ratione, contendunt; non enim quilibet antiquiores viros aegris inculcasse, sed cogitasse, quid maxime conveniret, et id usu explorasse, quo ante conjectura aliqua
 30 duxisset; neque interesse, an nunc jam pleraque explorata sint, si a consilio tamen coeperunt. Et id quidem in multis ita

*) Id est igne, aere, aqua, terra, seu calido, frigido, sicco, humido.

se habere. Saepe vero etiam nova incidere genera morborum, in quibus nihil adhuc usus ostenderit, et ideo necessarium sit animadvertere, unde ea coeperint; sine quo nemo reperire mortalium possit, cur hoc, quam illo, potius utatur. Et ob haec quidem in obscuro positas causas persequuntur. Evidentes vero eas appellant, in quibus quaerunt, initium morbi calor attulerit, an frigus; fames, an satietas; et quae similia sunt; occursum enim vitio dicunt eum, qui originem non ignorarit. Naturales vero corporis actiones appellant, per quas spiritum trahimus et emittimus; cibum potionemque et assumimus et concoquimus: itemque per quas eadem haec in omnes membrorum partes digeruntur. Tum requirunt etiam, quare venae nostrae modo submittant se, modo attollant; quae ratio somni, quae vigiliae sit: sine quorum notitia neminem putant vel occurrere, vel mederi morbis inter haec nascentibus posse. Ex quibus quia maxime pertinere ad rem concoctio videtur, huic potissimum insistant; et, duce alii Erasistrato, teri cibum in ventre contendunt; alii, Plistonico Praxagorae discipulo, putrescere; alii credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui: acceduntque Asclepiadis aemuli, qui, omnia ista vana et supervacua esse, proponunt: nihil enim concoqui, sed crudam materiam, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et haec quidem inter eos parum constant: illud vero convenit, alium dandum cibum laborantibus, si hoc; alium, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum quaerendum esse, qui facillime teri possit; si putrescit, eum, in quo hoc expeditissimum est; si calor concoquit, eum, qui maxime calorem movet: at nihil ex his esse quaerendum, si nihil concoquitur; ea vero sumenda, quae maxime manent qualia assumpta sunt. Eademque ratione, quum spiritus gravis est, quum somnus aut vigilia urget, eum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa qualiter eveniant, perceperit. Praeter haec quum in interioribus partibus et dolores et morborum varia genera nascantur, neminem putant his adhibere posse remedia, qui ipsas ignoret. Necessarium ergo esse incidere corpora mortuorum, eorumque viscera atque intestina scrutari; longaeque optime fecisse Herophilum et Erasistratum, qui nocentes homines, a regibus ex carcere acceptos, vivos inciderint, considerantque,

etiamnum spiritu remanente, ea, quae natura ante clausisset, eorumque positum, colorem, figuram, magnitudinem, ordinem, duritiem, mollitiem, laevorem, contactum; processus deinde singulorum et recessus, et sive quid inseritur alteri, sive quid partem alterius in se recipit. Neque enim, quum dolor intus incidit, scire quid doleat, eum, qui, qua parte quodque viscus intestinumve sit, non cognoverit: neque curari id, quod aegrum est, posse ab eo, qui, quid sit, ignoret. Et quum per vulnus alicujus viscera patefacta sunt, eum, qui sanae cujusque colorem partis ignoret, nescire quid integrum, quid corruptum sit; ita ne succurrere quidem posse corruptis. Aptiusque extrinsecus imponi remedia, comperitis interiorum et sedibus et figuris, cognitaque eorum magnitudine: similesque omnia, quae [intus] posita sunt, rationes habere. Neque esse crudele, sicut plerique proponunt, hominum nocentium, et horum quoque paucorum, supplicis, remedia populis innocentibus saeculorum omnium quaeri.

Contra ii, qui se *ἐμπειρικούς* ab experientia nominant, evidentes quidem causas, ut necessarias, amplectuntur: ob scurarum vero causarum et naturalium actionum quaestionem ideo supervacuam esse contendunt, quoniam non comprehensibilis natura sit. Non posse vero comprehendi, patere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia; quum de ista re, neque inter sapientiae professores, neque inter ipsos medicos conveniat. Cur enim potius aliquis Hippocrati credat, quam Herophilo? cur huic potius, quam Asclepiadi? Si rationes sequi velit, omnium posse videri non improbabilis; si curationes, ab omnibus his aegros perductos esse ad sanitatem. Ita neque disputationi, neque auctoritati cujusquam fidem derogari oportuisse: etiam sapientiae studiosos maximos medicos esse, si ratiocinatio hoc faceret; nunc illis verba superesse, deesse medendi scientiam. Differre quoque pro natura locorum genera medicinae; et aliud opus esse Romae, aliud in Aegypto, aliud in Gallia. Quod si morbos eae causae facerent, quae ubique eadem essent, remedia quoque ubique eadem esse debuissent. Saepe etiam causas apparere, ut puta lippitudinis, vulneris; neque ex his patere medicinam. Quod si scientiam hanc non subjiciat evidens

causa, multo minus eam posse subicere, quae in dubio est. Quum igitur illa incerta, incomprehensibilis sit, a certis potius et exploratis petendum esse praesidium; id est, iis, quae experientia in ipsis curationibus docuerit; sicut in ceteris omnibus artibus; nam ne agricolam quidem aut gubernato-⁵ rem disputatione, sed usu fieri. Ac nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere, eo quoque disci, quod qui diversa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse, quia non ab obscuris causis, neque a naturalibus actionibus, quae apud eos diversae erant,¹⁰ sed ab experimentis, prout cuique responderant, medendi vias traxerint. Ne inter initia quidem ab istis quaestionibus deductam esse medicinam, sed ab experimentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erant, alios propter aviditatem primis diebus protinus cibum assumpsisse, alios propter fastidium ab-¹⁵ stinuisse; levatumque magis eorum morbum esse, qui abstinerant. Itemque alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulo ante eam, alios post remissionem ejus; optime deinde iis cessasse, qui post finem febris id fecerant. Eademque ratione alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore, alios exi-²⁰ guo; gravioresque eos factos, qui se implerant. Haec similiaque quum quotidie inciderent, diligentes homines notasse, quae plerumque melius responderent: deinde aegrotantibus ea praecipere coepisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciose discernentem a salu-²⁵ taribus. Repertis deinde jam remediis, homines de rationibus eorum disserere coepisse: nec post rationem medicinam esse inventam; sed post inventam medicinam rationem esse quaesitam. Requiere etiam ratio idem doceat quod experientia, an aliud: si idem, supervacuum esse; si aliud, etiam³⁰ contrariam. Primo tamen remedia exploranda summa cura fuisse, nunc vero jam explorata esse; neque aut nova genera morborum reperiri, aut novam desiderari medicinam. Quod si jam incidat mali genus aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris: sed eum protinus visu-³⁵ rum, cui morbo id proximum sit; tentaturumque remedia similia illis, quae vicino malo saepe succurrerint, et per ejus similitudinem opem reperturum. Neque enim se dicere, consilio

medicum non egere, et irrationale animal hanc artem posse
 praestare; sed has latentium rerum conjecturas ad rem non
 pertinere; quia non intersit, quid morbum faciat, sed quid
 tollat, neque quomodo, sed quid optime digeratur; sive hac
 5 de causa concoctio incidat, sive de illa; et sive concoctio sit
 illa, sive tantum digestio. Neque quaerendum esse quomodo
 spiremus, sed quid gravem tardumque spiritum expediat; ne-
 que quid venas moveat, sed quid quaeque motus genera signi-
 ficient. Haec autem cognosci experimentis. Et in omnibus
 10 ejusmodi cogitationibus in utramque partem disseri posse; ita-
 que ingenium et facundiam vincere; morbos autem non elo-
 quentia, sed remediis curari. Quae si quis elinguis usu dis-
 creta bene norit, hunc aliquanto majorem medicum futurum,
 quam si sine usu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem,
 15 de quibus est dictum, supervacua esse tantummodo; id vero,
 quod restat, etiam crudele: vivorum hominum alvum atque
 praecordia incidi, et salutis humanae praesidem artem non so-
 lum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam, inferre; quum
 praesertim ex iis, quae tanta violentia quaerantur, alia non
 20 possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam
 colorem, laevorem, mollitiem, duritiem, similiaque omnia, non
 esse talia, inciso corpore, qualia integro fuerint: quia quum,
 corporibus inviolatis, haec tamen metu, dolore, inedia, crudi-
 tate, lassitudine, mille aliis mediocribus affectibus saepe mu-
 25 tentur; multo magis verisimile est, interiora, quibus major
 mollities, et lux ipsa nova sit, sub gravissimis vulneribus et
 ipsa trucidatione mutari. Neque quidquam esse stultius, quam
 quale quid vivo homine est, tale existimare esse moriente,
 imo jam mortuo; nam uterum (sc. *ventrem*) quidem, qui minus
 30 ad rem pertineat, spirante homine posse diduci: simul atque
 vero ferrum ad praecordia accessit, et discissum transversum
 septum est, quod membrana quadam superiores partes ab infe-
 rioribus diducit (*διάφραγμα* Graeci vocant), hominem protinus
 animam amittere: ita mortui demum praecordia et viscus
 35 omne in conspectum latrocinantis medici dari necesse est tale,
 quale mortui sit, non quale vivi fuit. Itaque consequi medicum
 ut hominem crudeliter jugulet, non ut sciat, qualia vivi viscera
 habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine

conspectui subjiciatur, id saepe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in arena, vel militem in acie, vel viatorem a latronibus exceptum sic vulnerari, ut ejus interior aliqua pars aperiatur, et in alio alia: ita sedem, positum, ordinem, figuram, similiaque alia cognoscere prudentem medicum, non caedem, sed sanitatem molientem; idque per misericordiam discere, quod alii dira crudelitate cognorint. Ob haec ne mortuorum quidem lacerationem necessariam esse, quae, etsi non crudelis, tamen foeda sit; quum aliter pleraque in mortuis se habeant: quantum vero in vivis cognosci potest, ipsa curatio ostendat.

Quum haec per multa volumina, perque magnae contentionis disputationes a medicis saepe tractata sint atque tractentur: subjiciendum est, quae proxima vero videri possint. Ea neque addicta alterutri opinioni sunt, neque ab utraque nimium abhorrentia; media quodammodo inter diversas sententias: quod in plurimis contentionibus deprehendere licet, sine ambitione verum scrutantibus, ut in hac ipsa re; nam quae demum causae, vel secundam valetudinem praestent, vel morbos excitent; quomodo spiritus, aut cibus, vel trahatur, vel digeratur, ne sapientiae quidem professores scientia comprehendunt, sed conjectura persequuntur. Cujus autem rei non est certa notitia, ejus opinio certum reperire remedium non potest. Verumque est, ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quamquam igitur multa sint ad ipsas artes proprie non pertinentia, tamen eas adjuvant, excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturae rerum contemplatio, quamvis non faciat medicum, aptiorem tamen medicinae reddit. Verique simile est, et Hippocratem et Erasistratum et quicumque alii, non contenti febres et ulcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideo quidem medicos fuisse, verum ideo quoque majores medicos extitisse. Ratione vero opus est ipsi medicinae, etsi non inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, tamen saepe; est enim haec ars conjecturalis; neque respondet ei plerumque non solum conjectura, sed etiam experientia. Et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur, sicut assuevit. Rarius, sed aliquando morbus quoque ipse no-

vas est: quem non incidere, manifeste falsum est; quum aetate
 nostra quaedam, ex naturalibus partibus carne prolapsa et
 arente, intra paucas horas expiraverit sic, ut nobilissimi me-
 dici neque genus mali, neque remedium invenerint. Quos eo
 5 nihil tentasse judico, quia nemo in splendida persona periculi-
 tari conjectura sua voluerit, ne occidisse, nisi servasset, vi-
 deretur: veri tamen simile est, potuisse aliquid cogitari, de-
 tracta tali verecundia; et fortasse responsurum fuisse id, quod
 aliquis esset expertus. Ad quod medicinae genus neque sem-
 10 per similitudo aliquid confert; et si quando confert, tamen id
 ipsum rationale est, inter multa similia genera et morborum
 et remediorum, cogitare, quo potissimum medicamento sit
 utendum. Quum igitur talis res incidit, medicus aliquid oportet
 inveniat, quod non utique fortasse, sed saepius tamen
 15 etiam respondeat. Petet autem novum quoque consilium non
 ab rebus latentibus, istae enim dubiae et incertae sunt, sed ab
 iis, quae explorari possunt, id est evidentibus causis. Interest
 enim, fatigatio morbum, an sitis, an frigus, an calor, an vigilia,
 an fames fecerit, an cibi vinique abundantia, an intemperan-
 20 tia libidinis. Neque ignorare hunc oportet, quae sit aegri
 natura: humidum magis, an magis siccum corpus ejus sit;
 validi nervi, an infirmi; frequens adversa valetudo, an rara;
 eaque, quum est, vehemens esse soleat, an levis; brevis, an
 longa: quod is vitae genus sit sequutus, laboriosum, an quie-
 25 tum; cum luxu, an cum frugalitate. Ex his enim, similibus-
 que, saepe curandi nova ratio ducenda est.

Quamvis ne haec quidem sic praeteriri debent, quasi nul-
 lam controversiam recipiant; nam et Erasistratus non ex his
 fieri morbos dixit; quoniam et alii, et iidem alias post ista
 30 non febricitarent: et quidam medici saeculi nostri, sub au-
 ctore, ut ipsi videri volunt, Themisone, contendunt, nullius
 causae notitiam quidquam ad curationes pertinere; satisque
 esse, quaedam *communia* morborum intueri. Siquidem ho-
 rum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, ter-
 35 tium mixtum. Nam modo parum excernere aegros, modo
 nimium; modo alia parte parum, alia nimium. Haec autem
 genera morborum modo acuta esse, modo longa; et modo in-
 crescere, modo consistere, modo minui. Cognito igitur eo,

quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse; si profluvio laborat, continendum; si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo. Et aliter acutis morbis medendum, aliter vetustis, aliter incrementibus, aliter subsistentibus, aliter jam ad sanitatem inclinatibus. Horum observationem medicinam esse; quam ita finiunt, ut quasi viam quamdam, quam μέθοδον Graeci nominant, eorumque, quae in morbis communia sunt, contemplatricem esse contendunt. Ac neque rationalibus se, neque experimenta tantum spectantibus adnumerari volunt: quum ab illis eo nomine dissentiant, quod in conjectura rerum latentium nolunt esse medicinam; ab his eo, quod parum artis esse in observatione experimentorum credunt. Quod ad Erasistratum pertinet, primum ipsa evidentia ejus opinioni repugnat; quia raro, nisi post horum aliquid, morbus venit. Deinde non sequitur, ut quod alium non afficit, aut eundem alias, id ne alteri quidem, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim quaedam subesse corpori, vel ex infirmitate ejus, vel ex aliquo affectu, quae vel in alio non sunt, vel in hoc alias non fuerunt; eaque per se non tanta, ut concitent morbum, tamen obnoxium magis aliis injuriis corpus efficiant. Quod si contemplationem rerum naturae, quam non temere medici sibi vindicant, satis comprehendisset, etiam illud scisset, nihil omnino ob unam causam fieri, sed id pro causa apprehendi, quod contulisse plurimum videtur. Potest autem id, dum solum est, non movere, quod junctum aliis maxime movet. Accedit ad haec, quod ne ipse quidem Erasistratus, qui transfuso in arterias sanguine febrem fieri dicit, idque nimis repleto corpore incidere, reperit, cur ex duobus aequè repletis, alter in morbum inciderit, alter omni periculo vacarit; quod quotidie fieri apparet. Ex disci potest, ut vera sit illa transfusio, tamen illam non per se, quum plenum corpus est, fieri, sed quum horum aliquid accesserit. Themisonis vero aemuli, si perpetua, quae promittunt, habent, magis etiam quam ulli, rationales sunt. Neque enim, si quis non omnia tenet, quae rationalis alius probat, protinus alio novo nomine indiget; si modo, quod primum est, non memoriae soli, sed rationi quoque insistit. Sin, quod vero propius est, vix ulla perpetua praecepta me-

dicinalis ars recipit (cf. II, 10; III, 4), idem sunt, quod ii, quos
 experimenta sola sustinent: eo magis, quoniam, compresserit
 aliquem morbus, an fuderit, quilibet etiam imperitissimus videt:
 quid autem compressum corpus resolvat, quid solutum teneat,
 si a ratione tractum est, rationalis est medicus; si, ut ei qui se
 rationalem negat, confiteri necesse est, ab experientia, em-
 piricus. Ita apud eum morbi cognitio extra artem, medicina
 intra usum est. Neque adjectum quidquam empiricorum pro-
 fessione, sed demtum est; quoniam illi multa circumspiciunt,
 hi tantum facillima, et non plus, quam vulgaria; nam et ii,
 qui pecoribus ac iumentis medentur, quum propria cujusque
 ex mutis animalibus nosse non possint, communibus tantum-
 modo insistent; et exteræ gentes, quum subtilem medicinæ
 rationem non noverint, communia tantum vident; et qui am-
 pla valetudinaria nutriunt, quia singulis summa cura consu-
 lere non sustinent, ad communia ista confugiunt. Neque, her-
 cules, istud antiqui medici nescierunt, sed his contenti non
 fuerunt. Ergo etiam vetustissimus auctor Hippocrates (*Epid.*
 I, sect. 3, § 10) dixit, mederi oportere et communia et pro-
 pria intuentem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam professionem
 consistere ullo modo possunt: siquidem et compressorum et
 fluentium morborum genera diversa sunt; faciliusque id in iis,
 quæ fluunt, inspicere potest. Aliud est enim sanguinem, aliud
 bilem, aliud cibum vomere; aliud dejectionibus, aliud tormi-
 nibus laborare; aliud sudore digeri, aliud tabe consumi. At-
 que in partes quoque humor erumpit, ut in oculos, auresque:
 quo periculo nullum humanum membrum vacat. Nihil autem
 horum sic, ut aliud, curatur. Ita protinus in his a communi
 fluentis morbi contemplatione ad propriam medicina descen-
 dit. Atque in hac quoque rursus alia proprietatis notitia sæpe
 necessaria est; quia non eadem omnibus, etiam in similibus
 casibus, opitulantur: siquidem certæ quaedam res sunt, quæ
 in pluribus ventrem aut adstringunt, aut resolvunt; inveniun-
 tur tamen, in quibus aliter, atque in ceteris, id eveniat. In
 his ergo communium inspectio contraria est, propriorum tan-
 tum salutaris. Et causæ quoque aestimatio sæpe morbum
 solvit. Ergo etiam ingeniosissimus sæculi nostri medicus,
 quem nuper vidimus, Cassius, febricitanti cuidam, et magna

siti affecto, quum post ebrietatem eum premi coepisse cognosset, aquam frigidam ingessit. Qua ille epota, quum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno et sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune providit, non ex eo, quod aut adstrictum corpus erat, aut fluebat; sed ex ea causa, quae ante praecesserat. Estque etiam proprium aliquid et loci et temporis istis quoque auctoribus: qui quum disputant, quemadmodum sanis hominibus agendum sit, praecipiunt, ut gravibus aut locis aut temporibus magis vitetur frigus, aestus, satietas, labor, libido; magisque ut conquiescat iisdem locis aut temporibus, si quis gravitatem corporis sentit; ac neque vomitu stomachum, neque purgatione alvum sollicitet. Quae vera quidem sunt; a communibus tamen ad quaedam propria descendunt. Nisi persuadere nobis volunt, sanis quidem considerandum esse, quod coelum, quod tempus anni sit; aegris vero non esse: quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quin etiam morborum in iisdem hominibus aliae atque aliae proprietates sunt; et qui secundis aliquando frustra curatus est, contrariis saepe restituitur. Plurimaeque in dando cibo discrimina reperiuntur: ex quibus contentus uno ero. Nam famem facilius adolescens, quam puer (*Aph.* I, 13); facilius in denso coelo, quam in tenui; facilius hieme, quam aestate; facilius uno cibo, quam prandio quoque assuetus; facilius inexercitatus, quam exercitatus homo sustinet. Saepe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus inediam tolerat. Ob quae concipio, eum, qui propria non novit, communia tantum intueri debere; eumque, qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negligere, sed his quoque insistere. Ideoque, quum par scientia sit, utiliorem tamen medicum esse amicum, quam extraneum.

Igitur, ut ad propositum meum redeam, rationalem quidem puto medicinam esse debere: instrui vero ab evidentibus causis; obscuris omnibus, non a cogitatione artificis, sed ab ipsa arte rejectis. Incidere autem vivorum corpora, et saepe crudele, et supervacuum est: mortuorum, discentibus necessarium; nam positum et ordinem nosse debent; quae cadaver melius, quam vivus et vulneratus homo, repraesentant.

Sed et cetera, quae modo in vivis cognosci possunt, in ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius, sed aliquanto mitius usus ipse monstrabit. His propositis, primum dicam, quemadmodum sanos agere conveniat: tum ad ea transibo, quae ad morbos curationesque eorum pertinebunt.

CAPUT I.

Qualiter se sanus agere debeat.

Sanus homo, qui et bene valet, et suae spontis est, nullis obligare se legibus debet; ac neque medico, neque alipta
10 egere. Hunc oportet varium habere vitae genus: modo ruri esse, modo in urbe, saepiusque in agro; navigare, venari, quiescere interdum, sed frequentius se exercere: siquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat (Hipp. *Vict. rat.* II, 60); illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit.
15 Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis uti; modo ungi, modo id ipsum negligere; nullum cibi genus fugere, quo populus utatur; interdum in convivio esse, interdum ab eo se retrahere; modo plus justo, modo non amplius assumere; bis die potius, quam semel cibum capere, et semper
20 quam plurimum, dummodo hunc concoquat. Sed ut huius generis exercitationes cibique necessarii sunt; sic athletici supervacui; nam et intermissus, propter civiles aliquas necessitates, ordo exercitationis corpus affligit: et ea corpora, quae more eorum repleta sunt, celerrime et senescunt,
25 et aegrotant.

Concubitus vero neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est: rarus corpus excitat; frequens solvit. Quum autem frequens non numero sit, sed ratione aetatis et corporis, scire licet, eum non inutilem esse, quem corporis neque languor, neque dolor sequitur. Item interdiu
30 pejor est, noctu tutior: ita tamen, si neque illum cibus, neque hunc cum vigilia labor statim sequitur. Haec firmis servanda sunt; cavendumque, ne in secunda valetudine adversae praesidia consumantur.

CAPUT II.

Qualiter se agere debeant qui imbecilles sunt.

At imbecillis (quo in numero magna pars urbanorum, omnesque paene cupidi literarum sunt), observatio major necessaria est; ut, quod vel corporis, vel loci, vel studii ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur, qui bene concoxit, mane tuto surget; qui parum, quiescere debet, et, si mane surgendi necessitas fuerit, redormire: qui non concoxit, ex toto conquiescere, ac neque labori se, neque exercitationi, neque negotiis credere. Qui crudum sine praecordiorum dolore ructat, is ex intervallo aquam frigidam bibere, et se nihilo minus continere. Habitare vero aedificio lucido, perflatum aestivum, hibernum solem habente; cavere meridianum solem, matutinum et vespertinum frigus; itemque auras fluminum atque stagnorum; minimeque, nubilo coelo, soli aperiendi, se committere, ne modo frigus, modo calor moveat; quae res maxime gravedines destillationesque concitat. Magis vero gravibus locis ista servanda sunt, in quibus etiam pestilentiam faciunt. Scire autem licet, integrum corpus esse, quum quotidie mane urina alba, deinde rufa est: illud concoquere, hoc concoxisse significat. Ubi expectatus est aliquis, paulum intermittere: deinde, nisi hiems est, fovere os multa aqua frigida debet. Longis diebus meridiari potius ante cibum; sin minus, post eum: per hiemem potissimum totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, non post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdiu vel domestica, vel civilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod servandum curationi corporis sui est. Prima autem ejus curatio, exercitatio est, quae semper antecedere cibum debet: in eo, qui minus laboravit, et bene concoxit, amplior; in eo, qui fatigatus est, et minus concoxit, remissior. Commode vero exercent clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio; atque haec non utique plana, commodior est; siquidem melius ascensus quoque et descensus cum quadam varietate corpus movet; nisi tamen id perquam imbecillum est. Melior autem

est sub divo, quam in porticu; melior, si caput patitur, in sole, quam in umbra; melior in umbra quam parietes aut viridia efficiunt, quam quae tecto subest; melior recta, quam flexuosa. Exercitationis autem plerumque finis esse debet
 5 sudor, aut certe lassitudo, quae citra fatigationem sit: idque ipsum modo minus, modo magis faciendum est. Ac ne his quidem, athletarum exemplo, vel certa esse lex, vel immodicus labor debet. Exercitationem recte sequitur modo unctio, vel in sole, vel ad ignem; modo balneum, sed conclavi
 10 quam maxime et alto et lucido et spatioso. Ex his vero neutrum semper fieri oportet; sed saepius alterutrum, pro corporis natura. Post haec paulum conquiescere opus est. Ubi ad cibum ventum est, numquam utilis est nimia satietas; saepe inutilis nimia abstinentia; si qua intemperantia subest,
 15 tutior est in potione, quam in esca (cf. *Aph.* II, 11). Cibus a salsamentis, oleribus, similibusque rebus melius incipit: tum caro assumenda est, quae assa optima, aut elixa est. Condita omnia duabus de causis inutilia sunt; quoniam et plus propter dulcedinem assumitur, et quod modo par est, tamen
 20 aegrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coacescit. Si quis itaque hoc parum valet, palmulas, pomaque, et similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quae aliquantum sitim excesserunt, nihil edendum est: post satietatem, nihil agendum. Ubi ex-
 25 pletus est aliquis, facilius concoquit, si quidquid assumsit, potione aquae frigidae includit, tum paulisper invigilat, deinde bene dormit. Si quis interdiu se implevit, post cibum neque frigori, neque aestui, neque labori se debet committere: neque enim tam facile haec inani corpore, quam repleto nocent.
 30 Si quibus de causis futura inedia est, labor omnis vitandus est. (*Hipp. Aph.* II, 16.)

CAPUT III.

Observationes circa corporum genera, aetates, et tempora anni.

Atque haec quidem paene perpetua sunt. Quasdam au-
 35 tem observationes desiderant et novae res, et corporum ge-

nera, et aetates, et tempora anni. Nam neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in gravem, prima hieme; ex gravi in eum, qui salubris est, prima aestate transire melius est. Neque vero ex multa fame nimia satietas; neque ex nimia satietate fames idonea est (cf. *Aph.* II, 4). Periclitaturque, et qui semel, et qui bis die cibum incontinenter, contra consuetudinem, assumit (*Hipp. Vict. rat. acut.* § 9). Item neque ex nimio labore subitum otium, neque ex nimio otio subitus labor, sine gravi noxa est. Ergo, quum quis mutare aliquid velit, paulatim debeat assuescere (*Aph.* II, 50). Omnem etiam laborem facilius vel puer vel senex, quam insuetus homo sustinet (*Aph.* II, 49). Atque ideo quoque nimis otiosa vita utilis non est; quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laboravit, aut si multo plus, quam solet, etiam is, qui assuevit, huic jejuno dormiendum est: multo magis, si etiam os amarum est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo jejuno est, sed etiam in posterum diem permanendum; nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est, surgere oportet, et lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis aliquis laboravit, tamen ingredi aliquid eodem modo debet. Communia deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumpturis, ubi paulum ambulaverunt, si balneum non est, calido loco, vel in sole, vel ad ignem ungi, atque sudare; si est, ante omnia in tepidario sedere, deinde, ubi paulum conquieverunt, intrare et descendere in solium; tum multo oleo ungi, leniterque perfricari, iterum in solium descendere: post haec os aqua calida, deinde frigida fovere. Balneum his fervens idoneum non est. Ergo si nimium alicui fatigato paene febris est, huic abunde est loco tepido demittere se inguinibus tenuis in aquam calidam, cui paulum olei sit adjectum; deinde totum quidem corpus, maxime tamen eas partes, quae in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui vinum et paulum contriti salis sit adjectum. Post haec omnibus fatigatis aptum est cibum sumere, eoque humido uti; aqua, vel certe diluta potione esse contentos; maximeque ea, quae moveat urinam. Illud quoque nosse oportet

tet, quod ex labore sudanti frigida potio perniciosissima est;
 atque etiam, quum sudor se remisit, itinere fatigatis inutilis.
 A balneo quoque venientibus Asclepiades inutilem eam ju-
 dicavit: quod in iis verum est, quibus alvus facile, nec tuto,
 5 resolvitur, quique facile inhorrescunt; perpetuum in omnibus
 non est, quum potius naturale sit, potione aestuantem sto-
 machum refrigerari. Quod ita praecipio, ut tamen fatear, ne
 ex hac quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum esse.
 Solet etiam prodesse, post varium cibum, frequentesque di-
 10 lutas potiones, vomitus, et postero die longa quies, deinde
 modica exercitatio. Si assidua fatigatio urget, invicem modo
 aqua, modo vinum bibendum est, raroque balneo utendum.
 Levatque lassitudinem etiam laboris mutatio: eumque, quem
 novum genus laboris pressit, id, quod in consuetudine est,
 15 reficit. Fatigato quotidianum cubile tutissimum est: insolitum
 contra lassat. Quod enim contra consuetudinem est, nocet,
 seu molle, seu durum est (cf. Hipp. *Vict. rat. acut.* § 12).

Proprie quaedam ad eum pertinent, qui ambulando fatiga-
 tur. Hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio; post
 20 iter, primum sedile, deinde unctio: tum calida aqua in balneo
 magis inferiores partes, quam superiores foveat. Si quis
 vero exustus in sole est, huic in balneum protinus eundum,
 perfundendumque oleo corpus et caput; deinde in solium
 bene calidum descendendum est; tum multa aqua per caput
 25 infundenda, prius calida, deinde frigida. At ei, qui perfrixit,
 opus est in balneo primum involuto sedere, donec insudet
 (cf. cap. 4 et II, 17); tum ungi; deinde lavari: cibum modi-
 cum, potiones meracas assumere. Is vero qui navigavit, et
 nausea pressus est, si multam bilem evomit, vel abstinere
 30 a cibo debet, vel paulum aliquid assumere; si pituitam aci-
 dam effudit, utique sumere cibum, sed assueto leviores; si
 sine vomitu nausea fuit, vel abstinere, vel post cibum vo-
 mere. Qui vero toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis
 sedit, huic nihil currendum, sed lente ambulandum est: lenta
 35 quoque in balneo mora, dein coena exigua prodesse consue-
 verunt. Si quis in balneo aestuat, reficit hunc ore exceptum,
 et in eo retentum acetum: si id non est, eodem modo frigida
 aqua assumpta.

Ante omnia autem norit quisque naturam sui corporis: quoniam alii graciles, alii obesi sunt, alii calidi, alii frigidiores, alii humidi, alii sicci; alios adstricta, alios resoluta alvus exercet: raro quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis vero homo implere se debet, plenus 5 extenuare, calidus refrigerare, frigidus calefacere, madens siccare, siccus madefacere: itemque alvum firmare is, cui fusa; solvere is, cui adstricta est: succurrendumque semper parti maxime laboranti est.

Implet autem corpus modica exercitatio, frequentior quies, 10 unctio, et, si post prandium est, balneum, contracta alvus, modicum frigus hieme, somnus et plenus et non nimis longus, molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos et potiones maxime dulcia et pingua, cibus et frequentior et quantus plenissimus potest concoqui. Extenuat corpus aqua calida, si 15 quis in eam descendit, magisque si salsa est; in jejuno balneum, inurens sol et omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium vel brevis vel longus; durum cubile (Hipp. *De sal. diaeta* § 4); cursus, multa ambulatio, omnisque vehemens exercitatio, vomitus, dejectio, acidae res et austerae, et semel 20 die assumtae, et vini non praefrigidi potio jejuno in consuetudinem adducta.

Quum vero inter extenuantia posuerim vomitum et dejectionem, de his quoque proprie quaedam dicenda sunt. Ejectum esse ab Asclepiade vomitum in eo volumine, quod *De 25 tuenda sanitate* composuit, video: neque reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quotidie ejiciendo, vorandi facultatem moliuntur. Paulo etiam longius processit: idem purgationes quoque eodem volumine expulit. Et sunt eae perniciosae, si nimis valentibus medicamentis sunt; sed 30 haec tamen submovenda esse, non est perpetuum; quia corporum temperumque ratio potest ea facere necessaria, dum et modo, et non nisi quum opus est, adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si quid jam corruptum esset, expelli debere confessus est: ita non ex toto res condemnanda est; sed esse 35 ejus etiam plures causae possunt; estque in ea quaedam paulo subtilior observatio adhibenda.

Vomitus utilior est hieme, quam aestate (cf. *Aph.* IV, 4):

nam tunc et pituitae plus, et capitis gravitas major subest. Inutilis est gracilibus, et imbecillum stomachum habentibus: utilis plenis et biliosis omnibus, si vel nimium se replerunt, vel parum concoxerunt; nam sive plus est, quam quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur, non oportet; sive corruptum est, nihil commodius est, quam id, qua via primum expelli potest, ejicere. Itaque, ubi amari ructus cum dolore et gravitate praecordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est (cf. *Aph.* IV, 17). Idem prodest ei, cui pectus
 10 aestuat, et frequens saliva, vel nausea est; aut sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum est: similiterque ei, qui vel coelum, vel locum mutat; iisque, quibus, si per plures dies non vomuerunt, dolor praecordia infestat. Neque ignoro inter haec praecipui quietem: quae non semper contingere
 15 potest agendi necessitatem habentibus; nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuriae causa fieri non oportere confiteor; interdum valetudinis causa recte fieri, experimentis credo: cum eo tamen, ne quis, qui valere et senescere volet, hoc quotidianum habeat. — Qui vomere post cibum vult, si ex
 20 facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere; si difficilior, aquae vel salis, vel mellis paulum adjicere. At qui mane vomiturus est, ante bibere mulsum, vel hyssopum, aut esse radiculam debet; deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cetera, quae antiqui medici praece-
 25 perunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi, sed hujus idonei, gustandum, et aquae frigidae cyathi tres bibendi sunt, nisi tamen fauces vomitus exasperarit. Qui vomuit, si mane id fecit, ambulare debet, tum ungi, deinde coenare: si post coenam,
 30 postero die lavari, et in balneo sudare. Huic proximus cibus mediocris utilior est; isque esse debet cum pane hesterno, vino austero meraco, et carne assa, cibisque omnibus quam siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius consulat, si biduo continuarit, quam si post quintumdecimum diem vomuerit (*Hipp. De salubri diaeta* § 5); nisi haec mora gravitatem pectori faciet.

Dejectio autem a medicamento quoque petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoque inflationes, cali-

gines, capitis dolores, aliaque superioris partis mala incrementum. Quid enim inter haec adjuvare possunt quies et inedia, per quae illa maxime eveniunt? Qui deicere vult, primum cibus vinisque utetur iis, quae hoc praestant; dein, si parum illa proficient, aloenumat. Sed purgationes quoque, sicut interdum necessariae sunt, sic, ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus; quum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit.

Calefacit autem unctio, aqua salsa, magisque si calida est, omnia salsa, amara, carnosa, si post cibum est, balneum, vinum austerum. Refrigerat in jejuno et balneum, et somnus, nisi nimis longus est, omnia acida; aqua quam frigidissima; oleum, si aqua miscetur. Humidum autem corpus efficit labor minor, quam ex consuetudine, frequens balneum, cibus plenior, multa potio; post haec ambulatio, et vigilia; 15 per se quoque ambulatio multa et vehemens, et matutinae exercitationi non protinus cibus adjectus; ea genera escae, quae veniunt ex locis frigidis, et pluviis, et irriguis. Contra siccata immodica exercitatio, fames, unctio sine aqua, calor, sol immodicus, frigida aqua, cibus exercitationi statim subiectus, et is ipse ex siccis et aestuosis locis veniens.

Alvum adstringit labor, sedile, creta figularis corpori illita, cibus imminutus, et is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet; exigua potio, neque adhibita, nisi quum cibi quis quantum assumpturus est, cepit; post cibum quies. Contra solvit aucta ambulatio atque esca, motus qui post cibum est, subinde potiones cibo immixtae. Illud quoque scire oportet, quod ventrem vomitus solutum comprimit, compressum solvit: itemque comprimit is vomitus, qui statim post cibum est; solvit is, qui tarde supervenit. 20

Quod ad aetates vero pertinet, inediam facillime sustinent mediae aetates, minus juvenes, minime pueri et senectute confecti (*Aph.* I, 13). Quo minus fert facile quisque, eo saepius debet cibum assumere; maximeque eo eget, qui incrementum (*Aph.* I, 14). Calida lavatio et pueris et senibus apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius, neutri aetati quae inflationes movent. Juvenum minus, quae assumant, et quomodo curentur, interest. Quibus juvenibus fluxit

alvus, plerumque in senectute contrahitur: quibus in adolescentia fuit adstricta, saepe in senectute solvitur (*Aph.* II, 20). Melior est autem in juvene fusior, in sene adstrictior (cf. *Aph.* II, 53).

5 Tempus quoque anni considerare oportet. Hieme plus esse convenit (*Aph.* I, 15; cf. 18); minus, sed meracius bibere; multo pane uti, carne potius assa, modice oleribus (cf. Hipp. *De diaeta salubri* § 1) semel die cibum capere, nisi si nimis venter adstrictus est. Si prandet aliquis, utilis
10 est exiguum aliquid, et ipsum siccum sine carne, sine portione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, vel calorem moventibus. Venus tum non aequè perniciosa est. At vere paulum cibo demendum, adjiciendumque potioni, sed dilutius tamen bibendum est; magis carne
15 utendum, magis oleribus; transeundum paulatim ab assis ad elixa. Venus eo tempore anni tutissima est. Aestate vero et portione et cibo saepius corpus eget; ideo prandere quoque commodum est. Eo tempore aptissima sunt et caro et olus; potio quam dilutissima, ut et sitim tollat, nec corpus incendat; frigida lavatio, caro elixa, frigidi cibi, vel qui refrigerent.
20 Ut saepius autem cibo utendum, sic exiguo est. Per autumnum vero, propter coeli varietatem, periculum maximum est (cf. *Aph.* III, 4). Itaque neque sine veste, neque sine calceamentis prodire oportet, praecipueque diebus frigidioribus, neque sub divo noctu dormire, aut certe bene operiri. Cibo vero jam paulo pleniore uti licet; minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quae immodice toto die plerumque sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur: ita non haec, sed consummatio omnium nocet.
30 Ex quibus in nullo tamen minus, quam in his noxae est. Sed his uti non saepius, quam alio cibo, convenit. Denique aliquid densiori cibo, quum hic accedit, necessarium est demi. Neque aestate vero, neque autumno utilis venus est: tolerabilior tamen per autumnum; aestate in totum, si fieri
35 potest, abstinendum est.

CAPUT IV.

De his quibus caput infirmum est.

Proximum est, ut de iis dicam, qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is, si bene concoxit, leniter perfricare id mane manibus suis debet; numquam id, si fieri potest, veste velare; ad cutem tonderi; sed numquam post cibum (cf. cap. 5). Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere; multum ambulare, sed, si licet, neque sub tecto, neque in sole; utique autem vitare solis ardorem, maximeque post cibum et vinum; potius ungi, quam lavari; numquam ad flammam ungi, interdum ad prunam. Si in balneum venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare, ibi ungi, tum transire in calidarium; ubi insudarit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per caput se totum perfundere, tum tepida, deinde frigida; diutiusque ea caput, quam ceteras partes perfundere; deinde id aliquamdiu perfricare; novissime detergere, et ungere. Capiti nihil aequè prodest atque aqua frigida: itaque is, cui hoc infirmum est, per aestatem id bene largo canali quotidie debet aliquamdiu subijcere. Semper autem, etiamsi sine balneo unctus est, neque totum corpus refrigerare sustinet, caput tamen aqua frigida perfundere. Sed quum ceteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad cervices aqua descendat; eamque, ne quid oculis, aliisve partibus noceat, defluentem subinde manibus ad hoc regerere. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat; isque, si jejuno caput laeditur, assumendus etiam medio die est; si non laeditur, semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutum, lene, quam aquam, magis expedit; ut, quum caput gravius esse coeperit, sit quo confugiat: eique ex toto neque vinum, neque aqua semper utilia sunt; medicamentum utrumque est, quum invicem assumitur (cf. III, 2). Scribere, legere, voce contendere, huic opus non est, utique post coenam; post quam ne cogitatio quidem ei satis tuta est: maxime tamen vomitus alienus est.

CAPUT V.

De his qui lippitudine, gravedine, destillatione, tonsillisque laborant.

Neque vero his solis, quos capitis imbecillitas torquet,
 5 usus aquae frigidae prodest, sed iis etiam, quos assiduae
 lippitudines, gravedines, destillationes, tonsillaeque male
 habent. His autem non caput tantum quotidie perfundendum,
 sed os quoque multa frigida aqua fovendum est; praecipueque
 omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi
 10 gravius coelum austri reddiderunt. Quumque omnibus inutilis
 sit post cibum aut contentio, aut cogitatio; tum iis praecipue,
 qui vel capitis, vel arteriae (*asperae*) dolores habere con-
 suerunt, vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiam gra-
 vedines, destillationesque possunt, si quam minime, qui his
 15 opportunus est, loca aquasque mutat; si caput in sole prote-
 git, ne incendatur, neve subitum ex repentino nubilo frigus
 id moveat; si post concoctionem jejunos caput radit; si post
 cibum neque legit, neque scribit.

CAPUT VI.

De alvo soluta.

20

Quem vero frequenter cita alvus exercet, huic opus est
 pila similibusque superiores partes exercere; dum jejunos
 est, ambulare; vitare solis nimium ardorem, continua bal-
 nea; ungi citra sudorem; non uti cibis variis, minimeque ju-
 25 vententis, aut leguminibus oleribusve iis, quae celeriter descen-
 dunt; omnia denique sumere quae tarde concoquuntur. Ve-
 natio, durique pisces, et ex domesticis animalibus assa caro
 maxime juvant. Numquam vinum salsum bibere expedit, ne
 tenue quidem, aut dulce; sed austerum et plenius, neque
 30 idipsum pervetus. Si mulso uti volet, id ex decocto melle
 faciendum est. Si frigidae potiones ventrem ejus non turbant,
 his utendum potissimum est. Si quid offensae in coena sen-
 sit, vomere debet; idque postero quoque die facere: tertio,

modici ponderis panem ex vino esse, adjecta uva ex olla, vel ex defruto (cf. Colum. XII, 43), similibusque aliis: deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum con-
quiescere, ac neque intendere animum, neque ambulatione
quamvis leni dimoveri. 5

CAPUT VII.

Remedia ad coli dolorem.

At si laxius intestinum dolere consuevit, quum id ni-
hil nisi genus inflationis sit, id agendum est, ut concoquat
aliquis, ut lectione, aliisque generibus exerceatur, utatur 10
balneo calido, cibus quoque et potionibus calidis; denique
omni modo frigus vitet, item dulcia omnia, leguminaque, et
quidquid inflare consuevit.

CAPUT VIII.

Stomacho laborantibus quae agenda sint.

15

Si quis vero stomacho laborat, legere clare debet; post
lectionem ambulare; tum pila, vel armis, aliove quo genere,
quo superior pars movetur, exerceri; non aquam, sed vinum
calidum bibere jejunos; cibum bis die assumere, sic tamen,
ut facile concoquat; uti vino tenui et austero, et post cibum 20
frigidis potionibus potius. Stomachum autem infirmum indi-
cant pallor, macies, praecordiorum dolor, nausea, et nolen-
tium vomitus, in jejuno dolor capitis. Quae in quo non sunt,
is firmi stomachi est. Neque credendum utique nostris est,
qui, quum in adversa valetudine vinum aut frigidam aquam 25
concupiverunt, deliciarum patrocinium in accusationem non
merentis stomachi habent. At qui tarde concoquunt, et quo-
rum ideo praecordia inflantur, quive propter ardorem ali-
quem noctu sitire consuerunt, antequam conquiescant, duos
tresve cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam 30
adversus tardam concoctionem clare legere, deinde ambulare,
tum vel ungi vel lavari; assidue vinum frigidum bibere; et

post cibum, magnam potionem, sed, ut supra dixi, per siphonem: deinde omnes potiones aqua frigida includere. Cui vero cibus aescit, is ante eum bibere aquam egelidam debet, et vomere: at si cui ex hoc frequens dejectio incidit, quoties alvus ei constiterit, frigida potione potissimum utatur.

CAPUT IX.

De dolore nervorum et de affectibus caloris frigorisque.

Si cui vero dolere nervi solent, quod in podagra chiragra grave esse consuevit (cf. II, 7; IV, 24), huic, quantum fieri potest, exercendum id est, quod affectum est, subjiendumque labori et frigori; nisi quum dolor increvit; sub quo quies optima est. Venus semper inimica est; concoctio, sicut in omnibus corporis affectibus, necessaria. Cruditas enim id maxime laedit, et quoties offensum corpus est, vitiosa pars maxime sentit.

Ut concoctio autem omnibus vitiis occurrit, sic rursus aliis frigus, aliis calor: quae sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni, tenui, vulneri, praecordiis, intestinis, vesicae, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, vulvae, cerebro: idem summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram; ex hoc horrores, tremoresque nascuntur (*Aph.* V, 18 et 20). At prodest juvenibus, et omnibus plenis: erectiorque mens est, et melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cavetur. Aqua vero frigida infusa, praeterquam capiti, etiam stomacho prodest: item articulis doloribusque¹⁾, qui sunt sine ulceribus: item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant (*Aph.* V, 25). Calor autem adjuvat omnia, quae frigus infestat: item lippientes, si nec dolor, nec lacrimae sunt; nervos quoque, qui contrahuntur (*Aph.* V, 22); praecipueque ea ulcera, quae ex frigore sunt: idem corporis colorem

1) *Id est*: item in articularum tumoribus doloribusque. In *Aph.* legitur: *Τὰ ἐν ἄρθροις οἰδήματα καὶ ἀλγήματα*, κ. τ. λ. cf. II, 7, p. 40, l. 3.

bonum facit; urinam movet. Si nimius est, corpus effeminat, nervos mollit, stomachum solvit (cf. *Aph.* V, 16). Minime vero aut frigus aut calor tuta sunt, ubi subita insuetis sunt; nam frigus lateris dolores, aliaque vitia, frigida aqua strumas excitat: calor concoctionem prohibet, somnum aufert, sudore digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

CAPUT X.

Regimen contra pestem.

Est etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, quum tamen securus esse non possit. Tunc igitur oportet peregrinari, navigare: ubi id non licet, gestari, ambulare sub divo, ante aestum, leniter; eodemque modo ungi: et, ut supra comprehensum est, vitare fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem: multoque magis se continere, si qua gravitas in corpore est. Tunc neque mane surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, minimeque post cibum, aut balneum; neque jejuno, neque coenato vomendum est; neque movenda alvus; atque etiam, si per se mota est, comprimenda est; abstinendum potius, si plenius corpus est. Itemque vitandum balneum (cf. III, 7), sudor, meridianus somnus, utique si cibus quoque antecessit; qui tamen semel die tum commodius assumitur; insuper etiam modicus, ne cruditatem moveat. Alternis diebus invicem, modo aqua, modo vinum bibendum est. Quibus servatis, ex reliqua victus consuetudine quam minimum mutari debet. Quum vero haec in omni pestilentia facienda sint, tum in ea maxime, quam austri excitarint. Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, ubi gravi tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel ubi in graves regiones venerunt. Ac si cetera res aliqua prohibebit, utique abstinere debebit: atque ita a vino ad aquam, ab hac ad vinum, eo, qui supra positus est, modo, transitus ei esse.

A. CORNELII CELSI
ARTIUM LIBER SEPTIMUS

IDEM

MEDICINAE SECUNDUS.

PROOEMIUM.


De signis adversae valetudinis, et de communibus auxiliis.

Instantis autem adversae valetudinis signa complura sunt. In quibus explicandis non dubitabo auctoritate antiquorum
5 virorum uti, maximeque Hippocratis; quum recentiores medici, quamvis quaedam in curationibus mutarint, tamen haec illum optime praesagisse fateantur. Sed antequam dico, quibus praecedentibus morborum timor subsit, non alienum videtur exponere, quae tempora anni, quae tempestatum
10 genera, quae partes aetatis, qualia corpora maxime tuta, vel periculis opportuna sint, quod genus adversae valetudinis in quoque timeri maxime possit. Non quod non omni tempore, in omni tempestatum genere, omnis aetatis, omnis habitus homines, per omnia genera morborum et aegrotent
15 et moriantur: sed quod frequentius tamen quaedam eveniant (cf. *Aph.* III, 19); ideoque utile sit scire unumquemque, quid, et quando maxime caveat.

CAPUT I.

Quae anni tempora, quae tempestatum genera, quae partes aetatis,
20 qualia corpora vel tuta vel morbis et qualibus opportuna sint.

Igitur saluberrimum ver est; proxime deinde ab hoc hiems; periculosior aestas; autumnus longe periculosissimus.



Ex tempestatibus vero optimae aequales sunt, sive frigidae, sive calidae: pessimae, quae maxime variant (cf. *Aph.* III, 1 et 8). Quo fit, ut autumnus plurimos opprimat (cf. *Aph.* III, 9); nam fere meridianis temporibus calor; nocturnis atque matutinis, simulque etiam vespertinis, frigus est. Corpus ergo, et aestate, et subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur; sed, ut eo tempore id maxime fit, sic quandocumque evenit, noxium est. Ubi aequalitas autem est, tamen saluberrimi sunt sereni dies; meliores pluvii quam tantum nebulosi, nubilive: optimique hieme, qui omni vento vacant, aestate, quibus favonii perfliant. Si genus aliud ventorum est, salubriores septentrionales, quam subsolani, vel austri sunt: sic tamen haec, ut interdum regionum sorte mutantur. Nam fere ventus ubique a mediterraneis regionibus veniens, salubris; a mari, gravis est. Neque solum in bono tempestatum habitu certior valetudo est; sed morbi quoque, si qui inciderunt, leviores sunt, et promptius finiuntur (*Aph.* III, 8; *Epid.* II, 1, 5). Pessimum aegro coelum est, quod aegrum fecit; adeo ut in id quoque genus, quod natura pejus est, in hoc statu salubris mutatio non sit. At aetas media tutissima est, quae neque juventae calore, neque senectutis frigore infestatur. Longis morbis senectus, acutis adolescentia magis patet. Corpus autem habilissimum quadratum est, neque gracile, neque obesum. Nam longa statura, ut in juvena decora est, sic matura senectute conficitur (*Aph.* II, 54): gracile corpus infirmum; obesum hebes est. Vere autem maxime, quaecumque humoris motu novantur, in metu esse consuerunt. Ergo tunc lippitudines, pustulae, profusio sanguinis, abscessus, quae ἀποστήματα Graeci nominant, bilis atra, quam μελαγχολίαν appellant, insania, morbus comitalis, angina, gravedines, destillationes oriri solent. Ii quoque morbi, qui in articulis nervisque modo urgent, modo quiescunt, tunc maxime et inchoantur et repetunt (cf. *Aph.* III, 20). At aestas non quidem vacat plerisque his morbis; sed adjicit febres vel continuas, vel ardentis, vel tertianas, vomitus, alvi dejectiones, auricularum dolores, ulcera oris, canculos, et in ceteris quidem partibus, sed maxime in obscoenis; et quidquid sudore hominem resol-

vit (*Aph.* III, 21). Vix quidquam ex his in autumnum non incidit; sed oriuntur quoque eo tempore febres incertae, lienis dolor, aqua inter cutem, tabes, quam Graeci *φθίσιν* nominant; urinae difficultas, quam *στραγγουρίαν* appellant; 5 tenuioris intestini morbus, quem *ελλεόν* nominant; item laevitas intestinorum, quae *λειεντερία* vocatur; coxae dolores; morbi comitiales (*Aph.* III, 22). Idemque tempus et diutinis malis fatigatos, et ab aestate etiam proxima pressos, interimit; et alios novis morbis conficit; et quosdam longissi-
 10 mis implicat, maximeque quartanis, quae per hiemem quoque exercent. Neque aliud magis tempus pestilentiae patet, cujuscumque ea generis est, quamvis variis rationibus nocet. Hiems autem capitis dolores, tussim, et quidquid in faucibus, in lateribus, in visceribus mali contrahitur, irritat (*Aph.* 15 III, 23).

At ex tempestatibus, aquilo tussim movet, fauces exasperat, ventrem adstringit, urinam suppressit, horrores excitat, item dolores lateris et pectoris: sanum tamen corpus spissat, et mobilius atque expeditius reddit. Auster aures 20 hebetat, sensus tardat, capitis dolorem movet, alvum solvit, totum corpus efficit hebes, humidum, languidum (*Aph.* III, 5, 17). Ceteri venti quo vel huic vel illi propiores sunt, eo magis vicinos his illisve affectus faciunt. Denique omnis calor et jecur et lienem inflammat, mentem hebetat, ut anima 25 deficiat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus modo nervorum distentionem, modo rigorem infert; illud *σπασμός*, hoc *τέτανος* Graece nominatur: nigriliem in ulceribus, horrores in febribus excitat (*Aph.* V, 17). In siccitatibus, acutae febres (*Aph.* III, 7), lippitudines, tormina, urinae difficultas, articularum dolores oriuntur. Per imbres, longae febres, 30 alvi dejectiones, angina, cancri, morbi comitiales, resolutio nervorum; *παράλυσιν* Graeci nominant (*Aph.* III, 16). Neque solum interest, quales dies sint, sed etiam quales ante praecesserint. Si hiems sicca septentrionales ventos habuit, 35 ver autem austros et pluvias exhibet, fere subeunt lippitudines, tormina, febres, maximeque in mollioribus corporibus, ideoque praecipue in muliebribus (*Aph.* III, 11). Si vero austri pluviaeque hiemem occuparunt, ver autem frigidum et

siccum est, gravidae quidem feminae, quibus tum adest partus, abortu periclitantur; eae vero quae gignunt, imbecillos, vixque vitales edunt: ceteros lippitudo arida, et, si seniores sunt, gravedines atque destillationes male habent (*Aph.* III, 12). At si a prima hieme austri ad ultimum ver continuarunt, 5 laterum dolores, et insania febricitantium, quam *φρενίτιν* (cf. III, 18) appellant, quam celerrime rapiunt. Ubi vero calor a primo vere orsus aestatem quoque similem exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi (*Aph.* III, 6). At si sicca aestas aquilones habuit, autumnus vero imbres austri- 10 que sunt, tota hieme, quae proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibusdam etiam tabes oritur (*Aph.* III, 13). Sin autem autumnus quoque aequè siccus iisdem aquilonibus perflatur, omnibus quidem mollioribus corporibus, inter quae muliebria esse proposui, secunda valetudo contingit: durio- 15 ribus vero instare possunt et aridae lippitudines, et febres partim acutae, partim longae; et ii morbi, qui ex atra bile nascuntur (*Aph.* III, 14).

Quod ad aetates vero pertinet, pueri proximique his vere optime valent, et aestate prima tutissimi sunt; senes aestate 20 et autumnus prima parte; juvenes hieme, quique inter juventam senectutemque sunt. Inimicior senibus hiems, aestas adolescentibus est (*Aph.* III, 18). Tum si qua imbecillitas oritur, proximum est, ut infantes, tenerosque adhuc pueros serpentia ulcera oris, quae *ἄφθας* Graeci nominant, vomitus, 25 nocturnae vigiliae, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exerceant (*Aph.* III, 24). Proprie etiam dentes, gingivarum exulcerationes, febriculae, interdum distentiones nervorum, alvi dejectiones, maximeque caninis dentibus orientibus, male habent. Quae pericula plenissimi 30 cujusque sunt, et cui maxime venter adstrictus est (*Aph.* III, 25). At ubi aetas paulum processit, glandulae, et vertebrae quae in spina sunt, aliquae inclinationes, strumae, verrucarum quaedam genera dolentia, *ἀκροχορδόνας* Graeci appellant, et plura alia tubercula oriuntur (*Aph.* III, 26). 35 Incipiente vero jam pube, ex iisdem multa, et longae febres, et sanguinis ex naribus cursus (*Aph.* III, 27). Maximeque omnis pueritia, primum circa quadragesimum diem, deinde

septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem inciderunt, ac neque pubertate, neque primis coitibus, neque in femina primis menstruis finita sunt, fere longa sunt (*Aph.* III, 28): saepius tamen morbi pueriles, qui diutius manserunt, terminantur. Adolescentia morbis acutis, item comitialibus, tabique maxime objecta est: fereque juvenes sunt, qui sanguinem exspuunt (*Aph.* III, 29). Post hanc aetatem laterum et pulmonis dolores, lethargus, cholera, insania, sanguinis per quaedam velut ora venarum, αἰμορροΐδας Graeci appellant, profusio (*Aph.* III, 30). In senectute, spiritus et urinae difficultas, gravedo, articulorum et renum dolores, nervorum resolutiones, malus corporis habitus, καχεξία Graeci appellant, nocturnae vigiliae, vitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, praecipueque soluta alvus, et, quae sequuntur hanc, tormina, vel laevitas intestinorum, ceteraque ventris fusi mala (*Aph.* III, 31). Praeter haec graciles tabes, dejectiones, destillationes; item viscerum et laterum dolores fatigant. Obesi plerumque acutis morbis, et difficultate spirandi strangulantur: subitoque saepe moriuntur; quod in corpore tenuiore vix evenit (*Aph.* II, 44).

CAPUT II.

De notis adversae valetudinis futurae.

Ante adversam autem valetudinem, ut supra dixi (*in prooem.*), quaedam notae oriuntur: quarum omnium commune est, aliter se corpus habere, atque consuevit; neque in pejus tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, et speciosior, et coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet; quae, quia neque in eodem habitu subsistere, neque ultra progredi possunt, fere retro, quasi ruina quadam, revolvuntur (*Aph.* I, 3). Pejus tamen signum est, ubi aliquis contra consuetudinem emacruit, et colorem decoremque amisit: quoniam in iis quae superant, est quod morbus demat; in iis quae desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Praeter haec protinus timeri debet, si graviora membr-

sunt; si crebra ulcera oriuntur; si corpus supra consuetudinem incaluit; si gravior somnus pressit; si tumultuosa somnia fuerunt; si saepius expergiscitur aliquis, quam assuevit, deinde iterum soporatur; si corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudinem insudat, maximeque si circa 5 pectus, aut cervices, aut crura, vel genua, vel coxas. Item, si marcet animus; si loqui et moveri piget; si corpus torpet; si dolor praecordiorum est, aut totius pectoris, aut, qui in plurimis evenit, capitis; si salivae plenum os est; si oculi cum dolore vertuntur; si tempora adstricta sunt; si membra 10 inhorrescunt; si spiritus gravior est; si circa frontem intente venae moventur; si frequentes oscitationes; si genua quasi fatigata sunt, totumve corpus lassitudinem sentit. Ex quibus saepe plura, nunquam non aliqua, febrem antecedunt. In primis tamen illud considerandum est, num cui saepius 15 horum aliquid eveniat, neque ideo corporis ulla difficultas subsequatur. Sunt enim quaedam proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quidquam in futurum praesagiri potest. Facile itaque securus est in iis aliquis, quae saepe sine periculo evasit: ille sollicitari debet, cui haec nova 20 sunt; aut qui ista numquam sine custodia sui tuta habuit.

CAPUT III.

Incipiente febre signa mala vel bona.

Ubi vero febris aliquem occupavit, scire licet, non periclitari, si in latus aut dextrum aut sinistrum, ut ipsi visum 25 est, cubat, cruribus paulum reductis; qui fere sani quoque jacentis habitus est (*Progn.* § 3); si facile convertitur (§ 9); si noctu dormit, interdiu vigilat (*Progn.* § 10); si ex facili spirat (*Progn.* § 5); si non conflictatur; si circa umbilicum et pubem cutis plena est (cf. *Aph.* II, 35); si praecordia ejus sine ullo sensu doloris aequaliter mollia in utraque parte sunt (*Progn.* § 7). Quod si paulo tumidiora sunt, sed tamen digitis cedunt et non dolent, haec valetudo, ut spatium aliquod habebit, sic tuta erit. Corpus quoque, quod aequaliter molle et calidum est, quodque aequaliter 35

totum insudat, et cujus febricula eo sudore finitur, securitatem pollicetur (cf. *Progn.* § 6). Sternumentum etiam inter bona indicia est, et cupiditas cibi vel a primo servata, vel etiam post fastidium orta. Neque terrere debet ea febris, 5 quae eodem die finita est; ac ne ea quidem, quae, quamvis longiore tempore tenuit, tamen ante alteram accessionem ex toto quievit, sic ut corpus integrum, quod *ελλικρινές* Graeci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse et bile et pituita debet; et in urina subsidere album, laeve, 10 aequale; sic ut etiam, si quae quasi nubeculae innatarint, in imum deferantur (cf. *Progn.* § 12—13). At venter ei, qui a periculo tutus est, reddit mollia, figurata, atque eodem fere tempore, quo secunda valetudine assuevit, modo convenientia iis quae assumuntur. Pejor cita alvus est: sed ne 15 haec quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, et rufa est, neque foeditate odoris similem alvum sani hominis excedit (cf. *Progn.* § 11). Ac lumbricos quoque aliquos sub fine morbi descendisse, nihil nocet 20 (*Ibid.*). Si inflatio in superioribus partibus dolorem tumoremque fecit, bonum signum est sonus ventris inde ad inferiores partes evolutus; magisque etiam si sine difficultate cum stercore excessit (*Aph.* IV, 73; *Coac.* 285; *Progn.* § 11).

CAPUT IV.

Mala signa aegrotorum.

25

Contra gravis morbi periculum est, ubi supinus aeger jacet, porrectis manibus et cruribus (*Progn.* § 3); ubi residere vult in ipso acuti morbi impetu, praecipueque pulmonibus laborantibus; ubi nocturna vigilia premitur, etiamsi 30 interdiu somnus accedit; ex quo tamen pejor est qui inter quartam horam et noctem est, quam qui a matutino tempore ad quartam (*Progn.* § 10). Pessimum tamen est, si somnus neque noctu, neque interdiu accedit (*Progn.* § 10): id enim fere sine continuo dolore esse non potest (*Coac.* 497). 35 Aequae vero signum malum est etiam somno ultra debitum

urgeri (cf. *Aph.* II, 3); pejusque quo magis sopor interdiu, noctaque continuat. Mali etiam morbi testimonium est, vehementer et crebro spirare, a sexto die coepisse inhorrescere (cf. *Aph.* IV, 29), pus expuere, vix excreare, dolorem habere continuum, difficulter ferre morbum, jactare brachia et crura, sine voluntate lacrimare (cf. *Aph.* IV, 52); habere humorem glutinosum dentibus inhaerentem (cf. *Aph.* IV, 53), cutem circa umbilicum et pubem macram (cf. *Aph.* II, 35), praecordia inflammata, dolentia, dura, tumida, intenta, magisque si haec dextra parte, quam sinistra, sunt ¹⁰ (*Progn.* § 7); periculosissimum tamen est, si venae quoque ibi vehementer agitantur (*Ibid.*). Mali etiam morbi signum est, nimis celeriter emacrescere; caput et pedes manusque frigidas habere, ventre et lateribus calentibus, aut frigidas extremas partes acuto morbo urgente (*Aph.* VII, 1); aut ¹⁵ post sudorem inhorrescere; aut post vomitum singultum esse, vel rubere oculos (*Aph.* VII, 4 et 3); aut post cupiditatem cibi, postve longas febres fastidire; aut multum sudare, maximeque frigido sudore; aut habere sudores non per totum corpus aequales, quique febrem non finiant; et eas febres, ²⁰ quae quotidie tempore eodem revertantur; quaeve semper pares accessiones habeant, neque tertio quoque die leventur (cf. *Aph.* IV, 43; *Progn.* § 6); quaeve sic continuant, ut per accessiones increscant, per decessiones tantum molliantur, neque umquam integrum corpus dimittant. Pessimum ²⁵ est, si ne levatur quidem febris, sed aequae concitata continuat. Periculosum est etiam, post arquatam morbum febrem oriri (cf. III, 24); utique si praecordia dextra parte dura manserunt. Ac dolentibus iis, nulla acuta febris leviter terere nos debet; neque umquam in acuta febre, aut a somno ³⁰ non est terribilis nervorum distentio. Timere etiam ex somno, mali morbi est; itemque in prima febre protinus mentem esse turbatam, membrumve aliquod resolutum. Ex quo casu, quamvis vita redditur, tamen id fere membrum debilitatur. Vomitus etiam periculosus est sincerus pituitae, vel bilis; ³⁵ peiorque, si viridis, aut niger est (cf. *Progn.* § 13). At mala urina est, in qua subsidunt subrubra et laevia: deterior, in qua quasi folia quaedam tenuia atque alba: pessima ex

his, si tamquam ex furfuribus factas nubeculas repraesentat. Diluta quoque atque alba, vitiosa est, sed in phreneticis maxime (*Aph.* IV, 72; *Coac.* 568; cf. *Progn.* § 12). Alvus autem mala est, ex toto suppressa: periculosa etiam, quae
 5 inter febres fluens conquiescere hominem in cubili non patitur; utique si quod descendit, est perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans. Praeter haec periculum ostendit id, quod excernitur, si est exiguum, glutinosum, laeve, album, idemque subpallidum: vel si est aut lividum, aut bilio-
 10 sum, aut cruentum, aut pejoris odoris quam ex consuetudine. Malum est etiam, quod post longas febres sincerum est (cf. *Progn.* § 11).

CAPUT V.

De signis longi morbi.

15 Post haec indicia votum est longum morbum fieri: sed et necesse est, nisi occidit. Neque vitae alia spes in magnis malis est, quam ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturque in id tempus, quod curationi locum praestet. Protinus tamen signa quaedam sunt, ex quibus colligere pos-
 20 simus, morbum, etsi non interemerit, longius tamen tempus habiturum: ubi frigidus sudor inter febres non acutas circa caput tantum et cervices oritur; aut ubi, febre non quiescente, corpus insudat (cf. *Aph.* IV, 56; *Coac.* 562; cf. *Progn.* § 6); aut ubi corpus modo frigidum, modo calidum est, et
 25 color alius ex alio fit (*Aph.* IV, 40); aut ubi, quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatem non pervenit (cf. *Aph.* IV, 51); aut ubi aeger pro spatio parum emacrescit (cf. *Aph.* II, 28): item, si urina modo liquida et pura est, modo habet quaedam subsidentia; si laevia atque alba rubrave
 30 sunt, quae in ea subsidunt; aut si quasdam quasi miculas repraesentat; aut si bullulas excitat (cf. *Progn.* § 12).

CAPUT VI.

De indiciis mortis.

Sed inter haec quidem, proposito metu, spes tamen superest. Ad ultima vero jam ventum esse testantur nares acutae, collapsa tempora, oculi concavi, frigidae languidaeque aures, et imis partibus leniter versae, cutis circa frontem dura et intenta, color aut niger aut perpallidus; multoque magis, si ita haec sunt, ut neque vigilia praecesserit, neque ventris resolutio, neque inedia. Ex quibus causis interdum haec species oritur, sed uno die finitur: itaque diutius durans, mortis index est (*Progn.* § 2). Si vero in morbo vetere jam triduo talis est, in propinquo mors est; magisque si, praeter haec, oculi quoque lumen refugiunt, et illacrimant; quaeque in iis alba esse debent, rubescunt; atque in iisdem venulae pallent; pituitaque in iis innatans, novissime angulis inhaerescit; alterque ex his minor est; iique aut vehementer subsederunt, aut facti tumidiores sunt (*Progn.* § 2); perque somnum palpebrae non committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet, neque id fluens alvus expressit (cf. *Aph.* VI, 52; *Progn.* § 2); eademque palpebrae pal-²⁰ lent, et idem pallor labra et nares decolorat; eademque labra, et nares, oculique, et palpebrae, et supercilia, aliquae ex his pervertuntur; isque propter imbecillitatem jam non audit, aut non videt (*Aph.* IV, 49; *Coac.* 72). Eadem mors denuntiatur, ubi aeger supinus cubat, eique genua con-²⁵ tracta sunt: ubi deorsum ad pedes subinde delabitur; ubi brachia et crura nudat, et inaequaliter dispergit, neque iis calor subest; ubi hiat; ubi assidue dormit; ubi is, qui mentis suae non est, neque id facere sanus solet, dentibus stridet; ubi ulcus, quod aut ante, aut in ipso morbo natum est,³⁰ aridum, et aut pallidum, aut lividum factum est (*Progn.* § 3). Illa quoque mortis indicia sunt, ungues, digitique pallidi; frigidus spiritus; aut si manibus quis in febre, et acuto morbo, vel insania, pulmonisve dolore, vel capitis, in veste floccos legit, fimbriasve diducit, vel in adjuncto pariete, si³⁵ qua minuta eminent, carpit (*Progn.* § 4). Dolores etiam

circa coxas et inferiores partes orti, si ad viscera transierunt, subitoque desierunt, mortem subesse testantur; magisque si alia quoque signa accesserunt (*Progn.* § 19). Neque is servari potest, qui sine ullo tumore febricitans, subito
 5 strangulatur, aut devorare salivam suam non potest (*Aph.* IV, 34; *Coac.* 271); cuive in eodem febris corporisque habitu cervix convertitur, sic ut devorare aequè nihil possit (*Aph.* IV, 35; *Coac.* 272); aut cui simul et continua febris et ultima corporis infirmitas est; aut cui, febre non quiescente,
 10 exterior pars friget, interior sic calet, ut etiam sitim faciat (cf. *Aph.* IV, 48; *Coac.* 13); aut qui, febre aequè non quiescente, simul et delirio et spirandi difficultate vexatur (cf. *Aph.* IV, 50); aut qui, epoto veratro, exceptus distentione nervorum est (cf. *Aph.* IV, 16; V, 1); aut qui ebrius obmutuit.
 15 Is enim fere nervorum distentione consumitur, nisi aut febris accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solvi debet, loqui coepit (*Aph.* V, 5). Mulier quoque gravida acuto morbo facile consumitur (cf. *Aph.* V, 30); et is, cui somnus dolorem auget (cf. *Aph.* II, 1); et cui protinus in recenti morbo bilis
 20 atra vel infra vel supra se ostendit; cuive alterutro modo se promsit, quum jam longo morbo corpus ejus esset extenuatum et affectum (cf. *Aph.* III, 22 et 23). Sputum etiam biliosum et purulentum, sive separatim ista, sive mixta proveniunt, interitus periculum ostendunt. Ac si circa septimum diem
 25 tale esse coepit, proximum est, ut is circa quartumdecimum decedat, nisi alia signa meliora pejorave accesserint (*Progn.* § 15): quae, quo leviora graviorave subsequuta sunt, eo vel seriore mortem, vel maturiorem denuntiant. Sudor quoque frigidus in acuta febre pestifer est: atque in
 30 omni morbo vomitus, qui varius, et multorum colorum est; praecipueque si malus in hoc odor est. Ac sanguinem quoque in febre vomuisse pestiferum est. Urina vero rubra et tenuis in magna cruditate esse consuevit; et saepe, antequam spatio maturescat, hominem rapit: itaque, si talis diutius per-
 35 manet, periculum mortis ostendit. Pessima tamen est, praecipueque mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Atque in viris quidem et mulieribus talis deterrima est: in pueris vero, quae tenuis et diluta est (cf. *Progn.* § 12). Alvus quoque va-

pestifera est, quae strigmentum, sanguinem, bilem, viride aliquid, modo diversis temporibus, modo simul, et in mixtura quadam, discreta tamen, repraesentat. Sed haec quidem potest paulo diutius trahere: in praecipiti vero jam esse denuntiat, quae liquida, eademque vel nigra, vel pallida, vel pinguis est; utique si magna foeditas odoris accessit (*Progn.* § 11).

Illud interrogari me posse ab aliquo scio: si certa futurae mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti a medicis convalescant, quosdamque fama prodiderit in ipsis funeribus revixisse? Quin etiam vir jure magni nominis Democritus, ne finitae quidem vitae satis certas notas esse proposuit, quibus medici credidissent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua signa futurae mortis essent. Adversus quos ne dicam illud quidem, quod in vicino saepe quaedam notae positae, non bonos, sed imperitos medicos decipiunt; quod Asclepiades funeri obviis intellexit, quemdam vivere, qui efferebatur: nec protinus crimen artis esse, si quod professoris sit; illa tamen moderatius subijciam: conjecturalem artem esse medicinam, rationemque conjecturae talem esse, ut quum saepius aliquando responderit, interdum tamen fallat. Si quid itaque vix in millesimo corpore aliquando decipit, id notam non habet, quum per innumerabiles homines respondeat. Idque non in iis tantum, quae pestifera sunt, dico; sed in iis quoque, quae salutaria. Siquidem etiam spes interdum frustratur, et moritur aliquis, de quo medicus securus primo fuit: quaeque medendi causa reperta sunt, nonnumquam in pejus alicui convertunt. Neque id evitare humana imbecillitas in tanta varietate corporum potest. Sed est tamen medicinae fides, quae multo saepius, perque multo plures aegros prodest. Neque tamen ignorare oportet, in acutis morbis fallaces magis notas esse et salutis et mortis (*Aph.* II, 19).

CAPUT VII.

Ex quibus notis singula morborum genera cognoscuntur.

Sed quum proposuerim signa, quae in omni adversa va-
titudine communia esse consueverunt; eo quoque transibo, ss

ut quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit notas, indicem. Quaedam autem sunt, quae ante febres, quaedam quae inter eas, quid aut intus sit, aut venturum sit, ostendunt. Ante febres, si caput grave est, aut ex somno oculi caligant, aut frequentia sternutamenta sunt, circa caput aliquis pituitae impetus timeri potest. Si sanguis, aut calor abundat, proximum est, ut aliqua parte profluvium sanguinis fiat. Si sine causa quis emacrescit, ne in malum habitum corpus ejus decadat, metus est. Si praecordia dolent, aut inflatio gravis est, aut toto die non concocta fertur urina, cruditatem esse manifestum est. Quibus diu color sine morbo regio malus est, hi vel capitis doloribus conflictantur, vel terram edunt (*Prorrh.* II, § 31). Qui diu habent faciem pallidam et tumidam, aut capite, aut visceribus, aut alvo laborant. Si in continua febre puero venter nihil reddit, mutaturque ei color, neque somnus accedit, ploratque is assidue, metuenda nervorum distentio est. Frequens autem destillatio in corpore tenui longoque, tabem timendam esse testatur. Ubi pluribus diebus non descendit alvus, docet, aut subitam dejectionem, aut febriculam instare. Ubi pedes turgent, longae dejectiones sunt; ubi dolor in imo ventre et coxis est, aqua inter cutem instat; sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet (*Progn.* § 8). Idem propositum periculum est iis, quibus voluntas desidendi est, venter nihil reddit, nisi et aegre et durum, tumor in pedibus est, idemque modo dextra, modo sinistra parte ventris, invicem oritur atque finitur. Sed a iecinore id malum proficisci videtur (*Progn.* § 8). Ejusdem morbi nota est, ubi circa umbilicum intestina torquentur, *σπρόφους* Graeci nominant; coxaeque dolores manent: eaque neque tempore, neque remediis solvuntur. Dolor autem articularum, prout in pedibus, manibusve, aut alia qualibet parte sic est, ut eo loco nervi contrahantur; aut si id membrum ex levi causa fatigatum, aequae frigido calidoque offenditur, podagram, chiragramve, vel ejus articuli, in quo id sentitur, morbum futurum esse denuntiat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desiit, hi vel capitis doloribus conflictentur necesse est, vel in articulis aliquas exulcerationes graves habeant, vel aliquo morbo etiam debilitentur. Qui

bus feminis menstrua non proveniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel quaelibet alia pars morbo infestetur (cf. *Aph.* V, 57). Eademque iis pericula sunt, quibus articulorum dolores tumoresque, sine podagra similibusque morbis, oriuntur, et desinunt: utique, si saepe tempora iisdem 5 dolent, noctuque corpora insudant. Si frons prurit, lippitudinis metus est. Si mulier a partu vehementes [capitis] dolores habet, neque alia praeterea signa mala sunt, circa vicesimum diem aut sanguis per nares erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet (*Progn.* § 21). Quicumque etiam 10 dolorem ingentem circa tempora et frontem habebit, is alterutra ratione eum finiet; magisque, si juvenis erit, per sanguinis profusionem; si senior, per suppurationem (*Progn.* § 21). Febris autem quae subito sine ratione, sine bonis signis finita est, fere revertitur (*Progn.* § 24). Cui fauces 15 sanguine et interdiu et noctu replentur, sic, ut neque capitis dolores, neque praecordiorum, neque tussis, neque vomitus, neque febricula praecesserit, hujus aut in naribus, aut in faucibus ulcus [vel hirudo] reperietur (*Prorrh.* II, § 17). Si mulieri inguen (cf. III, 5) et febricula orta est, neque 20 causa apparet, ulcus in vulva est (*Ibid.* § 24). Urina autem crassa, ex qua quod desidit, album est, significat circa articulos, aut circa viscera dolorem, metumque morbi esse (*Ibid.* § 4). Eadem viridis, aut viscerum dolorem, tumoremque cum aliquo periculo subesse, aut certe corpus integrum 25 non esse, testatur (*Ibid.*). At si sanguis aut pus in urina est, vel vesica, vel renes exulcerati sunt (*Aph.* IV, 75; — *ad seq.* cf. IV, 76, 79, 80, 81; VII, 34). Si haec crassa carunculas quasdam exiguas quasi capillos habet, aut si bullat, et male olet, et interdum quasi arenam, interdum quasi san- 30 guinem trahit, dolent autem coxae, quaeque inter has superque pubem sunt, et accedunt frequentes ructus, interdum vomitus biliosus, extremaeque partes frigescent, urinae crebra cupiditas, sed magna difficultas est, et quod inde excretum est, aquae simile, vel rufum, vel pallidum est, paulum 35 tamen in eo levamenti est, alvus vero cum multo spiritu redditur, utique in renibus vitium est. At si paulatim destillat, vel si sanguis per hanc editur, et in eo quaedam cruenta con-

creta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, et circa pubem interiores partes dolent, in eadem vesica vitium est. Calculosi vero his indiciis cognoscuntur: difficulter urina redditur, paulatimque; interdum etiam sine voluntate, destillat; eadem arenosa est (cf. *Aph.* IV, 79); nonnumquam aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur; eamque quidam promptius recti, quidam resupinati, maximeque ii, qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemque extendendo, dolorem levant. Gravitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est: atque ea cursu, omnique motu augentur. Quidam etiam, quum torquentur, pedes inter se, subinde mutatis vicibus, implicant. Feminae vero oras naturalium suorum manibus admotis scabere crebro coguntur: nonnumquam, si digitum admoverunt, ubi vesicae cervicem is urget, calculum sentiunt (cf. *Aer, aq. et loc.* 9). At qui spumantem sanguinem exscreant, his in pulmone vitium est (*Aph.* V, 13; *Coac.* 495). Mulieri gravidae sine modo fusa alvus elidere partum potest (*Aph.* V, 34). Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est quod intus gerit: duarum mammae, sanum illud esse, testantur (*Aph.* V, 52). Frequens singultus, et praeter consuetudinem continuus, jecur inflammatum esse significat (cf. *Aph.* VII, 17). Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idque a tergo incidit, vel distentio nervorum, vel rigor timeri potest: at si a priore parte id evenit, vel lateris acutus dolor, vel insania expectanda est (*Aph.* V, 65); interdum etiam ejusmodi casum, quae tutissima inter haec est, profusio alvi sequitur. Si ora venarum, sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur (*Aph.* VI, 12). Eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio intra quadraginta dies purgari non potuit (*Aph.* V, 15; *Coac.* 398). At si longa tristitia cum longo timore et vigilia est, atrae bilis morbus subest. Quibus saepe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet, aut capitis dolores sunt; quos sequitur, ut quaedam ante oculos tamquam imagines obversentur (*Prorrh.* II, § 35). At quibus magni lienes sunt, his gingivae malae sunt, et os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit: quorum si nihil evenit, necesse est in cruribus mala ulcera, et ex h

nigrae cicatrices fiant (*Ibid.* § 36). Quibus causa doloris, neque sensus ejus est, his mens labat (cf. *Aph.* II, 6). Si in ventrem sanguis confluit, ibi in pus vertitur (*Aph.* VI, 20). Si a coxis, et ab inferioribus partibus dolor in pectus transit, neque ullum signum malum accessit, suppurationis eo loco ⁵ periculum est (*Progn.* § 19). Quibus sine febre aliqua parte dolor, aut prurigo, cum rubore et calore est, ibi aliquid suppurat. Urina quoque quae in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denuntiat.

Haec vero, quum sine febre quoque vel latentium, vel ¹⁰ futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit; atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est, ubi expeditor alicujus, quam sani fuit, sermo est, subitaque loquacitas orta est, et haec ipsa solito audacior (cf. *Coac.* 51): aut ubi raro ¹⁵ quis et vehementer spirat, venasque concitatas habet, praecordiis duris et tumentibus. Oculorum quoque frequens motus, et in capitis dolore offusae oculis tenebrae; vel, nullo dolore substante, somnus ereptus, continuataque nocte et die vigilia; vel prostratum contra consuetudinem corpus in ²⁰ ventrem, sic ut ipsius alvi dolor id non coegerit; item, robusto adhuc corpore, insolitus dentium stridor, insaniae signa sunt (*Progn.* § 3). Si quid etiam abscessit, et antequam suppureret, manente adhuc febre, subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus (*Ibid.* § 18). Auris quoque ²⁵ dolor acutus, cum febre continua vehementique, saepe mentem turbat; et ex eo casu juniores interdum intra septimum diem moriuntur; seniores tardius; quoniam neque aequae magnas febres experiuntur, neque aequae insaniunt; ita sustinent, dum is affectus in pus vertatur (*Progn.* § 22). Suf- ³⁰ fusae quoque sanguine mulieris mammae, furorem venturum esse testantur (*Aph.* V, 40). Quibus autem longae febres sunt, his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt (*Aph.* IV, 44; *Coac.* 115). Quorum faucibus in febre illiditur spiritus, instat his nervorum distentio (*Aph.* IV, 68). Si ³⁵ angina subito finita est, in pulmonem id malum transit; idque saepe intra septimum diem occidit: quod, nisi incidit, sequitur ut aliqua parte suppuret (*Aph.* V, 10; *Coac.* 361; *Progn.*

§ 23). Denique post alvi longam resolutionem, tormina (cf. *Aph.* VII, 23); post haec, intestinorum laevis oritur (*Aph.* VII, 80, 81); post nimias destillationes, tabes; post lateris dolorem, vitia pulmonum (*Aph.* VII, 11; *Coac.* 391); post
 5 haec, insania (*Aph.* VII, 12); post magnos fervores corporis, nervorum rigor aut distentio (*Aph.* VII, 13); ubi caput vulneratum est, delirium (*Aph.* VII, 14); ubi vigilia torsit, nervorum distentio (cf. *Aph.* VII, 18); ubi vehementer venae super ulcera moventur, sanguinis profluvium (*Aph.*
 10 VII, 21).

Suppuratio vero pluribus morbis excitatur; nam si longae febres sine dolore, sine manifesta causa remanent, in aliquam partem id malum incumbit; in junioribus tamen: nam in senioribus ex ejusmodi morbo quartana fere nascitur (cf. *Progn.*
 15 § 24). Eadem suppuratio fit, si praecordia dura, dolentia ante vicesimum diem hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeque in adolescentibus; utique si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt: sed tum in inferioribus partibus aliquid abscedit; aut si praecordia tumorem mollem habent, neque habere intra sexaginta
 20 dies desinunt, haeretque per omne id tempus febris: sed tum in superioribus partibus fit abscessus (*Progn.* § 7); ac si inter ipsa viscera non fit, circa aures erumpit. Quumque omnis longus tumor ad suppurationem fere spectet, magis eo
 25 tendit is, qui in praecordiis, quam is, qui in ventre est; is, qui supra umbilicum, quam is, qui infra est (*Progn.* § 7). Si lassitudinis etiam sensus in febre est, vel in maxillis, vel in articulis aliquid abscedit (*Aph.* IV, 31). Interdum quoque urina tenuis et cruda sic diu fertur, ut alia salutaria signa
 30 sint; exque eo casu plerumque infra transversum septum fit abscessus (*Progn.* § 12). Dolor etiam pulmonis, si neque per sputa, neque per sanguinis detractionem, neque per victus rationem finitus est, vomicas aliquas intus excitat (*Progn.* § 15), aut circa vicesimum diem, aut circa tricesimum, aut
 35 circa quadragesimum, nonnumquam etiam circa sexagesimum (*Ibid.*). Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem ejus partis sensit (*Progn.* § 16; *Coac.* 396). Sed hae vomicae modo a pⁱ

mone, modo a contraria parte nascuntur. Quod suppurat, ab ea parte, quam afficit, dolorem inflammationemque concitat; ipsum calidius est; et si in partem sanam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo videtur. Omnis etiam suppuratio, quae nondum oculis patet, sic deprehendi potest: si febris non dimittit, eaque interdum levior est, noctu increscit; multus sudor oritur; cupiditas tussiendo est, et paene nihil in tussi exscreatur; oculi cavi sunt; malae rubent; venae sub lingua inallescunt; in manibus fiunt adunci ungues; digiti, maximeque summi, calent; in pedibus tumores sunt; spiritus 10 difficiliter trahitur; cibi fastidium est; pustulae toto corpore oriuntur (*Progn.* § 17). Quod si protinus initio dolor et tussis fuit, et spiritus difficultas, vomica vel ante, vel circa vicesimum diem erumpet: si serius ista coeperint, necesse est quidem increscant; sed quo minus cito affecerint, eo tardius solventur (cf. *Progn.* § 17). Solent etiam in gravi morbo pedes cum digitis unguibusque nigrescere: quod si non est mors consequuta, et reliquum corpus invaluit, pedes tamen decidunt (cf. *Progn.* § 9; *Epid.* III, 4).

CAPUT VIII.

20

Quae notae spem salutis quae pericula ostendunt.

Sequitur, ut in quoque morbi genere proprias notas explicem, quae vel spem, vel periculum ostendant. Ex vesica dolenti, si purulenta urina processit, inque ea laeve et album subsedit, metum detrahit (*Progn.* § 19). In pulmonis morbo, 25 si sputo ipse levatur dolor, quamvis id purulentum est, tamen aeger facile spirat, facile excreat, morbum ipsum non difficulter fert, potest ei secunda valetudo contingere (cf. *Progn.* § 15). Neque inter initia terreri convenit, si protinus sputum mixtum est rufo quodam, et sanguine, dummodo statim edatur (cf. *Progn.* § 14). Laterum dolores, suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diem purgata, finiuntur (*Aph.* V, 15; *Coac.* 398). Si in jecinore vomica est, et ex ea fertur pus purum et album, salus facilis: id enim malum in tunica est (*Aph.* VII, 45). Ex suppurationibus vero eae 35

tolerabiles sunt, quae in exteriorem partem feruntur, et
 acciuntur (*Progn.* § 7): et ex iis quae intus procedunt, eae
 leviores, quae contra se cutem non afficiunt, eamque et sine
 dolore, et ejusdem coloris, cujus reliquae partes sunt, sinunt
 5 esse (*Progn.* § 7). Pus quoque, quacumque parte erumpit,
 si est laeve, album, et unius coloris, sine ullo metu est
 (*Progn.* § 7 et 18); et, quo effuso, febris protinus conquievit,
 desieruntque urgere cibi fastidium et potionis desiderium
 (*Progn.* § 17). Si quando etiam suppuratio descendit in
 10 crura, sputumque factum pro rufo purulentum est, periculi
 minus est. At in tabe ejus, qui salvus futurus est, sputum
 esse debet album, aequale totum, ejusdemque coloris, sine
 pituita; eique etiam simile esse oportet, si quid in nares a
 capite destillat. Longe optimum est, febrem omnino non esse;
 15 secundum est, tantulam esse, ut neque cibum impediat, neque
 crebram sitim faciat (*Progn.* § 17; *Prorrh.* II, § 7). Alvus
 in hac valetudine ea tuta est, quae quotidie coacta, eaque
 convenientia iis, quae assumuntur, reddit; corpus id, quod
 minime tenue, maximeque lati pectoris atque setosi est, cujus-
 20 que cartilago exigua et carnosae est (*Prorrh.* II, § 7). Super
 tabem, si mulieri suppressa quoque menstrua fuerunt, et circa
 pectus atque scapulas dolor mansit, subitoque sanguis erupit,
 levare morbus solet: nam et tussis minuitur, et sitis atque
 febricula desinunt; sed iisdem fere, nisi redit sanguis, vo-
 25 mica erumpit; quae quo cruentior, eo melior est (*Ibid.* § 7).
 Aqua autem inter cutem minime terribilis est, quae nullo
 antecedente morbo coepit; deinde, quae longo morbo super-
 venit: utique si firma viscera sunt; si spiritus facilis; si nul-
 lus dolor; si sine calore corpus est, aequaliterque in extremis
 30 partibus macrum est; si venter mollis; si nulla tussis; nulla
 sitis; si lingua, ne per somnum quidem inarescit; si cibi cu-
 piditas est; si venter medicamentis movetur; si per se excernit
 mollia et figurata; si extenuatur (cf. III, 21); si urina,
 et vini mutatione, et epotis aliquibus medicamentis, mutatur;
 35 si corpus sine lassitudine est, et morbum facile sustinet: si-
 quidem in quo omnia haec sunt, is ex toto tutus est; in quo
 plura ex his sunt, is in bona spe est (*Prorrh.* II, § 5). Ar-
 ticulorum vero vitia, ut podagrae chiragraeque, si juvene-

tentarunt, neque callum induxerunt, solvi possunt: maxime-
 que torminibus leniuntur, et quocumque modo venter fluit
 (*Ibid.* § 8). Item morbus comitialis ante pubertatem ortus,
 non aegre finitur (cf. *Aph.* V, 7): et in quo ab una parte
 corporis venientis accessionis sensus incipit, optimum est a
 manibus pedibusve initium fieri; deinde a lateribus; pessi-
 mum inter haec a capite (*Ibid.* § 9). Atque in his quoque
 ea maxime prosunt, quae per dejectiones excernuntur. Ipsa
 autem dejectio sine ulla noxa est, quae sine febre est; si
 celeriter desinit; si contrectato ventre nullus motus ejus sen-
 titur; si extremam alvum spiritus sequitur. Ac ne tormina
 quidem periculosa sunt, si sanguis et strigmenta descendunt,
 dum febris ceteraeque accessiones hujus morbi absint: adeo
 ut etiam gravida mulier, non solum servari possit, sed etiam
 partum reservare (*Prorrh.* II, § 22). Prodestque in hoc 15
 morbo, si jam aetate aliquis processit (cf. *Aph.* II, 45).
 Contra intestinorum laevis facilius a teneris aetatibus de-
 pellitur; utique si ferri urina, et ali cibo corpus incipit. Eadem
 aetas prodest, et in coxae dolore, et humerorum, et in omni
 resolutione nervorum. Ex quibus coxa, si sine torpore est, 20
 si leviter friget, quamvis magnos dolores habet, tamen et
 facile, et mature sanatur: resolutumque membrum, si nihilo-
 minus alitur, fieri sanum potest. Oris resolutio etiam alvo
 cita finitur. Omnisque dejectio lippienti prodest (*Aph.* VI,
 17; *Coac.* 220). At varix ortus, vel per ora venarum subita 25
 profusio sanguinis, vel tormina, insaniam tollunt (*Aph.* VI,
 21). Humerorum dolores, qui ad scapulas vel manus tendunt,
 vomitu atrae bilis solvuntur: et quisquis dolor deorsum ten-
 dit, sanabilior est (*Prorrh.* II, § 40). Singultus sternuta-
 mento finitur (*Aph.* VI, 13). Longas dejectiones suppressit 30
 vomitus (*Aph.* VI, 15). Mulier sanguinem vomens, profusis
 menstruis, liberatur (*Aph.* V, 32). Quae menstruis non pur-
 gatur, si sanguinem ex naribus fudit, omni periculo vacat.
 Quae locis laborat, aut difficulter partum edit, sternutamento
 levatur. Aestiva quartana fere brevis est (*Aph.* II, 25). 35
 Cui calor et tremor est, saluti delirium est (*Coac.* 129).
 Lienosis bono tormina sunt (*Aph.* VI, 48). Denique ipsa
 febris, quod maxime mirum videri potest, saepe praesidio est;

nam et praecordiorum dolores, si sine inflammatione sunt, finit (*Aph.* VI, 40); et jecinoris dolori succurrit (*Aph.* VII, 42); et nervorum distentionem rigoremque, si postea coepit, ex toto tollit (*Aph.* IV, 57; *Coac.* 346); et ex difficultate urinae morbum tenuioris intestini ortum, si urinam per calorem movet, levat (*Aph.* VI, 44; *Coac.* 465). At dolores capitis, quibus oculorum caligo, et rubor cum quadam frontis prurigne accedunt, sanguinis profusione, vel fortuita, vel etiam petita submoventur. Si capitis ac frontis dolores ex 10 vento, vel frigore, aut aestu sunt, gravedine et sternutamentis finiuntur (*Prorrh.* II, § 30). Febrem autem ardentem, quam Graeci *καυσώδη* vocant, subitus horror exsolvit (*Aph.* IV, 58; *Coac.* 132). Si in febre aures obtusae sunt, si sanguis e naribus fluxit, aut venter resolutus est, illud malum de- 15 sinat ex toto (*Aph.* IV, 60; *Coac.* 207). Nihil plus adversus surditatem, quam biliosa alvus potest (*Aph.* IV, 28; *Coac.* 617). Quibus in fistula urinae minuti abscessus, quos *φύματα* Graeci vocant, esse coeperunt, iis, ubi pus ea parte profluxit, sanitas redditur (*Aph.* IV, 82; *Coac.* 463). Ex quibus quum 20 pleraque per se proveniant, scire licet, inter ea quoque, quae ars adhibet, naturam plurimum posse.

Contra, si vesica cum febre continenti dolet, neque venter quidquam reddit, malum atque mortiferum est; maximeque id periculum est pueris a septimo anno ad quartumdecimum 25 (*Progn.* § 19). In pulmonis morbo, si sputum primis diebus non fuit, deinde a septimo die coepit, et ultra septimum mansit, periculosum est (cf. *Progn.* § 15); quantoque magis mixtos, neque inter se diductos colores habet, tanto deterius. Et tamen nihil pejus est, quam sincerum id edi, sive rufum 30 est, sive cruentum, sive album, sive glutinosum, sive pallidum, sive spumans: nigrum tamen pessimum est (cf. *Progn.* § 14). In eodem morbo periculosa sunt tussis, destillatio; etiam, quod alias salutare habetur, sternutamentum: periculosissimumque est, si haec sequuta subita dejectio est (cf. *Aph.* 35 VI, 16). Fere vero quae in pulmonis, eadem in lateris doloribus, et mitiora signa, et asperiora esse consuerunt. Ex jecinore si pus cruentum exit, mortiferum est (cf. *Coac.* 442). At ex suppurationibus eae pessimae sunt, quae intus tendunt,

sic ut exteriorem quoque cutem decolorent: ex iis deinde, quae in exteriorem partem prorumpunt, quae maximae, quaeque planissimae sunt (cf. p. 45, l. 2). Quod si, ne rupta quidem vomica, vel pure extrinsecus emisso, febris quievit, aut quamvis quieverit, tamen repetit; item si sitis est, si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus est lividum et pallidum, si nihil aeger excreat nisi pituitam spumantem, periculum certum est. Atque ex iis quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitarunt, fere senes moriuntur: ex ceteris juniores (cf. *Progn.* § 15). At in tabe sputum mixtum purulentum, febris assidua, quae et cibi tempora eripit, et siti affligit, in corpore tenui periculum subesse testantur. Si quis etiam in eo morbo diutius traxit, ubi capilli fluunt (cf. *Aph.* V, 12; *Coac.* 428); ubi urina quaedam araneis similia subsidentia ostendit, atque in sputis odor foedus est; maximeque 15 ubi post haec orta dejectio est, protinus moritur: utique si tempus autumnus est, quo fere, qui cetera parte anni traxerunt, resolvuntur (cf. *Aph.* III, 10). Item pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto spuere desiisse, mortiferum est (*Aph.* VII, 16). Solet etiam in adolescentibus is morbus ex 20 vomica fistulae oriri: qui non facile sanescunt, nisi si multa signa bonae valetudinis subsequuta sunt. Ex reliquis vero minime facile sanantur virgines, aut eae mulieres, quibus super tabem menstrua suppressa sunt (*Prorrh.* II, § 7). Cui vero sano subitus dolor capitis ortus est, dein somnus oppressit, sic ut stertat, neque expergiscatur, intra septimum diem pereundum est (*Aph.* VI, 51); magis si, cum alvus cito non antecesserit, palpebrae dormientis non coeunt, sed album oculorum apparet (cf. *Progn.* § 2). Quos tamen ita mors sequitur, si id malum non est febre discussum. At 30 aqua inter cutem, si ex acuto morbo coepit, ad sanitatem raro perducitur: utique si contraria iis, quae supra posita sunt, subsequuntur. Aequè in ea quoque tussis spem tollit (*Aph.* VI, 35 et VII, 47): item, si sanguis sursum deorsumque erupit, et aqua medium corpus implevit. Quibusdam etiam 35 in hoc morbo tumores oriuntur, deinde desinunt, deinde rursus assurgunt. Hi tutiores quidem sunt, quam qui supra comprehensi sunt, si attendunt; sed fere fiducia secundae va-

letudinis opprimuntur. Illud jure aliquis mirabitur, quomodo quaedam simul et affligant nostra corpora, et parte aliqua teneantur. Nam, sive aqua inter cutem quem implevit, sive in magno abscessu multum puris coit, simul id omne effudisse, aequae mortiferum est, ac si quis sani corporis vulnere factus exsanguis est (*Aph.* VI, 27). Articuli vero cui sic dolent, ut super eos ex callo quaedam tubercula innata sint, numquam liberantur: quaeque eorum vitia vel in senectute coeperunt, vel in senectutem ab adolescentia pervenerunt, ut aliquando leniri possunt, sic numquam ex toto finiuntur. Morbus quoque comitialis post annum quintum et vicesimum ortus aegre curatur; multoque aegrius is, qui post quadagesimum annum coepit; adeo ut in ea aetate aliquid in natura spei, vix quidquam in medicina sit (*Prorrh.* II, § 9). In eodem morbo, si simul totum corpus afficitur, neque ante in partibus aliquis venientis mali sensus est, sed homo ex improvise concidit, cujuscumque is aetatis est, vix sanescit: si vero aut mens laesa est, aut nervorum facta resolutio, medicinae locus non est. Dejectionibus quoque si febris accessit; si inflammatio jecinoris, aut praecordiorum, aut ventris; si immodica sitis; si longius tempus; si alvus varia; si cum dolore est, etiam mortis periculum subest: maximeque si inter haec tormina esse coeperunt. Isque morbus maxime pueros absumit usque ad annum decimum: ceterae aetates facilius sustinent.

Mulier quoque gravida ejusmodi casu rapi potest; atque etiamsi ipsa convaluit, partum tamen perdit (*cf. Aph.* V, 34). Quin etiam tormina ab atra bile orsa mortifera sunt (*cf. Aph.* IV, 24); aut si sub his, extenuato jam corpore, subito nigra alvus profluxit. At intestinorum laevis periculosior est, si frequens dejectio est; si venter omnibus horis et cum sono, et sine hoc profluit; si similiter noctu et interdiu; si quod excernitur, aut crudum est, aut nigrum, et, praeter id, etiam laeve, et mali odoris; si sitis urget; si post potionem urina non redditur (quod evenit, quia tunc liquor omnis non in vesicam, sed in intestina descendit — *glossema*? —); si os exulceratur, si rubet facies, et quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur; si venter est quasi fermentatus, pinguis atque rugosus; si cibi et [ambulationis] cupiditas non est. Inter quae

quum evidens mors sit, multo evidentior est, si jam longum quoque id vitium est; maximeque si etiam in corpore senili est. Si vero in tenuiore intestino morbus est, vomitus, singultus, nervorum distentio, delirium, mala sunt. At in morbo arquato, durum fieri jecur, perniciosissimum est (*Aph.* VI, 42).⁵ Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt, deinde versa sunt vel in aquam inter cutem, vel in intestinorum laevitatem, vix ulla medicina periculo subtrahit (*Aph.* VI, 43; *Coac.* 457). Morbus intestini tenuioris, nisi resolutus est intra septimum diem, occidit (cf. *Aph.* VI, 44; *Coac.* 465).¹⁰ Mulier ex partu, si cum febre vehementibus etiam et assiduus capitis doloribus premitur, in periculo mortis est (cf. *Aph.* V, 55). Si dolor atque inflammatio est in iis partibus, quibus viscera continentur, frequenter spirare, signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est, et in cervices ac scapulas transit, rursusque in caput revertitur, aut a capite ad cervices scapulasque pervenit, perniciosus est: nisi vomica aliquam excitavit, sic ut pus extussiretur; aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit; aut nisi in capite multa porrigo, toto corpore pusulae ortae sunt. Aequae magnum malum²⁰ est, ubi torpor atque prurigo pervagantur, modo per totum caput, modo in parte; aut sensus alicujus ibi quasi frigoris est, eaque ad summam quoque linguam perveniunt. Et quum in iisdem abscessibus auxilium sit, eo difficilius sanitas est, quo minus saepe sub his malis illi subsequuntur. In coxae²⁵ vero doloribus, si vehemens torpor est, frigescitque crus et coxa; alvus nisi coacta non reddit, idque quod excernitur, mucosum est; jamque aetas ejus hominis quadragesimum annum excessit; is morbus erit longissimus, minimeque annuus; neque finiri poterit, nisi aut vere, aut aestate. Difficilis³⁰ aequae curatio est in eadem aetate, ubi humerorum dolor vel ad manus pervenit, vel ad scapulas tendit, torporemque et dolorem creat, neque bilis vomitu levatur. Quaecumque vero parte corporis membrum aliquod resolutum est, si neque movetur, et emacrescit, in pristinum habitum non revertitur (*Prorrh.* II, 35 39); eoque minus, quo vetustius id vitium est, et quo magis in corpore senili est. Omnique resolutioni nervorum ad medicinam non idonea tempora sunt hiems et autumnus: aliquid sperari

potest vere et aestate. Isque morbus mediocris vix sanatur; vehemens sanari non potest (*Aph.* II, 42). Omnis etiam dolor minus medicinae patet, qui sursum procedit. Mulieri gravidae, si subito mammae emacruerunt, abortus periculum est
 5 (*Aph.* V, 37). Quae neque peperit, neque gravida est, si lac habet, a menstruis defecta est (*Aph.* V, 39). Quartana autumnalis fere longa est: maximeque, quae coepit hieme appropinquante (*Aph.* II, 25 — cf. p. 46 l. 35). Si sanguis profluxit, deinde sequuta est dementia cum distentione ner-
 10 vorum, periculum mortis est (*Aph.* V, 3 et VII, 9; *Coac.* 332): itemque, si medicamentis purgatum et adhuc inanem, nervorum distentio oppressit (*Aph.* V, 4); aut si in magno dolore extremae partes frigent (cf. *Aph.* VII, 26). Neque is ad vitam redit, qui ex suspendio, spumante ore, detractus
 15 est (*Aph.* II, 43). Alvus nigra, sanguini atro similis, repentina, sive cum febre, sive etiam sine hac est, pernicioosa est (*Aph.* IV, 21; *Coac.* 596).

CAPUT IX.

De morborum curationibus.

20 Cognitis indiciiis, quae nos vel spe consolentur, vel metu terreant, ad curationes morborum transeundum est. Ex his quaedam communes sunt, quaedam propriae: communes, quae pluribus morbis opitulantur; propriae, quae singulis. Ante de communibus dicam: ex quibus tamen quaedam non aegros
 25 solum, sed sanos quoque sustinent; quaedam in adversa tantum valetudine adhibentur. Omne vero auxilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adjicit (*De flat.* § 1), aut evocat, aut reprimit, aut refrigerat, aut calefacit, simulque aut durat, aut mollit. Quaedam non uno modo tantum, sed
 30 etiam duobus inter se non contrariis adjuvant. Demitur materia sanguinis detractio, cucurbitula, defectione, vomitu, frictione, gestatione, omnique exercitatione corporis, abstinentia, sudore. De quibus protinus dicam.

CAPUT X.

De sanguinis missione per venam — (cf. Oribas. T. II, p. 750 s.).

Sanguinem, incisa vena, mitti, novum non est: sed nullum paene morbum esse in quo non mittatur, novum est. Item, mitti junioribus, et feminis uterum non gerentibus, vetus est: 5 in pueris vero idem experiri, et in senioribus, et in gravidis quoque mulieribus, vetus non est: siquidem antiqui primam ultimamque aetatem sustinere non posse hoc auxilii genus judicabant: persuaserantque sibi, mulierem gravidam, quae ita curata esset, abortum esse facturam (*Aph.* V, 31). Postea 10 vero usus ostendit, nihil in his esse perpetuum; aliasque potius observationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat: interest enim non quae aetas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quae vires sint. Ergo si juvenis imbecillus est, aut si mulier, quae gravis non est, 15 parum valet, male sanguis mittitur: emoritur enim vis, si quae supererat, hoc modo erepta. At firmus puer, et robustus senex, et gravis mulier valens, tuto curatur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest: quia fere minus roboris illis aetatibus subest; mulierique praegnanti post curationem 20 quoque viribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Non quidquid autem intentionem animi et prudentiam exigit, protinus ejiciendum est; quum praecipua in hoc ars sit, quae non annos numeret, neque conceptionem solam videat, sed vires aestimet, et ex eo colligat, possit 25 necne superesse, quod vel puerum, vel senem, vel in una muliere duo corpora simul sustineat. Interest etiam inter valens corpus, et obesum; inter tenue, et infirmum: tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractorem ejusmodi sustinent; celeriusque ea, 30 si nimium est pinguis, aliquis affligitur. Ideoque vis corporis melius ex venis, quam ex ipsa specie aestimatur. Neque solum haec considerata sunt, sed etiam morbi genus quod sit: utrum superans, an deficiens materia laeserit; corruptum cor- sit, an integrum; nam si materia vel deest, vel integra 35 istud alienum est: at si vel copia sui male habet, vel

corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, pleneque venae tument, sanguinis detractionem requirit: item viscerum morbi, nervorumque resolutio, et rigor, et distentio: quidquid denique fauces difficultate spiritus strangulat; quidquid subito supprimit vocem; quisquis intolerabilis dolor est; et quacumque de causa ruptum aliquid intus atque collisum est: item malus corporis habitus, omnesque acuti morbi, qui modo, ut supra dixi, non infirmitate, sed onere nocent. Fieri tamen potest, ut morbus
10 quidem id desideret, corpus autem vix pati posse videatur: sed si nullum tamen appareat aliud auxilium, periturusque sit qui laborat, nisi temeraria quoque via fuerit adjutus; in hoc statu boni medici est ostendere, quam nulla spes sit sine sanguinis detractione, faterique quantus in hac ipsa metus
15 sit: et tum demum, si exigetur, sanguinem mittere. De quo dubitari in ejusmodi re non oportet: satius est enim anceps auxilium experiri, quam nullum. Idque maxime fieri debet, ubi nervi resoluti sunt; ubi subito aliquis obmutuit; ubi angina strangulatur (cf. IV, 4); ubi prioris febris accessio paene con-
20 fecit, paremque subsequi verisimile est, neque eam videntur sustinere aegri vires posse. Quum sit autem minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est: neque enim semper concoctionem res exspectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decedit, si contusus est, si ex aliquo subito
25 casu sanguinem vomit, quamvis paulo ante sumsit cibum, tamen protinus ei demenda materia est, ne, si subsederit, corpus affligat. Idemque etiam in aliis casibus repentinis, qui strangulabunt, dictum erit. At si morbi ratio patietur, tum demum nulla cruditatis suspitione remanente id fiet. Ideoque
30 ei rei videtur aptissimus adversae valetudinis dies secundus, aut tertius. Sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est, sic numquam utile post diem quartum est, quum jam spatio ipso materia et exhausta est, et corpus corruptum: ut detractio imbecillum id facere possit, non possit
35 integrum. Quod si vehemens febris urget, in ipso impetu ejus sanguinem mittere, hominem jugulare est. Expectanda ergo remissio est; si non decrescit, sed crescere desiit, neque speratur remissio, tum quoque, quamvis pejor, sola tamen

ocasio non omittenda est. Fere etiam ista medicina, ubi necessaria est, in biduum dividenda est: satius est enim primum levare aegrum, deinde perpurgare, quam simul omni vi effusa fortasse praecipitare. Quod si in pure quoque aquaque quae inter cutem est, ita respondet, quanto magis necesse est in sanguine respondeat (cf. p. 49 l. 3). Mitti vero is debet, si totius corporis causa fit, ex brachio; si partis alicujus, ex ea ipsa parte, aut certe quam proxima: quia non ubique mitti potest, sed in temporibus, in brachiis, juxta talos. Neque ignore, quosdam dicere, quam longissime sanguinem inde, ubi laedit, esse mittendum: sic enim averti materiae cursum; at illo modo in id ipsum, quod gravat, evocari. Sed id falsum est: proximum enim locum primo exhaurit; ex ulterioribus autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur; ubi is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur tamen 15 usus ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio potius sanguinem esse mittendum; si quod in humero vitium est, ex altero brachio: credo, quia si quid parum cesserit, opportuniores eae partes injuriae sunt, quae jam male habent. Avertitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte prorumpens, 20 alia emittitur: desinit enim fluere qua nolumus, inde objectis quae prohibeant, alia dato itinere.

Mittere autem sanguinem quum sit expeditissimum usum habenti, tamen ignaro difficillimum est; juncta enim est venae arteria, his nervi: ita, si nervum scalpellus attingit, sequitur nervorum distentio, eaque hominem crudeliter consumit. At arteria incisa neque coit, neque sanescit; interdum etiam, ut sanguis vehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque venae, si forte praecisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur, summam 30 cutem lacerat, neque venam incidit. Nonnumquam etiam ea latet, neque facile reperitur. Ita multae res id difficile inscio faciunt, quod perito facillimum est. Incidenda ad medium vena est: ex qua quum sanguis erumpit, colorem ejus habitumque oportet attendere; nam si is crassus et niger est, vitiosus est; ideoque utiliter effunditur; si rubet et pellucet, integer est; eaque missio sanguinis adeo non prodest, ut etiam noceat; protinusque is supprimendus est. Sed id eve-

nire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut aequè niger assidue primo die profluat: quod quamvis ita est, tamen si jam satis fluxit, suppressendus est; semperque ante finis faciendus est, quam anima deficiat. Deligandumque brachium superimposito expresso ex aqua frigida penicillo: et postero die averso medio digito vena ferienda, ut recens coitus ejus resolvatur, iterumque sanguinem fundat. Sive autem primo, sive secundo die sanguis, qui crassus et niger initio fluxerat, 10 et rubere, et pellucere coepit, satis materiae detractum est, atque quod superest, sincerum est: ideoque protinus brachium deligandum, habendumque ita est, donec valens cicatricula sit; quae celerrime in vena confirmatur.

CAPUT XI.

15

De cucurbitis medicinalibus.

Cucurbitularum vero duo genera sunt; aeneum, et corneum. Aenea, altera parte patet, altera clausa est: cornea, altera parte aequè patens, altera foramen habet exiguum. In aeneam linamentum ardens conjicitur, ac sic os ejus cor-
 20 pori aptatur, imprimiturque, donec inhaereat. Cornea per se corpori imponitur; deinde ubi ea parte, qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est, superque cera cavum id clausum est, aequè inhaerescit. Utraque non ex his tantum materiae generibus, sed etiam ex quolibet alio recte fit.
 25 Ac si cetera defecerunt, caliculus quoque, aut pultarius oris compressoris, ei rei commode aptatur. Ubi inhaesit, si concisa ante scalpello cutis est, sanguinem extrahit; si integra est, spiritum. Ergo ubi materia, quae intus est, laedit, illo modo; ubi inflatio, hoc imponi solet. Usus autem cucurbitulae praecipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua vitium est, quam exhauriri ad confirmandam valetudinem satis est. Idque ipsum testimonium est, etiam scalpello sanguinem, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte, quae jam laesa est, esse mittendum, quod nemo cucurbitulam
 30 diversae parti imponit, nisi quum profusionem sanguini

avertit; sed ei ipsi, quae dolet, quaeque liberanda est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis, sive corrupta materia, sive spiritu male habente; in acutis quoque quibusdam, quamvis jam et iis spatium aliquod accessit, si et levare corpus debet, et ex vena sanguinem mitti vires non patiuntur. Idque auxilium ut minus vehemens, ita magis tutum; neque unquam periculosum est, etiamsi in medio febris impetu, etiamsi in cruditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa vena praeceps periculum est, aut si in parte corporis etiam vitium est, huc potius confugiendum est: quum eo tamen, ut sciamus, hic ut nullum periculum, ita levius praesidium esse; nec posse vehementi malo, nisi aequae vehemens auxilium succurrere (*Aph.* I, 6).

CAPUT XII.

De dejectione.

15

1. Dejectionem autem antiqui variis medicamentis, crebraque alvi ductione in omnibus paene morbis moliebantur: dabantque aut nigrum veratrum, aut filiculam, aut squamam aeris, quam *λεπίδα χαλκοῦ* Graeci vocant; aut lactucae marinae lac, cujus gutta pani adjecta abunde purgat; aut lac vel asininum, vel bubulum, vel caprinum; eique salis paulum adjiciebant, decoquebantque id, et sublati iis, quae coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogebant; sed medicamenta stomachum fere laedunt. Alvus si vehementius fluit, aut saepius ducitur, hominem infirmat. Ergo numquam in adversa valetudine medicamentum ejus rei causa recte datur, nisi ubi is morbus sine febre est; ut quum veratrum nigrum aut atra bile vexatis, aut cum tristitia insanientibus, aut iis, quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At ubi febres sunt, satius est ejus rei causa cibos potionesque assumere, qui simul et alant, et ventrem molliant. Suntque valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio convenit.

2. Plerumque vero alvus potius ducenda est: quod ab Asclepiade quoque sic temperatum, ut tamen servatum sit, video plerumque saeculo nostro praeteriri. Est autem ea

moderatio, quam is sequutus videtur, aptissima: ut neque saepe ea medicina tentetur, et tamen semel, vel summum bis, non omitatur, si caput grave est; si oculi caligant; si morbus majoris intestini est, quod Graeci κόλον nominant; 5 si in imo ventre, aut in coxa dolores sunt; si in stomachum quaedam biliosa concurrunt, vel etiam pituita eo se, humore aliquis aquae similis confert; si spiritus difficiliter redditur; si nihil per se venter excernit; utique, si juxta quoque stercus est, et intus remanet; aut si stercoris odorem, nihil deiciens, aeger ex spiritu suo sentit; aut si corruptum est, quod 10 excernitur; aut si prima inedia febrem non sustulit; aut si sanguinem mitti, quum opus sit, vires non patiuntur, tempus ejus rei praeteriit; aut si multum ante morbum aliquis potavit; aut si is, qui saepe vel sponte, vel casu purgatus est, 15 subito habet alvum suppressam. Servanda vero illa sunt: ne ante diem tertium ducatur; ne ulla cruditate substantive; ne in corpore infirmo, diuque adversa valetudine exhausto; neve in eo, cui satis alvus quotidie reddit, quive eam liquidam habet; neve in ipso accessionis impetu, quia, quod tum infusum 20 est, alvo continetur, regestumque in caput, multo gravius periculum efficit. Pridie vero abstinere debet aeger, ut aptus tali curationi sit: eo die ante aliquot horas aquam calidam bibere, ut superiores ejus partes madescant. Tum immittenda in alvum est, si levi medicina contenti sumus, pura aqua; si 25 paulo valentiori, mulsa; si leni, ea in qua foenum graecum, vel ptisana, vel malva decocta sit. Acris autem est marina aqua, vel alia sale adjecto: atque utraque decocta commodior est. Acrior sit adjecto, vel oleo, vel nitro, vel melle: quoque acrior est, eo plus extrahit, sed minus facile sustinetur. Idque quod infunditur, neque frigidum esse oportet, 30 neque calidum; ne alterutro modo laedat. Quum infusum est, quantum fieri potest, continere se in lectulo debet aeger, nec primae cupiditati defectionis protinus cedere: ubi necesse est, tum demum desidere. Fereque eo modo demta 35 materia, superioribus partibus levatis, morbum ipsum mollit. Cum vero, quoties res coegit, desidendo aliquis se exhaust, paulisper debet conquiescere; et, ne vires deficiant, utique eo die cibum assumere: qui plenior, an exiguus sit dandus,

ex ratione ejus accessionis, quae expectabitur, aut in metu non erit, aestimari oportebit.

CAPUT XIII.

De vomitu.

At vomitus, ut in secunda quoque valetudine saepe necessarius biliosis est, sic etiam in iis morbis, quos bilis concitavit. Ergo omnibus, qui ante febres horrore et tremore vexantur; omnibus, qui cholera laborant; omnibus etiam cum quadam hilaritate insanientibus; et comitiali quoque morbo oppressis necessarius est; sed si acutus morbus est, si febris est, asperioribus medicamentis opus non est; sicut in dejectionibus quoque supra dictum est: satisque est ea vomitus causa sumi, quae sanis quoque sumenda esse proposui. At ubi longi valentesque morbi sine febre sunt, ut comitialis, ut insania, veratro quoque albo utendum est. Id neque hieme, neque aestate recte datur; optime vere; tolerabiliter autumno. Quisquis daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humidius sit (cf. *Aph.* IV, 13). Illud scire oportet, omne ejusmodi medicamentum, quod potui datur, non semper aegris prodesse, semper sanis nocere (cf. *Aph.* II, 36. 37). 20

CAPUT XIV.

De frictione.

De frictione vero adeo multa Asclepiades, tamquam inventor ejus, posuit in eo volumine, quod *Communium Auxiliorum* inscripsit, ut, quum trium tantum faceret mentionem, hujus et aquae et gestationis, tamen maximam partem in hac consumserit. Oportet autem neque recentiores viros in iis fraudare, quae vel reppererunt, vel recte sequuti sunt; et tamen ea, quae apud antiquiores aliquos posita sunt, auctoribus suis reddere. Neque dubitari potest, quin latius quidem, 30
dilucidius, ubi et quomodo frictione utendum esset, Ascle-

piades praeceperit: nihil tamen repererit, quod non a veta-
 tissimo auctore Hippocrate (*De offic. med.* §. 17) pau-
 cis verbis comprehensum sit: qui dixit, 'frictione, si vehemens
 sit, durari corpus; si lenis, molliri; si multa, minui; si mo-
 dica, impleri'. Sequitur ergo, ut tum utendum sit, quum aut
 adstringendum corpus sit, quod hebes est; aut molliendum,
 quod induruit; aut digerendum in eo, quod copia nocet; aut
 alendum id, quod tenue et infirmum est. Quas tamen species
 si quis curiosius aestimet, quod jam ad medicum non perti-
 10 net, facile intelliget, omnes ex una causa pendere, quae de-
 mit; nam et adstringitur aliquid, eo demto, quod interposi-
 tum, ut id laxaretur, effecerat; et mollitur, eo detracto, quod
 duritiem creabat; et impletur, non ipsa frictione, sed eo cibo,
 qui postea usque ad cutem, digestionem quadam relaxatam,
 15 penetrat. Diversarum vero rerum in modo causa est. Inter
 unctionem autem et frictionem multum interest. Ungi enim,
 leniterque pertractari corpus, etiam in acutis et recentibus
 morbis oportet; in remissione tamen, et ante cibum: longa
 vero frictione uti, neque in acutis morbis, neque increscenti-
 20 bus convenit; praeterquam quum phreneticis somnus ea quae-
 ritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, et jam a
 primo impetu inclinata. Neque ignoro quosdam dicere, omne
 auxilium necessarium esse increscentibus morbis, non quum
 jam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest enim
 25 morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen
 adhibito auxilio tolli: quod duabus de causis necessarium est;
 et ut quam primum bona valetudo contingat; et ne morbus,
 qui remanet, iterum, quamvis levi de causa, exasperetur.
 Potest morbus minus gravis esse, quam fuerit, neque ideo
 30 tamen solvi, sed reliquiis quibusdam inhaerere, quas admo-
 tum aliquod auxilium discutiat. Sed ut, levata quoque ad-
 versa valetudine, recte frictio adhibetur; sic numquam adhi-
 benda est febre increscente: verum, si fieri poterit, quum
 ex toto corpus ea vacabit; sin minus, certe quum ea remise-
 35 rit. Eadem autem modo in totis corporibus esse debet, ut
 quum infirmus aliquis implendus; modo in partibus, aut quia
 ejus ipsius membri imbecillitas id requirit, aut quia alteri
 Nam et capitis longos dolores ipsius frictio levat; non

impetu tamen doloris: et membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longe tamen saepius aliud perfricandum est, quum aliud dolet; maximeque quum a summis, aut a mediis partibus corporis evocare materiam volumus; ideoque extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendum est: et si is perinfirmus est, potest satis esse quinquagies; si robustior, potest ducenties; inter utrumque deinde, prout vires sunt. Quo fit, ut etiam minus saepe in muliere, quam in viro; minus saepe in puero, vel sene, quam in juvene, manus dimovendae sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentique frictione opus est; nam neque totum corpus infirmari cito per partem potest, et opus est quam plurimum materiae digeri, sive id ipsum membrum, sive per id aliud levamus. At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigit, brevior esse debet et lenior; ut tantummodo summam cutem emolliat, quo facilius capax ex recenti cibo novae materiae fiat. In malis jam aegrum esse, ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, supra posui (cf. *Aph.* IV, 48; *Coac.* 113). Sed tunc quoque unicum in frictione praesidium est; quae si calorem in cutem evocavit, potest alicui medicinae locum facere.

CAPUT XV.

De gestatione.

25

Gestatio quoque longis et jam inclinatis morbis aptissima est: utilisque est et iis corporibus, quae jam ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt; et iis, quibus lentae morborum reliquiae remanent, neque aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti vehementique, praecipueque ardente febre, ad discutiendam eam, gestatione dixit utendum: sed id periculose fit; meliusque quiete ejusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen experiri volet, sic experiatur, si lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut praecordiis suberit. Et

ex toto numquam gestari corpus dolens debet, sive id in toto, sive in parte est; nisi tamen solis nervis dolentibus; neque umquam increscente febre, sed in remissione ejus. Genera autem gestationis plura sunt; quae adhibenda sunt et pro viribus cujusque, et pro opibus; ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humili desint. Lenissima est navi, vel in portu, vel in flumine; vehementior vel in alto (vid. p. 65, l. 38), vel lectica; etiamnum acrior vehiculo. Atque haec ipsa et intendi et leniri possunt. Si nihil horum est, suspendi lectus debet, et moveri: si ne id quidem est, at certe uni pedi subjiciendum fulmentum est, atque ita lectus huc et illuc manu impellendus (cf. Orib. T. I, p. 661).

Et lenia quidem genera exercitationis infirmis conveniunt valentiora vero iis, qui jam pluribus diebus febre liberati sunt; aut iis, qui gravium morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre vacent, quod et in tabe, et in stomachi vitiis, et quum aqua cutem subiit, et interdum in morbo regio fit; aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamvis diu, manent. In quibus affectibus ea quoque genera exercitationum necessaria sunt, quae comprehendimus eo loco, quo, quemadmodum sani, neque firmi homines se gererent, praecepimus (I, 2).

CAPUT XVI.

De abstinentia.

Abstinentiae vero duo genera sunt: alterum, ubi nihil assumit aeger; alterum, ubi non nisi quod oportet. Initia morborum primum famem sitimque desiderant: ipsi deinde morbi moderationem, ut neque aliud quam expedit, neque ejus ipsius nimium sumatur; neque enim convenit juxta in ediam protinus satietatem esse. Quod si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore etiam aegro? Neque ulla res magis adjuvat laborantem, quam tempestiva abstinentia. Intemperantes homines apud nos ipsi cibi tempora curantibus damus. Rursus alii tempora medicis pro dono remittunt, sibi ipsi

modum vindicant. Liberaliter agere se credunt, qui, quum cetera illorum arbitrio relinquunt, in genere cibi liberi sunt; quasi quaeratur, quid medico liceat, non quid aegro salutare sit. Cui vehementer nocet, quoties in ejus, quod assumitur, vel tempore, vel modo, vel genere peccatur. 5

CAPUT XVII.

De sudore eliciendo.

Sudor etiam duobus modis elicitur: aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, et arenae calidae, et laconici, et clibani (cf. Oribas. I, p. 563), et quarumdam naturalium 10 sudationum, ubi e terra profusus calidus vapor aedificio includitur, sicut super Bajas (cf. Horat. *Epist.* I, 15, v. 2) in murtetis habemus (cf. II, 21). Praeter haec sole quoque, et exercitatione is movetur. Utiliaque haec genera sunt, quoties humor intus nocet, isque digerendus est. Ac ner- 15 vorum quoque quaedam vitia sic optime curantur. Sed cetera infirmis possunt convenire: sol et exercitatio tantum robustioribus; qui tamen sine febre, vel inter initia morborum, vel etiam non gravibus morbis tenentur. Cavendum autem est, ne quid horum vel in febre, vel in cruditate tentetur. At 20 balnei duplex usus est; nam modo, discussis febribus, initium cibi plenioris, vinique firmioris valetudini facit; modo febrem ipsam tollit. Fereque adhibetur, ubi summam cutem relaxari, evocarique corruptum humorem, et habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo utebantur: Asclepia- 25 des audacius. Neque terrere autem ea res, si tempestiva est, debet: ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est, simulatque ea uno die non accessit, eo qui proximus est, post tempus accessionis, tuto lavari potest. At si circuitum habere ea febris solita est sic, ut tertio, quartove die reverta- 30 tur, quandocumque non accessit, balneum tutum est. Mamentibus vero adhuc febribus, si eae sunt lenes, levesque jamdiu male habent, recte medicina ista tentatur: cum eo tamen ne praecordia dura sint, neve ea tumeant, neve lingua aspera sit, neve aut in medio corpore, aut in capite do- 35 lor ullus sit, neve tum febris increscat. Atque in iis quidem

febris, quae certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt: alterum, ante horrorem; alterum, febre finita: in iis vero, qui lentis febriculis diu detinentur, quum aut ex toto recessit accessio; aut, si id non solet, certe lenita est, jamque corpus tam integrum est, quam maxime esse in eo genere valetudinis solet. Imbecillus homo, iturus in balneum, vitare debet ne ante frigus aliquod experiatur: ubi in balneum venit, paulisper resistere, experiri, num tempora adstringantur, et an sudor aliquis oriatur: illud si incidit, hoc non sequutum est, inutile eo die balneum est; perungendusque is leniter, et auferendus est; vitandumque omni modo frigus, et abstinencia utendum. At si temporibus integris, primum ibi, deinde alibi sudor incipit, fovendum os aqua calida; tum in solio desidendum est; atque ibi quoque videndum, num sub primo contactu aquae calidae summa cutis inhorrescat; quod vix tamen fieri potest, si priora recte cesserunt; certum id autem signum inutilis balnei est. Ante vero, an postea, quam in aquam calidam se demittat, aliquis perungi debeat, ex ratione valetudinis suae cognoscatur. Fere tamen, nisi ubi nominatim, ut postea fiat, praecipietur, moto sudore leniter corpus perungendum; deinde in aquam calidam demittendum est. Atque hic quoque habenda virium ratio est, neque committendum, ut per aestum anima deficiat; sed maturius is auferendus, curioseque vestimentis involvendus est, ut neque ad eum frigus adspiret, et ibi quoque, antequam aliquid assumat, insudet. Fomenta quoque calida sunt milium, sal, arena; quodlibet eorum calefactum, et in linteum coniectum; si minore vi opus est, etiam solum linteum; at si majore, extincti titiones, involutique panniculis, et sic circumdati. Quin etiam calido oleo replentur utriculi; et in vasa fictilia, a similitudine quas lenticulas vocant, aqua conjicitur; et sal sacco linteo excipitur, demittiturque in aquam bene calidam, tum super id membrum, quod fovendum est, collocatur. Juxtaque ignem ferramenta duo sunt capitibus paulo latioribus: alterumque ex his demittitur in eum salem, et aqua super leviter adspergitur; ubi frigere coepit, ad ignem refertur, et idem in altero fit; deinde invicem in utroque: inter quae descendit salsus et calidus

succus, qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus commune est, digerere id, quod vel praecordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque utendum sit, in ipsis morborum generibus dicitur.

5

CAPUT XVIII.

De cibis et potionibus.

Quum de iis dictum sit, quae detrahendo juvant; ad ea veniendum est, quae alunt, id est cibum et potionem. Haec autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundae 10 valetudinis communia praesidia sunt: pertinetque ad rem, omnium proprietates nosse; primum ut sani sciant, quomodo his utantur; deinde ut exsequentibus nobis morborum curationes, liceat species rerum, quae assumendae erunt, subjicere, neque necesse sit subinde singulas eas nominare. Scire 15 igitur oportet, omnia legumina, quaeque ex frumentis panificia sunt, generis valentissimi esse: valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est; item omne animal quadrupes domitatum; omnem grandem feram, quales sunt caprea, cervus, aper, onager; omnem grandem avem, quales sunt anser, et 20 pavo, et grus; omnes belluas marinas, ex quibus cetus est, quaeque his pares sunt: item mel, et caseum; quo minus mirum est, opus pistorium valentissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat; in media vero materia numerari ex oleribus debere ea, quorum radices, vel bulbos assumimus; 25 ex quadrupedibus, leporem; aves omnes a minimis ad phoenicopterum; item pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidive saliuntur; imbecillissimam vero materiam esse omnem caulem oleris, et quidquid in caule nascitur, qualis est cucurbita, et cucumis, et capparitis; omnia poma, oleas, 30 cochleas, itemque conchylia. Sed quamvis haec ita discreta sint, tamen etiam, quae sub eadem specie sunt, magna discrimina recipiunt; aliaque res alia vel valentior est, vel infirmior. Siquidem plus alimenti est in pane, quam in ullo alio: firmus est triticum, quam milium; id ipsum, quam hordeum, 35 et ex tritico firmissima siligo, deinde simila, deinde cui nihil

dentum est, quod *αὐτόπυρον* Graeci vocant; infirmior est ex polline; infirmissimus cibarius panis. Ex leguminibus vero valentior faba, vel lenticula, quam pisum. Ex oleribus valentior rapa, napique, et omnes bulbi, in quibus cepam quod-
 5 que, et allium numero, quam pastinaca, vel quae radícula (cf. I, 3, p. 19, l. 23) appellatur: item firmior brassica, et beta, et porrum, quam lactuca, vel cucurbita, vel asparagus. At ex fructibus surculorum valentiores uvae, ficus, nuces, palmulae, quam quae poma proprie nominantur: atque ex
 10 his ipsis firmiora, quae succosa, quam quae fragilia sunt. Itemque ex iis avibus, quae in media specie sunt, valentiores eae, quae pedibus, quam quae volatu magis nituntur; et ex iis, quae volatu fidunt, firmiores quae grandiores, quam quae minutae sunt; ut ficedula et turdus. Atque eae quoque quae
 15 in aqua degunt, leviolem cibum praestant, quam quae natandi scientiam non habent. Inter domesticas vero quadrupedes levissima suilla est; gravissima bubula: itemque ex feris, quo majus quodque animal, eo robustior ex eo cibus est. Pisciumque eorum, qui ex media materia sunt, quibus
 20 maxime utimur, tamen gravissimi sunt [ii] ex quibus salsamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est; deinde qui, quamvis teneriores, tamen duri sunt, ut aurata, corvus, sparus, oculata; tum plani; post quos etiamnum leviores lupi, mul-
 25 lli- que; et post hos, omnes saxatiles. Neque vero in generibus rerum tantummodo discrimen est, sed etiam in ipsis: quod et aetate fit, et membro, et solo, et coelo, et habitu. Nam quadrupes omne animal, si lactens est, minus alimenti praestat: itemque quo tenerior pullus cohortalis est: in piscibus quoque media aetas, quae nondum summam magnitudinem imple-
 30 vit. Deinde ex eodem suae unguiae, rostrum, aures, cerebellum; ex agno, hoedove cum petiolis totum caput aliquanto quam cetera membra leviora sunt: adeo ut in media materia poni possint. Ex avibus colla, alaeve recte infirmissimis annumerantur. Quod ad solum vero pertinet, frumentum quod-
 35 que valentius est collinum, quam campestre: levior piscis inter saxa editus, quam in arena; levior in arena, quam in limo: quo fit, ut ex stagno, vel lacu, vel flumine eadem genera graviora sint: leviorque qui in alto (cf. p. 61, l. 7), quam qui in vade

vixit. Omne etiam ferum animal domestico levius; et quodcumque humido coelo, quam quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingua, quam macra; recentia, quam salsa; nova, quam vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit jurulenta, quam assa; magis assa, quam elixa. 5 Ovum durum valentissimae materiae est; molle, vel sorbile, imbecillissimae. Quumque panificia omnia firmissima sint, elota tamen quaedam genera frumenti, ut alica, oryza, ptisana, vel ex iisdem facta sorbitio, aut pulicula, et aqua quoque madens panis, imbecillissimis annumerari potest. 10

Ex potionibus vero quaecumque ex frumento facta est, itemque lac, mulsum, defrutum, passum, vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magnae vetustatis, valentissimi generis est. At acetum, et id vinum quod paucorum annorum, vel austerum, vel pingue est, in media materia est: 15 ideoque infirmis numquam generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima est. Firmiorque ex frumento potio est, quo firmitus est ipsum frumentum: firmitus ex eo vino, quod bono solo, quam quod tenui; quodque temperato coelo, quam quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumque aut 20 frigido, aut calido natum est. Mulsum, quo plus mellis habet; defrutum, quo magis incoctum; passum, quo ex sicciora uva est, eo valentius est. Aqua levissima pluvialis est; deinde fontana; tum ex flumine; tum ex puteo; post haec ex nive, aut glacie; gravior his, ex lacu; gravissima, ex palude (cf. 25 Orib.; *Coll. med.* V, 1, sqq.). Facilis etiam et necessaria cognitio est naturam ejus requirentibus. Nam levis, pondere apparet; et ex iis, quae pondere pares sunt, eo melior quaeque est, quo celerius et calefit et frigescit, quoque celerius ex ea legumina percoquantur (*Aph.* V, 26). Fere vero se- 30 quitur, ut, quo valentior quaeque materia est, eo minus facile concoquatur; sed si concocta est, plus alat. Itaque utendum est materiae genere pro viribus; modusque omnium pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus, rebus infirmis opus est; mediocriter firmos media materia optime sustinet; et robustis apta validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex levioribus potest: magis in iis, quae valentissima sunt, temperare sibi debet.

CAPUT XIX.

Quae natura ac proprietas cujusque rei sit qua vescimur.

Neque haec sola discrimina sunt; sed etiam aliae res boni succi sunt, aliae mali; quas *ἐχρύμους*, vel *κακοχρύμους* Graeci vocant; aliae lenes, aliae acres; aliae crassiorem pituitam faciunt, aliae tenuiorem; aliae idoneae stomacho, aliae alienae sunt: itemque aliae inflant, aliae ab hoc absunt; aliae calefaciunt, aliae refrigerant; aliae facile in stomacho accescunt, aliae non facile intus corrumpuntur; aliae movent alvum, aliae supprimunt; aliae citant urinam (cf. cap. 31), *aliae tardant; quaedam somnum movent, quaedam sensus excitant. Quae omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud alii vel corpori, vel valetudini convenit.

CAPUT XX.

De his quae boni succi sunt.

Boni succi sunt triticum, siligo, alica, oryza, amyllum, tragus, ptisana, lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aves, quae ex media materia sunt; ex majoribus quoque eae, quas supra nominavi: medii inter teneros duosque pisces, 20 ut mullus, et lupus: verna lactuca (cf. cap. 32), urtica, malva, cucurbita, ovum sorbibile, portulaca, cochleae, palmulae: ex pomis quodcumque neque acerbum, neque acidum est: vinum dulce, vel lene, passum, defrutum, oleae, quae ex his duobus in alterutro servatae sunt: vulvae, rostra, truncu- 25 lique suum, omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne jecur.

CAPUT XXI.

De his quae mali succi sunt.

Mali vero succi sunt milium, panicum, hordeum, legumina, caro domestica permacra, omnisque caro salsa, omne 30 salsamentum, garum, vetus caseus, siser, radícula, rapa, napi,

bulbi, brassica, magisque etiam cyma ejus, asparagus, beta, cucumis (cf. cap. 22), porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, foeniculum, cuminum, anisum, lapathum, sinapi, allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcumque acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum, pisces quoque saxatiles, omnesque, qui ex tenerrimo genere sunt, aut qui rursus nimium duri virosique sunt, ut fere quos stagna, lacus, limosique rivi ferunt, quique in nimiam magnitudinem excesserunt.

CAPUT XXII.

10

Quae res lenes, quaeve acres sint.

Lenes autem sunt sorbitio, pulicula, laganum, amyllum, ptisana, pinguis caro, et quaecumque glutinosa est: quod fere quidem in omni domestica fit, praecipue tamen in ungulis, trunculisque suum, in petiolis capitulisque hoedorum et vitulorum et agnorum, omnibusque cerebellis: item qui proprie bulbi nominantur, lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acria sunt omnia nimis austera, omnia acida, omnia salsa, mel, et quidem quo melius est, eo magis: item allium, cepa, eruca, ruta, nasturtium, cucumis (cf. cap. 27), beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocimum, lactuca, maximaque olerum pars.

CAPUT XXIII.

De his quae crassiorem, quaeve tenuiorem pituitam faciunt.

Crassiorem autem pituitam faciunt ova sorbilia, alica, oryza, amyllum, ptisana, lac, bulbi, omniaque fere glutinosa. Extenuant eandem omnia salsa, atque acria, atque acida.

CAPUT XXIV.

De his quae stomacho idonea sunt.

Stomacho autem aptissima sunt, quaecumque austera sunt, etiam quae acida sunt, quaeque contacta sale modice

sunt; item panis sine fermento, et elota alica, vel oryza, vel ptisana; omnis avis, omnis venatio; atque utraque vel assa, vel elixa: ex domesticis animalibus bubula: si quid ex ceteris sumitur, macrum potius, quam pingue: ex sue ungulae, 5 rostra, aures, vulvaeque steriles: ex oleribus intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, siser: ex pomis cerasum, morum, sorbum, pirum fragile, quale crustuminum vel naevianum est: item pira, quae reponuntur, tarentina atque signina; malum orbiculatum, aut scandianum, vel amerinum, vel coto- 10 neum (cf. *Plin.* XV, 11, 10), vel punicum; uvae ex olla, molle ovum, palmulae, nuclei pinei, oleae albae ex dura muria, eadem aceto intinctae, vel nigrae, quae in arbore bene maturuerunt, vel quae in passo, defrutove servatae sunt (cf. I, 6): vinum austerum, licet etiam asperum sit, item 15 resinatum: duri ex media materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpurae (cf. cap. 28), cochleae, cybium, potionesque vel frigidae, vel ferventes; absinthium (cf. cap. 31).

CAPUT XXV.

De his quae stomacho aliena sunt.

20 Aliena vero stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, omnia jurulenta, omnia praedulcia, omnia pingua, sorbitio, panis fermentatus, idemque vel ex milio, vel ex hordeo, radices olerum, et quodcumque olus ex oleo garove estur, mel, mulsum, defrutum, passum, lac, omnis caseus, uva recens, 25 ficus et viridis et arida, legumina omnia, quaeque inflare consueverunt: item thymum, nepeta, satureia, hyssopum, nasturtium, lapathum, lapsana, juglandes. Ex his autem intelligi potest, non quidquid boni succi est, protinus stomacho convenire; neque quidquid stomacho convenit, protinus boni 30 succi esse.

CAPUT XXVI.

De his quae infant, aut non.

Inflant autem omnia fere legumina, omnia pingua, omnia dulcia, omnia jurulenta, mustum, atque etiam id vinum,

nihil adhuc aetatis accessit: ex oleribus allium, cepa, brassica, omnesque radices, excepto sisere et pastinaca, bulbi, ficus etiam aridae, sed magis virides, uvae recentes, nuces omnes, exceptis nucleis pineis, lac, omnisque caseus, quidquid denique subcrudum aliquis assumsit. Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchyliis, ovis vel mollibus vel sorbilibus, vino vetere. Foeniculum vero, et anethum inflationes etiam levant.

CAPUT XXVII.

De his quae calefaciunt aut refrigerant.

10

At calefaciunt piper, sal, caro omnis jurulenta, allium, cepa, ficus arida, salsamentum, vinum, et quo meracius est eo magis. Refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, et lactuca: item coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austera, pira fragilia, 15 caro elixa, praecipueque acetum, sive cibus ex eo, sive potio assumitur.

CAPUT XXVIII.

De his quae intus facile aut difficillime corrumpuntur.

Facile autem intus corrumpuntur panis fermentatus, et 20 quisquis alius quam qui ex tritico est; lac, mel; ideoque etiam lactantia, atque omne pistorium opus; teneri pisces, ostrea, olera, caseus et recens et vetus, crassa vel tenera caro, vinum dulce, mulsum, defrutum, passum; quidquid denique vel jurulentum est, vel nimis dulce, vel nimis tenue. 25 At minime intus vitiantur panis sine fermento, aves, et eae potius duriores, duri pisces; neque solum aurata puta, aut sparus, sed etiam lolligo, locusta, polypus: item bubula, omnisque dura caro; eademque aptior est, si macra, si salsa est; omniaque salsamenta; cochleae, murices, purpurae (cf. 30 cap. 24); vinum austerum, vel resinatum.

CAPUT XXIX.

De his quae alvum movent.

At alvum movent panis fermentatus, magisque si cibarius vel hordeaceus est; brassica, si subcruda est, lactuca, anethum, nasturtium, ocimum, urtica, portulaca, radícula, caparis, allium, cepa, malva, lapathum, beta, asparagus, cucurbita, cerasa, mora, poma omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis viridis, uvae recentes, pingues minutae aves, cochleae, garum, salsamentum, ostrea, pelorides, echini, muscoli, et omnes fere conchulae, maximeque jus earum; saxatiles, et 10 omnes teneri pisces, sepiarum atramentum; si qua caro assumitur pinguis, eadem vel jurulenta, vel elixa; aves quae natant; mel crudum, lac, lactantia omnia, mulsum, vinum dulce vel salsum, aqua tenera (Hipp. *De aere, aq. et loc.* § 1), 15 omnia tepida, dulcia, pinguis, elixa, jurulenta, salsa, diluta.

CAPUT XXX.

De his quae alvum adstringunt.

Contra adstringunt panis ex siligine, vel ex simila; magis si sine fermento est; magis etiam si ustus est; intenditurque 20 vis ejus etiam si bis coquitur: pulticula vel ex alica, vel ex panico, vel ex milio; itemque ex iisdem sorbitio; et magis, si haec antea fricta sunt: lenticula, cui vel beta, vel intubus, vel ambubeja, vel plantago adjecta est; magisque etiam si illa ante fricta est: per se etiam intubus, vel plantago, vel 25 ambubeja: minuta olera, brassica bis decocta: dura ova, magisque si assa sunt: minutae aves, merula, palumbus, magisque si in posca decoctus est; grus, omnes aves quae magis currunt, quam volant; lepus, caprea; jecur ex iis, quae se-vum habent, maximeque bubulum, ac se-vum ipsum: caseus, 30 qui vehementior vetustate fit, vel ea mutatione quam in transmarino videmus; aut si recens est, ex melle, mulsove decoctus: item mel coctum, pira immatura, sorba, magisque ea, quae torminalia vocantur, mala cotonea (cf. cap. 24), et pu-

nica, oleae vel albae vel permaturae, myrta, palmulae, purpurae, murices, vinum resinatum vel asperum, item meracum, acetum, mulsum quod inferbuit, item defrutum, passum, aqua vel tepida vel praefrigida, dura, id est ea quae tarde putescit; ideoque pluvia potissimum: omnia dura, macra, austera, 5 aspera, tosta, et in eadem carne, assa potius, quam elixa.

CAPUT XXXI.

De his quae urinam movent.

Urinam autem movent, quaecumque in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocimum, menta, 10 hyssopum, anisum, coriandrum, nasturtium, eruca, foeniculum: praeter haec asparagus, capparitis, nepeta, thymum, satureia, lapsana, pastinaca, magisque agrestis, radícula, siser, cepa; ex venatione maxime lepus; vinum tenue, piper et rotundum et longum, sinapi, absinthium, nuclei pinei. 15

CAPUT XXXII.

De his quae ad somnum apta sunt, et sensum excitant.

Somno vero aptum est papaver, lactuca, maximeque aestiva, cujus cauliculus jam lacte repletus est, morum, porum. Sensus excitant nepeta, thymum, satureia, hyssopum, 20 praecipueque pulegium, ruta, et cepa.

CAPUT XXXIII.

De his quae materiam evocant, reprimunt, molliunt, calefaciunt, durant, aut emolliunt.

Evocare vero materiam multa admodum possunt: sed ea 25 quum ex peregrinis medicamentis maxime constant, aliisque magis, quam quibus ratione victus succurritur, opulentur, in praesentia differam: ponam vero ea quae prompta, et iis morbis de quibus protinus dicturus sum, apta, corpus erodunt, et

sic eo, quod mali est, extrahunt. Habent autem hanc facultatem semina erucae, nasturtii, radiculæ; præcipue tamen omnium sinapi. Salis quoque et sici eadem vis est.

Leniter vero simul et reprimunt et molliunt lana succida
 5 ex aceto vel vino, cui oleum adjectum est; contritæ palmulæ, furfures in salsa aqua vel aceto decocti. At simul et reprimunt, et refrigerant herba muralis, *περδίκιον* appellant, serpyllum, pulegium, ocimum, herba sanguinalis, quam Graeci *πολύγονον* vocant, portulaca, papaveris folia, capreolique
 10 vitium, coriandri folia, hyoscyamum, muscus, siser, apium, solanum, quam *στρύχνον* Graeci vocant, brassicae folia, intubus, plantago, foeniculi semen, contrita pira vel mala, præcipueque cotonea (cf. cap. 24), lenticula, aqua frigida, maximeque pluvialis, vinum, acetum, et horum aliquo madens vel
 15 panis, vel farina, vel spongia, vel cinis, vel lana succida, vel etiam linteolum, creta cimolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa, acerbum oleum, verbenarum contusa cum teneris caulibus folia; cujus generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus, tamarix, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hederæ, punicum
 20 malum. Sine frigore autem reprimunt cocta mala cotonea, mallicorium, aqua calida, in qua verbenae coctae sint, quas supra posui, pulvis vel ex faece vini, vel ex myrti foliis, amarae nuces. Calefacit vero ex qualibet farina cataplasma, sive tritici, sive farri, sive hordei, sive ervi, vel lolii, vel milii,
 25 vel panici, vel lenticulae, vel fabae, vel lupini, vel lini, vel foeni graeci (cf. l. 33), ubi ea deferbuit, calidaque imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quam ex aqua cocta. Praeterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex fele, oleum, magisque si vetus est, junctaque oleo sal, nitrum, git,
 30 piper, quinquefolium. Fereque, quae vehementer et reprimunt, et refrigerant, durant; quae calefaciunt et digerunt, emolliunt: præcipueque ad emolliendum potest cataplasma ex lini vel foeni graeci semine. His autem omnibus, et simplicibus, et permixtis, varie medici utuntur; ut magis quid
 35 quisque persuaserit sibi, appareat, quam quid evidenter compererit.

A. CORNELII CELSI
ARTIUM LIBER OCTAVUS

IDEM
MEDICINAE TERTIUS.

CAPUT I.

De morborum generibus.

Provisis omnibus, quae pertinent ad universa genera morborum, ad singulorum curationes veniam. Hos autem in duas species Graeci diviserunt; aliosque ex his acutos, alios longos esse dixerunt: ideoque, quoniam non semper eodem modo respondebant, eosdem alii inter acutos, alii inter longos retulerunt. Ex quo plura eorum genera esse manifestum est. Quidam enim breves acutique sunt, qui cito vel tollunt hominem, vel ipsi cito finiuntur: quidam longi, sub quibus neque sanitas in propinquo, neque exitium est: tertiumque genus eorum est, qui modo acuti, modo longi sunt; idque non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est, sed in aliis quoque fit. Atque etiam praeter hos, quartum est, quod neque acutum dici potest, quia non perimit; neque utique longum, quia, si occurritur, facile sanatur. Ego, quum de singulis dicam, cujus quisque generis sit indicabo. Dividam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere videntur, et eos, qui oriuntur in partibus. Incipiam a prioribus, pauca de omnibus praefatus. In nullo quidem morbo minus fortuna sibi vindicare, quam ars potest; utpote quum, repugnante natura, nihil medicina proficiat (cf. VII, *prooem*). Magis tamen ignoscendum medico est parum proficienti in acu-

tis morbis, quam in longis. Hic enim breve spatium est, intra quod, si quod auxilium non profuit, aeger exstinguitur: ibi et deliberationi, et mutationi remediorum tempus patet; adeo ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens aeger sine illius
 5 vitio pereat. Longus tamen morbus quum penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quo vetustior est; longus autem, quo recentior, eo facilius curatur. Alterum illud ignorari non oportet, quod non omnibus aegris eadem auxilia conveniunt. Ex quo incidit, ut alia
 10 atque alia summi auctores, quasi sola, venditaverint, prout cuique cesserant. Oportet itaque, ubi aliquid non respondet, non tanti putare auctorem, quanti aegrum, et experiri aliud atque aliud: sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest; in longis, quos tempus ut facit, sic etiam sol-
 15 vit, non statim condemnetur, si quid non statim profuit; minus vero removeatur, si quid paulum saltem juvat; quia profectus tempore expletur.

CAPUT II.

Quomodo morbi cognoscantur, et an crescant, consistent, aut
 20 minuantur.

Protinus autem inter initia scire facile est, quis acutus morbus, quis longus sit: non in iis solis in quibus semper ita se habet; sed in iis quoque in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones et dolores graves urgent, acutus
 25 morbus est: ubi lenti dolores, lentaeve febres sunt, et spatia inter accessiones porriguntur, acceduntque ea signa, quae in priore volumine (II, cap. 5) exposita sunt, longum hunc futurum esse, manifestum est. Videndum etiam est, morbus an increseat, an consistat, an minuatur: quia quaedam reme-
 30 dia increscientibus morbis, plura inclinatis conveniunt, eaque quae increscientibus apta sunt, ubi acutus increscens urget, in remissionibus potius experienda sunt. Increscit autem morbus, dum graviores dolores, accessionesque veniunt; haecque et ante, quam proximae revertuntur, et postea desinunt.
 35 Atque in longis quoque morbis, etiam tales notas non habent-

tibus, scire licet increescere, si somnus incertus est, si deterior concoctio, si foetidiores dejectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit corpus frigus aut calor, si id magis pallet. Ea vero, quae contraria his sunt, decedentis ejus notae sunt. Praeter haec in acutis morbis serius aeger alendus est, nec nisi jam inclinatis: ut primo demta materia impetum frangat: in longis maturius, ut sustinere spatium affecturi mali possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed in parte est; magis tamen ad rem pertinet, vim totius corporis moliri, quam proprie (*propriae?*) partis aegrae¹⁰ sanitatem (cf. VII, 3). Multum etiam interest, ab initio quis recte curatus sit, an perperam: quia curatio minus iis prodest, in quibus assidue frustra fuit. Si quis temere habitus, adhuc integris viribus vivit, admota curatione momento restituitur.

Sed quum ab iis coeperim (II, 2), quae notas quasdam¹⁵ futurae adversae valetudinis exhibent, curationum quoque principium ab animadversione ejusdem temporis faciam. Igitur si quid ex iis, quae proposita sunt, incidit, omnium optima sunt quies et abstinencia; si quid bibendum est, aqua; idque interdum uno die fieri satis est; interdum, si terrentia manent,²⁰ biduo: proximeque abstinenciam sumendus est cibus exiguus, bibenda aqua; postero die etiam vinum; deinde invicem alternis diebus, modo aqua, modo vinum (cf. I, 4), donec omnis causae metus finiatur. Per haec enim saepe instans gravis morbus discutitur. Plurimique falluntur, dum se primo die²⁵ protinus sublaturus languorem aut exercitatione, aut balneo, aut coacta dejectione, aut vomitu, aut sudationibus, aut vino sperant. Non quo non interdum id incidat, sed quo saepius fallat, solaque abstinencia sine ullo periculo medeatur; quum praesertim etiam pro modo terroris moderari liceat; et si³⁰ leviora indicia fuerint, satis sit a vino tantum abstinere, quod subtractum plus, quam si cibo quid dematur, adjuvat: si paulo graviora, non aquam tantum bibere, sed etiam cibo carnem subtrahere; interdum panis quoque minus, quam pro consuetudine assumere, humidoque cibo esse contentum, et³⁵ olere potissimum: satisque sit, tunc ex toto a cibo, a vino, ab omni motu corporis abstinere, quum vehementes notae terruerunt. Neque dubium est, quin vix quisquam, qui

non dissimulavit, sed per haec mature morbo occurrit, aegrotet.

CAPUT III.

De febrium generibus.

5 Atque haec quidem sanis facienda sunt, tantum causam metuentibus. Sequitur vero curatio febrium, quod et in toto corpore, et vulgare maxime morbi genus est. Ex his una quotidiana, altera tertiana, altera quartana est: interdum etiam longiore circumitu quaedam redeunt; sed id raro fit: in
10 prioribus et morbi sunt, et medicina. Et quartanae quidem simpliciores sunt. Incipiunt fere ab horrore; deinde calor erumpit; finitaque febre biduum integrum est: ita quarto die revertitur. Tertianarum vero duo genera sunt: alterum eodem modo, quo quartana, et incipiens, et desinens; illo tantum
15 interposito discrimine, quod unum diem praestat integrum, tertio redit: alterum longe perniciosius, quod tertio quidem die revertitur, ex octo autem et quadraginta horis fere sex et triginta per accessionem occupat, interdum etiam vel minus, vel plus; neque ex toto in remissione desistit,
20 sed tantum levius est. Id genus plerique medici *μικροπύλον* appellant. Quotidianae vero variae sunt, et multiplices. Aliae enim protinus a calore incipiunt, aliae a frigore, aliae ab horrore. Frigus voco, ubi extremae partes membrorum inalgescunt: horrorem, ubi corpus totum intremitt. Rursus aliae
25 sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas: aliae sic, ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quaedam reliquiae remaneant, donec altera accessio accedat: ac saepe aliae vix quidquam aut nihil remittunt. Deinde aliae fervorem ingentem habent, aliae tolerabilem: aliae quotidie
30 pares sunt, aliae impares; atque invicem altero die leviores, altero vehementiores: aliae tempore eodem postridie revertuntur, aliae vel serius vel celerius: aliae diem noctemque accessione et decessione implent, aliae minus, aliae plus: aliae, quum decedunt, sudorem movent, aliae non movent;
35 atque alias per sudorem ad integritatem venit, alias corpus

tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam modo singulae singulis diebus fiunt, modo binae pluresve concurrunt: ex quo saepe evenit, ut quotidie plures accessiones remissionesque sint; sic tamen, ut unaquaeque alicui priori respondeat. Interdum vero accessiones quoque confunduntur sic, ut notari neque tempora earum, neque spatia possint. Neque verum est, quod dicitur a quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere: facilius enim semper curatio foret, si hoc verum esset. Sed quod evidentes causae faciunt, facere etiam abditae possunt. Neque de re, sed de verbo controversiam movent, qui quum aliter aliterque in eodem morbo febres accedunt, non easdem inordinate redire, sed alias aliasque subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret, etiamsi vere diceretur. Tempora quoque remissionum modo liberalia, modo vix ulla sunt.

CAPUT IV.

De febrium curationum diversis generibus.

Et febrium quidem ratio maxime talis est. Curationum vero diversa genera sunt, prout auctores aliquos habent. 20 Asclepiades officium esse medici dicit, *ut tuto, ut celeriter, ut jucunde* curet. Id votum est: sed fere periculosa esse nimia et festinatio et voluptas solet. Qua vero moderatione utendum sit, ut, quantum fieri potest, omnia ista contingant, prima semper habita salute, in ipsis partibus curationum considerandum erit. Et ante omnia quaeritur, primis diebus aeger qua ratione continendus sit. Antiqui, medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur; eo quod cruditatem maxime horrebant: deinde eam materiam, quae laedere videbatur, ducendo saepius alvum subtrahebant (cf. *Aph.* I, 30 • 22). Asclepiades medicamenta sustulit; alvum non toties, sed fere tamen in omni morbo, subduxit: febre vero ipsa praecipue se ad remedium ejus uti professus est. Convellendas enim vires aegri putavit, luce, vigilia, siti ingenti, sic ut ne os quidem primis diebus elui sineret; quo magis fal- 35

luntur qui per omnia jucundam ejus disciplinam esse concipiunt. Is enim ulterioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriae subscripsit; primis vero tortoris vicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari potiones, et alvum duci non nisi raro debere, concedo; non ideo tamen id agendum, ut aegri vires convellantur, existimo; quoniam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantum materiam superantem oportet, quae naturaliter digeritur, ubi nihil novi accedit. Itaque abstinendus a cibo primis diebus, et in luce habendus aeger, nisi infirmus, interdiu est, quoniam corpus ista quoque digerit; isque cubare quam maximo conclavi debet. Quod ad sitim vero somnumque pertinet, moderandum est, ut interdiu vigilet; noctu, si fieri potest, conquiescat: ac neque potest, neque nimium siti crucietur. Os etiam ejus elui potest, ubi et siccum est, et ipsi foetet; quamvis id tempus potioni aptum non est. Commodique Erasistratus dixit, saepe, interiore parte humorem non requirente, os et fauces requirere; neque ad rem, male haberi aegrum, pertinere.

Ac primo quidem sic tenendus est. Optimum vero medicamentum est, opportune cibus datus: qui quando primum dari debeat, quaeritur. Plerique ex antiquis tarde dabant, saepe quinto die, saepe sexto: et id fortasse vel in Asia, vel in Aegypto, coeli ratio patitur (cf. I, *prooem.*). Asclepiades, ubi aegrum triduo per omnia fatigaverat, quarto die cibo destinabat. At Themison nuper, non quando coepisset febris, sed quando desiisset, aut certe levata esset, considerabat; et ab illo tempore, expectato die tertio, si non accesserat febris, statim; si accesserat, ubi ea vel desierat, vel, si assidue inhaerebat, certe sese inclinaverat, cibum dabat. Nihil autem horum utique perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto; potest post unam accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qualis morbus sit, quale corpus, quale coelum, quae aetas, quod tempus anni, minimeque in rebus multum inter se differentibus, perpetuum esse praeceptum temporis potest. In morbo, qui plus virium aufert, celerius cibus dandus est:

itemque eo coelo, quod magis digerit. Ob quam causam in Africa nullo die aeger abstineri recte videtur. Maturius etiam puero, quam juveni, aestate, quam hieme, dari debet. Unum illud est, quod semper, quod ubique servandum est, ut aegri vires subinde assidens medicus inspiciat, et quamdiu supererunt, abstinence pugnet; si imbecillitatem vereri coeperit, cibo subveniat. Id enim ejus officium est, ut aegrum, neque supervacua materia oneret, neque imbecillitatem fame prodat. Idque apud Erasistratum quoque invenio: qui quamvis parum docuit, quando venter, quando corpus ipsum exinaniretur, 10 dicendo tamen haec esse videnda, et tum cibum dandum, quum corpori deberetur, satis ostendit, dum vires superessent, dari non oportere; ne deficerent, consulendum esse. Ex his autem intelligi potest, ab uno medico multos non posse curari: eumque, si artifex est, idoneum esse, qui non multum 15 ab aegro recedit. Sed qui quaestui serviunt, quoniam is major ex populo est, libenter amplectuntur ea praecepta, quae sedulitatem non exigunt; ut in hac ipsa re. Facile est enim dies vel accessiones numerare iis quoque, qui aegrum raro vident: ille assideat necesse est, qui, quod solum opus est, 20 visurus est, quando nimis imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit.

Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio; quoniam antiqui potissimum impares sequebantur, eosque, tamquam 25 tunc de aegris judicaretur, *κρίσιμους* nominabant* [adeo ut Hippocrates (*Aph.* IV, 61; *Coac.* 142), si alio die febris desisset, recidivam timere sit solitus]. Hi erant dies tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, quartusdecimus, unus et vicesimus; ita ut summa potentia septimo, deinde quarto- 30 decimo, deinde uni et vicesimo daretur (cf. *Aph.* II, 23; *Epid.* I, 12; *Hum.* 4, 5, 6). Igitur sic aegros nutriebant, ut dierum imparium accessiones exspectarent; deinde postea cibum, quasi levioribus accessionibus instantibus, darent. Id Asclepiades jure ut vanum repudiavit; atque in nullo die, 35 quia par imparve esset, iis vel majus vel minus periculum esse dixit. Interdum enim pejores dies pares fiunt; et opportunius post eorum accessiones cibus datur. Nonnumquam

etiam in ipso morbo dierum ratio mutatur; fitque gravior, qui remissior esse consueverat. Atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui quum octavum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius inciperet, ipsi sibi repugnabant, non octavum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendo, quasi potentiorum: plus enim tribuebant nono, et undecimo. Quod quum fecissent sine ulla probabili ratione, ab undecimo, non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant.

10 Est etiam apud Hippocratem, ei, quem septimus dies liberaturus sit, quartum esse gravissimum (cf. *Aph.* II, 24). Ita, illo quoque auctore, in die pari et gravior febris esse potest, et certa futuri nota. Atque idem alio loco (cf. *Progn.* § 20; *Epid.* II, 6, 11; *Fract.* § 31; *Art.* § 67) quartum quem-

15 que diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit; id est quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimumseptimum. In quo et ab imparis ad paris rationem transit, et ne hoc quidem propositum conservavit; quum a septimo die undecimus, non quartus, sed quintus sit. Adeo apparet,

20 quacumque ratione ad numerum respexerimus, nihil rationis, sub illo quidem auctore, reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum pythagorici numeri fefellerunt: quum hic quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri; et ex his conjectare, quando dan-

25 dus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet, scire, tum oporteat dari, quum jam bene venae conquieverunt, an etiamnum manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quam integerimis corporibus alimentum offerebant; Asclepiades, inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhaerente. In quo vanam

30 rationem sequutus est: non quo non sit interdum maturius cibus dandus, si mature timetur altera accessio; sed quo scilicet quam sanissimo dari debeat: minus enim corrumpitur, quod integro corpori infertur. Neque tamen verum est, quod Themisoni videbatur, si duabus horis integer futurus esset

35 aeger, satius esse tunc dari; ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset optimum: sed quum hoc breve tempus non praestet, satius est principia cibi a decedente febre, quam reliquias

ab incipiente excipi. Ita si longius tempus secundum est, quam integerrimo dandus est; si breve, etiam antequam ex toto integer fiat. Quo loco vero integritas est, eodem est remissio, quae maxima in febre continua potest esse. Atque hoc quoque quaeritur, utrum tot horae expectandae sint, quot febrem habuerunt; an satis sit primam partem earum praeteriri, ut aegris jucundius insadat, quibus interdum non vacat. Tutissimum est autem, ante totius accessionis tempus praeteriri: quamvis, ubi longa febris fuit, potest indulgeri aegro maturius, dum tamen ante minime pars dimidia praetereatur. Idque non in ea sola febre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus ita servandum est.

CAPUT V.

De febrium speciebus, et singularum curationibus; et primo quando cibus febricitantibus dandus.

15

Haec magis per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desiit, eaque vel ex inguine (cf. *Aph.* IV, 55), vel ex lassitudine, vel ex aestu, aliave simili re fuit, sic, ut interior nulla causa metum fecerit, postero die, quum tempus accessionis ita transiit, ut nihil moverit, cibus dari potest. At si ex alto calor venit, et gravitas vel capitis vel praecordiorum sequuta est, neque apparet quid corpus confuderit; quamvis unam accessionem sequuta integritas est; tamen, quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: et ubi accessionis tempus praeteriit, cibus dandus est, sed exiguus; quia quartana quoque timeri potest: et die quarto demum, si corpus integrum est, eo cum fiducia utendum. Si vero postero, tertiove, aut quarto die sequuta febris est, scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque, quarum et certus circumitus est, et finis integer, et liberaliter quieti tempora sunt, expeditior ratio est: de quibus suo loco dicam (cf. capp. 13 sqq.). Nunc vero eas explicabo quae quotidie urgent. Igitur tertio quoque die cibus aegro commo-
sime datur (cf. III, 13): ut alter febrem minuat, alter viribus

subveniat. Sed is dari debet, si quotidiana febris est, quae ex toto desinat, simulatque corpus integrum factum est: si quamvis non accessiones, febres tamen junguntur, et quotidie quidem increscunt, sed sine integritate tamen remittunt, quum
5 corpus ita se habet, ut major remissio non exspectetur: si altero die gravior, altero levior accessio est, post graviorem. Fere vero graviorem accessionem levior nox sequitur: quo lit, ut graviorem accessionem nox quoque tristior antecedit (cf. *Aph.* II, 13). At si continuatur febris, neque levior um-
10 quam fit, et dari cibum necesse est, quando dari debeat, magna dissensio est. Quidam, quia fere remissius matutinum tempus aegris est, tunc putant dandum. Quod si respondet, non quia mane est, sed quia remissio est, dari debet. Si vero ne tunc quidem ulla requies aegris est, hoc ipso pejus
15 id tempus est, quod quum sua natura melius esse debeat, morbi vitio, non est: simulque insequitur tempus meridianum, a quo quum omnis aeger fere pejor fiat, timeri potest, ne ille magis etiam, quam ex consuetudine, urgeatur. Igitur alii vespere tali aegro cibum dant. Sed quum eo tempore
20 fere pessimi sint, qui aegrotant, verendum est, ne, si quid tunc moverimus, fiat aliquid asperius. Ob haec ad mediam noctem decurro; id est, finito jam gravissimo tempore, eodemque longissime distante: sequuturis vero antelucanis horis, quibus omnes fere maxime dormiunt; deinde matutino
25 tempore, quod natura sua levissimum est. Si vero febres vagae sunt, quia verendum est, ne cibum statim subsequantur, quandocumque quis ex accessione levatus est, tunc debet assumere. At si plures accessiones eodem die veniunt, considerare oportet, paresne per omnia sint, quod vix fieri
30 potest, an impares. Si per omnia pares sunt, post eam potius accessionem cibus dari debet, quae non inter meridiem et vesperem desinit: si impares sunt, considerandum est, quo distent. Nam si altera gravior, altera levior est, post graviorem dari debet: si altera longior, altera brevior, post
35 longiorem: si altera gravior, altera longior est, considerandum est utra magis affligat, illa vi, an haec tempore; et post eam dandus est; sed plane plurimum interest, quantae qualesque inter eas remissiones sint. Nam si post alteram febrem

motio manet, post alteram integrum corpus est, integro corpore cibo tempus aptius est: si semper febricula manet, sed alterum tamen longius tempus remissionis est, id potius eligendum est; adeo ut, ubi accessiones continuantur, protinus, inclinata priore, dandus cibus sit. Etenim perpetuum est, ad quod omne consilium dirigi potest, cibum quam maxime semper ab accessione futura reducere; et, hoc salvo, dare quam integerrimo corpore (*Aph.* I, 11). Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones servabitur. Sed quum sit aptissimum tertio quoque die cibum dare; tamen, si corpus infirmum est, quotidie dandus est; multoque magis, si continentes febres sine remissione sunt, quanto magis corpus affligunt; aut si duae pluresve accessiones eodem die veniunt. Quae res efficit, ut et a primo die protinus cibus dari quotidie debeat, si protinus venae conciderunt; et saepius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest. Illud tamen in his servandum est, ut post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Quum vero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur, scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita; deinde quum decessio ejus consistit; tertium, si necesse est, quandoquique decedit; cetera omnia periculosa esse; si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse, consistente jam incremento febris, aliquid offerre, quam incrementum; satius esse, instante, quam incipiente: cum eo tamen, ut nullo tempore is, qui deficit, non sit sustinendus. Neque hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, et ad eum dirigere curationem; seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam alii affectus interveniunt. Quum vero semper aegros securos agere conveniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum praecipue, ubi cibum sumserunt. Itaque, si qua sunt, quae exasperatura eorum animos sunt, optimum est ea, dum aegrotant, eorum notitiae subtrahere: si id fieri non potest, sustinere tamen post cibum usque somni tempus (id est, toto somni tempore. cf. VIII, 4), et quum exporrecti sunt, tum exponere.

CAPUT VI.

Quando potiones febricitantibus dari expediat.

Sed de cibo quidem facilius cum aegris ratio est, quorum saepe stomachus hunc respuit, etiamsi mens concupiscit: de potione vero ingens pugna est; eoque magis, quo major febris est. Haec enim sitim accendit, et tum maxime aquam exigit, quum illa periculosissima est. Sed docendus aeger est, ubi febris quieverit, protinus sitim quoque quieturam; longioremque accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimen-
10 tum: ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Necesse est tamen, quanto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinent, tanto magis aegris in potione, quam in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet, nisi subito sic venae conciderunt, ut cibus quoque dari debeat: secundo vero, ceterisque etiam, quibus cibus non dabitur, tamen, si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem ab Heraclide Tarentino dictum ratione caret: ubi aut bilis aegrum, aut cruditas male habet, expedire quoque per modicas potiones misceri novam materiae corruptae
20 (cf. IV, 11). Illud videndum est, ut qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoque, ubi sine illo datur, deligantur; aut quum aegrum dormire cupiemus; quod fere sitis prohibet. Satis autem convenit, quum omnibus febricitantibus nimius humor alienus sit, tum praecipue esse feminis, quae ex
25 partu in febres inciderunt.

Sed quum tempora cibo potionique febris et remissionis ratio det, non est expeditissimum scire, quando aeger febricitet, quando melior sit, quando deficiat; sine quibus dispensari illa non possunt. Venis (sc. *arteriis*) enim maxime
30 credimus, fallacissimae rei; quia saepe istae leniores celerioresque sunt, et aetate, et sexu, et corporum natura: et plerumque satis sano corpore, si stomachus infirmus est, nonnumquam etiam incipiente febre, subeunt et quiescunt; ut imbecillus is videri possit, cui facile laturo gravis instat accessio. Contra saepe eas concitat et sol, et balneum, et exercitatio, et metus, et ira, et quilibet alius animi affectus: adeo

ut, quum primum medicus venit, sollicitudo aegri dubitantis, quomodo illi se habere videatur, eas moveat. Ob quam causam, periti medici est, non protinus ut venit, apprehendere manu brachium: sed primum residere hilari vultu, percontari-
que, quemadmodum se habeat; et si quis ejus metus est, eum probabili sermone lenire; tum deinde ejus corpori manum admove-
re. Quas venas autem conspectus medici movet, quam facile mille res turbant! Altera res est, cui credimus, calor, aequae fallax: nam hic quoque excitatur aestu, labore, somno, metu, sollicitudine. Igitur intueri quidem etiam
ista oportet; sed his non omnia credere. Ac protinus quidem scire, non febricitare eum, cujus venae naturaliter ordinatae sunt, teporque talis est, qualis esse sani solet: non protinus autem sub calore motuque febrem esse concipere; sed ita, si summa quoque arida inaequaliter cutis est; si calor et in
fronte est, et ex imis praecordiis oritur; si spiritus ex naribus cum fervore prorumpit; si color aut rubore, aut pallore novo mutatus est; si oculi graves, et aut persicci, aut subhumidi sunt; si sudor quum fit, inaequalis est; si venae non aequalibus intervallis moventur. Ob quam causam medicus
neque in tenebris, neque a capite aegri debet residere; sed illustri loco adversus, ut omnes notas ex vultu quoque cubantis percipiat. Ubi vero febris fuit, ac decrevit, spectare oportet, num tempora, partesve corporis aliae paulum madescant, quae sudorem venturum esse testentur: ac si qua nota
est, tunc demum dare potui calidam aquam, cujus salubris effectus est, si sudorem per omnia membra diffundit. Hujus autem rei causa, continere aeger sub veste satis multa manus debet; eademque crura, pedesque contegere: qua plerique aegros in ipso febris impetu male habent. Si sudare corpus
coepit, linteum tepefacere oportet, paulatimque singula membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est, aut si is non venit, ubi quam maxime potuit, idoneus esse cibo aeger videtur, sub veste leniter ungendus est, tum detergendus, deinde ei cibis dandus. Is autem febricitantibus humidus est
aptissimus (*Aph.* I, 16), aut humori certe quam proximus: utique ex materia quam levissima, maximeque sorbitio, ea-
que, si magnae febres fuerint, quam tenuissima esse debet.

Mel quoque despumatum huic recte adjicitur, quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachum offendit, supervacuum est; sicut ipsa quoque sorbitio. Dari vero in vicem ejus potest, vel intrita ex aqua calida, vel alica elota; si firmus est stomachus, et compressa alvus, ex aqua mulsa; si vel ille languet, vel haec profluit, ex posca. Et primo quidem cibo id satis est. Secundo vero aliquid adjici potest, ex eodem tamen genere materiae, vel olus, vel conchylium, vel pomum. Et dum febres quidem increscunt, hic solus cibus idoneus est. Ubi vero aut desinunt, aut levantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia levissima, adjiciendum vero aliquid ex media, ratione habita subinde et virium hominis et morbi. Ponendi vero aegro varii cibi, sicut Asclepiades praecepit, tum demum sunt, ubi fastidio urgetur, neque satis vires sufficiunt; ut paulum ex singulis degustando, famem vitet. At si neque vis, neque cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus aeger est; ne plus assumat, quam concoquat. Neque verum est, quod ab eo dicitur, facilius concoqui cibos varios. Eduntur enim facilius: ad concoctionem autem materiae genus et modus pertinent. Neque inter magnos dolores, neque increscente morbo, tutum est aegrum cibo impleri; sed ubi inclinata jam in melius valetudo est (*Aph. I, 7*).

Sunt aliae quoque observationes in febribus necessariae. Atque id quoque videndum est, quod quidam (*sc. Methodici*) solum praecipiunt, adstrictum corpus sit, an profluat; quorum alterum strangulat, alterum digerit; nam si adstrictum est, ducenda alvus est, movenda urina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest. Utile est etiam ducere in balneum, prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multaue aqua fovere inguina; interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere; uti cibo serius et rarius, tenui, simplici, molli, calido, exiguo; maximeque oleribus, qualia sunt lapathum, urtica, malva; vel jure etiam concharum, musculorumve, aut locustarum: neque danda caro, nisi elixa, est. At potio esse debet magis liberalis, et ante cibum, et post hunc, et cum hoc, ultra

quam sitis coget: poteritque a balneo etiam pinguius, aut dulcius dari vinum; poterit semel, aut bis interponi graecum salsum (cf. III, 16). Contra vero, si corpus profluet, sudor coercendus, quies adhibenda erit; tenebris somnoque, quandoque volet, utendum; non nisi leni gestatione corpus agitandum, et pro genere mali subveniendum. Nam si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decrevit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, et vomere cogere; nisi aut fauces, aut praecordia, aut latus dolet, aut vetus morbus est. Si vero sudor exercet, duranda cutis est nitro, vel sale, quae cum oleo miscentur: ac si levius id vitium est, oleo corpus ungendum; si vehementius, rosa, vel melino, vel myrteo, cui vinum austerum sit adjectum. Quisquis autem fluore aeger est, quum venit in balneum, prius ungendus, deinde in solium demittendus est. Si in cute vitium est, frigida quoque, quam calida aqua melius utetur. Ubi ad cibum ventum est, dari debet is valens, frigidus, siccus, simplex, qui quam minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, vinum austerum, vel certe subausterum; si venter profluit, calidum; si sudores nocent, vomitusve sunt, 20 frigidum.

CAPUT VII.

Quomodo pestilentes febres curari debeant.

1. Desiderat etiam propriam animadversionem in febribus pestilentiae casus. In hac minime utile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere alvum. Si vires sinunt, sanguinem mittere optimum est; praecipueque si cum dolore febris est (cf. II, 10): si id parum tutum est, ubi febris levata est, vomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quam in aliis morbis, ducere in balneum opus est; vinum calidum et 30 meracius dare, et omnia glutinosa; inter quae carnem quoque generis ejusdem. Nam quo celerius ejusmodi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate, rapienda sunt. Quod si puer est, qui laborat, neque tantum robur ejus est, ut sanguis mitti possit, cucurbitulis ei 35

utendum est; ducenda alvus vel aqua, vel ptisanæ cremore; tum demum levibus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri, ut viri, curari debent. Ergo, ut in alio quoque genere morborum, parcius in his agendum est: non facile sanguinem mittere, non facile ducere alvum, non cruciari vigilia, fameve, aut nimia siti, non vino curare. Vomitus post febrem eliciendus est; deinde dandus cibus ex levissimis; tum is dormiat; posteroque die, si febris manet, abstineat; tertio, ad similem cibum redeat. Dandaque opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam abstinentiam cibo opportuno, omissis ceteris, nutriatur.

2. Si vero ardens febris extorret, nulla medicamenti danda potio est; sed in ipsis accessionibus oleo et aqua refrigerandus est, quæ miscenda manu sunt, donec albescant; eo
15 conclavi tenendus, quo multum et purum aerem trahere possit; neque multis vestimentis strangulandus, sed admodum levibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum imponi folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. Alendus maturius est, id est a die tertio; et ante cibum iisdem perungendus. Si pituita in stomacho
20 coit, inclinata jam accessione, vomere cogendus est; tum dandum frigidum olus, aut pomum ex iis quæ stomacho conveniunt. Si siccus manet stomachus, protinus vel ptisanæ, vel alicæ, vel oryzae cremor dandus est, cum quo recens
25 adeps cocta sit. Quum vero in summo incremento morbus est, utique non ante quartum diem, magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem; et quum jam venter et præcordia ultra modum repleta, satisque refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne
30 vomitum quidem exigunt; sed ipsa aqua frigida tantum, ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Ubi utrumlibet factum est, multa veste operiendus est, et collocandus ut dormiat. Fereque post longam sitim et vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus venit, per
35 quem ingens sudor effunditur; idque præsentissimum auxilium est: sed in iis tamen, in quibus præter ardorem, nulli dolores, nullus præcordiorum tumor; nihil prohibens vel i thorace, vel in pulmone, vel in faucibus; non ulcus, no

*dejectio fuit. Si quis autem in ejusmodi febre leviter tussit, is neque vehementi siti conflictatur (cf. *Aph.* IV, 54), neque bibere aquam frigidam debet; sed eo modo curandus est, quo in ceteris febribus praecipitur.

CAPUT VIII.

5

Curatio semitertianae febris.

At ubi id genus tertianae est, quod *ἡμικριτικός* medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerumque frequentes accessiones decessionesque, porrigiturque febris inter horas viginti quatuor, et triginta sex; ut, quod idem est, non idem esse videatur. Et magnopere necessarium est, neque dari cibum, nisi in ea remissione, quae vera est; et ubi ea venit, protinus dari: plurimique sub alterutro curantis errore subito moriuntur. Ac, nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet; tum dari cibis, qui neque incitet febrem, et tamen longum ejus spatium sustineat.

CAPUT IX.

Curatio lentarum febrium.

Nonnumquam etiam lentae febres sine ulla remissione corpus tenent; ac neque cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet: fortasse enim curationi opportunior fiet. Saepe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adjectum, corpus ejus pertractandum est, quoniam interdum sic evenit, ut horror oriatur, et fiat initium quoddam novi motus; exque eo, quum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo et sale salubris videtur. At si diu frigus est, et torpor, et jactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, vel cum cibo vinum bene dilutum. Intenditur enim saepe ex eo febris; et major ortus calor simul et priora mala tollit, et spem remissionis, inque ea cu-

rationis ostendit. Neque hercules ista curatio nova est¹⁾, qua nunc quidam traditos sibi aegros, qui sub cautioribus medicis trahebantur, interdum contrariis remediis sanant. Siquidem apud antiquos quoque ante Herophilum et Erasistratum, maximeque post Hippocratem fuit Petro quidam, qui febricitantem hominem ubi acceperat, multis vestimentis operiebat, ut simul calorem ingentem, sitimque excitaret: deinde, ubi paulum remitti coeperat febris, aquam frigidam potui dabat; ac, si moverat sudorem, explicuisse se aegrum iudicabat; si non moverat, plus etiam aquae frigidae ingerebat; et tum vomere coge-
 10 bat. Si alterutro modo febre liberaverat, protinus suillam assam, et vinum homini dabat: si non liberaverat, decoquebat aquam sale adjecto (cf. III, 24), eamque bibere coge-
 15 bat, ut movendo ventrem purgaret. Et intra haec omnis ejus medicina erat; eaque non minus grata fuit iis, quos Hippocratis successores non refecerant; quam nunc est iis, quos Herophili vel Erasistrati aemuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina: quia plures, si protinus a principiis excepit, interimit. Sed quum
 20 eadem omnibus convenire non possint, fere quos ratio non restituit, temeritas adjuvat. deoque ejusmodi medici melius alienos aegros, quam suos nutriunt (cf. VI, 6, § 16). Sed est circumspecti quoque hominis, et novare interdum, et augere morbum, et febres accendere; quia curationem, ubi id,
 25 quod est, non recipit, potest recipere id quod futurum est.

CAPUT X.

Curatio symptomatum febrium.

Considerandum etiam est, febresne solae sint, an alia quoque his mala accedant; id est num caput doleat, num lin-

¹⁾ Antonium Musam indicare videtur, qui Augustum *contraria medicina periculo exemit*; ut tradit Plinius lib. XXIX, cap. 1, sect. 5. et Suetonius in Augusto cap. 31: *distillationibus, jocinere vitiatum, desperationem redactus, contrariam, et ancipitem rationem medei subiit: quia calida fomenta non proderant, frigidis curari coae auctore Antonio Musa.*

gua aspera, num praecordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, et in id ingerere: deinde habere duo pittacia, quae frontis latitudinem longitudinemque aequent; ex his invicem alterum in aceto et rosa habere, alterum in fronte; aut intinctam iisdem lanam succi-⁵ dam imponere. Si acetum offendit, pura rosa utendum est; si rosa ipsa laedit, oleo acerbo. Si ista parum juvant, teri potest vel iris arida, vel nuces amarae, vel quaelibet herba ex refrigerantibus: quorum quidlibet ex aceto impositum, dolorem minuit; sed magis aliud in alio. Juvat etiam panis cum¹⁰ papavere injectus; vel cum rosa cerussa, spumave argenti. Olfacere quoque vel serpyllum, vel anethum, non alienum est. At si in praecordiis inflammatio et dolor est, primo superimponenda sunt cataplasmata reprimentia; ne, si calidiora fuerint, plus eo materiae concurrat: deinde, ubi prima¹⁵ inflammatio se remisit, tunc demum ad calida et humida veniendum est; ut ea, quae remanserint, discutiant. Notae vero inflammationis sunt quatuor, rubor et tumor, cum calore et dolore. Quo magis erravit Erasistratus, qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est,²⁰ nihil imponendum est: hunc enim statim ipsa febris solvet. At si neque inflammatio, neque febris, sed tantum praecordiorum dolor est, protinus calidis et siccis fomentis uti licet. Si vero lingua sicca et scabra est, detergenda primum penicillo est ex aqua calida: deinde ungenda mixtis inter se rosa²⁵ et melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulque siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterosa est, ungi rosa debet, cui cerae paulum sit adjectum.

CAPUT XI.

Curatio frigoris quod febrem praecedat.

30

Solet etiam ante febres esse frigus; idque vel molestissimum morbi genus est. Ubi id expectatur, omni potione prohibendus aeger est: haec enim paulo ante data multum malo adjicit. Item maturius veste multa tegendus est; admovenda partibus iis, pro quibus metuimus, sicca et calida fomenta³⁵

sic, ne statim vehementissimi calores incipiant, sed paulatim
 increscant: perfricandae quoque eae partes manibus unctis
 ex vetere oleo sunt, eique adjiciendum aliquid ex calefacien-
 tibus; contentique medici quidam una frictione, etiam ex
 5 quolibet oleo, sunt. In harum febrium remissionibus nonnulli
 tres aut quatuor sorbitionis cyathos, etiamnum manente fe-
 bre, dant: deinde, ea bene finita, reficiunt stomachum cibo
 frigido et levi. Ego tum hoc puto tentandum, quum parum
 cibus, semel et post febrem datus, prodest. Sed curiose
 10 prospiciendum est, ne tempus remissionis decipiat: saepe
 enim in hoc quoque genere valetudinis jam minui febris vi-
 detur, et rursus intenditur. Itaque ei remissioni credendum
 est, quae etiam immoratur, et jactationem, foetoremque
 quemdam oris, quem ὄξην Graeci vocant, minuit. Illud satis
 15 convenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie cibum
 dandum: si impares, post graviolem, cibum; post leviolem,
 aquam mulsam.

CAPUT XII.

Curatio horroris in febribus.

20 Horror autem eas fere febres antecedit, quae certum ha-
 bent circumitum, et ex toto remittuntur; ideoque tutissimae
 sunt, maximeque curationes admittunt. Nam ubi incerta tem-
 pora sunt, neque alvi ductio, neque balneum, neque vinum,
 neque medicamentum aliud recte datur. Incertum est enim
 25 quando febris ventura sit: ita fieri potest, ut, si subito ve-
 nerit, summa in eo perniciēs sit, quod auxilii causa sit in-
 ventum. Nihilque aliud fieri potest, quam ut primis diebus
 bene abstinenceatur aeger; deinde sub decessu febris ejus, quae
 gravissima est, cibumumat. At ubi certus circumitus est, fa-
 30 cilis omnia illa tentantur; quia magis proponere nobis et ac-
 cessionum et decessionum vices possumus. In his autem,
 quum inveteraverunt, utilis fames non est: primis tantummo-
 do diebus ea pugnandum est; deinde dividenda curatio est, et
 ante horror, tum febris discutienda. Igitur quum primum ali-
 35 quis inhorruit, et ex horrore incaluit, dare ei oportet potui

tepidam aquam subsalsam, et vomere eum cogere: nam fere talis horror ab iis oritur, quae biliosa in stomacho resedunt. Idem faciendum est, si proximo quoque circumitu aequae accessit: saepe enim sic discutitur. Jamque quod genus febris sit, scire licet. Itaque sub exspectatione proximae accessio-
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 105
 110
 115
 120
 125
 130
 135
 140
 145
 150
 155
 160
 165
 170
 175
 180
 185
 190
 195
 200
 205
 210
 215
 220
 225
 230
 235
 240
 245
 250
 255
 260
 265
 270
 275
 280
 285
 290
 295
 300
 305
 310
 315
 320
 325
 330
 335
 340
 345
 350
 355
 360
 365
 370
 375
 380
 385
 390
 395
 400
 405
 410
 415
 420
 425
 430
 435
 440
 445
 450
 455
 460
 465
 470
 475
 480
 485
 490
 495
 500
 505
 510
 515
 520
 525
 530
 535
 540
 545
 550
 555
 560
 565
 570
 575
 580
 585
 590
 595
 600
 605
 610
 615
 620
 625
 630
 635
 640
 645
 650
 655
 660
 665
 670
 675
 680
 685
 690
 695
 700
 705
 710
 715
 720
 725
 730
 735
 740
 745
 750
 755
 760
 765
 770
 775
 780
 785
 790
 795
 800
 805
 810
 815
 820
 825
 830
 835
 840
 845
 850
 855
 860
 865
 870
 875
 880
 885
 890
 895
 900
 905
 910
 915
 920
 925
 930
 935
 940
 945
 950
 955
 960
 965
 970
 975
 980
 985
 990
 995
 1000
 1005
 1010
 1015
 1020
 1025
 1030
 1035
 1040
 1045
 1050
 1055
 1060
 1065
 1070
 1075
 1080
 1085
 1090
 1095
 1100
 1105
 1110
 1115
 1120
 1125
 1130
 1135
 1140
 1145
 1150
 1155
 1160
 1165
 1170
 1175
 1180
 1185
 1190
 1195
 1200
 1205
 1210
 1215
 1220
 1225
 1230
 1235
 1240
 1245
 1250
 1255
 1260
 1265
 1270
 1275
 1280
 1285
 1290
 1295
 1300
 1305
 1310
 1315
 1320
 1325
 1330
 1335
 1340
 1345
 1350
 1355
 1360
 1365
 1370
 1375
 1380
 1385
 1390
 1395
 1400
 1405
 1410
 1415
 1420
 1425
 1430
 1435
 1440
 1445
 1450
 1455
 1460
 1465
 1470
 1475
 1480
 1485
 1490
 1495
 1500
 1505
 1510
 1515
 1520
 1525
 1530
 1535
 1540
 1545
 1550
 1555
 1560
 1565
 1570
 1575
 1580
 1585
 1590
 1595
 1600
 1605
 1610
 1615
 1620
 1625
 1630
 1635
 1640
 1645
 1650
 1655
 1660
 1665
 1670
 1675
 1680
 1685
 1690
 1695
 1700
 1705
 1710
 1715
 1720
 1725
 1730
 1735
 1740
 1745
 1750
 1755
 1760
 1765
 1770
 1775
 1780
 1785
 1790
 1795
 1800
 1805
 1810
 1815
 1820
 1825
 1830
 1835
 1840
 1845
 1850
 1855
 1860
 1865
 1870
 1875
 1880
 1885
 1890
 1895
 1900
 1905
 1910
 1915
 1920
 1925
 1930
 1935
 1940
 1945
 1950
 1955
 1960
 1965
 1970
 1975
 1980
 1985
 1990
 1995
 2000
 2005
 2010
 2015
 2020
 2025
 2030
 2035
 2040
 2045
 2050
 2055
 2060
 2065
 2070
 2075
 2080
 2085
 2090
 2095
 2100
 2105
 2110
 2115
 2120
 2125
 2130
 2135
 2140
 2145
 2150
 2155
 2160
 2165
 2170
 2175
 2180
 2185
 2190
 2195
 2200
 2205
 2210
 2215
 2220
 2225
 2230
 2235
 2240
 2245
 2250
 2255
 2260
 2265
 2270
 2275
 2280
 2285
 2290
 2295
 2300
 2305
 2310
 2315
 2320
 2325
 2330
 2335
 2340
 2345
 2350
 2355
 2360
 2365
 2370
 2375
 2380
 2385
 2390
 2395
 2400
 2405
 2410
 2415
 2420
 2425
 2430
 2435
 2440
 2445
 2450
 2455
 2460
 2465
 2470
 2475
 2480
 2485
 2490
 2495
 2500
 2505
 2510
 2515
 2520
 2525
 2530
 2535
 2540
 2545
 2550
 2555
 2560
 2565
 2570
 2575
 2580
 2585
 2590
 2595
 2600
 2605
 2610
 2615
 2620
 2625
 2630
 2635
 2640
 2645
 2650
 2655
 2660
 2665
 2670
 2675
 2680
 2685
 2690
 2695
 2700
 2705
 2710
 2715
 2720
 2725
 2730
 2735
 2740
 2745
 2750
 2755
 2760
 2765
 2770
 2775
 2780
 2785
 2790
 2795
 2800
 2805
 2810
 2815
 2820
 2825
 2830
 2835
 2840
 2845
 2850
 2855
 2860
 2865
 2870
 2875
 2880
 2885
 2890
 2895
 2900
 2905
 2910
 2915
 2920
 2925
 2930
 2935
 2940
 2945
 2950
 2955
 2960
 2965
 2970
 2975
 2980
 2985
 2990
 2995
 3000
 3005
 3010
 3015
 3020
 3025
 3030
 3035
 3040
 3045
 3050
 3055
 3060
 3065
 3070
 3075
 3080
 3085
 3090
 3095
 3100
 3105
 3110
 3115
 3120
 3125
 3130
 3135
 3140
 3145
 3150
 3155
 3160
 3165
 3170
 3175
 3180
 3185
 3190
 3195
 3200
 3205
 3210
 3215
 3220
 3225
 3230
 3235
 3240
 3245
 3250
 3255
 3260
 3265
 3270
 3275
 3280
 3285
 3290
 3295
 3300
 3305
 3310
 3315
 3320
 3325
 3330
 3335
 3340
 3345
 3350
 3355
 3360
 3365
 3370
 3375
 3380
 3385
 3390
 3395
 3400
 3405
 3410
 3415
 3420
 3425
 3430
 3435
 3440
 3445
 3450
 3455
 3460
 3465
 3470
 3475
 3480
 3485
 3490
 3495
 3500
 3505
 3510
 3515
 3520
 3525
 3530
 3535
 3540
 3545
 3550
 3555
 3560
 3565
 3570
 3575
 3580
 3585
 3590
 3595
 3600
 3605
 3610
 3615
 3620
 3625
 3630
 3635
 3640
 3645
 3650
 3655
 3660
 3665
 3670
 3675
 3680
 3685
 3690
 3695
 3700
 3705
 3710
 3715
 3720
 3725
 3730
 3735
 3740
 3745
 3750
 3755
 3760
 3765
 3770
 3775
 3780
 3785
 3790
 3795
 3800
 3805
 3810
 3815
 3820
 3825
 3830
 3835
 3840
 3845
 3850
 3855
 3860
 3865
 3870
 3875
 3880
 3885
 3890
 3895
 3900
 3905
 3910
 3915
 3920
 3925
 3930
 3935
 3940
 3945
 3950
 3955
 3960
 3965
 3970
 3975
 3980
 3985
 3990
 3995
 4000
 4005
 4010
 4015
 4020
 4025
 4030
 4035
 4040
 4045
 4050
 4055
 4060
 4065
 4070
 4075
 4080
 4085
 4090
 4095
 4100
 4105
 4110
 4115
 4120
 4125
 4130
 4135
 4140
 4145
 4150
 4155
 4160
 4165
 4170
 4175
 4180
 4185
 4190
 4195
 4200
 4205
 4210
 4215
 4220
 4225
 4230
 4235
 4240
 4245
 4250
 4255
 4260
 4265
 4270
 4275
 4280
 4285
 4290
 4295
 4300
 4305
 4310
 4315
 4320
 4325
 4330
 4335
 4340
 4345
 4350
 4355
 4360
 4365
 4370
 4375
 4380
 4385
 4390
 4395
 4400
 4405
 4410
 4415
 4420
 4425
 4430
 4435
 4440
 4445
 4450
 4455
 4460
 4465
 4470
 4475
 4480
 4485
 4490
 4495
 4500
 4505
 4510
 4515
 4520
 4525
 4530
 4535
 4540
 4545
 4550
 4555
 4560
 4565
 4570
 4575
 4580
 4585
 4590
 4595
 4600
 4605
 4610
 4615
 4620
 4625
 4630
 4635
 4640
 4645
 4650
 4655
 4660
 4665
 4670
 4675
 4680
 4685
 4690
 4695
 4700
 4705
 4710
 4715
 4720
 4725
 4730
 4735
 4740
 4745
 4750
 4755
 4760
 4765
 4770
 4775
 4780
 4785
 4790
 4795
 4800
 4805
 4810
 4815
 4820
 4825
 4830
 4835
 4840
 4845
 4850
 4855
 4860
 4865
 4870
 4875
 4880
 4885
 4890
 4895
 4900
 4905
 4910
 4915
 4920
 4925
 4930
 4935
 4940
 4945
 4950
 4955
 4960
 4965
 4970
 4975
 4980
 4985
 4990
 4995
 5000
 5005
 5010
 5015
 5020
 5025
 5030
 5035
 5040
 5045
 5050
 5055
 5060
 5065
 5070
 5075
 5080
 5085
 5090
 5095
 5100
 5105
 5110
 5115
 5120
 5125
 5130
 5135
 5140
 5145
 5150
 5155
 5160
 5165
 5170
 5175
 5180
 5185
 5190
 5195
 5200
 5205
 5210
 5215
 5220
 5225
 5230
 5235
 5240
 5245
 5250
 5255
 5260
 5265
 5270
 5275
 5280
 5285
 5290
 5295
 5300
 5305
 5310
 5315
 5320
 5325
 5330
 5335
 5340
 5345
 5350
 5355
 5360
 5365
 5370
 5375
 5380
 5385
 5390
 5395
 5400
 5405
 5410
 5415
 5420
 5425
 5430
 5435
 5440
 5445
 5450
 5455
 5460
 5465
 5470
 5475
 5480
 5485
 5490
 5495
 5500
 5505
 5510
 5515
 5520
 5525
 5530
 5535
 5540
 5545
 5550
 5555
 5560
 5565
 5570
 5575
 5580
 5585
 5590
 5595
 5600
 5605
 5610
 5615
 5620
 5625
 5630
 5635
 5640
 5645
 5650
 5655
 5660
 5665
 5670
 5675
 5680
 5685
 5690
 5695
 5700
 5705
 5710
 5715
 5720
 5725
 5730
 5735
 5740
 5745
 5750
 5755
 5760
 5765
 5770
 5775
 5780
 5785
 5790
 5795
 5800
 5805
 5810
 5815
 5820
 5825
 5830
 5835
 5840
 5845
 5850
 5855
 5860
 5865
 5870
 5875
 5880
 5885
 5890
 5895
 5900
 5905
 5910
 5915
 5920
 5925
 5930
 5935
 5940
 5945
 5950
 5955
 5960
 5965
 5970
 5975
 5980
 5985
 5990
 5995
 6000
 6005
 6010
 6015
 6020
 6025
 6030
 6035
 6040
 6045
 6050
 6055
 6060
 6065
 6070
 6075
 6080
 6085
 6090
 6095
 6100
 6105
 6110
 6115
 6120
 6125
 6130
 6135
 6140
 6145
 6150
 6155
 6160
 6165
 6170
 6175
 6180
 6185
 6190
 6195
 6200
 6205
 6210
 6215
 6220
 6225
 6230
 6235
 6240
 6245
 6250
 6255
 6260
 6265
 6270
 6275
 6280
 6285
 6290
 6295
 6300
 6305
 6310
 6315
 6320
 6325
 6330
 6335
 6340
 6345
 6350
 6355
 6360
 6365
 6370
 6375
 6380
 6385
 6390
 6395
 6400
 6405
 6410
 6415
 6420
 6425
 6430
 6435
 6440
 6445
 6450
 6455
 6460
 6465
 6470
 6475
 6480
 6485
 6490
 6495
 6500
 6505
 6510
 6515
 6520
 6525
 6530
 6535
 6540
 6545
 6550
 6555
 6560
 6565
 6570
 6575
 6580
 6585
 6590
 6595
 6600
 6605
 6610
 6615
 6620
 6625
 6630
 6635
 6640
 6645
 6650
 6655
 6660
 6665
 6670
 6675
 6680
 6685
 6690
 6695
 6700
 6705
 6710
 6715
 6720
 6725
 6730
 6735
 6740
 6745
 6750
 6755
 6760
 6765
 6770
 6775
 6780
 6785
 6790
 6795
 6800
 6805
 6810
 6815
 6820
 6825
 6830
 6835
 6840
 6845
 6850
 6855
 6860
 6865
 6870
 6875
 6880
 6885
 6890

verit, post febrem experiri balneum et vinum; magisque si, horrore sublato, haec superest.

CAPUT XIV.

Curatio tertianae febris.

5 Si vero tertiana, quae ex toto intermittit, aut quartana est, mediis diebus et ambulationibus uti oportet, aliisque exercitationibus, et unctionibus. Quidam ex antiquis medicis Cleophantus, in hoc genere morborum, multo ante accessio-
nem, per caput aegrum multa calida aqua perfundebat, dein-
10 de vinum dabat. Quod, quamvis pleraque ejus viri praecepta sequutus est Asclepiades, recte tamen praeteriit: est enim anceps. Ipse, si tertiana febris est, tertio die post acces-
sionem dicit alvum duci oportere; quinto, post horrorem vo-
mitum elicere; deinde post febrem, sicut illi mos erat, adhuc
15 calidis dare cibum et vinum; sexto die in lectulo detineri: sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id saepe fieri posse verisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ordine utamur; tria remedia: vomitus, alvi ductionis, vini, per triduum, id
est tertio die et quinto, et septimo tentare: nec vinum, nisi
20 post accessionem diei septimi, bibat. Si vero primis diebus discussus morbus non est, inciditque in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat; post febrem perfricetur; tum, cibo assumpto, bibat aquam; postero die, ab exercitatione unctioneque, aqua tantum contentus, con-
25 quiescat. Et id quidem optimum est. Si vero imbecillitas urgebit, et post febrem vinum, et medio die paulum cibi debebit assumere.

CAPUT XV.

Curatio quartanae febris.

30 Eadem in quartana facienda sunt. Sed quum haec tarde admodum finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio praecipendum est, quid in ea fieri debeat. Igitur

si cui cum horrore febris accessit, eaque desiit, eodem die et postero tertioque continere se debet, et aquam tantummodo calidam primo die post febrem sumere; biduo proximo, quantum fieri potest, ne hanc quidem; si quarto die cum horrore febris revertitur, vomere, sicut ante praeceptum est; deinde post febrem modicum cibum sumere, vini quadrantem; postero tertioque die abstinere, aqua tantummodo calida, si sitis est, assumpta; septimo die balneo frigus praevenire; si febris redierit, ducere alvum; ubi ex eo corpus conquieverit, in unctione vehementer perfricari; eodem modo sumere cibum¹⁰ et vinum; biduo proximo se abstinere, frictione servata; decimo die rursus balneum experiri; et, si postea febris accessit, aequè perfricari, vinum copiosius bibere. Ac sic proximum est, ut quies tot dierum, et abstinencia cum ceteris, quae praecipiantur, febrem tollant. Si vero nihilominus¹⁵ remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus; idque agendum, ut, quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendam alvum, deinde abstinendum in septimum diem dixit. Quod, ut sustinere aliquis²⁰ possit, tamen, etiam febre liberatus, vix refectioni valebit: adeo, si febris saepius accesserit, concidet. Igitur si tertio decimo die morbus manebit, balneum neque ante febrem, neque post eam tentandum erit; nisi interdum jam horrore discusso: horror ipse per ea, quae supra scripta sunt (III, 12),²⁵ expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi, et vehementer perfricari; cibum et validum, et fortiter assumere; vino uti quanto libebit: postero die, quum satis quieverit, ambulare, exerceri, ungi, perfricari, cibum capere sine vino: tertio die abstinere. Quo die vero febrem expectabit,³⁰ ante surgere, et exerceri, dareque operam, ut in ipsam exercitationem febris tempus incurrat: sic enim saepe illa discutitur. At si in opere occupavit, tum demum se recipere. In ejusmodi valetudine medicamenta sunt oleum, frictio, exercitatio, cibum, vinum. Si venter adstrictus est, solvendus est. Sed haec facile validiores faciunt: si imbecillitas occupavit, pro exercitatione gestatio est: si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est: si haec quoque vehe-

mens onerat, intra quietem et unctionem et cibum sistendum est: dandaque opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem jugulat: sed si ex ea facta quotidiana est, in malis aeger est: quod tamen, nisi
5 culpa vel aegri vel curantis, numquam fit.

CAPUT XVI.

Curatio duarum quartanarum.

At si duae quartanae sunt, neque eae, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt; aut ex toto quiescere opus
10 est, aut, si id difficile est, leniter ambulare; considerare diligenter involutis pedibus et capite; quoties febris accessit et desiit, cibum modicum sumere, et vinum; reliquo tempore, nisi imbecillitas urget, abstinere; at si duae febres paene
junguntur, post utramque cibum sumere: deinde vacuo tem-
15 pore, et moveri aliquid, et post unctionem cibo uti. Quum vero vetus quartana raro, nisi vere, solvatur; utique eo tempore attendendum est, ne quid fiat, quod valetudinem impedi-
diat. Prodestque in vetere quartana mutare subinde victus
genus; a vino ad aquam, ab aqua ad vinum, a lenibus cibis
20 ad acres, ab acribus ad lenes transire; esse radicem (cf. I, 3; II, 18), deinde vomere; jureve pulli gallinaei ventrem
resolvere; oleo ad frictiones adjicere calefacientia; ante ac-
cessionem sorbere vel aceti cyathos duos, vel unum sinapis
cum tribus graeci vini salsi (cf. III, 6), vel mixta paribus
25 portionibus, et in aqua diluta, piper, castoreum, laser, myr-
rham. Per haec enim similiaque corpus agitandum est, ut
moveatur ex eo statu, quo detinetur. Si febris quievit, diu
meminisse ejus diei convenit; eoque vitare frigus, calorem,
cruditatem, lassitudinem. Facile enim revertitur, nisi a sano
30 quoque aliquamdiu timetur.

CAPUT XVII.

Curatio quotidianae febris, quae ex quartana facta sit.

At si ex quartana quotidiana facta est, quum id vitio i-
ciderit, per biduum abstinere oportet, et frictione uti; aqua

CELSUS I.

tantummodo vespere potui dare. Tercio die saepe fit, ne febris accedat: sed sive fuit, sive non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus; ac si manet, per triduum abstinentia, quanta maxima imperari potest (cf. III, 21), et frictione quotidie utendum est. 5

CAPUT XVIII.

De tribus insaniae generibus.

Et febrium quidem curatio exposita est. Supersunt vero alii corporis affectus, qui huic superveniunt; ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt (cf. IV, 1, *init.*), 10 protinus jungam. Incipiam ab insania, primamque hujus ipsius partem aggrediar, quae et acuta, et in febre est: *φρενίτις* Graeci appellant (cf. Hipp.). Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione aegros desipere, et loqui aliena. Quod non quidem leve est; neque incidere potest, 15 nisi in febre vehementi: non tamen aequè pestiferum est: nam plerumque breve esse consuevit, levatoque accessionis impetu, protinus mens redit. Neque id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in curanda febre praeceptum est. Phrenesis vero tum demum est, quum continua demen- 20 tia esse incipit; aut quum aeger, quamvis adhuc sapiat, tamen quasdam vanas imagines accipit: perfecta est, ubi mens illis imaginibus addicta est. Ejus autem plura genera sunt: siquidem ex phreneticis alii hilares, alii tristes sunt; alii facilius continentur, et intra verba desipiunt, alii consurgunt, 25 et violenter quaedam manu faciunt; atque ex his ipsis alii nihil nisi impetu peccant, alii etiam artes adhibent, summamque speciem sanitatis in captandis malorum operum occasionibus praebent; sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos, qui intra verba desipiunt, aut leviter etiam manu pec- 30 cant, onerare asperioribus coercionibus supervacuum est: eos vero qui violentius se gerunt, vincire convenit (cf. I. *Digest. de off. praes. tit. 14*); ne vel sibi vel alteri noceant. Neque credendum est, si vinctus aliquis, dum levare vinculis cupit, quamvis prudenter et miserabiliter loquitur; quoniam 35

is dolus insanientis est. Fere vero antiqui tales aegros in tenebris habebant; eo quod illis contrarium esset extereri, et ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades, tamquam tenebris ipsis terren-
 5 tibus, in lumine habendos eos dixit. Neutrum autem perpetuum est: alium enim lux, alium tenebrae magis turbant; reperiunturque, in quibus nullum discrimen deprehendi vel hoc, vel illo modo possit. Optimum itaque est utrumque experiri; et habere eum, qui tenebras horret, in
 10 luce; eum, qui lucem, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, aeger, si vires habet, loco lucido; si non habet, obscuro continendus est. Remedia vero adhibere, ubi maxime furor urget, supervacuum est: simul enim febris quoque increscit. Itaque tum nihil nisi continendus aeger est: ubi
 15 vero res patitur, festinanter subveniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinem mitti, ac si trucidentur: rationem hanc sequutus, quod neque insania esset, nisi febre intenta; neque sanguis, nisi in remissione ejus, recte mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quaesivit;
 20 quum et intentio febris somnum impediat, et frictio non nisi in remissione ejus utilis sit. Itaque hoc quoque auxilium debuit praeterire. Quid igitur est? Multa in praecipiti periculo recte fiunt, alias omittenda. Et continuata quoque febris habet tempora, quibus, etsi non remittit, non tamen crescit:
 25 estque hoc, ut non optimum, sic tamen secundum remediis tempus. Quod si vires aegri patiuntur, sanguis quoque mitti debet. Minus deliberari potest, an alvus ducenda sit. Tum, interposito die, convenit caput ad cutem tondere (cf. I, 4); deinde aqua fovere, in qua verbenae aliquae decoctae sint ex
 30 reprimentibus; aut prius fovere, deinde tondere, et iterum fovere; ac novissime rosa caput naresque implere; offerre etiam naribus rutam ex aceto contritam; movere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quae tamen facienda sunt in iis, quibus vires non desunt. Si vero imbecillitas est, rosa
 35 tantum caput, adjecto serpyllo, similive aliquo, madefaciendum est. Utiles etiam in quibuscumque viribus herbae duae sunt, solanum et muralis, si simul ex utraque succo expresso caput impletur. Quum febris remisit, frictione utendum est;

parcius tamen in iis, qui nimis hilares, quam in iis, qui nimis tristes sunt. Adversus omnium autem sic insanientium animos gerere se pro cuiusque natura necessarium est. Quorundam enim vani metus levandi sunt; sicut in homine praedivite famem timente incidit, cui subinde falsae hereditates nuntiabantur: quorundam audacia coercenda est; sicut in iis fit, in quibus continendis plagae quoque adhibentur: quorundam etiam intempestivus risus et objurgatione et minis finiendus: quorundam discutiendae tristes cogitationes; ad quod symphoniae, et cymbala, strepitusque proficiunt. Saepius tamen assentiendum, quam repugnandum est; paulatimque, et non evidenter, ab iis, quae stulte dicentur, ad meliora mens adducenda. Interdum etiam elicienda ipsius intentio; ut fit in hominibus studiosis litterarum, quibus liber legitur, aut recte, si delectantur, aut perperam, si id ipsum eos offendit: emendando enim convertere animum incipiunt. Quin etiam recitare, si qua meminerunt, cogendi sunt. Ad cibum quoque quosdam non desiderantes reduxerunt ii, qui inter epulantes eos collocarunt. Omnibus vero sic affectis somnus et difficilis, et praecipue necessarius est: sub hoc enim plerique sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad mentem ipsam componendam, crocinum unguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilant, quidam somnum moliantur potui dando aquam, in qua papaver, aut hyoscyamum decoctum sit: alii mandragorae mala pulvino subjiciunt: alii vel amomum, vel sycamini lacrimam fronti inducunt. Asclepiades ea supervacua esse dixit; quoniam in lethargum saepe converterent. Praecepit autem, ut primo die a cibo, potione, somno abstineretur; vespere ei daretur potui aqua; tum frictio admoveretur lenis, ut ne manum quidem, qui perfricaret, vehementer imprimeret; postero deinde die, iisdem omnibus factis, vespere ei daretur sorbitio et aqua, rursusque frictio adhiberetur: per hanc enim nos consequuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, et quidem adeo, ut, illo conistente, nimia frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis arcessendus est: habita scilicet eadem moderatione, quae hic quoque necessaria est, ne quem obdormire volumus, excitare postea

non possimus. Confert etiam aliquid ad somnum silanus (cf. Coel. Aurel. *Morb. chr.* I, 5) juxta cadens; vel gestatio post cibum et noctu; maximeque suspensi lecti motus. Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est, neque mens
 5 constat, neque somnus accedit, occipitio inciso cucurbitulam admove; quae, quia levat morbum, potest etiam somnum facere. Moderatio autem in cibo quoque adhibenda est: nam neque implendus aeger est, ne insaniat; neque jejuno utique vexandus, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est
 10 cibo infirmo, maximeque sorbitione, potione aquae mulsaе, cujus ternos cyathos bis hieme, quater aestate dedisse satis est.

Alterum insaniae genus est, quod spatium longius recipit; quia fere sine febre incipit, leves deinde febriculas excitat. Consistit in tristitia, quam videtur bilis atra contrahere.
 15 In hac utilis detractio sanguinis est: si quid hanc prohibet, prima est abstinencia; secunda per album veratrum vomitumque purgatio. Post utrumlibet adhibenda bis die frictio est; si magis valet, frequens etiam exercitatio; in jejuno vomitus: cibus, sine vino, dandus ex media materia est. Quam quoties
 20 posuero (cf. III, 21), scire licebit etiam ex infirmissima dari posse; dum ne ea sola quis utatur: valentissima tantummodo esse removenda. Praeter haec servanda alvus est quam tenerrima; removendi terrores, et potius bona spes afferenda; quaerenda delectatio ex fabulis, ludisque, quibus maxime capi
 25 sanus assueverat; laudanda, si qua sunt, ipsius opera, et ante oculos ejus ponenda; leviter objurganda vana tristitia; subinde admonendus, in iis ipsis rebus, quae sollicitant, cur potius laetitiae, quam sollicitudinis causa sit. Si febris quoque accessit, sicut aliae febres, curanda est.

30 Tertium genus insaniae est, ex his longissimum; adeo ut vitam ipsam non impediat: quod robusti corporis esse consuevit. Hujus autem ipsius species duae sunt. Nam quidam imaginibus, non mente falluntur, quales insanientem Ajacem vel Orestem percepisse poetae ferunt; quidam animo desi-
 35 piunt. Si imagines fallunt, ante omnia videndum est, tristes, an hilares sint. In tristitia nigrum veratrum dejectionis causa; in hilaritate, album, ad vomitum excitandum dari debet: idque, si in potione non accipit, pani adjiciendum est, qu

facilius fallat. Nam si bene se purgaverit, ex magna parte morbum levabit. Ergo etiam si semel datum veratrum parum profecerit, interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet, leviozem esse morbum cum risu, quam serio insanientium. Illud quoque perpetuum est in omnibus morbis; 5 ubi ab inferiore parte purgandus aliquis est, ventrem ejus ante solvendum esse; ubi a superiore, comprimendum (*Aph.* VII, 70). Si vero consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optime curatur. Ubi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, vinculis, plagis coercendus est. Cogendus est 10 et attendere, et ediscere aliquid, et meminisse: sic enim fiet, ut paulatim metu cogatur considerare, quid faciat. Subito etiam terreri, et expavescere, in hoc morbo prodest; et fere quidquid animum vehementer perturbat. Potest enim quaedam fieri mutatio, quum ab eo statu mens, in quo fuerat, ab- 15 ducta est. Interest etiam, is ipse sine causa subinde rideat, an moestus demissusque sit: nam demens hilaritas terroribus iis, de quibus supra dixi, melius curatur: si nimia tristitia est, prodest lenis, sed multa bis die frictio; item per caput aqua frigida infusa, demissumque corpus in aquam et oleum. 20 Illa communia sunt: insanientes vehementer exerceri debere; multa frictione uti; neque pinguem carnem, neque vinum assumere; cibis uti post purgationem, ex media materia, quam levissimis; non oportere esse vel solos, vel inter ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut negligant; mutare 25 debere regiones, et, si mens redit, annua peregrinatione esse jactandos.

Raro, sed aliquando tamen, ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium specie simili, similique victus genere curandum est: praeterquam quod in hoc insaniae genere 30 solo recte vinum datur.

CAPUT XIX.

De cardiacis.

His morbis praecipue contrarium est id genus, quod *καρδιακόν* a Graecis nominatur; quamvis saepe ad eum 35

phrenetici transeunt: siquidem mens in illis labat, in hoc constat. Id autem nihil aliud est, quam nimia imbecillitas corporis, quod stomacho languente, immodico sudore digeritur. Licetque protinus scire id esse, ubi venarum exigui imbecillique pulsus sunt; sudor autem supra consuetudinem, et modo, et tempore, ex toto thorace et cervicibus, atque etiam capite prorumpit, pedibus tantummodo et cruribus siccioribus atque frigentibus. Acutique id morbi genus est. Curatio prima est, supra praecordia imponere, quae reprimant, cataplasmata: 10 secunda, sudorem prohibere. Id praestat acerbum oleum, vel rosa, vel melinum, aut myrteum: quorum aliquo corpus leniter perungendum, ceratumque ex aliquo horum tum imponendum est. Si sudor vincit, delinendus homo est vel gypso, vel argenti spuma, vel cimolia creta, vel etiam subinde horum pulvere respargendus. Idem praestat pulvis ex 15 contritis aridis myrti vel rubi foliis, aut ex austeri et boni vini arida faece: pluraque similia sunt, quae si desunt, satis utilis est quilibet ex via pulvis injectus. Super haec vero, quo minus corpus insudet, levi veste debet esse contactus, 20 loco non calido, fenestris patentibus sic, ut perflatus quoque aliquis accedat. Tertium auxilium est, imbecillitati jacentis cibo vinoque succurrere. Cibus non multus quidem, sed saepe tamen nocte ac die dandus est, ut nutriat, neque oneret. Is esse debet ex infirmissima materia, et stomacho aptus. Nisi 25 si necesse est, ad vinum festinare non oportet: si verendum est, ne deficiat, tum et intrita ex hoc, et hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue, meraculum, egelidum subinde et liberaliter dandum est; adjecta polenta, si modo is aeger parum cibi assumit: idque vinum esse debet, neque nullarum 30 virium, neque ingentium; recteque tota die ac nocte, vel tres heminas aeger bibit; si vastius corpus est, plus etiam. Si cibum non accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida convenit, et tum dare. Quod si stomachus resolutus parum continet, et ante cibum, et post eum sponte vomere oportet; 35 rursusque post vomitum cibum sumere; si ne id quidem manserit, sorbere vini cyathum, interpositaque hora, sumere alterum. Si id quoque stomachus reddiderit, totum corpus bulbis contritis superillinendum est; qui, ubi inaruerunt, effa-

ciunt, ut vinum in stomacho contineatur, exque eo toti corpori calor, venisque vis redeat. Ultimum auxilium est, in alvum ptisanæ vel alicæ cremorem ex inferioribus partibus indere: siquidem id quoque vires tuetur. Neque alienum est, naribus quoque aestuantis admovere, quod reficiat; id est rosam et vinum: et si qua in extremis partibus frigent, unctis et calidis manibus fovere. Per quæ si consequi potuimus, ut et sudoris impetus minuatur, et vita prorogetur, incipit jam tempus ipsum esse praesidio. Ubi esse in tuto videtur, verendum tamen est, ne in eandem imbecillitatem cito recidat: itaque, vino tantummodo remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere, donec satis virium corpori redeat.

CAPUT XX.

De Lethargiis.

Alter quoque morbus est, aliter phrenetico contrarius. In eo difficilius somnus, prompta ad omnem audaciam mens est: in hoc marcor, et inexpugnabilis paene dormiendi necessitas. *Ἀνδραγον* Graeci nominarunt. Atque id quoque genus acutum est, et nisi succurritur, celeriter jugulat. Hos aegros quidam subinde excitare nituntur, admotis iis, per quæ ster-
nutamenta evocantur, et iis quæ odore foedo movent; qualis est pix cruda, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cepa. Juxta etiam galbanum incendunt, aut pilos, aut cornu cervinum; si id non est, quodlibet aliud. Tharrias vero quidam, accessionis id malum esse dixit, levat-
rique quum ea decessit: itaque eos, qui subinde excitant, sine usu male habere. Interest autem, in decessione expergiscatur aeger, an quum febris non levetur, aut levata quoque ea somnus urgeat. Nam si expergiscitur, adhibere ei, ut sopito, supervacuum est: neque enim vigilando melior fit; sed per se, si melior est, vigilat. Si vero continens ei somnus est, utique excitandus est; sed iis temporibus, quibus febris levissima est, ut et excernat aliquid, et sumat. Excitat autem validissime repente aqua frigida infusa. Post remissionem itaque, perunctum oleo multo corpus, tribus aut qua-
35

tuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc
 ntemur, si aequalis aegro spiritus erit, si mollia praecordia:
 sin aliter haec erunt, ea potiora, quae supra comprehensa
 sunt. Et, quod ad somnum quidem pertinet, commodissima
 5 haec ratio est. Medendi autem causa, caput radendum;
 deinde posca fovendum est, in qua laurus, aut ruta decocta
 sit *): altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto
 contrita, aut lauri baccae, aut hedera cum rosa et aceto.
 Praecipueque proficit, et ad excitandum hominem, naribus
 10 admotum, et ad morbum ipsum depellendum, capiti frontie
 impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest; ma-
 ximeque opportune cibus datus, id est in remissione, quanta
 maxima inveniri poterit. Aptissima autem sorbitio est, donec
 morbus decrescere incipiat: sic, ut si quotidie gravis accessio
 15 est, haec quotidie detur; si alternis, post graviores sorbitio,
 post leviores mulsa aqua. Vinum quoque cum tempestivo
 cibo datum non mediocriter adjuvat. Quod si post longas
 febres ejusmodi torpor accessit, cetera eadem servanda sunt:
 ante accessionem autem, tribus quatuorve horis, castoreum,
 20 si venter adstrictus est, mixtum cum scammonia; si non est,
 per se ipsum cum aqua dandum est. Si praecordia mollia
 sunt, cibus utendum est plenioribus; si dura, in iisdem sor-
 bitionibus subsistendum; imponendumque praecordiis, quod
 simul et reprimat, et emolliat.

25

CAPUT XXI.

De hydropicis.

Sed hic quidem acutus est morbus. Longus vero fieri
 potest eorum, quos aqua inter cutem male habet; nisi primis
 diebus discussus est: ὑδρωπία Graeci vocant. Atque ejus
 30 tres species sunt. Nam modo, ventre vehementer intento,
 creber intus ex motu spiritus sonus est: modo corpus inae-

*) Caelius Aurelianus lib. II. *Morb. Acut.* cap. 9 ita scri^l
Heractides caput posca fovet, in qua laurus fuerit decocta, et ra-
rasis quoque capillis ungit castoreo etc.

quale est, tumoribus aliter aliterque per totum id orientibus: modo intus in uterum aqua contrahitur, et moto corpore ita movetur, ut impetus ejus conspici possit. Primum *τυμπανίτην*, secundum *λευκοφλεγματίαν*, vel *ὑποσάγμα*, tertium *ἀσκίτην* Graeci nominarunt. Communis tamen omnium est humoris nimia abundantia; ob quam ne ulcera quidem in his aegris facile sanescunt (*Aph.* VI, 8). Saepe vero hoc malum per se incipit; saepe alteri vetusto morbo, maximeque quartanae, supervenit. Facilius in servis, quam in liberis tollitur: quia, quum desideret famem, sitim, mille alia taedia, longamque patientiam, promptius iis succurritur, qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est. Sed ne ii quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus, Chryssippi discipulus, apud Antigonum regem, amicum quemdam ejus, notae intemperantiae, mediocriter eo morbo implicatum, negavit posse sanari. Quumque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur; respondit, illum ad morbum aegri respicere; se, ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim quum summa diligentia non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua devorando, bibendoque suam urinam, in exitium se praecipitavit. Inter initia tamen non difficilis curatio est, si imperata sunt (cf. III, 17) quies, sitis, inedia; at si malum inveteravit, nonnisi magna mole discutitur. Metrodorum tamen, Epicuri discipulum, ferunt, quum hoc morbo tentaretur, nec aequo animo necessariam sitim sustineret, ubi diu abstinuerat, bibere solitum, deinde evomere. Quod si redditur quidquid receptum est, multum taedio demit; si a stomacho retentum est, morbum augeat: ideoque in quolibet tentandum non est. Sed si febris quoque est, haec in primis submovenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est: si sine febre aeger est, tum demum ad ea veniendum est, quae ipsi morbo mederi solent. Atque hic quoque quaecumque species est, si nondum nimis occupavit, iisdem auxiliis opus est: multum ambulandum, currendum aliquid est; superiores maxime partes sic perfricandae, ut spiritum ipse contineat; evocandus est sudor, non per exercitationem tantum, sed

etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusque aliis; maximeque utiles naturales et siccae sudationes sunt (cf. II, 17). Balneum, atque omnis humor alienus est. Jejunio recte catapotia dantur, facta ex absinthii duabus, myrrhae tertia parte. Cibus esse debet ex media quidem materia, sed tamen generis durioris: potio non ultra danda est; quam ut vitam sustineat; optimaque est, quae urinam movet. Sed id ipsum tamen moliri cibo, quam medicamento melius est. Si tamen res coget, ex iisdem aliquid, quae id praestant, 10 erit decoquendum, eaque aqua potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere iris, nardum, crocum, cinnamum, amomum, casia, myrrha, balsamum, galbanum, ladanum, oenanthe, panaces, cardamomum, hebenus, cupressi semen, uva taminia, quam *σταφίδα ἀγρίαν* Graeci nominant, abrotonum, rosae 15 folia, acorum, amarae nuces, tragoriganum, styrax, costum, junci quadrati et rotundi semen; illum *κύπειρον*, hunc *σχότον* Graeci vocant: quae quoties posuero (cf. III, 18), non quae hic nascuntur, sed quae inter aromata afferuntur, significabo. Primo tamen, quae levissima ex his sunt, id est 20 rosae folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum quoque utile est austerum, sed quam tenuissimum. Commodum est etiam, lino quotidie ventrem metiri, et, qua comprehendit alvum, notam imponere; posteroque die videre, plenius corpus sit, an extenuetur: id enim, quod extenuatur, medicinam 25 sentit. Neque alienum est metiri et potionem ejus, et urinam: nam si plus humoris excernitur, quam assumitur, ita demum secundae valetudinis spes est. Asclepiades in eo, qui ex quartana in hydropa deciderat, se abstinencia bidui, et frictione usum; tertio die, jam et febre et aqua liberato, cibum 30 et vinum dedisse, memoriae prodidit.

Hactenus communiter de omni specie praecipi potest: si vehementius malum est, diducenda ratio curandi est. Ergo si inflatio, et ex ea dolor creber est, utilis quotidianus, aut 35 altero quoque die post cibum, vomitus est: fomentis siccis calidisque utendum est. Si per haec dolor non finitur, necessariae sunt sine ferro cucurbitulae; si ne per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, et tum his utendum. Ultimum auxilium est, si cucurbitulae nihil profuerunt, per

alvum infundere copiosam aquam calidam, eamque recipere. Quin etiam quotidie ter quaterve opus est uti frictione vehementi cum oleo et quibusdam calefacientibus: sed in hac frictione a ventre abstinendum est. Imponendum vero in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat; ferramentisque candentibus pluribus locis venter exulcerandus est, et servanda ulcera diutius. Utiliter etiam scilla cocta delingitur. Sed diu post has inflationes abstinendum est ab omnibus inflantibus.

At si id vitium est, cui *λευκοπλεγματτα* nomen est, eas partes, quae tument, subicere soli oportet; sed non nimium, 10 ne febriculam accendat: si is vehementior est, caput velandum est: utendumque frictione, madefactis tantum manibus aqua, cui sal et nitrum et olei paulum sit adjectum; sic, ut aut pueriles aut muliebres manus adhibeantur, quo mollior earum tactus sit: idque, si vires patiuntur, ante meridiem 15 tota hora, post meridiem semihora fieri oportet. Utilia etiam sunt cataplasmata, quae reprimunt; maximeque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum, quatuor fere digitis, ex parte interiore, qua per aliquot dies frequens humor feratur; atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet *) : concutiendumque multa gestatione corpus est: atque, ubi inductae vulneribus cicatrices sunt, adjiciendum et exercitationibus est, et cibus, donec corpus ad pristinum habitum revertatur. Cibus valens esse debet, et glutinosus, maximeque caro: vinum, si per stomachum licet, dulcius; sed ita, 25 ut invicem biduo triduoque, modo aqua, modo id bibatur. Prodest etiam lactucae marinae (cf. II, 12, 1) semen cum aqua potui datum. Si valens est, qui id accipit, et scilla cocta, sicut supra dixi, delingitur. Auctoresque multi sunt, inflatis vesicis pulsandos tumores esse (cf. Aët. X, 9).

Si vero id morbi genus est, quo in uterum multa aqua contrahitur, ambulare, sed magis modice oportet; malagma, quod digerat, impositum habere; idque ipsum superimposito

*) Caelius Aurelianus lib. III. *Morb. Chron.* cap. 8: *Laudat etiam Asclepiades punctiorem, quatuor digitis a talo distantem faciendam superius ab interiore parte, sicut in phlebotomia ut per eandem punctiorem humore effuso, corpora extenuentur.*

triplici panno, fascia, non nimium tamen vehementer adstringere: quod a Tharria profectum, servatum esse a pluribus video. Si jecur, aut lienem affectum esse manifestum est, sicut pinguem contusam, adjecto melle, superponere.

5 Si per talia auxilia venter non siccatur, sed humor nihilo minus abundat, celeriori via succurrere, ut is per ventrem ipsum emittatur. Neque ignoro Erasistrato displicuisse hanc curandi viam: morbum enim hunc jecinoris putavit: ita illud esse sanandum; frustra que aquam emitti, quae, vitiatum illo,

10 subinde nascatur. Sed primum non hujus visceris unius hoc vitium est: nam et liene affecto, et in totius corporis malo habitu fit. Deinde, ut inde coeperit, tamen aqua nisi emittitur, quae contra naturam ibi substitit, et jecinori et ceteris interioribus partibus nocet. Convenitque corpus nihilo minus

15 esse curandum. Neque enim sanat emissus humor, sed medicinae locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac ne illud quidem in controversiam venit, quin non omnes in hoc morbo sic curari possint; sed juvenes robusti, qui vel ex toto carent febre, vel certe satis liberales intermissiones habent.

20 Nam quorum stomachus corruptus est, quive ex atra bile huc deciderunt, quive malum corporis habitum habent, idonei huic curationi non sunt. Cibus autem, quo die primum humor emissus est, supervacuus est, nisi si vires desunt: insequentibus diebus, et is, et vinum meracius quidem, sed

25 non ita multum dari debet, paulatimque evocandus aeger est ad exercitationes, frictiones, solem, sudationes, navigationes (cf. I, 2; Cael. Aurel., *Morb. chron.* III, 8), et idoneos cibos, donec ex toto convalescat. Balneum rarum res amat; frequentiore in jejuno vomitum. Si aestas est, in mari natare commodum est. Ubi convaluit aliquis, diu tamen alienus ei veneris usus est.

30

CAPUT XXII.

De tabe, ejusque speciebus.

Diutius saepe et periculosius tabes eos male habet, quo
 30 invasit. Atque hujus quoque plures species sunt. Una est

qua corpus non alitur, et naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis vero in eorum locum subeuntibus, summa macies oritur; et, nisi occurritur, tollit. *Ἀργοσίαν* hanc Graeci vocant. Ea duabus fere de causis incidere consuevit. Aut enim nimio timore aliquis minus, aut aviditate nimia plus, quam debet, assumit: ita vel, quod deest, infirmat; vel, quod superat, corrumpitur. Altera species est, quam Graeci *καχέξιν* appellant, ubi malus corporis habitus est; ideoque omnia alimenta corrumpuntur. Quod fere fit, quum longo morbo vitata corpora, etiamsi illo vacant, refectionem tamen non accipiunt; aut quum malis medicamentis corpus affectum est; aut quum diu necessaria defuerunt; aut quum inusitados et inutiles cibos aliquis assumsit, aliquidve simile incidit. Huic, praeter tabem, illud quoque nonnumquam accedere solet, ut per assiduas pustulas, aut ulcera, summa cutis exasperetur, vel aliquae corporis partes intumescant. Tertia est, longaque periculosissima species, quam Graeci *φθίσιν* nominarunt. Oritur fere a capite; inde in pulmonem destillat; huic exulceratio accedit; ex hac febricula levis fit, quae etiam quum quievit, tamen repetit; frequens tussis est; pus excreatur; interdum cruentum aliquid. Quidquid exscreatum est, si in ignem impositum est, mali odoris est: itaque, qui de morbo dubitant, hac nota utuntur (*Aph. V, 11; Coac. 426*).

Quum haec genera tabis sint, animadvertere primum oportet, quid sit in quo laboretur; deinde, si tantum non ali corpus apparet, causam ejus attendere; et si cibi minus aliquis, quam debet, assumsit, adjicere, sed paulatim; ne si corpus insuetum subita multitudine oneraverit, concoctionem impediat. Si vero plus justo quis assumere solitus est, abstinerere uno die; deinde ab exiguo cibo incipere; quotidie adjicere, donec ad justum modum perveniat. Praeter haec convenit ambulare locis quam minime frigidis, sole vitato; per manus quoque exerceri: si infirmior est, gestari, ungi, perfricari, si potest, maxime per se ipsum, saepius eodem die et ante cibum, et post eum, sic ut interdum oleo quaedam adjiciantur calefacientia, donec insudet. Prodestque jejuno apprehendere per multas partes cutem et attrahere, ut relaxe-

tur; aut, imposita resina et abducta, subinde idem facere. Utile est etiam interdum balneum, sed post cibum exiguum. Atque in ipso solio recte cibi aliquid assumitur; aut, si sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi vero esse debent ex
 5 iis, qui facile concoquuntur, qui maxime alunt. Ergo vini quoque, sed austeri, necessarius usus est. Movenda urina.

At si malus corporis habitus est, primum abstinendum est; deinde alvus ducenda; tum paulatim cibi dandi, adjectis exercitationibus, unctionibus, frictionibus. Utilius his fre-
 10 quens balneum est, sed jejunis; etiam usque sudorem. Cibis vero opus est copiosis, variis, boni succi, quique etiam minus facile corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est; sed paulatim, quotidieque pluribus diebus, cum eo, ut cetera quoque eodem modo ser-
 15 ventur.

Quod si mali plus est, et vera phthisis est, inter initia protinus occurrere necessarium est: neque enim facile is morbus, quum inveteravit, evincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, coeli mutatione, sic ut densius
 20 quam id est, ex quo discedit aeger, petatur: ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur¹⁾). Fereque id posse inter principia corpus pati debet, quum hic morbus aetate firmissima maxime oriatur, id est ab anno duodevicesimo ad annum quintum et tricesimum (cf. *Aph.* V, 9; *Coac.* 431).
 25 Si id imbecillitas non sinit, nave tamen non longe gestari commodissimum est: si navigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus dimovendum est. Tum a negotiis abstinendum est, omnibusque rebus, quae sollicitare animum possunt; somno indulgendum; cavendae destillationes,
 30 ne, si quid cura levarit, exasperent; et ob id vitanda cru-

1) Plinius lib. XXVIII. cap. 3. sect. 14: *Phthisi navigatio utilissima; longis morbis locorum mutatio*; et lib. XXXI. cap. 6. sect. 33: *Neque enim Aegyptus propter se petitur, sed propter longinquitatem navigandi*. At lib. XXIV. cap. 6. sect. 19 ita scribit: *Silvas eas dumtaxat, quae picis resinaeque gratia radantur, phthisicis, aut qui longae valetudine non recolligant vires; et illum coeli aera, plus, quam navigationem Aegyptiam, proficere, quam lactis herbidos per menses aestiva succos*.

ditas, simulque et sol, et frigus; os obtegendum, fauces velandae, tussicula suis remediis finienda: et, quamdiu quidem febricula incursat, huic interdum abstinencia, interdum etiam tempestivis cibis medendum; eoque tempore bibenda aqua. Lac quoque, quod in capitis doloribus, et in acutis febribus, et per eas facta nimia siti, ac, sive praecordia tument, sive biliosa urina est, sive sanguis fluxit, pro veneno est; in phthisi tamen, sicut in omnibus longis difficilibusque febriculis, recte dari potest (*Aph.* V, 64). Quod si febris aut nondum incursat, aut jam remisit, decurrendum est ad modicas exercitationes, maximeque ambulationes; item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer, ut allium, porrum, idque ipsum ex aceto, vel ex eodem intubus, ocimum, lactuca: deinde lenis, ut sorbitio ex ptisana, vel ex alica, vel ex amylo, lacte adjecto. Idem oryza quoque, et, si nihil aliud est, far praestat. Tum invicem modo his cibis, modo illis utendum est; adjiciendaque quaedam ex media materia, praecipueque cerebellum, vel pisciculus, et his similia. Farina etiam cum sevo ovillo caprinove mixta, deinde incocta pro medicamento est. Vinum assumi debet leve, austerum (cf. III, 21; IV, 18). Hactenus non magna mole pugnatur: si vehementior noxa est, ac neque febricula, neque tussis quiescit, tenuarique corpus apparet, validioribus auxiliis opus est. Exulcerandum est ferro candenti, uno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammam utramque; item sub imis ossibus scapularum, quas *ὤμοπλάτας* Graeci vocant, sic, ne sanescere ulcera sinamus, nisi tussi finita: cui per se quoque medendum esse manifestum est. Tunc ter quaterve die vehementer extremas partes perfricandae, thorax levi manu pertractandus, post cibum intermittenda hora, et perfricanda crura brachiaque: interpositis denis diebus, demittendus est aeger in solium, in quo sit aqua calida et oleum: ceteris diebus bibenda aqua; tum et vinum, si tussis non est, potui frigidum dandum; si est, egelidum. Utile est etiam cibos in remissionibus quotidie dari: frictiones gestationesque similiter adhiberi: eadem acria quarto aut quinto die sumere: interdum herbam sanguinali ex aceto, vel ptantaginem esse. Medicamentum

est etiam vel plantaginis succus per se, vel marrubii cum melle incoctus; ita ut illius cyathus sorbeatur, hujus cochleare plenum paulatim delingatur; vel inter se mixta, et incocta resinae terebinthinae pars dimidia, butyri et mellis
 5 pars altera. Alvus cita utique vitanda est (cf. *Aph.* V, 14). Vomitus in hoc morbo frequens, perniciosus est, maximeque sanguinis (cf. III, 27, 4). Qui meliusculus esse coëpit, adjicere debet exercitationes, frictiones, cibos: deinde ipse se, suppresso spiritu (cf. Oribas. t. I, p. 656), perfricare;
 10 diu abstinere a vino, balneo, venere.

CAPUT XXIII.

De Comitiali morbo.

Inter notissimos morbos est etiam is, qui comitialis, vel major nominatur. Homo subito concidit; ex ore spumae
 15 moventur; deinde interposito tempore ad se redit, et per se ipse consurgit. Id genus saepius viros, quam feminas occupat. Ac solet quidem etiam longum esse, usque ad mortis diem, et vitae non periculosum; interdum tamen, quum recens est, hominem consumit: et saepe eum, si re-
 20 media non sustulerunt, in pueris veneris, in puellis menstruorum initium tollit (cf. *Aph.* V, 7). Modo cum distentione nervorum prolabitur aliquis, modo sine illa. Quidam hos quoque iisdem, quibus lethargicos, excitare conantur: quod admodum supervacuum est; et quia ne lethargicus
 25 quidem his sanatur; et quia, quum possit ille numquam expergisci, atque ita fame interire, hic ad se utique revertitur. Ubi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utique sanguis mitti debet: si accessit, non utique mittendus est, nisi alia quoque hortantur. Necessarium autem
 30 est ducere alvum, vel nigro veratro purgare, vel utrumque facere, si vires patiuntur: tunc caput tondere, oleoque et aceto perungere: cibum post diem tertium, simul transi-
 hora qua concidit, dare. Neque sorbitiones autem his, al-
 que molles et faciles cibi, neque caro, minimeque suil
 35 convenit; sed mediae materiae: nam et viribus opus es

et cruditates cavendae sunt. Cum quibus fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaque calefacientia; item frigus, vinum, venerem, loci praecipitis conspectum, omniumque terrentium, vomitum, lassitudinem, sollicitudines, negotia omnia; ubi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, 5 et invicem alterum quemque, eadem hora cibi servata, donec quatuordecim dies transeant. Quos ubi morbus excessit, acuti vim deposuit: ac, si manet, curandus jam ut longus est. Quod si, non quo die primum id incidit, medicus accessit, sed is, qui cadere consuevit, ei traditus est; pro- 10 tinus eo genere victus habito, qui supra comprehensus est, exspectandus est dies, quo prolabatur; utendumque tum vel sanguinis missione, vel ductione alvi, vel nigro veratro, sicut praeceptum est: insequentibus deinde diebus per eos cibos, quos proposui, vitatis omnibus, quae cavenda dixi, 15 nutriendus. Si per haec morbus finitus non fuerit, confugiendum erit ad album veratrum; ac ter quoque aut quater eo utendum, non ita multis interpositis diebus; sic tamen, ne iterum umquam sumat, nisi conciderit. Mediis autem diebus vires ejus erunt nutriendae; quibusdam, praeter ea, quae 20 supra scripta sunt, adjectis. Ubi mane expectatus est, corpus ejus leniter ex oleo vetere, cum capite excepto ventre, permulceatur: tum ambulatione quam maxime longa et recta utatur: post ambulationem loco tepido vehementer et diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfrice- 25 tur: deinde per caput multa aqua frigida perfundatur; paulum cibi assumat; conquiescat; rursus ante noctem ambulatione utatur; iterum vehementer perfricetur, sic ut neque venter, neque caput contingatur; post haec coenet; interpositisque tribus aut quatuor diebus, uno aut altero acria 30 assumat. Si ne per haec quidem fuerit liberatus, caput radat; ungatur oleo vetere, adjecto aceto et nitro; perfundatur aqua salsa; bibat jejunos ex aqua castoreum; nulla aqua, nisi decocta, potionis causa utatur. Quidam jugulati gladiatoris calido sanguine epoto tali morbo se liberarunt: apud 35 quos miserum auxilium tolerabile miserius malum fecit (cf. Plin. XXVIII, 1, 2; Aret. *Cur. chronic.* I, 4; Des Etangs, *in ed.* Celsi, p. 281). Quod ad medicum vero pertinet, ulti-

mum est, juxta talum ex utroque crure paulum sanguinis mittere; occipitium incidere, et cucurbitulas admove; ferro candenti in occipitio, et infra quoque, qua summa vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, ut per ea perniciosus humor evadat. Quibus si finitum malum non fuerit, prope est, ut perpetuum sit. Ad levandum id, tantummodo utendum erit exercitatione multa, frictione, cibisque iis, qui supra comprehensi sunt: praecipueque vitanda omnia, quae, ne fierent, excepimus.

10

CAPUT XXIV.

De Regio morbo.

Aequè notus est morbus, quem interdum arquatam, interdum regium nominant. Quem Hippocrates (*Aph.* IV, 62, 64; *Coac.* 118) ait, si post septimum diem febricitante aegro
 15 supervenit, tutum esse, mollibus tantummodo praecordiis substantibus: Diocles ex toto, si post febrem oritur, etiam prodesse; si post hunc febris, occidere. Color autem eum morbum detegit, maxime oculorum, in quibus, quod album esse debet, fit luteum. Soletque accedere et sitis, et dolor
 20 capitis, et frequens singultus, et praecordiorum dextra parte durities, et, ubi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumque resolutio: atque, ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbescit. Primo die abstinere aegrum oportet; secundo ducere alvum: tum,
 25 si febris est, eam victus genere discutere; si non est, scammoniam potui dare, vel cum aqua betam albam contritam, vel cum aqua mulsa nuces amaras, absinthium, anisum, sic ut pars hujus minima sit. Asclepiades aquam quoque salsam, et quidem per biduum, purgationis causa bibere
 30 cogebat, iis, quae urinam movent, rejectis. Quidam, superioribus omissis, per haec, et per eos cibos, qui extenuant, idem se consequi dicunt. Ego ubique, si satis virum est, validiora; si parum, imbecilliora auxilia praefero. Si purgatio fuit, post eam triduo primo modice cibum oportet
 35 assumere ex media materia, et vinum bibere graecum.

sum, ut resolutio ventris maneat: tum altero triduo validiores cibos, et carnis quoque aliquid esse, intra aquam manere: deinde ad superius genus victus reverti, cum eo, ut magis satiatur; omisso graeco vino (cf. p. 115, l. 35; p. 118, l. 17), bibere integrum, austerum (cf. Aet. X, 18); atque ita per haec variare, ut interdum acres quoque cibos interponat, interdum ad salsum vinum redeat. Per omne vero tempus utendum est exercitatione, frictione; si hiems est, balneo: si aestas, frigidis natationibus; lecto etiam, et conclavi cultiore, lusu, joco, ludis, lascivia, per quae mens exhilaretur: ob quae regius morbus dictus videtur. Malagma quoque, quod digeratur, super praecordia datum prodest; vel arida ibi ficus superimposita, si jecur aut lienis affectus est.

CAPUT XXV.

De Elephantia.

15

Ignotus autem paene in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem *ἐλεφαντίασις* Graeci vocant: isque longis annumeratur. Totum corpus afficitur ita, ut ossa quoque vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas crebrosque tumores habet; rubor earum paulatim in atrum colorem convertitur; summa cutis inaequaliter crassa, tenuis, dura, mollisque, quasi squamis quibusdam exasperatur; corpus emacrescit; os, surae, pedes intumescunt: ubi vetus morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur, febricula oritur, quae facile tot malis obrutum hominem consumit. Protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet, aut nigro veratro venter solvi: adhibenda tum, quanta sustineri potest, inedia est: paulum deinde vires reficiendae, et ducenda alvus: post haec, ubi corpus levatum est, utendum est exercitatione, praecipueque cursu: sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus evocandus: frictio adhibenda: moderandumque inter haec, ut vires conserventur. Balneum rarum esse debet; cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine infantibus: vinum, praeterquam primis

diebus, recte datur. Corpus contrita plantago et illita optime tueri videtur.

CAPUT XXVI.

De Attonitis.

Attonitos quoque raro videmus, quorum et corpus et
 5 mens stupet. Fit interdum ictu fulminis, interdum morbo:
ἀποπληξίαν hunc Graeci appellant (cf. Hipp. *Diaeta in*
acutis, § 5. *De morbis* II, § 8 et 25). His sanguis mittendus
 est: veratro quoque albo, vel alvi ductione utendum. Tum
 adhibendae frictiones, et ex media materia minime pingues
 10 cibi; quidam etiam acres; a vino abstinendum.

CAPUT XXVII.

De resolutione nervorum.

1. At resolutio nervorum (sc. *tendinum*) frequens ubi-
 que morbus est: sed interdum tota corpora, interdum partes
 15 infestat. Veteres auctores illud *ἀποπληξίαν*, hoc *παράλυσιν*
 nominaverunt: nunc utrumque *παράλυσιν* appellari video.
 Solent autem, qui per omnia membra vehementer resoluti
 sunt, celeriter rapi: ac si correpti non sunt, diutius quidem
 vivunt; sed raro tamen ad sanitatem perveniunt, et plerum-
 20 que miserum spiritum trahunt, memoria quoque amissa
 (cf. *Aph.* II, 42). In partibus vero numquam acutus, saepe
 longus, fere insanabilis morbus est. Si omnia membra vehe-
 menter resoluta sunt, sanguinis detractio vel liberat, vel
 occidit: aliud curationis genus vix umquam sanitatem resti-
 25 tuit, saepe mortem tantum differt, vitam interim infestat.
 Post sanguinis missionem, si non redit et motus et mens,
 nihil spei superest; si redit, sanitas quoque prospicitur. At
 ubi pars resoluta est, pro vi et mali et corporis, vel sanguis
 mittendus, vel alvus ducenda. Cetera eadem in utroque casu
 30 facienda sunt: siquidem vitare praecipue convenit frigus;
 paulatimque ad exercitationes revertendum est, sic ut in-
 grediatur ipse protinus, si potest: si id crurum imbecillita
 prohibet, vel gestetur, vel motu lecti concutiat: tum in
 membrum, quod deficit, si potest, per se; sin minus, per

alium moveatur, et vi quadam ad consuetudinem redeat. Prodest etiam torpentis membri summam cutem exasperasse, vel urticis caesam, vel imposito sinapi, sic ut, ubi rubere coeperit corpus, haec removeantur. Scilla quoque contrita, bulbique contriti cum ture recte imponuntur. Neque alienum est, resina cutem tertio quoque die diutius vellere, pluribus etiam locis; aliquando sine ferro cucurbitulas admovere. Uctioni vero aptissimum est vetus oleum, vel nitrum aceto et oleo mixtum. Quin etiam fovere aqua calida marina, vel, si ea non est, tamen salsa, magnopere necessarium est. Ac ¹⁰ si quo loco vel naturales, vel etiam manu factae tales nationes sunt, iis potissimum utendum est; praecipueque in his agitanda membra, quae maxime deficiunt: si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeque ex venatione; potio sine vino aquae calidae: si ¹⁵ tamen vetus morbus est, interponi quarto vel quinto die purgationis causa vinum graecum salsum potest. Post coenam utilis vomitus est.

2. Interdum vero etiam nervorum (sc. *tendinum*) dolor oriri solet. In hoc casu non vomere, non medicamentis ur- ²⁰ nam movere, non exercitatione sudorem, ut quidam praecipiunt, expedit. Bibenda aqua est: his die in lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est, deinde retento spiritu: ab ipsa exercitatione potius superiores partes movendae: balneo raro utendum: mutandum subinde peregrinationibus ²⁵ coelum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo, nitro ex aqua perungenda est; deinde involvenda, et subjicienda pruna lenis, et sulphur, atque ita id suffumigandum; idque aliquamdiu faciendum, sed jejuno, quum bene jam concoxerit. Cucurbitulae quoque saepe dolenti parti admovendae sunt, ³⁰ pulsandusque leniter inflatis vesicis bubulis is locus est. Utile est etiam sebum miscere cum hyoscyami et urticae contritis seminibus, sic ut omnium par modus sit, idque imponere (cf. Diosc. IV, 69): fovere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Utriculi quoque recte imponuntur aqua calida ³⁵ repleti, aut bitumen cum hordeacea farina mixtum. Atque in ipso potissimum dolore utendum gestatione vehementi est: quod in aliis doloribus pessimum est.

3. Tremor autem nervorum aequè vomitu medicamentisque urinam moventibus intenditur. Inimica etiam habet balnea, assasque sudationes. Bibenda aqua est; acri ambulatione utendum; itemque unctionibus frictionibusque, maxime per se ipsum; pila, similibusque superiores partes dimovendae; cibo quolibet utendum, dummodo concoctioni utique studeatur; secundum cibum, curis abstinendum; rarissima Venere utendum est. Si quando quis in eam prolapsus est, tum oleo leniter diuque in lectulo perfricari manibus
10 puerilibus potius, quam virilibus, debet.

4. Suppurationes autem, quae in aliqua interiori parte oriuntur, ubi natae fuerint, primum id agere oportet per ea cataplasmata, quae reprimunt, ne coitus inutilis materiae fiat; deinde, si haec victa sunt, per ea malagmata, quae
15 digerunt, dissipentur. Quod si consequuti non sumus, sequitur ut evocetur: deinde ut maturescat. Omnis tum vomicae finis est, ut rumpatur: indiciumque est pus vel alvo vel ore redditum. Sed nihil facere oportet, quominus quidquid est puris excedat. Utendum maxime sorbitionibus est, et
20 aqua calida. Ubi pus ferri (id est *fluere*—cf. V, 25, 8 et passim) desiit, transeundum ad faciles quidem, sed tamen validiores et frigidos cibos, frigidamque aquam, sic, ut ab egelidis tamen initium fiat. Primoque cum melle quaedam edenda, ut nuclei pinei, vel graecae nuces, vel avellanae:
25 postea submovendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est succus assumptus vel porri vel marrubii, et omni cibo porrum ipsum adjectum. Oportebit autem uti in iis partibus, quae non afficiuntur, frictionibus; item ambulationibus lenibus: vitandumque erit, ne vel luctando, vel currendo, vel alia ratione sanescentia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoque omni modo cavendus sanguinis vomitus est.

A. CORNELII CELSI
ARTIUM LIBER NONUS

IDEM

MEDICINAE QUARTUS.

CAPUT I.

De humani corporis interioribus partibus.

Hactenus reperiuntur ea genera morborum, quae in totis corporibus ita sunt, ut iis certae sedes assignari non possint: nunc de iis dicam, quae sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi curationesque in notitiam venient, si prius eorum sedes breviter ostendero. Caput igitur, eaque, quae in ore sunt, non lingua tantummodo palatoque terminantur; sed etiam quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraque circa guttur venae grandes, quae *σφαγιτιδες* nominantur; itemque arteriae, quas *καρωτιδες* vocant, sursum procedentes ultra aures feruntur. At in ipsis cervicibus glandulae positae sunt, quae interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt: alterum *asperam arteriam* nominant; alterum *stomachum*. Arteria exterior ad pulmonem; stomachus interior ad ventriculum fertur: illa spiritum; hic cibum recipit. Quibus quum diversae viae sint, qua coeunt, exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est, quae, quum spiramus, attollitur; quum cibum potionemque assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria dura et cartilaginosa in gutture assurgit; ceteris partibus residit. Constat ex circulis quibusdam compositis ad imaginem earum vertebrarum, quae in spina sunt: ita tamen,

ut ex parte exteriori aspera, ex interiori, stomachi modo laevis sit: eaque descendens ad praecordia cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoque spiritus capax, et a tergo spinae ipsi junctus, in duas fibras ungulae bubulae modo dividitur. Huic cor annexum est, natura musculosum, in pectore sub sinisteriore mamma situm; duosque quasi ventriculos habet. At sub corde atque pulmone transversum ex valida membrana septum est, quod a praecordiis uterum (id est *ventrem*) diducit; idque nervosum, multis etiam venis per id discurrentibus, a superiore parte, non solum intestina, sed jecur quoque lienemque discernit. Haec viscera proxime, sed infra tamen posita, dextra sinistraque sunt. Jecur a dextra parte sub praecordiis ab ipso septo orsum, intrinsecus cavum, extrinsecus gibbum: quod prominens leviter ventriculo insidet, et in quatuor fibras dividitur. Ex inferiore vero parte ei fel inhaeret. At lienis sinistra, non eidem septo, sed intestino innexus est, natura mollis et rarus, longitudinis crassitudinisque modicae; isque paulum a costarum regione in uterum excedens, ex maxima parte sub his conditur. Atque haec quidem juncta sunt. Renes vero diversi; qui lumbis sub imis costis inhaerent, a parte earum rotundi, ab altera resimi; qui et venosi sunt, et ventriculos habent, et tunicis superconteguntur. — Ac viscerum quidem hae sedes sunt. Stomachus vero, qui intestinorum principium est, nervosus a septima spinae vertebra incipit; circa praecordia cum ventriculo committitur. Ventriculus autem, qui receptaculum cibi est, constat ex duobus tergoribus; isque inter lienem et jecur positus est, utroque ex his paulum super eum ingrediente. Suntque etiam membranulae tenues, per quas inter se tria ista connectuntur, jungunturque ei septo, quod transversum esse supra posui. Inde ima ventriculi pars paulum in dexteriores partem conversa, in summum intestinum (*duodenum*) coartatur. Hanc juncturam *πυλωρόν* Graeci vocant, quoniam portae modo in inferiores partes ea, quae excreturi sumus, emittit. Ab ea jejunum intestinum incipit, non ita implicitum: cui tale vocabulum est, quia numquam, quod accipit, continet; sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenuius intestinum est, in

sinus vehementer implicitum: orbes vero ejus per membranas singuli cum inferioribus connectuntur; qui in dexteriorem partem conversi, et e regione dexteroris coxae finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transverso committitur, quod a dextra parte incipiens, in sinisteriorem pervium et longum est, in dexteriorem non est; ideoque *caecum* nominatur. At id, quod pervium est, late fusum atque sinuatum, minusque quam superiora intestina nervosum, ab utraque parte huc atque illuc volutum, magis tamen sinisteriores inferioresque 10 partes tenens, contingit jecur atque ventriculum: deinde cum quibusdam membranulis a sinistro rene venientibus jungitur; atque hinc dextra recurvatum in imo dirigitur, qua excernit; ideoque id ibi *rectum intestinum* nominatur. Contegit vero universa haec omentum, ex inferiore parte laeve 15 et strictum, ex superiore mollius; cui adeps quoque innascitur; quae sensu, sicut cerebrum quoque et medulla, caret. At a renibus singulae venae, colore albae, ad vesicam feruntur; *ὀυρητήρας* Graeci vocant, quod per eas inde descendentem urinam in vesicam destillare concipiunt. Vesica autem 20 in ipso sinu nervosa et duplex, cervice plena atque carnosa, jungitur per venas cum intestino, eoque osse, quod pubi subest: ipsa soluta atque liberior est: aliter in viris atque in feminis posita. Nam in viris juxta rectum intestinum est, potius in sinistram partem inclinata; in feminis super genitale 25 earum sita est, superque elapsa, ab ipsa vulva sustinetur. Tum in masculis iter urinae spatiosius et compressius a cervice hujus descendit ad colem: in feminis brevius et plenius, super vulvae cervicem se ostendit. Vulva autem in virginibus quidem admodum exigua est: in mulieribus vero, nisi 30 ubi gravidae sunt, non multo major, quam ut manu comprehendatur. Ea recta tenuataque cervice, quem canalem vocant, contra mediam alvum orsa, inde paulum ad dexteriorem coxam convertitur; deinde super rectum intestinum progressa, illis feminae latera sua innectit. Ipsa autem ilia 35 inter coxas et pubem imo ventre posita sunt. A quibus ac pube abdomen sursum versus ad praecordia pervenit; ab exteriori parte evidenti cute; ab interiore laevi membrana

inclusum, quae omento jungitur; περιτόναιον autem a Graecis nominatur.

CAPUT II.

De curationibus morborum capitis.

5 His veluti in conspectum quemdam, quatenus scire curanti necessarium est, adductis, remedia singularum laborantium partium exsequar, orsus a capite: sub quo nomine nunc significo eam partem, quae capillo tegitur: nam oculorum, aurium, dentium dolor, et si quis similis est, alias
 10 erit explicandus. In capite autem interdum acutus et pestifer morbus est, quam κεφαλαίαν Graeci vocant: cujus notae sunt, horror validus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic ut vox supprimatur; vel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima
 15 deficiat: praeter haec, dolor intolerabilis, maxime circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neque gravis, neque periculosa per hominis aetatem est: interdum gravior dolor, sed brevis, neque tamen mortiferus; qui vel vino, vel cruditate, vel frigore,
 20 vel igne, aut sole contrahitur. Hique omnes dolores modo cum febre, modo sine hac sunt; modo in toto capite, modo in parte; interdum sic, ut oris quoque proximam partem excrucient. Praeter haec etiamnum invenitur genus, quod potest longum esse; ubi humor cutem inflat, eaque intumescit, et prementi digito cedit: ὑδροκέφαλον Graeci
 25 appellant. Ex his id, quod secundo loco positum est, dum leve est, qua sit ratione curandum, dixi, quum persequeretur ea, quae sani homines in imbecillitate partis alicujus facere deberent. Quae vero auxilia sint capitis, ubi cum febre
 30 dolor est, eo loco explicitum est, quo febrium curatio exposita est. Nunc de ceteris dicendum est. Ex quibus id, quod acutum est, et id, quod supra consuetudinem intenditur, idque quod ex subita causa, etsi non pestiferum, tamen vehemens est, primam curationem habet, qua sanguis
 35 mittatur. Sed id, nisi intolerabilis dolor est, supervacuum est: satiusque est abstinere a cibo; si fieri potest, etiam a

potione; si non potest, aquam bibere. Si postero die dolor remānet, alvum ducere, sternutamenta evocare, nihil assumere, nisi aquam. Saepe enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit; utique si ex vino vel cruditate origo est. Si vero in his auxilii parum est, tonderi oportet ad cutem: deinde considerandum est, quae causa dolorem excitavit. Si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit: spongiam concavam imponere subinde in aqua frigida expressam: ungere rosa et aceto, vel potius his tinctam lanam succidam imponere, aliave refrigerantia cataplasmata. 10 At si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida marina, vel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit; tum caput vehementer perfricare; deinde calido oleo implere et veste velare. Quidam etiam id devinciunt; alii cervicalibus vestimentisque onerant, et sic levantur; alios calida cata- 15 plasmata adjuvant. Ergo etiam ubi causa incognita est, videre oportet, refrigerantia magis, an calefacientia leniant, et iis uti, quae experimentum approbarit. At si parum causa discernitur, perfundere caput primum aqua calida, sicut supra praeceptum est, vel salsa, vel ex lauro decocta; tum 20 frigida posca. Illa in omni vetusto capitis dolore communia sunt: sternutamenta excitare; inferiores partes vehementer perfricare; gargarizare iis quae salivam movent; cucurbitulas temporibus et occipitio admove; sanguinem ex naribus detrahare; resina subinde tempora pervellere, et im- 25 posito sinapi exulcerare ea, quae male habent, ante linteolo subjecto, ne vehementer arrodat; candentibus ferramentis, ubi dolor est, ulcera excitare; cibum permodicum cum aqua sumere: ubi levatus est dolor, in balneum ire, ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi: si dis- 30 cussus ex toto dolor est, etiam ad vinum reverti; sed postea semper, antequam quidquam aliud, aquam bibere. Dissimile est id genus, quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessarium est; deinde imponere sinapi sic, ut exulceret; si id parum profuit, scalpello utendum est. 35 Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur, insudet, vehementer perfricetur, cibis potionibusque utatur urinam praecipue moventibus.

CAPUT III [2] ¹).

De morbo qui circa faciem nascitur.

Circa faciem vero morbus innascitur, quem Graeci
κυνικὸν σπασμόν (*caninus raptus*: Coel. Aurel. *chron.*
 5 II, 2) nominant. Isque cum acuta fere febre oritur; os cum
 motu quodam pervertitur; accedit crebra coloris in facie
 totoque corpore mutatio; somnus in promptu est. In hoc
 sanguinem mittere optimum est: si finitum eo malum non
 est, ducere alvum: si ne sic quidem discussum est, albo
 10 veratro vomitum movere. Praeter haec necessarium est vi-
 tare solem, lassitudinem, vinum. Si discussum his non est,
 utendum est cursu; frictione in eo, quod laesum est, leni et
 multa; in reliquis partibus brevior, sed vehementi. Prodest
 etiam movere sternutamenta; caput radere; idque perfundere
 15 aqua calida, marina, vel certe salsa, sic ut ei sulphur
 quoque adjiciatur; post perfusionem iterum perfricare;
 sinapi manducare; eodemque tempore affectis oris partibus
 ceratum, integris idem sinapi, donec arrodat, imponere.
 Cibus aptissimus ex media materia est.

20

CAPUT IV [2].

De resolutione linguae.

At si lingua resoluta est, quod interdum per se, interdum
 ex morbo aliquo fit, sic ut sermo hominis non explicetur;
 oportet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum, vel hys-
 25 sopum, vel nepeta decocta sit; aquam bibere; caput, et
 os, et ea, quae sub mento sunt, et cervicem vehementer
 perfricare; lasere linguam ipsam linere; manducare, quae
 sunt acerrima, id est sinapi, allium, cepam; magna vi luctari,
 ut verba exprimantur; exerceri retento spiritu (cf. III, 22

1) In hoc libro divisiones quas ultima Targae recensio capitibus praefert sequuti sumus; priscas tamen uncis subjungendas esse censuimus.

in fine); caput saepe aqua frigida perfundere; nonnumquam multam esse radiculam, deinde vomere.

CAPUT V [2].

De destillatione ac gravedine.

Destillat autem humor de capite interdum in nares,⁵ quod leve est; interdum in fauces, quod pejus est; interdum etiam in pulmonem, quod pessimum est. Si in nares destillat, tenuis per has pituita profluit, caput leviter dolet, gravitas ejus sentitur, frequentia sternutamenta sunt; si in fauces, has exasperat, tussiculam movet; si in pulmonem, praeter¹⁰ sternutamenta et tussim, est etiam capitis gravitas, lassitudo, sitis, aestus, biliosa urina. Aliud autem, quamvis non multum distans, malum, gravedo est. Haec nares claudit, vocem obtundit, tussim siccam movet: sub eadem salsa est saliva, sonant aures, venae moventur in capite, turbida urina est.¹⁵ Haec omnia *νοσήζας* Hippocrates nominat (*De veteri medicina*, § 18): nunc video apud Graecos in gravedine hoc nomen servari; destillationem *κατασταγμόν* appellari. Haec autem et brevia, et si neglecta sunt, longa esse consuerunt. Nihil pestiferum est, nisi quod pulmonem exulcerat. Ubi²⁰ aliquid ejusmodi sentimus, protinus abstinere a sole, balneo, vino, venere debemus: inter quae unctione, et assueto cibo nihilo minus uti licet. Ambulatione tantum acri, sed tecta utendum est, et post eam caput atque os supra quinquagies perfricandum. Raroque fit, ut, si biduo, vel certe triduo²⁵ nobis temperavimus, id vitium non levetur. Quo levato, si in destillatione crassa facta pituita est, vel in gravedine nares magis patent, balneo utendum est, multaque aqua prius calida, post egelida, fovendum os caputque; deinde cum cibo pleniore vinum bibendum. At si aequae tenuis³⁰ quarto die pituita est, vel nares aequae clausae videntur, assumendum est vinum amineum (cf. Oribas., T. I, p. 639) austerum; deinde rursus biduo aqua; post quae ad balneum, et ad consuetudinem revertendum est. Neque tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, ex-³⁵ pedit tamquam aegros agere; sed cetera omnia quasi sanis

facienda sunt, praeterquam si diutius aliquem et vehementius ista sollicitare consuerunt: huic enim quaedam curiosior observatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces destillat, praeter ea, quae supra retuli, protinus
 5 primis diebus multum ambulandum est; perfricandae vehementer inferiores partes; lenior frictio adhibenda thoraci, ori, capiti; demenda assueto cibo pars dimidia; sumenda ova, amyllum, similiaque, quae pituitam faciunt crassiorem; siti contra, quanta maxima sustineri potest, pugnandum.
 10 Ubi per haec idoneus aliquis balneo factus, eoque usus est, adjiciendus est cibo pisciculus, aut caro, sic tamen, ne protinus justus modus cibi sumatur: vino meraco copiosius utendum est. At si in pulmonem quoque destillat, multo magis et ambulatione et frictione opus est; eademque adhi-
 15 bita ratione in cibis, si non satis illi proficiunt, acrioribus utendum est; magis somno indulgendum, abstinendumque a negotiis omnibus; aliquando, sed serius, balneum tentandum. In gravedine autem, primo die quiescere, neque esse, neque bibere, caput velare, fauces lana circumdare: postero die
 20 surgere, abstinere a potione, aut, si res coegerit, non ultra heminam aquae assumere: tertio die panis non ita multum ex parte interiore cum pisciculo, vel levi carne sumere, aquam bibere: si quis sibi temperare non potuerit, quominus pleniore victu utatur, vomere: ubi in balneum ventum
 25 est, multa calida aqua caput et os fovere usque ad sudorem: tum ad vinum redire. Post quae vix fieri potest, ut idem incommodum maneat: sed si manserit, utendum erit cibis frigidis, aridis, levibus, humore quam minimo, servatis frictionibus exercitationibusque, quae in omni tali genere
 30 valetudinis necessariae sunt.

CAPUT VI [3].

De cervicis morbis.

A capite transitus ad cervicem est; quae gravibus admodum morbis obnoxia est. Neque tamen alius impor-
 35 tunior acutiorque morbus est, quam is, qui quodam rigore nervorum (sc. *tendinum*. cf. III, 27), modo caput

scapulis, modo mentum pectori adnectit, modo rectam et immobilem cervicem intendit. Priorem Graeci ὀπισθοτόνον, insequentem ἐμπροσθοτόνον, ultimum τέτατον appellant: quamvis minus subtiliter quidam indiscretis his nominibus utuntur. Ea saepe intra quartum diem tollunt: si hunc evaserunt, sine periculo sunt (*Aph.* V, 6). Eadem omnia ratione curantur; idque convenit. Sed Asclepiades utique mittendum sanguinem credidit: quod quidam vitandum esse dixerunt, eo quod maxime tum corpus calore egeret; isque esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neque enim natura sanguinis est, ut utique caleat; sed ex iis quae in homine sunt, hic celerrime vel calescit, vel refrigescit (cf. Hipp. *De corde*). Mitti vero nec ne debeat, ex iis intelligi potest, quae de sanguinis missione praecepta sunt (II, 10, 11). Utique autem recte datur castoreum, et cum hoc piper, vel laser: deinde opus est fomento humido et calido: itaque plerique aqua calida multa cervices subinde perfundunt. Id in praesentia levat; sed opportuniores nervos frigori reddit: quod utique vitandum est. Utilius igitur est cerato liquido primum cervicem perungere; deinde admoveere vesicas bubulas, vel utriculos oleo calido repletos, vel ex farina calidum cataplasma, vel piper rotundum cum ficu contusum. Utilissimum tamen est humido sale fovere: quod quomodo fieret jam ostendi (II, 17, 33). Ubi eorum aliquid factum est, admoveere ad ignem, vel, si aestas est, in sole aegrum oportet; maximeque oleo vetere; si id non est, syriaco; si ne id quidem est, adipe quam vetustissima cervicem et scapulas et spinam perfricare. Frictio quum omnibus in homine vertebrae utilis sit, tum iis praecipue quae in collo sunt. Ergo die nocteque, interpositis tamen quibusdam temporibus, hoc remedio utendum est; dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefacientibus. Cavendum vero praecipue frigus; ideoque in eo conclavi, quo cubabit aeger, ignis continuus esse debet, maximeque tempore antelucano, quo praecipue frigus intenditur. Neque inutile erit caput attonsum habere, idque irino vel cyprino calido madefacere, et superimposito pileo velare; nonnumquam etiam in calidum oleum totum descendere,

vel in aquam calidam, in qua foenum graecum decoctum sit, et adjecta olei pars tertia. Alvus quoque ducta saepe superiores partes resolvit. Si vero etiam vehementius dolor crevit, admovendae cervicibus cucurbitulae sunt, sic ut cutis incidatur: eadem aut ferramentis, aut sinapi adurenda. Ubi levatus est dolor, moverique cervix coepit, scire licet cedere remediis morbum. Sed diu vitandus cibus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus utendum, itemque ovis sorbilibus, aut mollibus; jus aliquod assumendum. Id si bene processerit, jamque ex toto recte se habere cervices videbuntur, incipiendum erit a pulricula, vel intrita bene madida. Celerius tamen etiam panis mandendus, quam vinum gustandum: siquidem hujus usus praecipue periculosus; ideoque in longius tempus differendus est.

15

CAPUT VII [IV, 1].

De faucium morbis: et primum de angina.

Ut hoc autem morbi genus circa totam cervicem, sic alterum, aequè pestiferum acutumque, in faucibus esse consuevit. Nostri *anginam* vocant: apud Graecos nomen prout species est. Interdum enim neque rubor, neque tumor ullus apparet; sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra solvuntur: id *συνάγχην* vocant. Interdum lingua faucesque cum rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultusque est: id *κυνάγχην* vocant. Illa communia sunt: aeger non cibum devorare, non potionem potest; spiritus ejus intercluditur. Levius est, ubi tumor tantummodo ruborque est, cetera non sequuntur: id *παρὰ-συνάγχην* appellant. Quidquid est, si vires patiuntur, sanguis mittendus est: secundum est ducere alvum (cf. VIII, 9). Cucurbitula quoque recte sub mento, et circa fauces admoveatur, ut id quod strangulat, evocet. Opus est deinde fomentis humidis: nam sicca spiritum elidunt. Ergo admovere spongas oportet; quae melius in calidum oleum, quam in calidam aquam subinde demittuntur: efficacissimusque est hic quoque salis calidus succus (cf. Hipp. *Vict. rat. in acut.*

CELSUS.

§ 7). Tum commodum est, hyssopum, vel nepetam, vel thymum, vel absinthium, vel etiam furfures, aut ficus aridas cum mulsa aqua decoquere, eaque gargarizare: post haec palatum ungere vel felle taurino, vel eo medicamento, quod ex moris est. Polline etiam piperis id recte respergitur. Si per haec parum proficitur, ultimum est incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, et in palato citra uvam, vel eas venas, quae sub lingua sunt; ut per ea vulnera morbus erumpat. Quibus si non fuerit aeger adjutus, scire licet malo victum esse. Si vero his morbus levatus est, 10 jamque fauces et cibum et spiritum capiunt, facilis ad bonam valetudinem recursus est. Atque interdum natura quoque adjuvat, si ex angustiore sede vitium transit in latiore: itaque rubore et tumore in praecordiis orto, scire licet fauces liberari (*Aph.* VI, 37; VII, 47). Quidquid autem eas 15 levarit, incipiendum est ab humidis, maximeque aqua mulsa decocta: deinde assumendi molles et non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum habitum revertantur. Vulgo audio, si quis pullum hirundinis ederit (cf. Plin. XXX, 4, 12), angina toto anno non periclitari; servatumque eum ex sale, 20 quum is morbus urget, comburi, carbonemque ejus contritum in aquam mulsam, quae potui detur, infriari, et prodesse (cf. Plin. *l. l.*). Id quum idoneos auctores ex populo habeat, neque habere quidquam periculi possit, quamvis in monumentis medicorum non legerim, tamen inserendum huic 25 operi meo credidi.

CAPUT VIII [IV, 2].

De difficultate spirandi.

Est etiam circa fauces malum, quod apud Graecos aliud aliudque nomen habet, prout se intendit. Omne in difficultate 30 spirandi consistit: sed haec dum modica est, neque ex toto strangulat, δύσπνοια appellatur: quum vehementior est, ut spirare aeger sine sono et anhelatione non possit, ἀσθμα: quum accessit id quoque, ne nisi recta cervice spiritus trahatur, ὀρθόπνοια. Ex quibus id, quod primum est, potest 35

diu trahi; duo insequentia acuta esse consuerunt. His communia sunt: quod propter angustias, per quas spiritus evadit, sibilum edit, dolor in pectore praecordiisque est, interdum etiam in scapulis, isque modo decedit, modo revertitur; ad
 5 haec tussicula accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet, in sanguinis detractio. Neque id satis est, sed lacte quoque venter solvendus est: liquanda alvus, interdum etiam ducenda, quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem etiam in lecto sublime habendum
 10 est; thorax fomentis, cataplasmatisque calidis, aut siccis, aut etiam humidis adjuvandus est; et postea vel malagma superimponendum, vel certe ceratum ex cyprino, vel irino unguento. Sumenda deinde jejuno potui mulsa aqua, cum qua vel hyssopus cocta, vel contrita capparis radix sit.
 15 Delingitur etiam utiliter aut nitrum, aut nasturtium, aut allium frictum, deinde contritum et cum melle mixtum: simulque coquuntur mel, galbanum, resina terebinthina, et ubi coierunt, ex his quod fabae magnitudinem habet, quotidie sub lingua liquatur: aut sulphuris ignem non experti
 20 p.)-(. =. abrotoni p.)-(. in vini cyatho teruntur, idque tepefactum sorbetur. Est etiam non vana opinio, vulpinum jecur, ubi siccum et aridum factum est, contundi oportere, polentamque ex eo potioni aspergi: vel ejusdem pulmonem quam recentissimum assum, sed sine ferro (?) coctum, edendum
 25 esse. Praeter haec sorbitionibus et lenibus cibis utendum est; interdum vino tenui, austero; nonnumquam vomitu. Prosunt etiam quaecumque urinam movent: sed nihil magis quam ambulatio lenta paene usque ad lassitudinem; frictio multa, praecipue inferiorum partium, vel in sole, vel ad ignem, et
 30 per se ipsum, et per alios, usque ad sudorem.

CAPUT IX [IV, 3].

De faucium exulceratione.

In interiore vero faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac plerique extrinsecus cataplasmatibus calidis,
 35 fomentisque humidis utuntur: volunt etiam vaporem calidum

ore recipi: per quae molliores alii partes eas fieri dicunt, opportunioreque vitio jam haerenti. Sed, si bene vitari frigus potest, tuta illa praesidia; si metus ejus est super-
 vacua sunt. Utique autem perfricare fauces periculosum est: exulcerat enim. Neque utilia sunt, quae urinae movendae sunt; quia possunt, dum transeunt, ibi quoque pituitam extenuare, quam suppressi melius est. Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoque sequuti sumus, auctor bonus, acetum ait quam acerrimum esse sorbendum: hoc enim sine ulla noxa comprimi ulcera. Sed id suppressere sanguinem potest, 10
 ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei lycium est; quod idem quoque aequè probat: vel porri, vel marrubii succus, vel nuces graecae cum tragacantho contritae et cum passo mixtae, vel lini semen contritum et cum dulci vino mixtum. Exercitatio quoque ambulandi currendique neces- 15
 saria est: frictio a pectore vehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi vero esse debent neque nimium acres, neque asperi; mel, lenticula, tragum, lac, ptisana, pinguis caro, praecipueque porrum, et quidquid cum hoc mixtum est. Potionis quam minimum esse convenit. Aqua dari potest vel 20
 pura, vel in qua malum cotoneum, palmulaeve decoctae sint. Gargarizationes quoque lenes: sin hae parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neque acutum est, et potest esse non longum, curationem tamen maturam, ne vehementer et diu laedat, desiderat.

25

CAPUT X [IV, 4].

De tussi.

Tussis vero fere propter faucium exulcerationem molesta est; quae multis modis contrahitur. Itaque illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque male habere; 30
 et vix, quum vetus facta est, eliditur. Ac modo arida est, modo pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoque die bibere; spiritu retento currere, sed minime in pulvere; ac lectione uti vehementi, quae primo impeditur a tussi, post eam vincit: tum ambulare: deinde per manus quoque exer- 35

ceri, et pectus diu perfricare: post haec quam pinguiSSimae
 ficus uncias tres super prunam incoctas, esse. Praeter haec,
 si humida est, prosunt frictions validae cum quibusdam cale-
 facientibus, sic ut caput quoque simul vehementer perfri-
 5 cetur: item cucurbitulae pectori admotae; sinapi ex parte
 exteriore faucibus impositum, donec leviter exulceret; potio
 ex menta, nucibusque graecis et amylo; primoque assumtus
 panis aridus, deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis
 est, quum ea vehementissime urget, adjuvat vini austeri
 10 cyathus assumtus, dum ne amplius id, interposito tempore
 aliquo, quam ter aut quater fiat: item laseris quam optimi
 paulum devorare opus est; porri vel marrubii succum assu-
 mere; scillam delingere; acetum ex ea, vel certe acre sor-
 bere, aut cum spica allii contriti duos vini cyathos. Utilis
 15 etiam in omni tussi est peregrinatio, navigatio longa (cf. III,
 22), loca maritima, natationes: cibus interdum mollis, ut
 malva, ut urtica; interdum acer, ut lac cum allio coctum;
 sorbitiones quibus laser sit adjectum, aut in quibus porrum
 incoctum tabuerit; ovum sorbile sulphure adjecto; potui pri-
 20 mum aqua calida, deinde invicem aliis diebus haec, aliis vinum.

CAPUT XI [IV, 5].

De sanguinis sputu.

Magis terreri potest aliquis, quum sanguinem exspuit:
 sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit modo
 25 ex gingivis, modo ex ore: et quidem ex hoc interdum etiam
 copiose, sed sine tussi, sine ulcere, sine gingivarum ullo
 vitio; ita ut nihil exscreetur: verum ut ex naribus, sic ex
 ore aliquando prorumpit. Atque interdum sanguis profluit,
 interdum simile aquae quiddam, in qua caro recens lota est.
 30 Nonnumquam autem is a summis faucibus fertur, modo exul-
 cerata ea parte, modo non exulcerata; sed aut ore venae
 alicujus adaperto, aut tuberculis quibusdam natis, exque his
 sanguine erumpente. Quod ubi incidit, neque laedit potio
 aut cibus, neque quidquam ut ex ulcere exscreatur. Ali-
 35 quando vero, gutture et arteriis (id est, *aspera arteria*)

exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque extundit: interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex jecinore feratur: saepe feminae, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc expuunt. Anctoresque medici sunt, vel exesa parte aliqua sanguinem exire, vel rupta, vel ore alicuius venae patefacto. Primam *διάβρωσιν*, secundam *ῥήξιν*, tertiam *ἀναστόμωσιν* appellant. Ultima minime nocet; prima gravissime. Ac saepe quidem evenit, ut sanguinem pus sequatur (cf. *Aph.* VII, 15 et 82). Interdum autem, qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad valetudinem profuit. Sed si sequuta ulcera sunt, si pus, si tussis est, prout sedes ipsa est, ita varia et periculosa genera morborum sunt. Si vero sanguis tantum fluit, expeditius et remedium et finis est. Neque ignorari oportet, iis quibus fluere sanguis solet, aut quibus dolet spina, coxaeve, aut post cursum vehementem, vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocre profuvium: idque per urinam redditum ipsam quoque lassitudinem solvere: ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decidit, si tamen in ejus urina nihil novavit: neque vomitum hujus afferre periculum, etiam quum repetit, si ante confirmare et implere corpus licuit: et ex toto nullum nocere qui in corpore robusto, neque nimis est, neque tussim aut calorem movet. Haec pertinent ad universum: nunc ad ea loca, quae proposui, veniam. Si ex gingivis exit, portulacam manducasse satis est; si ex ore, continuisse eo merum vinum: si parum id proficit, acetum. Si inter haec quoque graviter erumpit, quia consumere hominem potest, commodissimum est, impetum ejus, admota occipitio cucurbitula, sic ut cutis quoque incidatur, avertere: si id mulieri, cui menstrua non feruntur, evenit, eandem cucurbitulam incisis inguinibus ejus admove. At si ex faucibus, interioribusve partibus processit, et metus major est, et cura major adhibenda. Sanguis mittendus est; et si nihilo minus ex ore processit, iterum tertioque, et quotidie paulum aliquid: protinus autem debet sorbere vel acetum, vel cum ture plantaginis aut porri succum; imponendaque extrinsecus supra id quod dolet, lana succida ex aceto est, et

id spongia subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoque et femora brachiaque pluribus locis deligabat. Id Asclepiades, adeo non prodesse, etiam inimicum esse proposuit (cf. Cael. Aur. *Chron.* II, 13). Sed id saepe com-
 5 inode respondere experimenta testantur. Neque tamen pluribus locis deligari necesse est: sed satis est infra inguina, et super talos, summosque humeros, etiam brachia. Tum, si febris urget, danda est sorbitio, et potui aqua, in qua aliquid
 10 ex iis, quae alvum adstringunt, decoctum sit: at si abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua frigida, et molle quoque ovum dari potest; potui vel idem quod supra scriptum est, vel vinum dulce, vel aqua frigida. Sed sic bibendum erit, ut sciamus huic morbo sitim prodesse. Praeter haec necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput
 15 hujus quoque cubantis sublime esse debet; recteque tondetur. Facies saepe aqua frigida fovenda est. At inimica sunt vinum, balneum, venus, in cibo oleum, acria omnia, item calida fomenta, conclave calidum et inclusum, multa vestimenta corpori injecta, etiam frictiones; ubi bene sanguis con-
 20 quievit. Tum vero incipiendum est a brachiis, cruribusque; a thorace abstinendum. In hoc casu per hiemem locis maritimis; per aestatem mediterraneis opus est (cf. cap. 10, fine.)

CAPUT XII [V].

De stomachi morbis.

25 Faucibus subest stomachus; in quo plura longa vitia incidere consuerunt. Nam modo ingens calor, modo inflatio hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit; interdum pituita, interdum bilis oritur; frequentissimumque ejus malum est, quo resolvitur; neque ulla re magis aut afficitur, aut
 30 corpus afficit. Diversa autem, ut vitia ejus, sic etiam remedia sunt. Ubi exaestuat, aceto cum rosa extrinsecus subinde fovendus est; imponendusque pulvis cum oleo, et ea cataplasmata, quae simul et reprimunt, et emolliunt. Potui, nisi quid obstat, gelida aqua praestanda. Si inflatio est, prosunt
 35 admotae cucurbitulae; neque incidere cutem necesse est: prosunt sicca et calida fomenta, sed non vehementissima.

Interponenda abstinencia est. Utilis in jejuno potio est absinthii, vel hyssopi, aut rutae. Exercitatio primo lenis, deinde major adhibenda est; maximeque quae superiores partes moveat: quod genus in omnibus stomachi vitiis aptissimum est. Post exercitationem opus est unctione, frictione; balneo quoque nonnumquam, sed rarius; interdum alvi ductione; cibus deinde calidis, neque infantibus; eodemque modo calidis potionibus, primo aquae, post, ubi resedit inflatio, vini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi vitiis praecipendum est, ut quo modo se quisque aeger refecerit, eo sanus utatur: nam redit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defenditur bona valetudo, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est, quam fere tumor et dolor sequitur, prima sunt, quies, abstinencia, lana sulphurata circumdata, in jejuno absinthium. Si ardor stomachum urget, aceto cum rosa subinde fovendus est: deinde cibus quidem utendum est modicis; imponenda vero extrinsecus quae simul et reprimunt, et emolliunt: deinde, his detractis, utendum calidis ex farina cataplasmatibus, quae reliquias digerant: interdum alvus ducenda: adhibenda exercitatio, et cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem fere facienda sunt, quae in faucibus exulceratis praecepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda; adhibendi lenes et glutinosi cibi, sed citra satietatem; omnia acria atque acida removenda; vino, si febris non est, dulci, aut, si id inflat, certe leni utendum; sed neque prae frigido, neque nimis calido. Si vero pituita stomachus impletur, necessarius modo in jejuno, modo post cibum vomitus est: utilis exercitatio, gestatio, navigatio, frictio: nihil edendum bibendumque, nisi calidum; vitatis tantum iis quae pituitam contrahere consuerunt. Molestius est, si stomachus bile vitiosus est. Solent autem ii, qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus, hanc, et quidem, quod pessimum est, atram vomere. His recte alvus ducitur; potiones ex absinthio dantur; necessaria gestatio, navigatio est; si fieri potest, ex nausea vomitus; vitanda cruditas; sumendi cibi faciles et stomacho non alieni, vinum austerum. Vulgatissimum vero pessimumque stomachi vitium est resolutio, id est quum cibi non tenax est, soletque

desinere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est; lectiones, exercitationesque superioris partis necessariae; item unctiones frictionesque. His perfundi frigida, atque in eadem natare; canalibus ejusdem subjicere et stomachum ipsum, et magis etiam a scapulis id quod contra stomachum est; consistere in frigidis medicatisque fontibus, quales Cutiliarum Simbruinarumque sunt, salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter concoquuntur, quam facile vitiantur. Ergo plerique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubulam concoquunt. Ex quo colligi potest, neque avem, neque venationem, neque piscem dari debere, nisi generis durioris. Potui quidem aptissimum est vinum frigidum, vel certe bene calidum, meracum, potissimum rheticum, vel allobrogicum, aliudve, quod et austerum et resina conditum sit; si id non est, quam asperrium, maximeque signinum. Si cibus non continetur, danda aqua, et eliciendus plenior vomitus est, iterumque dandus cibus; et tum admovendae duobus infra stomachum digitis cucurbitulae, ibique duabus aut tribus horis continendae sunt. Si simul et vomitus et dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, vel spongia ex aceto, vel cataplasma, quod refrigeret: perfricanda vero non diu, sed vehementer brachia et crura, et calefacienda. Si plus doloris est, infra praecordia quatuor digitis cucurbitula utendum est; et protinus dandus panis ex posca frigida: si non continuit, post vomitum leve aliquid ex iis, quae non aliena stomacho sint: si ne id quidem tenuit, singuli cyathi vini, singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens etiam medicamentum est radicae succus: valentius, acidi punici mali, cum pari modo succi, qui ex dulci punico malo est, adjecto etiam intubi succo, et mentae, sed hujus minima parte; quibus tantumdem, quantum in his omnibus est, aquae frigidae quam optimae miscetur; id enim plus quam vinum ad comprimendum stomachum potest. Supprimendus autem vomitus est, qui per se venit, et si nausea est. Sed si coacuit intus cibus, aut computruit, quorum utrumlibet ructus ostendit, ejiciendus est; protinusque, cibus assumtis iisdem, quos proxime posui, stomachus restituendus.

Ubi sublatus est praesens metus, ad ea redeundum est, quae supra praecepta sunt.

CAPUT XIII [VI].

De laterum doloribus.

Stomachus lateribus cingitur; atque in his quoque vehementes dolores esse consuerunt. Initium vel ex frigore, vel ex ictu, vel ex nimio cursu, vel ex morbo est: sed interdum malum intra dolorem est, isque modo tarde, modo celeriter solvitur; interdum ad perniciem quoque procedit, oriturque acutus morbus, qui *πλευριτικός* a Graecis nominatur. Huic dolori lateris febris et tussis accedit: et per hanc exscreatur, si tolerabilis morbus est, pituita; si gravis, sanguis. Interdum etiam sicca tussis est, quae nihil emolitur: idque primo vitio gravius, secundo tolerabilius est. Remedium vero est magni et recentis doloris, sanguis missus. At, sive levior, sive vetustior casus est, vel supervacuum, vel serum id auxilium est; confugiendumque ad cucurbitulas est, ante summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec ulcera pustulasque excitet; et tum medicamentum, quod humorem illuc citet.²⁸ Praeter haec circumdare primum oportet latus hapso lanae sulphuratae; deinde, quum paulum inflammatio se remisit, siccis et calidis fomentis uti. Ab his transitus ad malagmata est. Si vetustior dolor remanet, novissime resina imposita discutitur. Utendum cibus potionibusque calidis; vitandum²⁵ frigus: inter haec tamen non alienum est extremas partes oleo et sulphure perfricare: si levata tussis est, leni lectione uti; jamque et acres cibos, et vinum meracius assumere. Quae ita a medicis praecipiuntur, ut tamen sine his rusticos nostros epota ex aqua herba trixago satis adjuvet. Haec in³⁰ omni lateris dolore communia sunt: plus negotii est, si acutus quoque morbus is factus est. In hoc praeter ea, quae supra posita sunt, haec animadvertenda sunt: ut cibus sit quam maxime tenuis et lenis, praecipueque sorbitio, eaque ex ptisana potissimum, aut jus in quo porrus cum pullo gal-³⁵

linaceo coctus sit; idque non nisi tertio quoque die detur, si tamen per vires licebit; potui vero aqua mulsa, in qua hyssopum, aut ruta decocta sit. Quae quibus temporibus danda sint, ex ratione levatae febris apparebit; sic, ut in remissione quam maxima dentur: cum eo tamen, ut sciamus non esse ejus generis tussi aridas fauces committendas: saepe enim, ubi nihil est quod exscreetur, continuatur, et strangulat. Ob quam causam dixi etiam pejus id genus esse tussis, quod nihil, quam quod pituitam moveret. Sed hic vinum sorbere, ut supra praecepimus, morbus ipse non patitur: in vicem ejus cremor ptisanæ sumendus est. Ut his autem in ipso morbi fervore sustinendus aeger est, sic, ubi paulum is se remisit, alimenta pleniora, et vini quoque aliquid dari potest: dum nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectioe quoque manserit tussis, intermittere oportebit uno die; posteroque cum cibo vini paulo plus assumere. Atque incipiente quoque tussi, tum non erit alienum, ut supra quoque positum est (cf. cap. 10), vini cyathos sorbere: sed in hoc genere valetudinis dulce, vel certe lene commodius est. Si malum inveteravit, athletico victu corpus firmandum est.

CAPUT XIV [VII].

De viscerum morbis, et primo de pulmone.

A compagine corporis ad viscera transeundum est; et in primis ad pulmonem veniendum; ex quo vehemens et acutus morbus oritur, quem *περιπνευμονιχόν* Graeci vocant. Ejus haec conditio est: pulmo totus afficitur: hunc ejus casum subsequitur tussis, bilem vel pus trahens, praecordiorum totiusque pectoris gravitas, spiritus difficultas, magnae febres, continua vigilia, cibi fastidium, tabes. Id genus morbi plus periculi, quam doloris habet. Oportet, si satis validae vires sunt, sanguinem mittere: si minores, cucurbitulas sine ferro praecordiis admovere: tum, si satis valet, gestando aegrum digerere: si parum, intra domum tamen dimovere; potionem autem hyssopi dare, cum quo

ficus arida sit incocta; aut aquam mulsam, in qua vel hyssopum, vel ruta decocta sit; frictione uti diutissime in scapulis, proxime ab his in brachiis et pedibus et cruribus, leniter contra pulmonem; idque bis quotidie facere. Quod ad cibum vero pertinet, huic nec salsis opus est, neque acribus, neque amaris, neque alvum adstringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est sorbitio ptisanæ, vel alicæ, vel oryzae, cum qua recens adeps cocta sit: cum hac sorbibile ovum, nuclei pinei ex melle, panis vel elota alica ex aqua mulsæ: potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsæ egelida, aut, si aestas est, etiam frigida; nisi quid obstat. Haec autem altero quoque die, increscente morbo, dare satis est: ubi in incremento constitit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, praeterquam aqua egelida. Si vires desunt, adjuvandæ sunt aqua mulsæ. Pro suntque adversus dolores imposita calida fomenta, vel ea, quæ simul et reprimunt, et emolliunt: prodest impositus super pectus sal bene contritus, cum cerato mixtus; quia leviter cutem erodit, eoque impetum materiae, quo pulmo vexatur, evocat. Utile etiam aliquod malagma est ex iis, quæ materiam trahunt (cf. Hippoc. *Vict. rat. in acutis* § 7). Neque alienum est, dum premit morbus, clausis fenestris aegrum continere: ubi paulum levatus est, ter aut quater die, fenestris aliquantum apertis, purum aerem recipere. Deinde in refectione pluribus diebus a vino abstinere; gestatione, frictione uti; sorbitionibus et prioribus cibis adjicere, ex oleribus porrum, ex carne ungulas, et summa trunculorum atque pisciculos sic, ut diu nihil nisi molle et lene sumatur.

CAPUT XV [VIII].

De hepaticis.

30

Alterius quoque visceris morbus, id est jecinoris, aequè modo longus, modo acutus esse consuevit: *ἥπατικόν* Graeci vocant. Dextra parte sub praecordiis vehemens dolor est; idemque ad latus dextrum, et ad jugulum, humerumque partis ejusdem pervenit; nonnumquam manus quoque dextra

torquetur; horror validus est; ubi male est, bilis evomitur; interdum singultus prope strangulat. Et haec quidem acuti morbi sunt. Longioris vero, ubi suppuratio in jecinore est; dolorque modo finitur, modo intenditur; dextra parte prae-
5 cordia dura sunt, et tument; post cibum major spiritus difficultas est; accedit maxillarum quaedam resolutio. Ubi inveteravit malum, venter et crura pedesque intumescunt; pectus atque humeri, circaque jugulum utrumque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est; tum venter solvendus
10 est, si non potest aliter, per nigrum veratrum: imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quae reprimant, deinde calida, quae diducant; quibus recte iris vel absinthium adjicitur: post haec malagma. Dandae vero sorbitiones sunt, omnesque cibi et calidi, et qui non multum alunt, et fere
15 qui pulmonis quoque dolori conveniunt; praeterque eos, qui urinam movent, potionesque ad id efficaces. Utilia in hoc morbo sunt thymum, satureia, hyssopum, nepeta, anisum, sesamum, lauri baccae, pini flos (*folia?* cf. Cael. Aurel. *Chronic.* III, 4; Diosc. I, 74), herba sanguinalis, menta, ex
20 malo cotoneo medium, columbae jecur recens et crudum: ex quibus quaedam per se esse, quaedam adjicere vel sorbitioni, vel potioni licet; sic tamen, ut parce assumantur. Neque alienum est, absinthium contritum ex melle et pipere, ejusque catapotium quotidie devorare. Abstinendum utique
25 est ab omnibus frigidis: neque enim res ulla magis jecur laedit. Frictionibus utendum in extremis partibus; vitandus omnis labor, omnis vehementior motus; ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, jactus, cursus inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua,
30 si hiems est, calida; si aestas, tepida: item liberalis unctio, et in balneo sudor. Si vero jecur vomica laborat, eadem facienda sunt, quae in ceteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam contra id scalpello aperiunt, et ipsam vomicam adurunt.

CAPUT XVI [IX].

De Lienosis.

At lienis, ubi affectus est, intumescit, simulque cum eo pars sinistra; eaque dura est, et prementi renititur; venter intentus est; aliquis etiam in cruribus tumor est; ulcera aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem vix recipiunt (cf. Hipp. *Intern. affect.* § 31); in intenta ambulatione, cursuque dolor et quaedam difficultas est. Hoc vitium quies augeat: itaque exercitatione et labore opus est; habita tamen ratione, ne febrem ista, si nimium processerint, excitent. 10 Uctiones, frictionesque, et sudores necessarii sunt. Dulcia omnia inimica sunt; item lac et caseus: acida autem maxime conveniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, et magis etiam, quod scilla conditum est, expedit. Edenda sunt salsamenta, vel oleae ex muria dura; tinctae in aceto lactucae 15 intubique, ex eodem betae, ex sinapi asparagus, armoracia, pastinaca, ungulae, rostra, aves macrae, ejusdem generis venatio. Potui vero jejuno dari debet absinthium incoctum: at post cibum aqua a ferrario fabro, in qua candens ferrum subinde tinctum sit: haec enim vel praecipue lienem coercet. 20 Quod animadversum est in iis animalibus, quae apud hos fabros educata exiguos lienes habent. Potest etiam dari vinum tenue, austerum; omniaque in cibis et potionibus, quae urinae movendae sunt. Praecipueque ad id valet vel trifolii semen, vel cuminum, vel apium, vel serpyllum, vel 25 cytisus, vel portulaca, vel nepeta, vel thymum, vel hyssopum, vel satureia: haec enim inde commodissime videntur humorem educere. Lienis quoque bubulus utiliter esui datur: praecipueque eruca et nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt, quae levant. Fit ex unguento 30 et palmulis; fit ex lini et nasturtii semine, quo vinum et oleum adjicitur: fit ex cupresso viridi et arida sicu: fit ex sinapi, cui sevi hircini a renibus quarta pars ponderis adjicitur, teriturque in sole, et protinus imponitur. Multisque modis huic rei capparum aptum est: nam et ipsum cum cibo 35 assumere, et muriam ejus cum aceto sorbere commodum. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem

ejus cum furfuribus, aut ipsum cappari cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

CAPUT XVII [X].

De Renum morbis.

5 At renes ubi affecti sunt, diu male habent. Pejus est, si frequens biliosus vomitus accedit. Oportet conquiescere; cubare molliter; solvere alvum; si aliter non respondet, etiam ducere; saepe desiderare in aqua calida; neque cibum, neque potionem frigidam assumere; abstinere ab omnibus
10 salsis, acribus, acidis, pomis; bibere liberaliter; adjicere modo cibo, modo potioni piper, porrum, ferulam, album papaver, quae maxime inde urinam movere consuerunt. Auxilio quoque his exulceratis sunt, si adhuc ulcera purganda sunt, cucumeris semina detractis corticibus sexaginta,
15 nuclei ex pinu silvestri duodecim, anisi quod tribus digitis sumi possit, croci paulum, contrita et in duas mulsi potiones divisa. Si vero dolor tantum levandus est, ejusdem cucumeris semina triginta, iidem nuclei viginti, nuces graecae quinque, croci paululum, contrita et cum lacte potui data.
20 Ac super quoque recte quaedam malagmata injiciuntur; maximeque ea, quae humori extrahendo sunt.

CAPUT XVIII [XI].

De intestinorum morbis, et primo de cholera.

A visceribus ad intestina veniendum est, quae sunt et
25 acutis et longis morbis obnoxia. Primoque facienda mentio est cholerae (*cholera nostras*); quia commune id stomachi atque intestinorum vitium videri potest; nam simul et dejectio et vomitus est; praeterque haec inflatio est, intestina torquentur, bilis supra infraque erumpit, primum aquae similis,
30 deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnumquam nigra, vel varia. Ergo eo nomine morbum hunc *χολέραν* Graeci nominarunt. Praeter ea vero, quae supra comprehensa sunt, saepe etiam crura manusque contrahuntur, urget sitis, anima deficit: quibus concurrentibus

non mirum est, si subito quis moritur. Neque tamen ulli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo, ubi ista coeperunt, aquae tepidae quam plurimum bibere oportet, et vomere. Vix umquam sic non vomitus sequitur; sed etiam si non incidit, miscuisse tamen novam materiam corruptae prodest; parsque sanitatis est, vomitum esse suppressum. Si id incidit, protinus ab omni potione abstinendum est. Si vero tormina sunt, oportet frigidis et humidis fomentis stomachum fovere; vel si venter dolet, iisdem egelidis sic, ut venter ipse mediocriter calentibus juvetur. Quod si vehementer et vomitus, et dejectio, et sitis vexant, et adhuc subcruda sunt quae vomuntur, nondum vino maturum tempus est: aqua, neque ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est: admovendumque naribus est pulegium ex aceto; vel polenta vino adpersa, vel menta secundum naturam est. At 15 quum discussa cruditatis est, tum magis verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad vinum. Id esse oportet tenue, odoratum, cum aqua frigida mixtum; vel polenta adjecta, vel infracto pane, quem ipsum quoque assumere expedit; quotiesque aliquid aut stomachus, aut 20 venter effudit, toties per haec vires restituere. Erasistratus primo tribus vini guttis, aut quinis aspergendam potionem esse dixit; deinde paulatim merum adjiciendum (cf. Cael. Aur. *Acut.* III, 21). Is, si et ab initio vinum dedit, et metum cruditatis sequutus est, non sine causa fecit: si vehementem infirmitatem adjuvari posse tribus guttis putavit, erravit. At si inanis est homo, et crura ejus contrahuntur, interponenda potio absinthii est. Si extremae partes corporis frigent, ungendae sunt calido oleo, cui cerae paulum sit adjectum, calidisque fomentis nutriendae. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admovenda est, aut sinapi superimponendum. Ubi is constitit, dormire oportet: postero die utique a potione abstinere: die tertio in balneum ire: paulatim se cibo reficere, somno[que] quisquis facile acquiescit; ** itemque lassitudine et frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, alvum duci necessarium est: tum cibis, vinoque 25
lum est.

CAPUT XIX [XII].

De coeliaco ventriculi morbo.

Sed hic quidem morbus et acutus est, et inter intestina stomachumque versatur sic, ut, cujus potissimum partis sit, non facile dici possit; in ipsius vero ventriculi porta consistit is, qui longus esse consuevit: *κοιλιακός* a Graecis nominatur (cf. cap. 21). Sub hoc venter indurescit, dolorque ejus est: alvus nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit: extremae partes frigescunt, difficulter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia calida cataplasmata toto ventri imponere, ut dolorem leniant: post cibum vomere, atque ita ventrem exinanire: proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro ventri et coxis admove: ventrem ipsum liquare dato lacte, et vino salso, frigido; si tempus anni patitur, etiam viridibus ficis: sic tamen, ne quis aut cibum, aut humor universus detur, sed paulatim. Ergo per intervalla temporis sat est cyathos binos ternosve sumere, et cibum pro portione hujus: commodeque facit cyatho lactis cyathus aquae mixtus, et sic datus: cibique inflantes et acres utiliores sunt; adeo ut lacti quoque recte contritum allium adjiciatur. Procedente vero tempore, opus est gestari; maximeque navigare; perfricari ter aut quater die sic, ut nitrum oleo adjiciatur; perfundi aqua calida post cibum; deinde sinapi imponere per omnia membra, excepto capite, donec arrodantur et rubeant; maximeque si corpus durum et virile est: paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quae ventrem comprimunt. Assa caro danda, valens et quae non facile corrumpatur: potui vero pluvialis aqua decocta, sed quae per binos ternosve cyathos bibatur. Si vetus vitium est, oportet laser quam optimum ad piperis magnitudinem devorare: altero quoque die vinum bibere: interdum interposito cibo singulos vini cyathos sorbere: ex inferiori parte infundere pluviatilem egelidam aquam, maximeque si dolor in imis partibus remanet.

CAPUT XX [XIII].

De tenuioris intestini morbo.

Intra ipsa vero intestina consistunt duo morbi, quorum alter in tenuiore, alter in pleniore est. Prior acutus est; ⁵ insequens esse longus potest. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum *χόρδαψον*, plenioris *εἰλεόν* nominavit. A plerisque video nunc illum priorem *εἰλεόν*, hunc *κολικόν* nominari. Sed prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem movet. Fit alterutro loco inflammatio: nec ¹⁰ alvus, nec spiritus infra transmittitur: si superior pars affecta est, cibus; si inferior, stercus per os redditur: si utrumlibet vetus est. Adjicit periculo vomitus biliosus, mali odoris, aut varius, aut niger. Remedium est sanguinem mittere; vel cucurbitulas pluribus locis admovere, non ubi- ¹⁵ que cute incisa: id enim duobus aut tribus locis satis est: ex ceteris spiritum evocare abunde est. Tum animadvertere oportet, quo loco malum sit: solet enim contra id tumere. Et si supra umbilicum est, alvi ductio utilis non est: si infra est, alvum ducere, ut Erasistrato placuit, optimum est; et ²⁰ saepe id auxilii satis est (cf. Cael. Aur. *Acut.* III, 17). Ducitur autem percolato ptisanæ cremore, cum oleo et melle sic, ut praeterea nihil adjiciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere oportet supra summum ventrem, paulatimque deducere: invenietur enim mali locus, qui necesse est renita- ²⁵ tur; et ex eo deliberari poterit, ducenda, nec ne alvus sit. Illa communia sunt: calida cataplasmata admovere, eaque imponere a mammis usque ad inguina et spinam, ac saepe mutare: brachia cruraque perfricare: demittere totum hominem in calidum oleum: si dolor non quiescit, etiam in alvum ³⁰ ex parte inferiore tres aut quatuor cyathos calidi olei dare; ubi per haec consequuti sumus, ut jam ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui mulsum tepidum non multum: nam ante magna cura vitandum est, ne quid bibat: si id comode cessit, adjicere sorbitionem: ubi dolor et ³⁵ febricula quierunt, tum demum uti cibo pleniore; sed neque inflante, neque duro, neque valido, ne intestina adhuc imbe-

cilla laedantur: potui vero nihil, praeterquam puram aquam; nam sive quid vinolentum, sive acidum est, id huic morbo alienum est. Ac postea quoque vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, ceterosque corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit; et sive quum frigus subit, sive aliqua jactatio, nisi bene jam confirmatis intestinis, revertitur.

CAPUT XXI [XIV].

De morbo intestini plenioris.

Is autem morbus, qui in intestino plenior est, in ea
 10 maxime parte est, quam caecam esse proposui. Vehemens fit inflatio, vehementes dolores, dextra magis parte: intestinum, quod verti videtur, prope spiritum elidit. In plerisque post frigora cruditatesque oritur, deinde quiescit; et per aetatem saepe repetens sic cruciat, ut vitae spatio nihil
 15 demat. Ubi is dolor coepit, admoveere sicca et calida fomenta oportet; sed primo lenia, deinde validiora; simulque frictione ad extremas partes, id est crura brachiaque materiam evocare: si discussus non est, qua dolet, cucurbitulas sine ferro defigere. Est etiam medicamentum ejus rei causa comparatum. Id se reperisse Cassius gloriabatur. Magis prodest
 20 potui datum: sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem levat. Nisi finito vero tormento, recte neque cibus, neque potio assumitur. Quo victu sit utendum iis, qui hoc genere tentantur, jam mihi dictum est.

25

CAPUT XXII [XV].

De torminibus.

Proxima his inter intestinorum mala tormina esse consueverunt: *δυσεντερα* graece vocatur. Intus intestina exulcerantur: ex his cruor manat; iisque modo cum stercore
 30 aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quasi mucosis excernitur: interdum simul quaedam carnosae descendunt (cf. *Aph.* IV, 26): frequens dejiciendi cupiditas, dolorque

in ano est: cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur: atque eo quoque tormentum intenditur: idque post tempus aliquod levatur; exiguaeque requies est: somnus interpellatur: febricula oritur: longoque tempore id malum, quum inveteraverit, aut tollit hominem, aut, etiamsi finitum, ex-cruciat. Oportet in primis conquiescere; siquidem omnis agitatio exulcerat: deinde jejunum sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquefolii sit adjecta: imponere cata-plasmata super ventrem, quae reprimant; quod in superioribus ventris morbis non expedit: quotiesque desedit, sub-luere aqua calida in qua decoctae verbenae sint: portulacam vel coctam, vel ex dura muria edisse. Si vetustior morbus est, ex inferioribus partibus tepidum infundere vel ptisanæ cremorem, vel lac, vel adipem liquatam, vel medullam cervinam, vel oleum, vel cum rosa butyrum, vel cum eadem album crudum ex ovis, vel aquam in qua lini semen decoctum sit; vel, si somnus non accedit, vitellos cum aqua in qua rosae floris folia cocta sint. Levant enim dolorem haec, et mitiora ulcera efficiunt; maximeque utilia sunt, si cibi quoque sequutum fastidium est. Themison muria dura quam asperrima sic utendum memoriae prodidit. Cibi vero esse debent, qui leniter ventrem adstringant. At ea, quae urinam movent, si id consequuta sunt, in aliam partem humorem avertendo, prosunt; si non sunt consequuta, noxam augment: itaque nisi in quibus prompte id facere consuerunt, non sunt adhibenda. Potui, si febricula est, aqua pura calida, vel ea quae ipsa quoque adstringat, dari debet: si non est, vinum leve, austerum. Si pluribus diebus nihil remedia alia juverunt, vetusque jam vitium est, aquae bene frigidae potio assumpta ulcera adstringit, et initium secundae valetudininis facit. Sed ubi venter suppressus est, protinus ad calidam potionem revertendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies, pessimique odoris descendere: solet purus sanguis profluere. Si superius vitium est, alvus aqua mulsa duci debet; tum deinde eadem infundi, quae supra comprehensa sunt. At si sanguis profluit, cibi potionesque esse debent, quae adstringant.

CAPUT XXIII [XVI].

De laevitate intestinorum.

Ex torminibus interdum intestinorum laevitas oritur; qua continere nihil possunt, et quidquid assumptum est, im-
5 perfectum protinus reddunt. Id interdum aegros trahit, interdum praecipitat. In hoc utique adhibere oportet compri-
mentia; quo facilius tenendi aliquid intestinis vis sit. Ergo et super pectus ponatur sinapi; exulcerataque cute, malagma quod humorem evocet: et ex verbenis decocta in aqua
10 desideat: et cibos potionesque assumat, quae alvum adstringant: et frigidis utatur perfusionibus. Oportet tamen prospicere, ne, simul his omnibus admotis, vitium contrarium per immodicas inflationes oriatur. Paulatim ergo firmari intestina debebunt, aliquibus quotidie adjectis. Et quum in
15 omni fluore ventris, tum in hoc praecipue necessarium est, non quoties libet desiderare, sed quoties necesse est; ut haec ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoque, quod aequae ad omnes similes affectus pertinet, in hoc maxime servandum est; ut, quum pleraque
20 utilia insuavia sint, qualis est plantago et rubi et quidquid malicorio mixtum est, ea potissimum ex his dentur, quae maxime aeger volet: deinde, si omnia ista fastidiet, ad excitandam cibi cupiditatem, interponatur aliquid minus utile, sed magis gratum. Exercitationes et frictiones huic quoque
25 morbo necessariae sunt; et cum his sol, ignis, balneum, vomitus, ut Hippocrati visum est (*Hipp. De affect.* §. 23, 24), etiam albo veratro, si cetera parum proficient, evocatus.

CAPUT XXIV [XVII].

De lumbricis alvum occupantibus.

30 Nonnumquam autem lumbrici quoque occupant alvum; hique modo ex inferioribus partibus, modo foedius ore redduntur: atque interdum latos eos, qui pejores sunt, interdum teretes videmus. Si lati sunt, aqua potui dari debet, in qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit; aut cui adjectum

sit contritum vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scammoniae paulum; vel etiam pridie, quum multum allium ederit, vomat: posteroque die mali punici tenues radículas colligat, quantum manu comprehendet; eas contusas in aquae tribus sextariis decoquat, donec tertia pars supersit; huc adjiciat nitri paulum, et jejunos bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas potiones sumat. At aquae, vel muriae durae sit adjecta: tum desideat subjecta calida aqua in pelve. Si vero teretes sunt, qui pueros maxime exercent, et eadem dari possunt, et quaedam leviora; ut contritum semen urticae, aut brassicae, aut cumini cum aqua, vel menta cum eadem, vel absinthium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulsa, vel nasturtii semen cum aceto contritum. Edisse etiam et lupinum, et allium prodest; vel in alvum oleum subter dedisse.

15

CAPUT XXV [XVIII].

De tenesmo.

Est autem aliud levius omnibus proximis, de quibus supra dictum est, quod *τενεσμός* Graeci vocant. Id neque acutis, neque longis morbis annumerari debet; quum et facile tollatur, neque umquam per se jugulet. In hoc aequae atque in torminibus frequens desidendi cupiditas est; aequae dolor ubi aliquid excernitur. Descendunt autem pituitae mucusque similia, interdum etiam leviter subcruenta: sed his interponuntur nonnumquam ex cibo quoque recte coacta. Desidere oportet in aqua calida; saepiusque ipsum anum nutrire; cui plura medicamenta idonea sunt: butyrum cum rosa; acacia ex aceto liquata; emplastrum id quod *τετραφάρμακον* Graeci vocant, rosa liquatum; alumen lana circumdatum, et ita appositum; eademque ex inferiore parte indita, quae torminum auxilia sunt; eadem verbenae decoctae, ut inferiores partes foveantur. Alternis vero diebus aqua, alternis leve et austerum vinum bibendum est. Potio esse debet egelida et frigidae propior; ratio victus talis, qualem in torminibus supra praecepimus (cf. cap. 22).

35

CAPUT XXVI [XIX]

De ventris fluxu.

Levior etiam, dum recens, dejectio est; ubi et liquida alvus, et saepius quam ex consuetudine fertur, atque interdum tolerabilis dolor est, interdum gravissimus; idque pejus est. Sed uno die fluere alvum saepe pro valetudine est: atque etiam pluribus, dum febris absit, et intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, et quod intus laesurum erat, utiliter effunditur. Verum spatium periculosum est: interdum enim tormina ac febriculas excitat, viresque consumit. Primo die quiescere satis est; neque impetum ventris prohibere; si per se desiit, balneo uti, paulum cibi capere: si mansit, abstinere non solum a cibo, sed etiam a potione; postero die, si nihilominus liquida alvus est, aequè conquiescere; paulum adstringentis cibi sumere; tertio die in balneum ire; vehementer omnia praeter ventrem perfrire; ad ignem lumbos, scapulasque admove; cibis uti, sed ventrem contrahentibus; vino non multo, meraco; si postero quoque die fluet, plus edisse, sed vomere; et ex toto, donec conquiescat, contra siti, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, ut, post hanc animadversionem, alvus non contrahatur. Alia via est ubi velis suppressere: coenare, deinde vomere: postero die in lecto conquiescere; vespere ungi, sed leniter; deinde panis circa selibram ex vino amineo mero sumere; tum assum aliquid, maximeque avem; et postea vinum idem bibere aqua pluviali mixtum: idque usque quintum diem facere, iterumque vomere. Frigidam autem assidue potionem esse debere, contra priores auctores Asclepiades affirmavit, et quidem quam frigidissimam. Ego experimentis quemque in se credere debere existimo, calida potius, an frigida utatur. Interdum autem evenit, ut id pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. A vomitu oportet incipere: deinde postero die vespere tepido loco ungi; cibum modicum assumere, vinum meracum quam asperrimum; impositam super ventrem habere cum cerato rutam. In hoc autem affectu corporis neque ambulatione, neque frictione opus est: vehiculo sedisse, vel magis etiam

equo, prodest: neque enim ulla res magis intestina confirmat. Si vero etiam medicamentis utendum est, aptissimum est id quod ex pomis fit. Vindemiae tempore in grande vas conjicienda sunt pira atque mala silvestria: si ea non sunt, pira tarentina viridia, vel signina, mala scandiana, vel amerina, [pira?] myrapia (cf. Colum. XII, 10; Plin. XXIII, 1, 21); hisque adjicienda sunt cotonea, et cum ipsis corticibus suis punica, sorba, et quibus magis utimur, et terminalia, sic, ut haec tertiam ollae partem teneant: tum deinde ea musto implenda est; coquendumque id, donec omnia 10 quae indita sunt, liquata, in unitatem quamdam coeant. Id gustui non insuave est; et, quandocumque opus est, assumtum leniter, sine ulla stomachi noxa, ventrem tenet. Duo aut tria cochlearia uno die sumsisse, satis est. Alterum valentius genus: myrti baccas legere, ex his vinum expri- 15 mere, id decoquere, ut decima pars remaneat, ejusque cyathum sorbere. Tertium, quod quandocumque fieri potest: malum punicum excavare, exemptisque omnibus seminibus, membranas quae inter ea fuerunt, iterum conjicere: tum infundere cruda ova, rudiculaque miscere: deinde malum 20 ipsum super prunam imponere; quod, dum humor intus est, non aduritur: ubi siccum esse coepit, remove oportet, extractumque cochleari, quod intus est, edisse. Aliquibus adjectis, majus momentum habet: itaque etiam in piperatum conjicitur, misceturque cum sale et pipere, atque ex his 25 edendum est. Pulticula etiam, cum qua paulum ex favo veteri coctum sit, et lenticula cum malicorio cocta, rubique cacumina in aqua decocta, et ex oleo atque aceto assumpta, efficacia sunt: atque ea aqua in qua vel palmulae, vel malum cotoneum, vel arida sorba, vel rubi decocti sint; 30 quod genus significo, quoties potionem dandam esse dico, quae adstringat. Tritici quoque hemina in vino amineo austero decoquitur; idque triticum jejuno ac sitiendi datur; superque id vinum id sorbetur: quod jure valentissimis medicamentis annumerari potest. Atque etiam potui datur 35 vinum signinum, vel resinatum austerum, vel quodlibet austerum. Contunditurque cum corticibus seminibusque suis punicum malum, vinoque tali miscetur: idque vel merum

sorbet aliquis, vel bibit mixtum. Sed medicamentis uti, nisi in vehementibus malis, supervacuum est.

CAPUT XXVII [XX].

De vulvae morbo.

5 1. Ex vulva quoque feminis vehemens malum nascitur: proximeque ab stomacho vel afficitur haec, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat, ut tamquam comitiali morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eo quod neque
10 tur: sopor tantum est. Idque quibusdam feminis crebro revertens perpetuum fit. Ubi incidit, si satis virium est, sanguis missus adjuvat: si parum, cucurbitulae tamen deligendae sunt in Inguinibus. Si diutius aut jacet, aut alioqui jacere consuevit, admovere oportet naribus exstinctum ex lucerna
15 linamentum, vel aliud ex iis, quae foedioris esse odoris retuli, quod mulierem excitet. Idemque aquae quoque frigidae perfusio efficit. Adjuvatque ruta contrita cum melle, vel ex cyprino ceratum, vel quodlibet calidum et humidum cataplasma naturalibus pube tenus impositum. Inter haec etiam
20 perfricare coxas et poplites oportet. Deinde, ubi ad se rediit, circumcidendum vinum est in totum annum, etiamsi casus idem non revertitur: frictione quotidie utendum totius quidem corporis, praecipue vero ventris et poplitum: cibus ex media materia dandus: sinapi super imum ventrem tertio
25 quoque aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat ¹⁾. . . . Si durities manet, mollire commodè videtur solanum in lac demissum, deinde contritum; et cera alba atque medulla cervina cum irino, aut sebum taurinum vel caprinum cum rosa mixtum. Dandum etiam potui vel castoreum est,
30 vel gith, vel anethum. Si parum pura est, purgetur junco quadrato. Si vero vulva exulcerata est, ceratum ex rosa, et recens suilla adeps, et ex ovis album misceatur,

1) Nihil praecedit de duritie, quo haec referantur. Forsan aliqua desunt:

idque apponatur; vel album ex ovo cum rosa mixtum, adjecto, quo facilius consistat, contritae rosae pulvere. Dolens vero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulae, cute incisa, inguinibus vel etiam sub mammis admotae (*Aph.* V, 50). Si maligna purgatio est¹⁾, subjicienda sunt

. coeuntia. Id faciunt etiam albae olivae, et nigrum papaver cum melle assumptum, et gummi cum trito semine apii liquatum, et cum cyatho passi datum. Praeter¹⁰ haec in omnibus vesicae doloribus idoneae potiones sunt, quae ex odoribus fiunt, id est spica nardi, croco, cinnamo, casia, similibusque: idemque etiam decocta lentiscus praestat. Si tamen intolerabilis dolor est, et sanguis profluit, etiam sanguinis detractio apta est; aut certe coxis admotae¹⁵ cucurbitulae cute incisa.

2. At quum urina super potionum modum etiam sine dolore profluens maciem et periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione et frictione, maximeque in sole, vel

1) Edd. sex primae, et Ruelliana ita habent: *subjicienda sunt coeuntia*; Manutianae: *subjicienda sunt coeuntia*; Caesariana, Pantiniana, et Stephaniana: *subjicienda sunt coercentia*; Gryphiana, et Constantiniana, *subjicienda sunt coeuntia*; Constantiniana in margine, *menses evocantia*; Lindeniana, *subjicienda sunt * coeuntia*. In Codd. Mss. inter haec verba *subjicienda sunt*, et illa *coeuntia*. *Id faciunt* etc. quae infra posita sunt, magna lacuna est; et in plerisque margini adscriptum est, *Desunt in vetustissimo exemplari duo folia*. Quae desint, Morgagnus ostendit ex ea parte Indicum, qui huic libro praepositi sunt in Codd. Foroliviensi, et Veneto: quae pars huic lacunae respondet: videlicet:

CII. Vola (id est Volva) exulcerata est.

CIII. De Vesica.

CIIII. De calculis in vesica.

CV. In omni dolore vesicae.

Ejusmodi indices habentur etiam in Codd. Mediceis II. III. IV. V. et VII. et in multis Vaticanis: in Med. autem I. et Vat. VIII. haec sunt: *De capitis doloribus, de distensione oris, linguae resolutione, destillatione dejectione, vulvae et vesicae vitiiis, profusione coxis, genibus, humeris, pedibus, manibus dolentibus.*

ad ignem: balneum rarum esse debet, neque longa in eo mora: cibus comprimens: vinum austerum meracum, per aestatem frigidum, per hiemem egelidum; sed tantum, quantum minimum sit. Alvus quoque vel ducenda, vel lacte purganda est. Si crassa urina est, vehementior esse debet et exercitatio, et frictio: longior in balneo mora: cibus opus est teneris: vino eodem. In utroque morbo vitanda omnia sunt, quae urinam movere consuerunt.

CAPUT XXVIII [XXI].

10 De Seminis nimia ex naturalibus profusione.

Est etiam circa naturalia vitium, nimia profusio seminis, quod sine venere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut, interposito spatio, tabe hominem consumat. In hoc affectu salutare sunt vehementes frictiones, perfusiones, natationes: 15 que quam frigidissimae: neque cibi, nec potio, nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet cruditates et omnia infantia: nihil ex iis assumere, quae contrahere semen videntur; qualia sunt siligo, simila, ova, alica, amyllum, omnis caro glutinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neque alienum est 20 fovere inferiores partes aqua decocta ex verbenis reprimentibus: ex iisdem aliqua cataplasmata imo ventri inguinibusque circumdare; praecipueque ex aceto rutam: vitare etiam ne supinus obdormiat.

CAPUT XXIX [XXII].

25 De Coxarum morbis.

Superest ut ad extremas partes corporis veniam, quae articulis inter se conseruntur. Initium a coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit: isque hominem saepe debilitat: et quosdam non dimittit. Eoque id genus difficillime curatur, 30 quod fere post longos morbos vis pestifera huc se inclinat: quae ut alias partes liberat, sic hanc jam ipsam quoque affectamprehendit. Fovendum primum aqua calida est: deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse videtur

aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mixtus capparis cortex concisus; vel lolii farina ex vino diluto cocta, et mixta cum arida faece: quae quia refrigescunt, imponere noctu malagmata commodius est. Inulae quoque radix contusa, et ex vino austero postea cocta, et late^s super coxam imposita, inter valentissima auxilia est. Si ista non solverunt, sale calido et humido utendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admovendae sunt cucurbitulae; movenda urina; alvus, si compressa est, ducenda. Ultimum est, et in veteribus quo-¹⁰ que morbis efficacissimum, tribus aut quatuor locis super coxam, cutem candentibus ferramentis exulcerare. Sed frictione quoque utendum est, maxime in sole, et eodem die saepius; quo facilius ea, quae coeundo nocuerunt, digerantur: eaque, si nulla exulceratio est, etiam ipsis coxis;¹⁵ si est, ceteris partibus adhibenda est. Quum vero saepe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit, ut materia inutilis evocetur, illud perpetuum est, non ut primum fieri potest, hujus generis ulcera sanare; sed ea trahere, donec id vitium, cui per haec opitulamur, conquiescat. 20

CAPUT XXX [XXIII].

De Genuum dolore.

Coxis proxima genua sunt, in quibus ipsis nonnumquam dolor esse consuevit. In iisdem autem cataplasmatibus cucurbitulisque praesidium est: sicut etiam quum in humeris,²⁵ aliisque commissuris dolor aliquis exortus est. Equitare ei, cui genua dolent, inimicissimum omnium est. Omnes autem ejusmodi dolores, ubi inveteraverunt, vix citra ustionem finiuntur.

CAPUT XXXI [XXIV].

30

De manuum, pedum, articularumque vitiiis.

In manibus pedibusque articularum vitia frequentiora longioraque sunt; quae in podagris chiragrisve esse consue-
runt. Ea raro vel castratos, vel pueros ante feminae coitum,

vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, tentant (*Aph.* VI, 28, 29 et 30). Ubi sentiri coeperunt, sanguis mittendus est: id enim inter initia statim factum, saepe annuam, nonnumquam perpetuam valetudinem bonam praestat. Quidam etiam, quum asinino lacte epoto sese eluissent, in perpetuum hoc malum evaserunt. Quidam quum toto anno a vino, mulso, venere sibi temperassent, securitatem totius vitae consequuti sunt. Idque utique post primum dolorem servandum est, etiamsi quievit. Quod si jam consuetudo
10 ejus facta est, potest quidem aliquis esse securior iis temporibus, quibus dolor se remisit: majorem vero curam adhibere debet iis quibus id revertitur; quod fere vere autumnove fieri solet (cf. *Aph.* VI, 55). Quum vero dolor urget, mane gestari debet; deinde ferri in ambulationem, ibi se
15 dimovere; et si podagra est, interpositis temporibus exiguis, invicem modo sedere, modo ingredi; tum antequam cibum capiat, sine balneo loco calido leniter perfricari, sudare, perfundi aqua egelida; deinde cibum sumere ex media materia, interpositis rebus urinam moventibus; quotiesque plenior est, evomere. Ubi dolor vehemens urget, interest sine
20 tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor jam etiam obcalluerit. Nam si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel muriam duram ferverefacere oportet, deinde in pelvem conjicere, et quum jam homo pati potest,
25 pedes demittere, superque pallam dare, et vestimento tegere; paulatim deinde juxta labrum ipsum ex eadem aqua leniter infundere, ne calor intus destituat; ac deinde noctu cataplasmata calefacientia imponere, maximeque hibisci radicem ex vino coctam (cf. *Plin.* XX, 4, 14).

30 Si vero tumor calorque est, utiliora sunt refrigerantia, recteque in aqua quam frigidissima articuli continentur; sed neque quotidie, neque diu, ne nervi indurescant. Imponendum vero est cataplasma quod refrigeret; neque tamen in hoc ipso diu permanendum; sed ad ea transeundum, quae
35 sic reprimunt, ut emolliant. Si major est dolor, papaveris cortices in vino coquendi, miscendique cum cerato sunt, quod ex rosa factum sit: vel cerae et adipis suillae tantumdem una liquandum, deinde his vinum miscendum, atque ubi

quod ex eo impositum est, incaluit, detrahendum, et subinde aliud imponendum est. Si vero tumores etiam obcalluerunt, et dolent, levat spongia imposita, quae subinde ex oleo et aceto, vel aqua frigida exprimitur; aut pari portione inter se mixta pix, cera, alumen. Sunt etiam plura idonea manibus pedibusque malagmata. Quod si nihil superimponi dolor patitur, id, quod sine tumore est, fovere oportet spongia, quae in aquam calidam demittatur, in qua vel papaveris cortices, vel cucumeris silvestris radix decocta sit: tum inducere articulis crocum cum succo papaveris et ovillo lacte. 10 At si tumor est, foveri quidem debet aqua egelida, in qua lentiscus, aliave verbenae ex reprimentibus decocta sit: induci vero medicamentum ex nucibus amaris cum aceto tritis; aut ex cerussa, cui contritae herbae muralis succus sit adjectus. Lapis etiam qui carnem exedit, quem *σαρκοφάγον* 15 Graeci vocant, excisus, sic, ut pedes capiat, demissos eos, quum dolent, retentosque ibi levare consuevit. Ex quo in Asia lapidi assio gratia est. Ubi dolor et inflammatio se remiserunt quod intra dies quadraginta fit, nisi vitium hominis accessit, modicis exercitationibus, abstinentia, unctionibus 20 lenibus utendum est, sic, ut etiam cum acopo, vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est. Quibus vero articulorum dolor certis temporibus revertitur, hos ante et curioso victu cavere oportet, ne inutilis materia corpori supersit, et crebriore vomitu; 25 et, si quis ex corpore metus est, vel alvi ductione uti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis expulit, ne in inferiores partes factus cursus pedes replet: quum evidens sit, omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. 30

CAPUT XXXII [XXV].

De refectione convalescentium a morbo.

Ex quocumque autem morbo quis convalescit, si tarde confirmatur, vigilare prima luce debet; nihilominus in lecto conquiescere: circa tertiam horam leniter unctis manibus 35

corpus permulcere: deinde delectationis causa, quantum
juvat, ambulare, circumcisa omni negotiosa cogitatione:
tum gestari diu: multa frictione uti: loca, coelum, cibos
saepe mutare: ubi triduo quatrduove vinum bibit, uno aut
5 etiam altero die interponere aquam. Per haec enim fiet, ne
in vitia tabem inferentia incidat, et ut mature vires suas
recipiat. Quum vero ex toto convaluerit, periculose vitae
genus subito mutabit, et inordinate aget. Paulatim ergo
debebit, omissis his legibus, eo transire, ut arbitrio suo
10 vivat.

A. CORNELII CELSI
ARTIUM LIBER DECIMUS

IDEM

MEDICINAE QUINTUS.

De medicamentorum facultatibus.

Dixi de iis malis corporis, quibus victus ratio maxime subvenit: nunc transeundum est ad eam medicinae partem, quae magis medicamentis pugnat. His multum antiqui auctores tribuerunt, et Erasistratus, et ii qui se *ἐμπειρικούς* nominaverunt; praecipue tamen Herophilus, deductique ab illo viri; adeo ut nullum morbi genus sine his curarent. Multaque etiam de facultatibus medicamentorum memoriae prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andreae, vel Apollonii qui Mys cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte Asclepiades non sine causa sustulit; et, quum omnia fere medicamenta stomachum laedant, malique succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam transtulit. Verum, ut illud in plerisque morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuerunt, quae sine medicamentis ad sanitatem pervenire non possunt. Illud ante omnia scire oportet, quod omnes medicinae partes ita innexae sunt, ut ex toto separari non possint; sed ab eo nomen trahant, a quo plurimum petunt. Ergo ut illa, quae victu curat, aliquando medicamentum adhibet, ita illa, quae praecipue medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem victus debet, quae multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed quum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac saepe simplicia opitulentur, saepe mixta;

non alienum videtur ante proponere et nomina, et vires, et mixturas eorum; quo minor ipsas curationes exsequentibus mora sit.

CAPUT I.

5 De remediis quae sanguinem supprimunt.

Sanguinem supprimunt atramentum sutorium, quod Graeci *χάλκανθον* appellant, chalcitis, acacia, et ex aqua lycium, tus, aloe, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta vel cimolia vel figularis, misy, frigida
10 aqua, vinum, acetum, alumen, melinum, squama et ferri et aeris, atque hujus quoque duae species sunt, alia tantum aeris, alia rubri aeris.

CAPUT II.

Quae vulnus glutinent.

15 Glutinant vulnus myrrha, tus, gummi, praecipueque acanthinum, psyllium, tragacantha, cardamomum, bulbi, lini semen, nasturtium, ovi album, gluten, ichthyocola, vitis alba, contusae cum testis suis cochleae, mel coctum, sponsia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto ex-
20 pressa; ex iisdem lana succida; si levis plaga est, etiam aranea.

Reprimunt alumen et scissile, quod *σχιστόν* vocatur, et liquidum, melinum, auripigmentum, aerugo, chalcitis, atramentum sutorium.

CAPUT III.

25 Quae concoquant et moveant pus.

Concoquant et movent pus nardum, myrrha, costum, balsamum, galbanum, propolis, styrax, turis et fuligo et cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, sebum, adeps,
30 oleum.

CAPUT IV.

Quae aperiant ora in corporibus.

Aperiunt tamquam ora (sc. *Venarum*) in corporibus, cinnamomum, balsamum, panaces, juncus quadratus, pu-
CELSUS. 11

legium, flos albae violae, bdellium, galbanum, resina terebinthina et pinea, propolis, oleum vetus, piper, pyrethrum, chamaepitys, uva taminia, sulphur, alumen, rutae semen.

CAPUT V.

5

Quae purgent.

Purgant aerugo, auripigmentum, quod *ἀρσενικόν* a Graecis nominatur, squama aeris, pumex, iris, balsamum, styrax, tus, turis cortex, resina, et pinea, et terebinthina liquida, oenanthe, lacerti stercus, sanguis columbae, et ¹⁰ palumbi, et hirundinis, ammoniacum, bdellium, abrotonum, ficus arida, coccum gnidium, scobis eboris, omphacium, radícula, coagulum, sed maxime leporinum, fel, vitellus crudus, cornu cervinum, gluten taurinum, mel crudum, misy, chalcitis, crocum, uva taminia, spuma argenti, galla, ¹⁵ squama aeris, lapis haematites, minium, costum, sulphur, pix cruda, sebum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenticula, ervum.

CAPUT VI.

Quae rodant.

20

Rodunt alumen liquidum, sed magis rotundum, aerugo, chalcitis, misy, squama aeris, sed magis rubri, aes combustum, sandaracha, minium sinopicum, galla, balsamum, myrrha, tus, turis cortex, galbanum, resina terebinthina humida, piper utrumque, sed rotundum magis, cardamomum, ²⁵ auripigmentum, calx, nitrum et spuma ejus, apii semen, narcissi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaris nucibus, allium, mel crudum, vinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scammonia, uva taminia, cinnamomum, styrax, cicutae semen (cf. II, 33), resina, narcissi semen, ³⁰ fel, nuces amarae, atramentum sutorium, chrysocolla, veratrum, cinis.

CAPUT VII.

Quae exedant corpus.

Exedunt corpus acaciae succus, hebenus, aerugo, squama
 aeris, chrysocolla, cinis cyprius, nitrum, cadmia, spuma
 5 argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur,
 cicuta, sandaracha, salamandra, alcyonium, aeris flos, chal-
 citis, atramentum sutorium, ochra, calx, galla, alumen,
 lac caprifici, vel lactucae marinae, quae *τιθύμαλλος* a Grae-
 cis nominatur, fel, turis fuligo, spodium, lenticula, mel,
 10 oleae folia, marrubium, lapis haematites, et phrygius, et
 assius, et scissilis, misy, vinum, acetum.

CAPUT VIII.

Quae adurant.

Adurant auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis,
 15 misy, aerugo, calx, charta combusta, sal, squama aeris,
 faex combusta, myrrha, stercus et lacerti, et columbae, et
 palumbi, et hirundinis, piper, coccum gnidium, allium,
 diphryges, lac utrumque quod proximo capite supra com-
 prehensum est, veratrum et album et nigrum, cantharides,
 20 corallium, pyrethrum, tus, salamandra, eruca, sandaracha,
 uva taminia, chrysocolla, ochra, alumen scissile, ovillum
 stercus, oenanthe.

CAPUT IX.

Quae crustas ulceribus inducant.

25 Eadem fere crustas ulceribus tamquam igne adustis in-
 ducunt, sed praecipue chalcitis, utique si cocta est, flos
 aeris, aerugo, auripigmentum, misy, et id quoque magis
 coctum.

CAPUT X.

Quae crustas ulceribus resolvant.

30 Crustas vero has resolvit farina triticea cum ruta, vel
 porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adjectum sit.

CAPUT XI.

Quae discutiant ea, quae in aliqua parte corporis coierunt.

Ad discutienda vero ea, quae in corporis parte aliqua coierunt, maxime possunt abrotonum, helenium, amaracus, alba viola, mel, lilium, sampsuchus cyprius (cf. Plin. XXI, 5 11, 35; 22, 93), lac, sertula campana, serpyllum, cupressus, cedrus, iris, viola purpurea, narcissus, rosa, crocum, passum (*prastum*. Lind.), juncus quadratus, nardum, cinnamomum, casia, ammoniacum, cera, resina, uva taminia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini et 10 narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut molaris, crudus vitellus, amarae nuces, sulphur.

CAPUT XII.

Quae evocent et educant.

Evocat et educit ladanum, alumen rotundum, hebenus, 15 lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, resina terebinthina et pinea, propolis, ficus arida decocta, stercus columbae, pumex, farina lolii, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri baccae, nitrum, sal.

CAPUT XIII.

20

Quae exasperata laevent.

Laevat id quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, ovi album, lac, tragacanthum.

CAPUT XIV.

Quae carnem nutriant ut ulcus impleant.

25

Carnem alit et ulcus implet resina pinea, ochra attiae, vel, astyrice (*mel erithace?* cf. Varro R. R. III, 16), cera, butyrum.

CAPUT XV.

Quae molliant.

Molliunt aes combustum, terra eretria, nitrum, papa-
veris lacrima, ammoniacum, bdellium, cera, sebum, adeps,
5 oleum, ficus arida, sesamum, sertula campana, narcissi et
radix et semen, rosae folia, coagulum, vitellus crudus,
amarae nuces, medullae omnis, stibi, pix, cochlea cocta,
cicutae semen, plumbi recrementum; *σκαριαν μολύβδου*
Graeci vocant; panaces, cardamomum, galbanum, resina,
10 uva taminia, styrax, iris, balsamum, sordes ex gymnasio,
sulphur, butyrum, ruta.

CAPUT XVI.

Quae cutem purgent.

Cutem purgat mel, sed magis si est cum galla, vel ervo,
15 vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro,
vel aerugine.

CAPUT XVII.

De mixturis simplicium rerum, et de ratione ponderum.

1. Expositis simplicibus facultatibus, dicendum est quem-
20 admodum misceantur, quaeque ex his fiant. Miscentur autem
varie, neque hujus ullus modus est; quum ex simplicibus
alia demantur, alia adjiciantur; iisdemque servatis, ponde-
rum ratio mutetur. Itaque quum facultatum materia non ita
multiplex sit, innumerabilia mixturarum genera sunt: quae
25 comprehendi si possent, tamen esset supervacuum. Nam et
iidem effectus intra paucas compositiones sunt, et mutare
eas cuilibet, cognitis facultatibus, facile est. Itaque con-
tentus iis ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem
volumine eas explicabo, quae vel desiderari in prioribus
30 potuerunt, vel ad eas curationes pertinent, quas protinus
hic comprehendam, sic ut tamen, quae magis communia
sunt, simul jungam. Si qua singulis, vel etiam paucis ac-
commodata sunt, in ipsarum locum differam. Sed et ante

sciri volo, in uncia pondus denariorum septem esse: unius deinde denarii pondus dividi a me in sextantes, ut idem in sextante denarii habeam, quod Graeci habent in eo quem ὀβολόν appellant. Id ad nostra pondera relatum paulo plus dimidio scripulo facit.

2. Malagmata vero, atque emplastra, pastillique, quos τροχίσκους Graeci vocant, quum plurima eadem habeant, differunt eo, quod malagmata maxime ex odoribus eorumque etiam surculis, emplastra pastillique magis ex quibusdam metallicis sunt. Deinde malagmata contusa abunde mollescunt: nam super integram cutem injiciuntur: laboriose vero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastillique fiunt, ne laedant vulnera, quum imposita sunt. Inter emplastrum autem et pastillum hoc interest, quod emplastrum utique liquati aliquid accipit: in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore junguntur. Tum emplastrum hoc modo fit: arida medicamenta per se teruntur; deinde mixtis his instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est, et ea rursus ex eo teruntur: ea vero, quae liquari possunt, ad ignem simul liquantur; et si quid olei misceri debet, tum infunditur: interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Ubi facta sunt, quae separatim fieri debuerunt, in unum omnia miscentur. At pastilli haec ratio est: arida medicamenta contrita humore non pingui, ut vino, vel aceto, coguntur, et rursus coacta, inarescunt; atque, ubi utendum est, ejusdem generis humore diluuntur. Tum emplastrum imponitur, pastillus illinitur, aut alicui molliori ut cerato, miscetur.

CAPUT XVIII.

De Malagmatis.

30

His cognitis, primum malagmata subjiciam, quae fere non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen, quod refrigerare possit, ad calidas podagras aptum. Habet gallae et immaturae et alterius, coriandri seminis, cicutae, lacrimae aridae, gummis, singulorum plenum acetabulum, cerati eloti, quod πεπλυμένον Graeci vocant, seli-

bram. Reliqua fere calefaciunt: sed quaedam digerunt materiam, quaedam extrahunt, quae ἐπισπαστικά vocantur; pleraque certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

5 2. Si materia extrahenda est, ut in lateris dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoque mediocri, aptum est id quod habet resinae aridae, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum pondo, cerae pondo. Aut in quo haec sunt: aeruginis rasae, turis, singulorum p.)-(. II. ammoniaci salis
10 p.)-(. VI. squamae aeris, cerae, singulorum p.)-(. VIII. resinae aridae p.)-(. XII. aceti cyathus (Galenus, *De compositis. Medicam. secundum genera* VI, 14). Idem praestat cumini farina cum struthio, et melle.

3. Si jecur dolet, id in quo est balsami lacrimae p.
15)-(. XII. costi, cinnamomi, casiae corticis, myrrhae, croci, junci rotundi, balsami seminis, iridis illyricae, cardamomi, amomi, nardi, singulorum p.)-(. XVI. quibus adjicitur nardinum unguentum, donec cerati crassitudo sit. Et hujus quidem recentis usus est: si vero servandum est, resinae
20 terebinthinae p.)-(. XVI. cerae p.)-(. X. ex vino leni contunduntur, tum eo miscentur.

4. At si lienis torquet, glandis, quam βάλανον μυρεψικήν Graeci vocant, cortex et nitrum paribus portionibus contunduntur, respergunturque aceto quam acerrimo: ubi
25 cerati crassitudinem habet, linteo ante in aqua frigida madefacto illinitur, et sic imponitur; supraque farina hordeacea injicitur: sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat; satiusque est id bis, aut ter fieri.

5. Commune autem jocinori, et lieni, Lysias composuit
30 ex his: opopanax, styracis, galbani, resinae, singulorum p.)-(. II. ammoniaci, bdellii, cerae, sevi taurini, iridis aridae p.)-(. IV. cachryos acetabulo, piperis granis quadraginta: quae contrita irino unguento temperantur.

6. Ad laterum autem dolores compositio est Apollo
35 phanis: in qua sunt resinae terebinthinae, turis fuliginis, singulorum p.)-(. IV. bdellii, ammoniaci, iridis, sevi vstulini, aut caprini a renibus, visci, singulorum p.)-(. IV. haec

autem eadem omnem dolorem levant, dura emolliunt, medicriter calefaciunt (Gal. S. G. VII, 7).

7. Ad idem Andreae quoque malagma est; quod etiam resolvit, humorem educit, pus maturat, ubi id maturum est, cutem rumpit, ad cicatricem perducit. Prodest impositum⁵ minutis majoribusque abscessibus; item articulis, ideoque et coxis, et pedibus dolentibus; item, si quid in corpore collisum est, reficit; praecordia quoque dura et inflata emollit; ossa extrahit: ad omnia denique valet, quae adjuvare calor potest. Id habet cerae p.)-(. XI. visci, sycamini, quam alias¹⁰ sycomorum vocant (cf. III, 18), lacrimae, singulorum p.)-(. I. piperis et rotundi, et longi, ammoniaci thymiamatis, bdellii, iridis illyricae, cardamomi, amomi, xylobalsami, turis massuli, myrrhae, resinae aridae, singulorum p.)-(. X. pyrethri, cocci gnidii, spumae nitri, salis ammoniaci, aristolo-¹⁵ chiae creticae, radices ex cucumere agresti, resinae terebinthinae liquidae, singulorum p.)-(. XX. quibus adjicitur unguenti irini, quantum satis est ad ea mollienda atque cogenda (Galenus, *De compositione medicam. secundum locos* X, 2).²⁰

8. Praecipuum vero est ad resolvenda quae adstricta sunt, mollienda quae dura sunt, dirigenda quae coeunt, id quod ad Polyarchum auctorem refertur. Habet junci quadrati, cardamomi, turis fuliginis, amomi, cerae, resinae liquidae pares portiones.²⁵

9. Aliud ad eadem Nilei: crocomagmatis (cf. Plin. XXI, 20, 82) p.)-(. IV. ammoniaci thymiamatis, cerae, singulorum p.)-(. XX. ex quibus duo priora ex aceto teruntur, cera cum rosa liquatur, et tum omnia junguntur (Gal. I. I. VIII, 5).

10. Proprie etiam dura emollit id, quod Moschi esse³⁰ dicitur. Habet galbani unciam, turis fuliginis p. z. cerae, ammoniaci thymiamatis trientes, picis aridae p. II. aceti heminas tres (Gal. S. L. IV, 8).

11. Fertur etiam ad digerenda quae coeunt, sub auctore Medio, quod habet cerae p. z. panacis p.)-(. s. squamae³⁵ aeris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum p.)-(. I. plumbi combusti p.)-(. I. s.

12. Ad eadem Panthemus utebatur calcis p. s. sinapis contriti, item foeni graeci, aluminis, singulorum p. I. sevi bubuli p. II. s.

13. 14. Ad strumam multa malagmata invenio. Credo autem, quo pejus id malum est, minusque facile discutitur, eo plura esse tentata; quae in personis varie responderunt. Andreas auctor est, ut haec misceantur: urticae seminis p.)-(I. piperis rotundi, bdellii, galbani, ammoniaci thymiamatis, resinae aridae, singulorum p.)-(IV. resinae liquidae, cerae, pyrethri, piperis longi, lactucae marinae seminis, sulphuris ignem non experti, quod *ἄπυρον* vocatur, faecis aridae aceti, spumae nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis ex cucumere silvestri, resinae, singulorum p.)-(VIII. quae ex leni vino contunduntur (Gal. 15 l. I. X, 2).

15. Expeditius ad idem fit, quod habet visci * seminis, stercoris, resinae, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris p.)-(I. lapidis, quem pyriten vocant, p.)-(IV. cumini acetabulum. Item in quo est lapidis ejusdem pars una, sulphuris duae partes, resinae terebinthinae partes tres.

16. Arabis autem cujusdam est ad strumam, et orientia tubercula, quod haec digerit. Habet myrrhae, salis ammoniaci, turis, resinae et liquidae et aridae, crocomagmatis, cerae, singulorum p.)-(I. lapidis ejus, quem pyriten vocant, p.)-(IV. quibus quidam adjiciunt sulphuris p.)-(II.

17. Est etiam proficiens in struma, et in iis tuberculis, quae difficiliter concoquuntur, et in iis, quae *καρκινώδη* vocantur, quod ex his constat: sulphuris p.)-(II. nitri p.)-(IV. myrrhae p.)-(VI. fuliginis turis p. s. salis ammoniaci p. z. cerae p. I.

18. Protarchus autem ad *παρωτίδας*, eaque tubercula, quae *μελικηρίδες* nominantur, item mala ulcera, pumicis, resinae pineae liquidae, turis fuliginis, spumae nitri, iridis, singulorum p.)-(VIII. cum cerae p.)-(IX. miscebat, hisque olei cyathum et dimidium adjiciebat.

19. At adversus panum tum primum orientem, quod

φύγεθλον Graeci vocant, et omne tuberculum, miscetur ochra, quae Attice nominatur, cum duabus partibus similae, hisque, dum contunduntur, subinde mel instillatur, donec malagmatis crassitudo sit.

20. Discutit etiam omne tuberculum, id quod habet calcis, nitri spumae, piperis rotundi, singulorum p.)-(. I. galbani p.)-(. II. salis p.)-(. IV. quae excipiuntur cerato ex rosa facto.

21. Supprimitque omne, quod abscedit, id in quo est galbani, fabae fresae, singulorum p.)-(. I. myrrhae, turis, ex radice capparidis corticis, singulorum p.)-(. IV. Satisque omnia abscedentia digerit murex combustus, et bene contritus, aceto subinde adjecto.

22. * At si satis sanguis subit, recte imponitur, quod adversus phymata quoque potest. Constat ex his: bdellii, styracis, ammoniaci, galbani, resinae et aridae et liquidae pineae, item ex lentisco, turis, iridis, singulorum p.)-(. II.

23. Καρκινώδη vero commode his leniuntur: galbani, visci, ammoniaci, resinae terebinthinae, singulorum p.)-(. I. sevi taurini p. s. faecis combustae quam maxima portione, dum id siccus non faciat, quam esse malagma oportet.

24. Quod si facie contusa livor subcruentus est, haec compositio nocte et die imposita tollit. Aristolochiae, thapsiae, singulorum p.)-(. II. bdellii, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galbani, resinae aridae, et ex lentisco liquidae, turis masculi, iridis illyricae, cerae, singulorum p.)-(. IV. Idem faba quoque imposita proficit.

25. Sunt etiam quaedam malagmata, quae ἀναστομωτικά Graeci vocant (Gal. Med. simpl. V, 14), quoniam aperiendi vim habent. Quale est, quod ex his constat: piperis longi, spumae nitri, singulorum p.)-(. II. erysimi p.)-(. IV. quae cum melle miscentur. Idoneaeque etiam strumae aperiendae sunt. Ejus generis, vehementiusque ex his est id, quod habet calcis p.)-(. IV. piperis grana sex, nitri, cerae, singulorum p.)-(. X. mellis p. z. olei heminam.

26. Niconis quoque est quod resolvit, aperit, purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum, pumicem, paribus por-

tionibus; quibus tantum picis, et cerae adjicitur, ut fiat cerati crassitudo.

27. Ad ossa autem Aristogenis fit ex his: sulphuris p.)-(I. resinae terebinthinae, nitri spumae, et ex scilla
5 partis interioris, plumbi eloti, singulorum p.)-(II. turis fuliginis p.)-(VIII. ficus aridae quam pinguisssimae, sevi taurini, singulorum p.)-(VIII. cerae p.)-(XII. iridis macedonicae p.)-(VI. sesami fricti acetabulum.

28. Maximeque nervis et articulis malagma convenit.
10 Igitur Euthylei est, et ad articulos, et ad omnem dolorem, et ad vesicae, et ad recenti cicatrice contractos articulos, quae ἀγκύλας Graeci nominant, conveniens; quod habet
fuliginis turis acetabulum, resinae tantumdem, galbani sine
surculis sescunciam, ammoniaci, bdellii, singulorum p. z.
15 cerae p. s. Ad eosdem * digitos: iridis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum p.)-(XIV. resinae liquidae p.)-(VI. cerae p.)-(XVI.

29. Ad dolores articulorum, Sosagorae: plumbi combusti, papaveris lacrimae, corticis hyoscyami, styracis,
20 peucedani, sevi, resinae, cerae pares portiones.

30. Chrysippi: resinae liquidae, sandarachae, piperis, singulorum p.)-(XII. quibus cerae paululum adjicitur.

31. Ctesiphontis: cerae creticae, resinae terebinthinae, nitri quam ruberrimi, singulorum p. s. olei cyathi tres. Sed
25 id nitrum ante per triduum, instillata aqua, teritur, et cum sextario ejus incoquitur, donec omnis humor consumatur. Potest vero ea compositio etiam ad parotidas, phymata, strumam, omnemque coitum humoris emolliendum (Gal. S. L. VI, 14).

32. Ad articulos, fici quoque aridae partem nepetae
30 mixtam; vel uvam taminiam sine seminibus cum pulegio recte aliquis imponit.

33. Eadem podagrae praesidio sunt. Sed ad eam fit Aristonis quoque, quod habet nardi, cinnamomi, casiae, chamaeleontis, junci rotundi, singulorum p.)-(VIII. sevi
35 caprini ex irino liquati p.)-(XX. iridis p.)-(I. quae in aceto quam acerrimo jacere per XX. dies debet. Idem autem etiam recentia phymata doloresque omnes discutit.

34. At Theoxenus ad pedum dolores, sevi a renibus

partem tertiam, salis partes duas miscebat, hisque membranulam illitam imponebat; tum superinjiciebat ammoniacum thymiama in aceto liquatum.

35. At Numenius podagram, ceterosque articulos induratos hoc mollebat: abrotoni, rosae aridae, papaveris la-
crimae, singulorum p.)-(. III. resinae terebinthinae p.)-(. IV. turis, spumae nitri, singulorum p.)-(. VIII. iridis, aristolochiae, singulorum p.)-(. XII. cerae p. III. quibus adjicitur cedri cyathus unus, olei laurei cyathi tres, olei acerbi sextarius.

36. Si quando autem in articulis callus increvit, Dexius 10 docuit imponere calcis p.)-(. IV. cerussae p.)-(. VIII. resinae pineae p.)-(. XX. piperis grana XXX. cerae p. z. quibus, dum contunduntur, hemina vini lenis instillatur.

CAPUT XIX.

De Emplastris.

15

Ex emplastris autem nulla majorem usum praestant, quam quae cruentis protinus vulneribus injiciuntur: *ἐναιμα* Graeci vocant. Haec enim reprimunt inflammationem, nisi magna vis eam cogit, atque illius quoque impetum minuunt, tum glutinant vulnera quae id patiuntur, cicatricem iisdem 20 inducunt. Constant autem ex medicamentis non pinguibus; ideoque alipenae nominantur (Gal. S. G. I, 15).

1. Optimum ex his est, quod barbarum vocatur. Habet aeruginis rasae p.)-(. XII. spumae argenti p.)-(. XX. aluminis, picis aridae, resinae pineae aridae, singulorum p.)-(. I. 25 quibus adjiciuntur olei et aceti singulae heminae (Gal. S. G. II, 22, t. XIII, p. 556).

2. Alterum ad idem, quod *κωακόν* vocant, habet spumae argenti p.)-(. C. resinae aridae tantumdem: sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris 30 color niger est, qui fere talis fit ex pice atque resina: at ex bitumine nigerrimus; ex aerugine, aut aeris squama, viridis; ex minio ruber; ex cerussa albus.

3. Paucae admodum compositiones sunt, in quibus aliquid mixturae varietas novat. Ergo id quoque nigrum est, 35 quod *βασίλικόν* nominatur (cf. Gal. S. L. VIII, 5). Habet

opopanacis p.)-(I. galbani p.)-(II. picis, et resinae, singulorum p.)-(X. olei dimidium cyathum.

4. At quia perviride est smaragdinum appellatur, in quo sunt resinae pineae p.)-(III. cerae p.)-(I. aeruginis p. s. turis fuliginis p. z. olei tantundem, aceti, quo fuligo et aerugo in unum cogantur (Gal. S. G. II, 2).

5. Est etiam coloris fere rufi, quod celeriter ad cicatricem vulnera perducere videtur. Habet turis p.)-(I. resinae p.)-(II. squamae aeris p.)-(IV. spumae argenti
10 p.)-(XX. cerae p.)-(C. olei heminam.

6. Praeterea est, quam *ῥάπτουσαν* a glutinando vocant (cf. 26, 23). Constat ex his: bituminis, aluminis scissilis, p.)-(IV. spumae argenti p.)-(XL. olei veteris hemina.

7. Praeterea sunt quaedam generis ejusdem, quae, quia
15 capitibus fractis maxime conveniunt, *κεφαλικά* a Graecis nominantur. Philotae (Gal. S. G. IV, 13) compositio habet terrae eretriae, chalcitidis, singulorum p.)-(IV. myrrhae, aeris combusti, singulorum p.)-(X. ichthyocollae p.)-(VI. aeruginis rasae, aluminis rotundi, misy crudi, aristolochiae,
20 singulorum p.)-(VIII. squamae aeris p.)-(X. turis masculi p.)-(II. cerae p. I. rosae, et olei acerbi ternos cyathos, aceti quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur.

8. Aliud ad idem viride: aeris combusti, squamae aeris, myrrhae, ichthyocollae, singulorum p.)-(VI. misy crudi,
25 aeruginis rasae, aristolochiae, aluminis rotundi, singulorum p.)-(VIII. cerae p.)-(I. olei hemina, aceti quod satis sit (Gal. S. G. II, 2).

9. Puri autem movendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est: *τετραφάρμακον* a Graecis nominatur
30 (Gal. Med. simpl. XI, 1, §. 2). Habet pares portiones cerae, picis, resinae, sevi taurini; si id non est, vitulini.

10. Alterum ad idem, *έννεαφάρμακον* nominatur; quod magis purgat. Constat ex novem rebus, cera, melle, sevo, resina, myrrha, rosa, medulla vel cervina vel vitulina vel
35 bubula, oesypo, butyro: quorum ipsorum quoque pondera paria miscentur (Gal. S. L. IX, 7).

11. Sunt autem quaedam emplastra, quibus utriusque rei facultas est: quae, si singula habenda sunt, meliora sunt;

sed in copia rejicienda sunt; his potius adhibitis, quae proprie id quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam. Est igitur ad vulnera Attalum (Attalicum? — cf. Gal. *S. G.* I, 17); quod habet squamae aeris p.)-(*XVI. turis fuliginis p.*)-(*XV. ammoniaci tantumdem, resinae terebinthinae liquidae p.*)-(*XXV. sevi taurini tantumdem, aceti heminas tres, olei sextarium.* At inter ea, quae fracto capiti accommodantur, habent quidam id, quod ad auctorem Judaeum refertur (cf. Aëtius, *XV*, 14). Constat ex his: salis p.)-(*IV. squamae aeris rubri, aeris combusti, singulorum* ¹⁰ *p.*)-(*XII. ammoniaci thymiamatis, turis fuliginis, resinae aridae, singulorum p.*)-(*XVI. resinae colophoniacae, cerae, sevi vitulini curati, singulorum p.*)-(*XX. aceti sesquicyathus, olei minus cyatho.* Curata vocant, quum ex sevo, puta, omnes membranulae diligenter exemptae sunt. ¹⁵

12. Sunt etiam quaedam emplastra nobilia ad extrahendum, quae ipsa quoque *ἐπισπαστικά* nominantur (Gal. *S. G.* VI, 13): quale est quod, quia lauri baccas habet, *διὰ δαφνιδαν* appellatur. In eo est, resinae terebinthinae p.)-(*X. nitri, cerae, picis aridae, baccarum lauri, singulorum p.* ²⁰ *)-(XX. olei paulum.* Quoties aut baccam, aut nucem, aut simile aliquid posuero, scire oportebit, antequam expendatur, ei summam pelliculam esse demendam.

13. Aliud eodem nomine, quod puri quoque movendo est. Sevi vitulini, ammoniaci thymiamatis, picis, cerae, ²⁵ nitri, baccarum lauri, resinae aridae, aristolochiae, pyrethri pares portiones.

14. Praeter haec est Philocratis; quod habet salis ammoniaci p.)-(*VII. aristolochiae p.*)-(*VIII. cerae, resinae terebinthinae, fuliginis turis, singulorum p.*)-(*XV. spumae* ³⁰ *argenti p.*)-(*XXXII.* Quibus, ut pus quoque moveant, iridis p.)-(*IV. et galbani p.*)-(*VI. adjiciuntur.*

15. Optimum tamen ad extrahendum est id, quod a similitudine sordium *ὀνκωδες* Graeci appellant (Gal. *S. G.* II, 1). Habet myrrhae, croci, iridis, propolis, bdellii, capitulorum punici mali, aluminis et scissilis et rotundi, misy, chalcitidis, atramenti sutorii cocti, opopanacis, salis ammoniaci, visci, singulorum p.)-(*IV. aristolochiae p.*)-(

VIII. squamae aeris p.)-(. XVI. resinae terebinthinae p.)-(. LXXV. cerae, et sevi vel taurini vel hircini, singulorum p.)-(. C.

16. Hecataeo quoque auctore emplastrum generis ejusdem sit ex his: galbani p.)-(. II. fuliginis turis p.)-(. IV. picis p.)-(. VI. cerae, et resinae terebinthinae, singulorum p.)-(. VIII. quibus paulum irini unguenti miscetur.

17. Valensque ad idem emplastrum viride alexandrinum est. Habet aluminis scissilis p.)-(. VIII. salis ammoniaci p.)-(. VIII. z. squamae aeris p.)-(. XVI. myrrhae, turis, singulorum p.)-(. XVIII. cerae p.)-(. CL. resinae colophoniacae aut pineae p.)-(. CC. olei heminam, aceti sextarium.

18. Quaedam autem sunt emplastra exedentia, quae *σηπτά* Graeci vocant: quale est id, quod habet resinae terebinthinae, fuliginis turis, singulorum p. z. squamae aeris p.)-(. I. ladani p.)-(. II. aluminis tantumdem, spumae argenti p.)-(. IV.

19. Exest etiam vehementer corpus, atque ossa quoque resolvit, et supercrescentem carnem coercescit id, quod habet spumae argenti, squamae aeris uncias singulas, nitri ignem non experti, lapidis assii, aristolochiae p. sextantes, cerae, resinae terebinthinae, turis, olei veteris, atramenti sutorii, salis ammoniaci p. s. aeruginis rasae p. bessem, aceti sciliciti heminam, vini aminei tantumdem.

20. Sunt etiam adversus morsus quaedam accommodata; quale est Diogenis nigrum, quod habet bituminis, cerae, resinae pineae aridae, singulorum p.)-(. XX. spumae argenti p.)-(. C. olei sextarium. Aut in quo sunt squamae aeris p.)-(. IV. cerussae, et aeruginis rasae, singulorum p.)-(. VIII. ammoniaci p.)-(. XII. cerae, resinae pineae, singulorum p.)-(. XXV. spumae argenti p.)-(. C. olei sextarium. Aut in quo sunt squamae aeris p.)-(. XIV. galbani p.)-(. VI. cerussae, et aeruginis rasae, singulorum p.)-(. VIII. ammoniaci p.)-(. XII. cerae, resinae pineae, singulorum p.)-(. XXXV. Spuma argenti concoquitur.

21. Rubrum quoque emplastrum, quod Ephesium vocatur, huc aptum est. Habet resinae terebinthinae p.)-(. II. galbani p.)-(. IV. minii sinopici p.)-(. VI. turis fuliginis

p.)-(. VI. ceræ p.)-(. VIII. spumæ argenti p.)-(. XXXVI. olei veteris heminam.

22. Item id, quod ex his constat: squamæ aeris, turis fuliginis, singulorum p.)-(. IV. galbani p.)-(. VI. salis ammoniaci p.)-(. XII. z. ceræ p.)-(. XXV. olei tribus heminis. Haec autem aliis quoque recentioribus vulneribus recte imponuntur.

23. Sunt etiam alba lenia (Gal. S. G. I, 18); fere non gravibus vulneribus accommodata, præcipueque senilibus: quale est quod habet cerussæ p.)-(. XXXII. sevi vitulini curati, et ceræ, singulorum p.)-(. XLVIII. olei heminas tres, ex quibus cerussa coquitur.

24. Aliud, quod habet cerussæ p.)-(. XX. ceræ p.)-(. XXXV. olei heminam, aquae sextarium. Quæ quoties adjiciuntur cerussæ vel spumæ argenti, scire licet illa ex his coquenda esse. Est autem ea per candida compositio, ideoque elephantine nominatur.

25. Lenia quoque quaedam emplastra sunt, quas λιπαρός fere Graeci nominant; ut id quod habet minii p.)-(. IV. spumæ argenti p.)-(. XXV. ceræ, et adipis suillae, singulorum p.)-(. XXXVII. vitellos quatuor.

26. Alia compositio generis ejusdem: ceræ, resinae terebinthinae, singulorum p.)-(. VI. cerussæ p.)-(. VIII. spumæ argenti, plumbi recrementi, singulorum p.)-(. XX. cicini olei et murtei singulae heminae. 25

27. Tertia, quæ ad auctorem Archagathum refertur: misy cocti, aeris combusti, singulorum p.)-(. IV. cerussæ coctæ p.)-(. VIII. resinae terebinthinae p.)-(. X. spumæ argenti p.)-(. VI.

28. Etiamnum generis ejusdem: spumæ argenti, ceræ, 30 adipis suillae, singulorum p.)-(. XXVII. vitelli cocti quatuor, rosæ hemina. Aut cerati ex oleo murteo facti partes tres, adipis suillae pars quarta, paulum ex plumbi recremento. Aut, spumæ argenti selibra, ex olei hemina, et aquae marinae altera, cocta, donec bullire desierit, cui paulum ceræ sit adjectum. Aut, pares portiones ceræ, sevi, stibis, spumæ argenti, cerussæ.

CAPUT XX.

De pastillis.

1. Pastilli quoque facultates diversas habent. Sunt enim ad recentia vulnera glutinanda sanandaque apti: qualis est, ⁵ qui habet chalcitidis, misy, spumae nitri, floris aeris, gallae, aluminis scissilis modice cocti, singulorum p.)-(. I. aeris combusti, capitulorum mali punici, singulorum p.)-(. III. Hunc oportet diluere aceto, ac sic, ubi vulnus glutinandum est, illinire. At, si nervosus aut musculosus is locus est, ¹⁰ commodius est, cerato miscere, sic, ut illius octo partes, nona hujus sit.

Alius ad idem constat ex his: bituminis, aluminis scissilis, singulorum p.)-(. I. aeris combusti p.)-(. IV. spumae argenti p.)-(. XI. olei sextario.

¹⁵ 2. Sed longe Polyidae celeberrimus est, *σφογγίς* autem nominatur: qui habet aluminis scissilis p.)-(. I. s. atramenti sutorii p.)-(. II. myrrhae p.)-(. V. aloes tantumdem, capitulorum punici mali, fellis taurini, singulorum p.)-(. VI. quae contrita vino austero excipiuntur (Gal. S. G. V, 12).

²⁰ 3. Ad ulcera sordida, et nigritiem in auribus, naribus, obscenis partibus, inflammationesque eorum: chrysocollae p.)-(. I. atramenti sutorii, aluminis scissilis, singulorum p.)-(. II. halicaccabocorticis p.)-(. IV. minii p.)-(. VI. spumae argenti p.)-(. XII. cerussae p.)-(. XVI. quae ex aceto et ²⁵ coguntur, et, ubi utendum est, diluuntur.

4. Andronis vero est ad uvam inflammatam, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia: gallae, atramenti sutorii, myrrhae, singulorum p.)-(. I. aristolochiae, aluminis scissilis, singulorum p.)-(. II. capitulorum punici mali p. ³⁰)-(. XXV. ex passo coacta, et, quum usus exigit, aceto vel vino diluta, prout valentius aut levius vitium est, cui medendum est (*Ibid.*).

5. Proprie autem ad ani fissa, vel ora venarum fundentia sanguinem, aeruginis p.)-(. II. myrrhae p.)-(. XII. stibis, ³⁵ lacrimae papaveris, acaciae, singulorum p.)-(. XVI. quae ex vino et teruntur, et in ipso usu deliquantur (cf. *Ibid.*: *Pastillus Darii*).

6. Expellere autem ex vesica cum urina calculum videtur haec compositio: casiae, croci, myrrhae, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radices, balsami, hyperici pares portiones conteruntur; deinde vinum lene instillatur, et pastilli fiunt, qui singuli habeant p.)-(z. hique singuli quotidie mane jejuno dantur.

CAPUT XXI.

De pessis.

Haec tria compositionum genera, maximum praecipueque varium usum praestant. Sed alia quoque utilia sunt; 10 ut ea quae feminis subjiciuntur: *πασσούς* Graeci vocant. Eorum haec proprietas est: medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaque lana naturalibus conditur.

1. Ad sanguinem autem evocandum, cauneis duabus adjicitur nitri p.)-(I. aut allii semen conteritur, adjicitur 15 myrrhae paululum, et unguento susino miscetur: aut cucumeris silvestris pars interior ex lacte muliebri diluitur.

2. Ad vulvam molliendam ovi vitellus, et foenum graecum, et rosa, et crocum temperantur. Aut elaterii p.)-(z. salis tantumdem, uvae taminiae p.)-(VI. melle excipiuntur. 20

3. Aut Boetho auctore: croci, resinae terebinthinae, singulorum p.)-(IV. myrrhae p.)-(zz. rosae p.)-(I. sevi vitulini p.)-(I. z. cerae p.)-(II. miscentur.

4. Optima autem adversus inflammationes vulvae Nume-
nii compositio est, quae habet croci p.)-(z. cerae p.)-(25
I. butyri p.)-(VIII. adipis anserinae p.)-(XII. vitellos
coctos duos, rosae minus cyatho.

5. Si vero infans intus decessit, quo facilius ejiciatur, malicorium ex aqua terendum, eoque utendum est.

6. Si concidere vitio locorum mulier solet, cochleae 30 cum testis suis comburendae conterendaeque, deinde his mel adjiciendum est.

7. Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa mollienda est.

CAPUT XXII.

De medicamentis quibus aridis utimur.

1. Quaedam autem mixturae medicamentorum sunt, quibus aridis neque coactis utimur sic, ut inspergamus, aut cum aliquo liquido mixta illinamus (Cf. Gal. S. G. V, 13 et 14): quale est ad carnem supercrescentem exedendam, quod habet squamae aeris, fuliginis turis, singulorum p.)-(. I. aeruginis p.)-(. II. Haec autem eadem cum melle purgant ulcera; cum cera, implent. Misy quoque et galla, si paribus portionibus misceantur, corpus consumunt: eaque vel arida inspergere licet, vel excepta cadmia illinere.

2. Putrem vero carnem continet, neque ultra serpere patitur, et leniter exest, mel vel cum lenticula, vel cum marrubio, vel cum oleae foliis, ante ex vino decoctis: item sertula campana in mulso cocta, deinde contrita: aut calx cum cerato: aut amarae nuces cum allio sic, ut hujus pars tertia sit, paulumque his croci adjiciatur: aut quod habet spumae argenti p.)-(. VI. cornu bubuli combusti p.)-(. XII. olei murtei, et vini cyathos ternos: aut quod ex his constat: floris punici mali, atramenti sutorii, aloes, singulorum p.)-(. II. aluminis scissilis, turis, singulorum p.)-(. IV. gallae p.)-(. VIII. aristolochiae p.)-(. X. Vehementius idem facit, etiam adurendo, auripigmentum cum chalcitide, et aut nitro, aut calce, aut charta combusta: item sal cum aceto; vel ea compositio, quae habet chalcitidis, capitulum punici mali, aloes, singulorum p.)-(. II. aluminis scissilis, turis, singulorum p.)-(. IV. gallae p.)-(. VIII. aristolochiae p.)-(. X. mellis quantum satis sit ad ea cogenda: vel cantharides p.)-(. I. sulphuris p.)-(. I. lolii p.)-(. III. quibus adjicitur picis liquidae quantum satis est ad jungendum: vel chalcitis quoque cum resina et ruta mixta; aut cum eadem resina diphryges: aut uva taminia cum pice liquida, Idem vero possunt faecis vini combustae et calcis, et nitri pares portiones: vel aluminis scissilis p.)-(. zz. turis sandarachae, nitri, singulorum p.)-(. I. gallae p.)-(. VIII. aristolochiae p.)-(. X. mellis quantum satis est.

3. Est etiam Herae compositio, quae habet myrrhae,

chalcitidis, singulorum p.)-(. II. aloes, turis, aluminis scissilis, singulorum p.)-(. IV. aristolochiae, gallae immaturae, singulorum p.)-(. VIII. malicorii contriti p.)-(. X.

4. Est Judaei, in qua sunt calcis partes duae, nitri quam ruberrimi pars tertia: quae urina impuberis pueri coguntur, donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

5. At Jollas, chartae combustae, sandarachae, singulorum p.)-(. I. calcis p.)-(. II. auripigmenti tantumdem miscebat.

6. Si vero ex membrana, quae super cerebrum est, 10 profluit sanguis, vitellus combustus et contritus inspergi debet: si alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamae aeris, singulorum p.)-(. I. sandarachae p.)-(. II. marmoris cocti p.)-(. IV. Eadem cancro quoque obsistunt. Ad inducendam cicatricem, squamae aeris, turis fuliginis, 15 singulorum p.)-(. II. calcis p.)-(. IV. Eadem increscentem quoque carnem coercent.

7. Timaeus autem ad ignem sacrum et his utebatur: myrrhae p.)-(. II. turis, atramenti sutorii, singulorum p.)-(. III. sandarachae, auripigmenti, squamae aeris, singulorum p.)-(. IV. gallae p.)-(. VI. cerussae combustae p.)-(. VIII. Ea vel arida inspersa, vel melle excepta idem praestant.

8. Sternutamenta vero vel albo veratro, vel struthio coniecto in nares excitantur, vel his mixtis: piperis, veratri 25 albi, singulorum p.)-(. z. castorei p.)-(. I. spumae nitri p.)-(. I. struthii p.)-(. IV.

9. Gargarizationes autem aut laevandi causa fiunt, aut reprimendi, aut evocandi. Laevant lac, cremor vel ptisanæ, vel furfurum: reprimunt aqua, in qua vel lenticula, vel rosa, 30 vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmulae decoctae sint: evocant sinapi, piper.

CAPUT XXIII.

De antidotis, et quibus malis opitulentur.

Antidota raro, sed praecipue interdum necessaria sunt, 35 quia gravissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dan-

tur collis corporibus vel per ictus, vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum, laterum, faucium, interiorumque partium doloribus: maxime autem desideranda sunt adversus venena, vel per morsus, vel per cibos, aut potiones nostris corporibus inserta.

1. Unum est, quod habet lacrimae papaveris p.)-(. zz. acori, malabathri p.)-(. v. iridis illyricae, gummi, singulorum p.)-(. II. anisi p.)-(. III. nardi gallici, foliorum rosae aridorum, cardamomi, singulorum p.)-(. IV. petroselinii p.)-(. IV. zz. trifolii p.)-(. V. casiae nigrae, silis, bdellii, balsami seminis, piperis albi, singulorum p.)-(. V. zz. styracis p.)-(. V. zz. myrrhae, opopanax, nardi syri, turis masculi, hypocistidis succi, singulorum p.)-(. VI. castorei p.)-(. VI. costi, piperis albi, galbani, resinae terebinthinae, croci, floris junci rotundi, singulorum p.)-(. VI. zz. dulcis radices p.)-(. VIII. zz. quae vel melle vel passo excipiuntur.

2. Alterum quod Zopyrus regi Ptolemaeo dicitur composuisse, atque AMBROSIAM nominasse, ex his constat: costi, turis masculi, singulorum p.)-(. V. piperis albi p.)-(. z. floris junci rotundi p.)-(. II. cinnamomi p.)-(. III. casiae nigrae p.)-(. IV. croci cilicii p.)-(. IV. z. myrrhae, quam *στακτήν* nominant, p.)-(. V. nardi indici p.)-(. V. z. quae singula contrita melle cocto excipiuntur; deinde, ubi utendum est, id quod aegyptiae fabae magnitudinem impleat, in potione vini diluitur (Gal. *Antid.* II, 1, 8, 17).

3. Nobilissimum autem est Mithridatis (*Ibid.* II, 1, 2), quod quotidie sumendo rex ille dicitur adversus venenorum pericula tutum corpus suum reddidisse: in quo haec sunt: costi p.)-(. z. acori p.)-(. V. hyperici, gummis, sagapeni, acaciae succi, iridis illyricae, cardamomi, singulorum p.)-(. II. anisi p.)-(. III. nardi gallici, gentianae radices, aridorum rosae foliorum, singulorum p.)-(. IV. papaveris lacrimae, petroselini, singulorum p.)-(. IV. z. casiae, silis, polii, piperis longi, singulorum p.)-(. VI. styracis p.)-(. V. z. castorei, turis, hypocistidis succi, myrrhae, opopanax, singulorum p.)-(. VI. malabathri folii p.)-(. VI. floris junci rotundi, resinae terebinthinae, galbani, dauci cretici seminis,

singulorum p.)-(. VI. z. nardi, opobalsami, singulorum p.)-(. VI. z. thlaspis p.)-(. V. zz. radices ponticae p.)-(. VII. croci, zingiberis, cinnamomi, singulorum p.)-(. VIII. Haec contrita melle excipiuntur, et adversus venenum, quod magnitudinem nucis graecae impleat, ex vino datur: in ceteris autem affectibus corporis pro modo eorum, vel quod aegyptiae fabae, vel quod ervi magnitudinem impleat, satis est.

CAPUT XXIV.

De acopis.

1. Acopa quoque utilia nervis sunt: quale est quod habet floris junci rotundi p.)-(. II. zz. costi, junci quadrati, lauri baccarum, ammoniaci, cardamomi, singulorum p.)-(. III. z. myrrhae, aeris combusti, singulorum p.)-(. VII. iridis illyricae, cerae, singulorum p.)-(. XIII. alexandrini calami, junci rotundi, aspalathi, xylobalsami, singulorum p.)-(. XXVIII. sevi p. I. unguenti irini cyathum.

2. Alterum quod *εὐώδες* vocant, hoc modo fit: cerae p. z. olei tantumdem, resinae terebinthinae ad nucis juglandis magnitudinem, simul incoquuntur; deinde in mortario teruntur, instillaturque subinde quam optimi mellis acetabulum, tum irini unguenti, et rosae terni cyathi.

3. *Ἐγγύστρα* autem Graeci vocant liquida, quae illinuntur: quale est quod fit ad ulcera purganda et implenda, maxime inter nervos, paribus portionibus inter se mixtis, butyri, medullae vitulinae, sevi vitulini, adipis anserinae, 25 cerae, mellis, resinae terebinthinae, rosae, olei cicini: quae separatim omnia liquantur, deinde liquida miscentur, et tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis vero emollit, si pro rosa cyprus infunditur.

4. Ad sacrum ignem: spumae argenti p.)-(. VI. cornu 30 bubuli combusti p.)-(. XII. conteruntur, adjiciturque invicem vinum, et murteum, donec utriusque terni cyathi conciantur.

CAPUT XXV.

De Catapotiiis.

1. Catapotia quoque multa sunt, variisque de causis fiunt. *Ἀνώδυνα* vocant, quae somno dolorem levant: quibus uti, nisi nimia necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis, et stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaveris lacrimae, galbani, singulorum p.)-(. I. myrrhae, castorei, piperis, singulorum p.)-(. II. ex quibus, quod ervi magnitudinem
10 habet, satis est devorasse.

2. Alterum stomacho pejus, ad somnum valentius, ex his fit: mandragorae p.)-(. z. apii seminis, item hyoscyami seminis, singulorum p.)-(. IV. quae ex vino teruntur. Unum autem ejusdem magnitudinis, quae supra posita est,
15 abunde est sumsisse.

3. Sive autem capitis dolores, sive ulcera, sive lippitudo, sive spiritus difficultas, sive intestinorum tormenta, sive inflammatio vulvae est, sive coxa, sive jecur, aut lienis, aut latus torquet, sive vitio locorum aliquo prolabitur
20 et obmutescit, occurrit dolori per quietem ejusmodi catapotium. Silis, acori, rutae silvestris seminis, singulorum p.)-(. I. castorei, cinnamomi, singulorum p.)-(. II. papaveris lacrimae, panacis radices, mandragorae, malorum aridorum, junci rotundi floris, singulorum p.)-(. III. piperis
25 grana LVI. Haec per se contrita, rursus instillato subinde passo simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut devoratur, aut aqua diluitur, et potui datur.

4. Quin etiam silvestris papaveris, quum jam ad excipi-
30 endam lacrimam maturum est, manipulus in vas demittitur, et superinfunditur aqua, quae id contegat, atque ita coquitur. Ubi jam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus projicitur, et cum eo humore passum pari mensura miscetur, infervetque, donec crassitudinem sordium habeat. Quum
35 infixit, catapotia ex eo fiunt ad nostrae fabae magnitudinem, habentque usum multiplicem. Nam et somnum faciunt vel per se assumpta, vel ex aqua data: et aurium dolor

levant, adiectis exiguo modo rutae succi, ac passo: et tormina supprimunt ex vino liquata: et inflammationem vulvae coercent, mixta cerato ex rosa facto, cum paulum his croci quoque accessit: et ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

5
5. Item, si vulva dolens somnum prohibet: croci p.)-(. zz. anisi, myrrhae, singulorum p.)-(. I. papaveris lacrimae p.)-(. III. cicutae seminis p.)-(. VIII. miscentur, excipiunturque vino vetere, et quod lupini magnitudinem habet, in tribus cyathis aquae diluitur. Id tamen in febre periculose 10 datur.

6. Ad sanandum jecur: nitri p.)-(. z. croci, myrrhae, nardi gallici, singulorum p.)-(. I. melle excipiuntur, daturque, quod aegyptiae fabae magnitudinem habeat.

7. Ad lateris dolores finiendos, piperis, aristolochiae, 15 nardi, myrrhae pares portiones.

8. Ad thoracis: nardi p.)-(. I. turis, casiae, singulorum p.)-(. III. myrrhae, cinnamomi, singulorum p.)-(. VI. croci p.)-(. VIII. resinae terebinthinae quadrans, mellis heminae tres. 20

9. Ad tussim Athenionis: myrrhae, piperis, singulorum p.)-(. I. castorei, papaveris lacrimae, singulorum p.)-(. I. quae separatim contusa postea junguntur, et ad magnitudinem fabae nostrae, bina catapotia mane, bina noctu dormituro dantur. 25

10. Si tussis somnum prohibet, ad utrumque Heraclidis Tarentini: croci p.)-(. z. myrrhae, piperis longi, costi, galbani, singulorum p.)-(. z. cinnamomi, castorei, papaveris lacrimae, singulorum p.)-(. I.

11. Quod si purganda ulcera in faucibus tussientibus 30 sunt, panacis, myrrhae, resinae terebinthinae, singulorum p. uncia, galbani p.)-(. z. hyssopi p.)-(. III. conterenda sunt, hisque hemina mellis adjicienda, et quod digito excipi potest, devorandum est.

12. Colice vero Cassii ex his constat (Gal. S. L. IX, 4): 35 croci, anisi, castorei, singulorum p.)-(. III. petroselini p.)-(. IV. piperis et longi et rotundi, singulorum p.)-(. V. papaveris lacrimae, junci rotundi, myrrhae, nardi, singulo-

rum p.)-(VI. quae melle excipiuntur. Id autem et devorari potest, et ex aqua calida sumi.

13. Infantem vero mortuum, aut secundas expellit aquae potio, cui salis ammoniaci p.)-(I. aut cui dictami cretici p.)-(I. adiectum est.

14. Ex partu laboranti erysimum ex vino tepido jejunaè dari debet.

15. Vocem adjuvat turis p.)-(I. in duobus cyathis vini datum.

10 16. Adversus urinae difficultatem: piperis longi, castorei, myrrhae, galbani, papaveris lacrimae, croci, costi, unciae singulae, styracis, resinae terebinthinae, pondo sextantes, melampsithii cyathus: ex quibus ad magnitudinem fabae aegyptiae et mane et coenato dari debet.

15 17. Arteriae vero hoc modo fit: casiae, iridis, cinnamomi, nardi, myrrhae, turis, singulorum p.)-(I. croci p.)-(I. z, piperis grana XXX ex passi tribus sextariis decoquuntur, donec mellis crassitudo his fiat; aut croci, myrrhae, turis, singulorum p.)-(I. conjiciuntur in passi eundem modum, eodemque modo decoquuntur: aut ejusdem
20 passi heminae tres usque eo coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat; eo adjicitur tritae casiae p.)-(I.

CAPUT XXVI.

De quinque generibus noxarum corporis et primo de vulneribus.

25 Quum facultates medicamentorum proposuerim, genera in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt: quum quid extrinsecus laesit, ut in vulneribus; quum quid intra seipsum corruptum est, ut in cancro; quum quid innatum est, ut in vesica calculus; quum quid increvit, ut vena,
30 quae intumescens in varicem convertitur; quum quid deest, ut quum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt in quibus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ego, dilatis iis quae praecipue scalpellum et manum postulant, nunc de iis dicam quae maxime medicamentis egent. Dividam autem
35 hanc quoque curandi partem, sicut priorem; et ante dicam

de iis quae in quamlibet partem corporis incident; tum de iis quae certas partes infestant. Incipiam a vulneribus.

1. In his autem ante omnia scire medicus debet, quae insanabilia sint, quae difficilem curationem habeant, quae promptiorem. Est enim prudentis hominis, primum eum, qui servari non potest, non attingere, nec subire speciem ejus ut occisi, quem sors ipsius interemit (Hipp. *De arte* 13): deinde, ubi gravis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis in difficili spem esse; ne, si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse videatur. Sed ut haec prudenti viro conveniunt, sic rursus histrionis est, parvam rem attollere, quo plus praestitisse videatur. Obligarique aequum est confessione promptae rei, quo curiosius etiam circumspectat, ne, quod per se exiguum est, majus curantis negligentia fiat. 15

2. Servari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui jecinoris portae, cui in spina medulla percussa est; cuive aut pulmo medius, aut jejunum, aut tenuius intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt; cuive circa fauces grandes venae, vel arteriae praecisae sunt 20 (cf. *Aph.* VI, 18 et 23; *Coac.* 499).

3. Vix autem ad sanitatem perveniunt, quibus ulla parte aut pulmo, aut jecinoris crassum, aut membrana, quae continet cerebrum, aut lienis, aut vulva, aut vesica, aut ullum intestinum, aut septum transversum vulneratum est. Ii quoque in praecipiti sunt, in quibus usque ad grandes intusque conditas venas in alis, vel poplitibus mucro desedit. Periculosa etiam vulnera sunt, ubicumque venae majores sunt, quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt: idque evenit non in alis tantum atque poplitibus, sed etiam 30 in iis venis quae ad anum testiculosque perveniunt. Praeter haec malum vulnus est, quodcumque in alis, vel feminibus, vel inanibus locis, vel in articulis, vel inter digitos est: item quodcumque muscolum, aut nervum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem laesit (*Aph.* VI, 19; *35* *Coac.* 494). Tutissimum omnium, quod in carne est.

4. Et haec quidem loco vel pejora, vel meliora sunt. Modo vero periculum facit quodcumque magnum est.

5. Aliquid etiam in vulneris genere figuraque est. Nam pejus est, quod etiam collisum, quam quod tantum discissum est: adeo ut acuto quoque, quam retuso telo, vulnerari commodius sit. Pejus etiam vulnus est, ex quo aliquid excisum est; ex quoque caro alia parte abscissa, alia dependet. Pessimaque plaga in orbem est; tutissima, quae lineae modo recta est. Quo deinde propius huic illive figurae vulnus est, eo vel deterius vel tolerabilius est.

6. Quin etiam confert aliquid et aetas, et corpus, et vitae propositum, et anni tempus: quia facilius sanescit puer vel adolescens, quam senior; valens, quam infirmus; neque nimis tenuis, neque nimis plenus, quam si alterum ex his est; integri habitus, quam corrupti; exercitatus, quam iners; sobrius et temperans, quam vino venerique deditus. Oppor-
15 tunissimumque curationi tempus vernum est, aut certe neque fervens, neque frigidum: siquidem vulnera et nimius calor et nimium frigus infestant; maxime tamen horum varietas: ideoque perniciosissimus autumnus est.

7. Sed pleraque ex vulneribus oculis subjecta sunt: quorundam ipsae sedes indices sunt; quas alio loco demonstravimus, quum positus interiorum partium ostendimus. Verumtamen, quia quaedam vicina sunt, interestque, vulnus in summa parte sit, an penitus penetraverit, necessarium est notas subicere, per quas quid intus ictum sit, scire
25 possimus; et ex quibus vel spes, vel desperatio oriatur.

8. Igitur, corde percusso, sanguis multus fertur, venae elanguescunt, color pallidissimus, sudores frigidi, malique odoris, tamquam irrorato corpore oriuntur: extremisque partibus frigidis matura mors sequitur.

30 9. Pulmone vero icto, spirandi difficultas est; sanguis ex ore spumans, ex plaga ruber, simulque etiam spiritus cum sono fertur; in vulnus inclinari juvat: quidam sine ratione consurgunt: multi si in ipsum vulnus inclinati sunt, loquuntur; si in aliam partem, obmutescunt.

35 10. Jecinoris autem vulnerati notae sunt: multus sub dextra parte praecordiorum profusus sanguis; ad spinam reducta praecordia; in ventrem cubandi dulcedo; punctio-
nes, doloresque usque ad jugulum, junctumque ei latr

scapularum os, intenti: quibus nonnumquam etiam bilis vomitus accedit.

11. Renibus vero percussis, dolor ad inguina testiculosque descendit; difficulter urina redditur; eaque aut est cruenta, aut cruor fertur.

12. At liene icto, sanguis niger a sinistra parte prorumpit; praecordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt; sitis ingens oritur; dolor ad jugulum, sicut jecinore vulnerato, venit.

13. At quum vulva percussa est, dolor in inguinibus, et coxis, et feminibus est; sanguinis pars per vulnus, pars per naturale descendit; vomitus bilis insequitur; quaedam obmutescunt; quaedam mente labuntur; quaedam, sui compotes, nervorum oculorumque dolore urgeri se confitentur; morientesque eadem, quae corde vulnerato patiuntur.

14. Sin cerebrum membranave ejus vulnus accepit, sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit; fereque bilis vomitus insequitur (cf. *Aph.* VI, 50; *Coac.* 490); quorundam sensus obtunduntur, appellatique ignorant; quorundam trux vultus est; quorundam oculi, quasi resoluti, huc atque illuc moventur; fereque tertio, vel quinto die delirium accedit; multorum etiam nervi distenduntur: ante mortem autem plerique fascias, quibus caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori objiciunt.

15. Ubi stomachus autem percussus est, singultus, et bilis vomitus insequitur; si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito; venarum motus elanguescunt; sudores tenues oriuntur, per quos extremae partes frigescent.

16. Communes vero jejuni intestini et ventriculi vulnerati notae sunt: nam cibus et potio per vulnus exeunt; praecordia indurescunt; nonnumquam bilis per os redditur: intestino tantum sedes inferior est. Cetera intestina icta vel stercus, vel odorem ejus exhibent.

17. Medulla vero, quae in spina est, discissa, nervi resolvuntur, aut distenduntur; sensus intercidit; interposito tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt.

18. At si septum transversum percussus est, praecordia

sursum contrahuntur; spina dolet; spiritus rarus est; sanguis spumans fertur.

19. Vesica vero vulnerata, dolent inguina; quod super pubem est, intenditur; pro urina, sanguis; at ex ipso vulnere urina descendit; stomachus afficitur; itaque aut bilem vomunt, aut singultiunt; frigus, et ex eo mors sequitur.

20. His cognitis, etiamnum quaedam alia noscenda sunt, ad omnia vulnera ulceraque, de quibus dicturi sumus, pertinentia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis
10 omnibus notus est; sanies est tenuior hoc, varie crassa et glutinosa et colorata; pus crassissimum albidissimumque, glutinosius et sanguine et sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut jam sanescente; sanies inter utrumque
15 et sanies et pus quasdam species graecis nominibus distinctas habent. Est enim quaedam sanies, quae vel *ἰχώρ*, vel *μεικνῆρα* nominatur: est pus, quod *ἐλαιῶδες* appellatur. *ἰχώρ* tenuis, subalbidus, ex malo ulcere exit, maximeque ubi nervo laeso, inflammatio sequuta est. Melicera crassior
20 est, glutinosior, subalbida, mellique albo subsimilis. Fertur haec quoque ex malis ulceribus, ubi nervi circa articulos laesi sunt; et inter haec loca, maxime ex genibus. *Ἐλαιῶδες* tenue, subalbidum, quasi unctum, colore atque pinguitudine oleo albo non dissimile apparet in magnis ulceribus sane-
25 scentibus. Malus autem est sanguis nimium aut tenuis, aut crassus, colore vel lividus, vel niger, aut pituita mixtus, aut varius: optimus calidus, ruber, modice crassus, non glutinosus. Itaque protinus ejus vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit: itemque postea
30 spes in iis major est, ex quibus melioris generis quaeque proveniunt. Sanies igitur mala est multa, nimis tenuis, livida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quae et ipsum ulcus, et junctam ei cutem erodit: melior est non multa, modice crassa, subrubicunda, aut subalbida.
35 *ἰχώρ* autem peior est multus, crassus, sublividus aut subpallidus, glutinosus, acer, calidus, mali odoris: tolerabilior est subalbidus, qui cetera omnia contraria prioribus habet. Melicera autem mala est multa et percrassa: melior quae et

tenuior et minus copiosa est. Pus inter haec optimum est. Sed id quoque pejus est multum, tenue, dilutum; magisque si ab initio tale est: itemque si colore sero simile, si pallidum, si lividum, si faeculentum est: praeter haec si male olet; nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius: itemque si laeve est, si nihil olet, si aequale est. Modo tamen convenire et magnitudini vulneris, et tempori debet: nam plus ex majore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. *Ἐλαιῶδες* quoque pejus est multum, et parum pingue: quo minus ejus, 10 quoque id ipsum pinguius, eo melius est.

21. Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est, qui servari potest, protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis profusio, neve inflammatio interimat. Si profusionem timemus (quod ex sede vulneris, et ex magnitudine ejus, et ex im- 15 petu ruentis sanguinis intelligi potest); siccis linamentis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia ex aqua frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, saepius linamenta mutanda sunt; et, si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id ve- 20 hemens ad sanguinem supprimendum est; ideoque quidam id vulneri infundunt. Sed alius rursus metus subest; ne, nimis valenter ibi retenta materia, magnam inflammationem postea moveat. Quae res efficit, ut neque rodentibus medicamentis, neque adurentibus, et ob id ipsum inducentibus 25 crustam, sit utendum; quamvis pleraque ex his sanguinem suppressunt: sed, si semel ad ea decurritur, iis potius, quae mitius idem efficiunt. Quod si illa quoque profluvio vincuntur, venae quae sanguinem fundunt, apprehendendae, circaque id quod ictum est, duobus locis deligandae, interci- 30 dendaeque sunt (cf. Aët. XIV, 51; Paul. Aegin. IV, 53), ut et in se ipsae coeant, et nihilominus ora praeclusa habeant. Ubi ne id quidem res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco quo neque nervus, neque musculus est, ut, puta, in fronte, 35 vel superiore capitis parte, commodissimum tamen est cucurbitulam admoveere a diversa parte, ut illuc sanguinis cursus revocetur.

22. Et adversus profusionem quidem in his auxilium est: adversus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu. Ea timeri potest, ubi laesum est vel os, vel nervus, vel cartilago, vel musculus; aut ubi parum sanguinis pro modo
 5 vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem mature suppressere non oportebit; sed pati fluere, dum tutum erit, adeo ut si parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat; utique si corpus juvenile et robustum et exercitatum est: multoque magis, si id vulnus ebrietas prae-
 10 cessit. Quod si musculus laesus videbitur, praecidendus erit: nam percussus, mortiferus est; praecisus, sanitatem recipit.

23. Sanguine autem vel suppresso, si nimius erumpit; vel exhausto, si per se parum fluxit; longe optimum est vulnus glutinari. Potest autem id quod vel in cute, vel
 15 etiam in carne est, si nihil ei praeterea mali accedit: potest caro alia parte dependens, alia inhaerens; si tamen etiamnum integra est, et conjunctione corporis fovetur. In iis vero quae glutinantur, duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte est, sui debet; maximeque, si discissa auris
 20 ima est, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis, vel venter. Si vero in carne vulnus est, hiatque, neque in unum orae facile attrahuntur, sutura quidem aliena est; imponendae vero fibulae sunt; ἀγκυρῆρας Graeci nominant; quae oras, paulum tamen
 25 contrahant, quo minus lata postea cicatrix sit. Ex his autem colligi potest, id quoque quod alia parte dependens, alia inhaerebit, si alienatum adhuc non est, suturam, an fibulam postulet. Ex quibus neutra ante debet imponi, quam intus vulnus purgatum est; ne quid ibi concreti sanguinis relin-
 30 quatur. Id enim et in pus vertitur, et inflammationem movet, et glutinari vulnus prohibet. Ne linamentum quidem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est, ibi relinquendum est: nam id quoque inflammat. Comprehendi vero sutura, vel fibula, non cutem tantum, sed aliquid etiam ex carne,
 35 ubi suberit haec, oportebit; quo valentius haereat, neque cutem abruptat. Utraque optima est ex acia molli, non nimis torta, quo mitius corpori insidat. Utraque neque nimis rara, neque nimis crebra injicienda. Si nimis rara est, non

continet: si nimis crebra est, vehementer afficit: quia, quo saepius acus corpus transsuit, quoque plura loca injectum vinculum mordet, eo majores inflammationes oriuntur; magisque aestate. Neutra etiam vim ullam desiderat; sed eatenus utilis est, qua cutis ducentem quasi sua sponte subse-
 quitur. Fere tamen fibulae latius vulnus esse patiuntur: sutura oras jungit, quae ne ipsae quidem inter se contingere ex toto debent; ut si quid intus humoris concreverit, sit qua emanet. Si quod vulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet. Deinde omni vulnere primo imponenda est spongia ex aceto expressa: si sustinere aliquis aceti vim non potest, vino utendum est. Levius plaga juvatur etiam, si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. Sed ea, quocumque modo imposita est, dum madet, prodest: itaque, ut inarescat, non est committendum. Licetque sine peregrinis, et conquisitis, et compositis medicamentis vulnus curare. Sed si quis huic parum confidit, imponere medicamentum debet, quod sine sevo compositum sit ex iis, quae cruentis vulneribus apta esse proposui; maximeque si caro est, barbarum; si nervi, vel cartilago, vel aliquid ex eminentibus, quales aures, vel labra sunt, Polyidae sphragidem (cf. 20, 2). Alexandrinum quoque viride (19, 17) nervis idoneum est: eminentibusque partibus ea quam Graeci *ῥάπτουσαν* vocant (cf. 19, 6). Solet etiam, colliso corpore, exigua parte findi cutis. Quod ubi incidit, non alienum est scalpello latius aperire; nisi muscoli, nervique juxta sunt, quos incidi non expedit: ubi satis diductum est, medicamentum imponendum est. At si id quod collisum est, quamvis parum diductum est, latius tamen aperiri propter nervos aut musculos non licet, adhibenda sunt ea quae humorem leniter extrahant; praecipueque ex his id, quod *ὀυπῶδες* vocari proposui (19, 15). Non alienum est etiam, ubicumque vulnus grave est, imposito quo id juvetur, insuper circumdare lanam succidam ex aceto et oleo: vel cataplasma, si mollis is locus est, quod leniter reprimat; si nervosus, aut musculosus, quod emolliat.

24. Fascia vero ad vulnus deligandum lintea aptissima est; eaque lata esse debet, ut semel injecta non vulnus tan-

tum, sed paulum utrimque etiam oras ejus comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur: si aequè ab utraque, transversa comprehendere oras debet; aut si id vulneris ratio non patitur, media primum
 5 injicienda est; ut tum in utramque partem ducatur. Sic autem deliganda est, ut et contineat, neque adstringat: quod non continetur, elabitur; quod nimis adstrictum est, cancro periclitatur. Hieme saepius fascia circumire debet: aestate quoties necesse est. Tum extrema pars ejus inferioribus acu
 10 assuenda est: nam nodus vulnus laedit, nisi tamen longe est. Illo neminem decipi decet, ut propriam viscera curationem requirant, de quibus supra posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus vel sutura, vel alio medicinae genere est. In visceribus nihil movendum est; nisi, ut si quid aut
 15 ex jecinore, aut liene, aut pulmone dumtaxat extremo dependet, praecidatur. Alioquin vulnus interius ea victus ratio, eaque medicamenta sanabunt, quae cuique visceri convenire superiore libro proposui.

25. His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est; isque, si grave vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem, cibo debet; bibere, donec sitim finiat, aquam calidam, vel, si aestas est, ac neque febris, neque dolor est, etiam frigidam. Adeo tamen nihil perpetuum est, sed semper pro vi corporis aestimandum, ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit; tenuem scilicet, et exiguum, qui tantum sustineat. Multique etiam ex profluvio sanguinis intermorientes ante ullam curationem vino reficiendi sunt: quod alioqui inimicissimum vulneri est.

30 26. Nimis vero intumescere vulnus, periculosum; nihil intumescere, periculosissimum est (cf. *Aph.* V, 66): illud indicium est magnae inflammationis; hoc emortui corporis. Protinusque, si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet mature vulnus sanum fore. Ac ne febris quidem
 35 terrere debet, si in magno vulnere, dum inflammatio est, permanet. Illa perniciosa est, quae vel levi vulnere supervenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium movet: vel si nervorum rigor, aut distentio, quae

vulnere orta est, ea non finitur (cf. *Aph.* II, 26; *Coac.* 350). Vomitus quoque biliosus non voluntarius, vel protinus ut percussus est aliquis, vel dum inflammatio manet, malum signum est in iis dumtaxat, quorum vel nervi, vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere, non alienum est; praecipue iis, quibus in consuetudine fuit: sed neque protinus post cibum, neque jam inflammatione orta, neque quum in superioribus partibus plaga est.

27. Biduo sic vulnere habito, tertio die id aperiendum, tergendaque sanies ex aqua frigida est, eademque rursus¹⁸ injicienda sunt. Quinto jam die, quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die, rursus detecto vulnere, considerandus color est: qui si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger est, scire licet malum vulnus esse; idque quodcumque animadversum est, terrere nos potest. Album, aut¹⁵ rubicundum esse, commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit: bona signa sunt, ubi haec sine dolore, tenuis et mollis est. Sed si glutinatur vulnus, aut leviter intumuit, eadem sunt imponenda quae primo fuerunt; si gravis inflammatio est, neque glutinandi spes est, ea²⁰ quae pus moveant. Jamque aquae quoque calidae necessarius usus est, ut et materiam digerat, et duritiam emolliat, et pus citet. Ea sic temperanda est, ut manu contingenti jucunda sit; et usque eo adhibenda, donec aliquid ex tumore minuisse, coloremque ulceri magis naturalem reddidisse videatur.²⁵ Post id fomentum, si late plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet; maximeque, si grande vulnus est, tetrapharmacum (19, 9); si in articulis, digitis, locis cartilaginosis, rhyppodes (19, 15): at si latius hiat, idem illud emplastrum liquari ex irino unguento oportet, eoque illita³⁰ linamenta disponi per plagam; deinde emplastrum supra dari, et super id succidam lanam: minusque etiam quam primo, fasciae adstringendae sunt.

28. Proprie quaedam in articulis visenda sunt. In quibus si praecisi nervi sunt, qui continebant, debilitas ejus partis³⁵ sequitur. Si id dubium est, et ex acuto telo plaga est, ea transversa commodior est: si ex retuso et gravi, nullum in figura discrimen est; sed videndum est, pus supra articu-

lum, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albumque et crassum diu fertur, nervum praecisum esse credibile est; magisque, quo majores dolores inflammationesque, et quo maturius excitatae sunt. Quamvis autem non abscissus nervus est; tamen, si circa tumor durus diu permanet, necesse est et diuturnum ulcus esse, et, sano quoque eo, tumorem permanere: futurumque est, ut tarde membrum id vel extendatur, vel contrahatur. Major tamen in extendendo mora est, ubi recurvato articulo curatio adhibita est; quam in recurvando eo quod rectum continuerimus. Collocari quoque membrum quod ictum est, ratione certa debet: si glutinandum est, ut superius sit; si in inflammatione est, ut in neutram partem inclinatum sit; si jam pus profluit, ut devexum sit. Optimum etiam medicamentum quies est: moveri, ambulare, nisi sanis, alienum est. Minus tamen iis periculosum, qui in capite vel brachiis, quam qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Minimeque ambulatio convenit, femine, aut crure, aut pede laborante. Locus in quo cubabit, tepidus esse debet. Balneum quoque, dum parum vulnus purum est, inter res infestissimas est: nam id et tumidum et sordidum reddit: ex quibus ad cancrum transitus esse consuevit. Lenis frictio recte adhibetur; sed iis partibus quae longius absunt a vulnere.

29. Inflammatione finita, vulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta; supraque idem emplastrum, vel enneapharmacum (19, 10) dandum est. Tum demum vero purum est, quum rubet, ac nimium neque siccum, neque humidum est. At quodcumque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est, quod aut albidum, aut pallidum, aut lividum, aut nigrum est, id purum non est.

30. Purgato, sequitur ut impleatur. Jamque calida aqua eatenus necessaria est, ut sanies removeatur. Lanae succidae supervacuus usus est: lota melius circumdatur. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua: itaque ea adhiberi non alienum est; ut butyrum cum rosa, et exigua mellis parte; aut cum eadem rosa tetrapharmacum; aut ex rosa linamenta. Plus tamen p

balneum rarum, cibi boni succi, vitatis omnibus acribus; sed iam pleniores. Nam et avis, et venatio, et suilla elixa dari potest. Vinum omnibus, dum febris, dum inflammatio est, alienum est: itemque usque ad cicatricem, si nervi, musculive vulnerati sunt; etiam si alte caro. At si plaga in summa cute generis tutioris est, potest non pervetus, modice tamen datum, ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est, quod in nervosis locis, musculosisque necessarium est, cerato quoque super vulnus utendum est. At si caro supercrevit, modice reprimat siccum linamentum; vehementius squama aeris. Si plus est, quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum vehementiora, quae corpus exedant. Cicatricem post omnia haec commode inducit lycium ex passo aut lacte dilutum; vel etiam per se impositum siccum linamentum.

31. Hic ordo felicitis curationis est: sed quaedam tamen ¹⁵periculosa incidere consuerunt. Interdum enim vetustas ulcus occupat, induciturque ei callus, et circum orae crassae livent: post quae, quidquid medicamentorum ingeritur, parum proficit: quod fere negligenter curato ulceri supervenit. Interdum vel ex nimia inflammatione, vel ob aestus immodicos, vel ob nimia frigora, vel quia nimis vulnus adstrictum est, vel quia corpus aut senile, aut mali habitus est, cancer occupat. Id genus a Graecis diductum in species est; nostris vocabulis non est. Omnis autem cancer non solum id corrumpit, quod occupavit, sed etiam serpit: ²⁵deinde aliis aliisque signis discernitur. Nam modo super inflammationem rubor ulcus ambit, isque cum dolore procedit; *ἐρυσίπελας* Graeci nominant. Modo ulcus nigrum est, quia caro ejus corrupta est: idque vehementius etiam putrescendo intenditur, ubi vulnus humidum est, et ex nigro ³⁰ulcere humor pallidus fertur, malique odoris est; carunculaeque corruptae, interdum etiam nervi ac membranae resolvuntur; specillumque demissum descendit aut in latus, aut deorsum: eoque vitio nonnumquam os quoque afficitur. Modo oritur ea quam Graeci *γάγγραιναν* appellant. Priora ³⁵in qualibet parte corporis fiunt, hoc in prominentibus membris, id est inter ungues, et alas, vel inguina; fereque in senibus, vel in iis quorum corpus mali habitus est. Caro in

ulcere vel nigra, vel livida est, sed sicca et arida; proximaque cutis plerumque subnigris pusulis impletur: deinde ei proxima vel pallida, vel livida, fereque rugosa et sine sensu est; ulterior in inflammatione est; omniaque ea simul
 5 serpunt, ulcus in locum pusulosum; pusulae in eum qui pallet aut livet; pallor aut livor in id quod inflammatum est; inflammatio in id quod integrum est, transit. Inter haec deinde febris acuta oritur, ingensque sitis: quibusdam etiam delirium accedit: alii, quamvis mentis suae compotes sunt,
 10 balbutiundo tamen vix sensus suos explicant: incipit affici stomachus: fit foedi spiritus ipse odoris. Atque initium quidem ejus mali recipit curationem: ubi vero penitus insedit, insanabile est; plurimique sub frigido sudore moriuntur.

32. Ac pericula quidem vulnerum haec sunt. Vetus
 15 autem ulcus scalpello concidendum est, excidendaeque ejus orae, et quidquid super eas livet aequae incidendum. Si varicula intus est, quae id sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde ubi sanguis emissus, novatumque vulnus est, eadem curatio adhibenda, quae in recentibus vulneribus ex-
 20 posita est. Si scalpello aliquis uti non vult, potest sanare id emplastrum, quod ex ladano fit: et quum ulcus sub eo exesum est, id quo cicatrix inducitur (cf. cap. 19, § 18).

33. Id autem, quod *έρυσίπτελας* vocari dixi, non solum vulnere supervenire, sed sine hoc quoque oriri consuevit:
 25 atque interdum periculum majus affert; utique si circa cervices aut caput constitit. Oportet, si vires patiuntur, sanguinem mittere: deinde imponere simul reprimentia et refrigerantia; maximeque cerussam solani succo, aut cimoliam cretam aqua pluviali exceptam, aut ex eadem aqua
 30 subactam farinam, cupresso adjecta, aut, si tenerius corpus est, lenticulam. Quidquid impositum est, betae folio contegendum est, et super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo: sulphuris p.)-(I. cerussae et croci, sin-
 35 gulorum p.)-(XII. s. eaque cum vino conterenda sunt, et id his illinendum. At si durior locus est, solani folia contrita suillae adipi miscenda sunt, et illita linteolo superin-
 jicienda.

At si nigrities est, nequedum serpit, imponenda sunt, quae carnem putrem lenius exedant: repurgatumque ulcus sic ut cetera, nutriendum est. Si magis putre est, jamque procedit ac serpit, opus est vehementius erodentibus. Si ne haec quidem evincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est, siccum est quum aduritur. Post ustionem putris ulceris, superponenda sunt quae crustas a vivo resolvant. Ubi eae exciderunt, purgandum ulcus maxime melle et resina est: sed aliis quoque purgari potest, quibus purulenta curantur; eodemque modo ad sanitatem perducendum est. 10

34. Gangraenam vero, si nondum plane tenet, sed adhuc incipit, curare non difficillimum est; utique in corpore juvenili: et magis etiam si muscoli integri sunt; si nervi vel laesi non sunt, vel leviter affecti sunt; neque ullus magnus articulus nudatus est; aut carnis in eo loco paulum est, ideoque non multum, quod putresceret, fuit; consistitque eo loco vitium, quod maxime fieri in digito potest. In ejusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere: deinde quidquid aridum est, et intentione quadam proximum quoque locum male habet, usque sanum corpus concidere. Medicamenta vero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt, quae pus movere consuerunt; ideoque ne aqua quidem calida. Gravia quoque, quamvis reprimentia, aliena sunt; sed his quam levissimis opus est: superque ea, quae inflammata sunt, utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, uri id quod est inter integrum ac vitiatum locum debet. Praecipueque in hoc casu petendum, non a medicamenti solum, sed etiam a victus ratione praesidium est: neque enim id malum, nisi corrupti vitiosique corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia utendum; deinde danda, quae per cibum potionemque alvum, ideoque etiam corpus, adstringant; sed ea levia. Postea, si vitium constitit, imponi super vulnus eadem debent, quae in putri ulcere praescripta sunt. Ac tum quoque plenioribus cibis uti licebit ex media materia; sed tamen non nisi alvum, corpusque siccantibus; aqua vero pluviali frigida. Balneum, nisi jam certa fiducia redditae sanitatis est, alienum est: siqui- 35

dem emollitum in eo vulnus cito rursus eodem malo afficitur. Solent vero nonnumquam nihil omnia auxilia proficere, ac nihilo minus serpere is cancer: inter quae miserum, sed unicum auxilium est, ut cetera pars corporis tuta sit, membrum, 5 quod paulatim emoritur, abscindere.

35. Hae gravissimorum vulnerum curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda, ubi integra cute interior pars collisa est; aut ubi derasum, attritumve aliquid est; aut ubi surculus corpori infixus est; aut ubi tenue, sed altum vulnus 10 insedit. In primo casu commodissimum est maliciorum ex vino coquere, interioremque ejus partem conterere, et cerato miscere ex rosa facto, idque superponere: deinde, ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum, quale lipara est. Deraso vero, detritoque imponendum est empla- 15 strum tetrapharmacum (19, 9), minuendusque cibus, et vinum subtrahendum. Neque id, quia non habebit altiores ictus, contemnendum erit: siquidem ex ejusmodi casibus saepe cancri fiunt. Quod si levius id erit, et in parte exigua, contenti esse poterimus eodem leni medicamento. Surculum vero, si 20 fieri potest, oportet vel manu, vel etiam ferramento ejicere. Si vel prae fractus est, vel altius descendit quam ut id ita fieri possit, medicamento evocandus est. Optime autem educit superimposita arundinis radix, si tenera est, protinus contrita; si jam durior, ante in mulso decocta; cui semper 25 mel adjiciendum est: aut aristolochia cum eodem melle. Pessima ex surculis arundo est, quia aspera est: eademque offensa etiam in filice est. Sed usu cognitum est, utramque adversus alteram medicamentum esse, si contrita ac superimposita est. Facit autem idem in omnibus surculis, quod- 30 cumque medicamentum extrahendi vim habet. Idem altis tenuibusque vulneribus aptissimum est. Priori rei Philocratis (19, 14); huic Hecataei (19, 16) emplastrum maxime convenit.

36. Ubi vero in quolibet vulnere ventum ad inducendam cicatricem est, quod perpurgatis jam, repletisque ulceribus 35 necessarium est, primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur; deinde quum jam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur: tum deligari super album plumbum oportet, quo et reprimitur cicatrix, et

colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix silvestris cucumeris praestat: idem compositio, quae habet elaterii p.)-(. I. spumae argenti p.)-(. II. unguenti p.)-(. VII. quae excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoque cicatrices leniter purgant paribus portionibus mixta aerugo et plumbum elotum, eademque resina coacta; sive ungitur cicatrix, quod in facie fieri potest; sive id ut emplastrum imponitur, quod in aliis partibus commodius est. At si vel excrevit cicatrix, vel concava est, stultum est decoris causa rursus et dolorem et medicinam sustinere: alioquin res utrique succurri patitur. Siquidem utraque cicatrix exulcerari scalpello potest: si medicamentum aliquis mavult, idem efficiunt compositiones eae, quae corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta conjicienda sunt; super concavam, implentia; donec utrumque ulcus sanae cuti aequatur, et tum cicatrix inducatur.

CAPUT XXVII.

De curatione vulnorum, quae per morsus inferuntur.

1. Dixi de iis vulneribus, quae maxime per tela inferuntur: sequitur, ut de iis dicam, quae morsu fiunt, interdum hominis (cf. Plin. XVIII, 4, 8), interdum simiae, saepe canis, nonnumquam ferorum animalium, aut serpentium. Omnis autem fere morsus habet quoddam virus. Itaque si vehemens vulnus est, cucurbitula admovenda est: si levius, protinus emplastrum injiciendum, praecipueque Diogenis (19, 20); si id non est, quodlibet ex iis, quae adversus morsus propositi; si ea non sunt, viride alexandrinum (19, 17); si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex iis, quae recentibus vulneribus accommodantur. Sal quoque his, praecipueque ei, quod canis fecit, medicamentum est, si vulnere imponitur, superque id duobus digitis verberatur: exsanat enim. Ac salsamentum quoque recte super id vulnus deligatur.

2. Utique autem, si rabiosus canis fuit, cucurbitula

virus ejus extrahendum est. Deinde, si locus neque nervosus, neque musculosus est, vulnus id adurendum est: si uri non potest, sanguinem homini mitti non alienum est. Tum usto quidem vulnere superimponenda quae ceteris ustis sunt: 5 ei vero quod expertum ignem non est, ea medicamenta, quae vehementer exedunt. Post quae nullo novo magisterio, sed jam supra posito vulnus erit implendum, et ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum mittunt, ibique patiuntur desudare, dum vires corporis sinunt, vulnere adaperto, quo magis ex eo quoque virus destillet: deinde multo meracoque vino excipiunt, quod omnibus venenis contrarium est. Idque quum ita per triduum factum est, tutus esse homo a periculo videtur.

Solet autem ex eo vulnere, ubi parum occursum est, 15 aquae timor nasci: ὕδροφόβος (ὕδροφοβίαν? *vel potius glossema*) Graeci appellant. Miserrimum genus morbi, in quo simul aeger et siti et aquae metu cruciatur: quo oppressis in angusto spes est. Sed unicum tamen remedium est, nec opinantem in piscinam non ante ei provisam projicere, et, si 20 natandi scientiam non habet, modo mersum bibere pati, modo attollere; si habet, interdum deprimere, ut invitus quoque aqua satietur: sic enim simul et sitis et aquae metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida vexatum nervorum distentio absumat. Id ne incidat, a 25 piscina protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum autem, praecipue id, quod primo loco posui (23, 1); ubi id non est, aliud, si nondum aeger aquam horret, potui ex aqua dandum est; et si amaritudine offendit, mel adjiciendum est: si jam is morbus occupavit, per catapotia sumi potest.

30 3. Serpentium quoque morsus non nimium distantem curationem desiderant: quamvis in ea multum antiqui variarunt; ut in singula genera anguium singula medendi genera praeciperent; alique alia. Sed in omnibus eadem maxime proficiunt. Igitur in primis super vulnus id membrum deligandum est; non tamen nimium vehementer, ne torpeat: dein 35 venenum extrahendum est. Id cucurbitula optime facit: neque alienum est, ante scalpello circa vulnus incidere; plus vitii jam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non

quod tamen vix incidere potest, tum quodlibet simile vas, quod idem possit: si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui id vulnus exsugat. Neque hercules scientiam praecipuam habent ii, qui Psylli nominantur (cf. Des Etangs, p. 282); sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam venenum serpentis, 5 ut quaedam etiam venatoria venena, quibus Galli praecipue utuntur, non gustu, sed in vulnere nocent. Ideoque colubra ipsa tuto estur; ictus ejus occidit. Et si stupente ea, quod per quaedam medicamenta circulatores faciunt, in os digitum quis indidit, neque percussus est, nulla in ea saliva noxa est. 10 Ergo quisquis, exemplum Psylli sequutus, id vulnus exsuxerit, et ipse tutus erit, et tutum hominem praestabit. Illud, ne intereat, ante debet attendere, ne quod in gingivis, palato ve, aliave parte oris ulcus habeat. Post haec is homo loco calido collocandus est sic, ut id, quod percussus erit, in inferiorem 15 partem inclinetur. Si neque qui exsugat, neque cucurbitula est, sorbere oportet jus anserinum, vel ovillum, vel vitulinum, et vomere: vivum autem gallinaceum pullum per medium dividere, et protinus calidum super vulnus imponere sic, ut pars interior corpori jungatur. Facit id etiam hoedus 20 agnusve discissus, et calida ejus caro statim super vulnus imposita: emplastra quoque, quae supra comprehensa sunt; aptissimumque est vel Ephesium (19, 21), vel id quod ei subjectum est. Praesensque in aliquo antidoto praesidium est. Si id non est, necessarium est exsorbere potionem 25 meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud, quod calori movendo est, nec humorem intus coire patitur: nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam 30 ventia, quia materiam extenuant, utilia sunt.

4. Haec adversus omnes ictus communia sunt: usus tamen ipse docuit, eum, quem aspis percussit, acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cujusdam pueri, qui quum ab hac ictus esset, et partim ob ipsum vulnus, partim ob immodicos aestus siti premeretur, ac locis siccis alium humorem non reperiret, acetum, quod forte se- 35 cum habebat, ebibit, et liberatus est. Credo quoniam id, quamvis refrigerandi vim habet, tamen habet etiam dissipandi. Quo fit, ut terra respersa eo spumet. Eadem ergo vi

verisimile est spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo discuti, et sic dari sanitatem.

5. In quibusdam etiam aliis serpentibus certa quaedam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimum
 5 medicamentum est. Quidam contritum cum vino bibunt: quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt: quidam super prunam eo imposito vulnus suffumigant, undique veste circumdata, ne is fumus dilabatur: tum carbonem ejus super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbae solaris, quam
 10 ἥλιοςτρόπιον Graeci vocant, semen, vel certe folia ex vino. Super vulnus vero etiam furfures ex aceto, vel ruta silvatica recte imponitur, vel cum melle sal tostus. Cognovi tamen medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

15 6. Et ad scorpionis autem et aranei ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoque contritum superimponitur.

7. At si cerastes, aut dipsas, aut haemorrhoids (cf. Des Etangs, p. 283) percussit, polii, quod aegyptiae fabae magnitudinem aequet, arefactum, in duas potiones dividendum est
 20 sic, ut ei rutae paulum adjiciatur. Trifolium quoque et mentastrum, et cum aceto panaces aequae proficiunt. Costumque, et casia, et cinnamomum recte per potionem assumuntur.

8. Adversus chelydri vero ictum, panaces, aut laser vel porri succus cum hemina vini sumendus est, et edenda
 25 multa satureia. Imponendum autem super vulnus stercus caprinum ex aceto coactum; aut ex eodem hordeacea farina; aut ruta, vel nepeta cum sale contrita, melle adjecto. Quod in eo quoque vulnere, quod cerastes fecit, aequae valet.

9. Ubi vero phalangium nocuit, praeter eam curationem,
 30 quae manu redditur, saepe homo demittendus in solium est, dandusque ei myrrhae et uvae taminiae par modus ex passi hemina; vel radiculae semen, aut polii radix ex vino; et super vulnus furfures ex aceto cocti, imperandumque, ut is conquiescat.

35 10. Verum haec genera serpentium et peregrina, et aliquanto magis pestifera sunt; maximeque aestuosis locis gignuntur. Italia frigidioresque regiones hac quoque parte sa-

lubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Adversus quos satis proficit herba vettonica, vel cantabrica, vel centauryon, vel argemonia, vel trixago, vel personata, vel marina pastinaca, singulae binaeve tritae, et cum vino potui datae, et super vulnus impositae. Illud ignorari non oportet, omnis serpentis ictum et jejuni et jejuno magis nocere: ideoque perniciosissimi sunt quum incubant; utilissimumque est, ubi ex anguibus metus est, non ante progredi, quam quis aliquid assumsit.

11. Non tam facile iis opitulari est, qui venenum vel in cibo, vel in potione sumserunt: primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti; ita ne succurrere quidem statim sibi possunt: deinde quia noxa non a cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto vomere: deinde, ubi praecordia exhaustit, bibere antidotum; si id non est, vel merum vinum.

12. Sunt tamen quaedam remedia propria adversus quaedam venena, maximeque leviora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panaces cum lacte contusa, vel galbanum vino adjecto dari, vel lac per se debet. Si cicutam, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est; deinde is vomere cogendus; posteaque laser ex vino dandum: isque, si febre vacat, in calidum balneum mittendus; si non vacat, ungendus ex calefacientibus est: post quae quies ei necessaria est. Si hyoscyamum, fervens mulsum bibendum est, aut quodlibet lac, maxime tamen asininum. Si cerussam, jus malvae, vel juglandes ex vino contritae, maxime prosunt. Si sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coit, aut passum, aut coagulum, aut cum aceto laser. Si fungos inutiles quis assumsit, radícula aut e posca, aut cum sale et aceto edenda est. Ipsi vero hi et specie quidem discerni possunt ab utilibus, et cocturae genere idonei fieri. Nam sive ex oleo inferbuerunt, sive piri surculus cum his inferbuit, omni noxa vacat.

13. Adustus quoque locis extrinsecus vis infertur: itaque sequi videtur, ut de his dicam. Haec autem optime curantur foliis aut liliis, aut linguae caninae, aut betae in vetere vino

oleoque decoctis: quorum quidlibet protinus impositum ad sanitatem perducit. Sed dividi quoque curatio potest in ea, quae mediocriter exedentia reprimantur, primo et pusulas prohibeant, et summam pelliculam exasperent: deinde ea
 5 quae lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lentilulae cum melle farina, vel myrrha cum vino, vel creta cimolia cum turis cortice contrita et aqua coacta, atque ubi
 10 usus necessitas incidit, aceto diluta: ex insequentibus, quaelibet lipara; sed idonea maxime est, quae vel plumbi recre-
 15 mentum, vel vitellos habet. Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum melle lentilulam: ubi ea declinavit, farinam cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crustae cadant: tum ervum cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit: no-
 15 vissime siccum linamentum.

CAPUT XXVIII.

De interioribus ulceribus, quae aliqua corporum parte corrupta nascuntur.

1. Ab his quae extrinsecus incidunt, ad ea veniendum
 20 est, quae interius, corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo pejus est. Ejus hae notae sunt: rubor est, superque eum non nimium pusulae eminent, maxime nigrae, interdum sublividae, aut pallidae; in his sanies esse videtur; infra color niger est; ipsum cor-
 25 pus aridum et durius, quam naturaliter oportet; circaque quasi crusta est; eaque inflammatione cingitur; neque in eo loco levare cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est; somnus urget; nonnumquam horror, aut febris oritur, aut utrumque. Idque vitium subteractis quasi quibusdam radici-
 30 bus serpit, interdum celerius, interdum tardius: supra quoque procedens inalbescit; dein lividum fit, circumque exiguae pusulae oriuntur: et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum saepe elidit. Nihil melius est, quam protinus
 adurere. Neque id grave est: nam non sentit; quoniam ea

caro mortua est. Finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde vulnus, sicut cetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta, undique a viva carne diducta, quae trahit secum quidquid corruptum erat; purusque jam sinus curari potest, implentibus. At si in summa cute vitium est, possunt succurrere quaedam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia: vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumque vero medicamentum impositum est, si satis proficiet, protinus a viva corruptam partem resolvit; certaue esse fiducia potest fere, 10 ut undique vitiosa caro excidat. Si id non fit, medicamentumque malo vincitur, utique ad ustionem properandum est. Sed in ejusmodi casu abstinendum a cibo, a vino est: aquam liberaliter bibere expedit: magisque ea servanda sunt, si febricula quoque accessit. 15

2. Non idem periculum carcinoma affert, nisi imprudentia curantis agitata est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, mammas feminarum. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur; isque immobilis, inaequalis tumet; interdum etiam torpet. Circa eum inflatae 20 venae quasi recurvantur, haeque pallent, aut livent; nonnumquam etiam in quibusdam delitescunt: tactusque is locus aliis dolorem affert, in aliis eum non habet: et nonnumquam sine ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet; nonnumquam iisdem omnibus ulcus accedit: interdum- 25 que nullam habet proprietatem; interdum simile iis est, quae Graeci vocant *κονδυλώματα*, aspredine quadam et magnitudine sua: colorque ejus ruber est, aut lenticulae similis; neque tuto aufertur: nam protinus aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur. Saepe homo ictus obmutescit, at- 30 que ejus anima deficit. Quibusdam etiam, si id ipsum pressum est, quae circa sunt intenduntur et intumescunt. Ob quae pessimum id genus est. Fereque primum id fit, quod *κακότηδες* a Graecis nominatur; deinde ex eo id carcinoma quod sine ulcere est: deinde ulcus; ex eo thymium. Tolli 35 nihil, nisi cacoethes potest: reliqua curationibus irritantur; et quo major vis adhibita est, eo magis. Quidam usi sunt medicamentis adurentibus; quidam ferro adusserunt; quidam

scalpello exciderunt: neque ulli umquam medicina profecit: sed adusta protinus concitata sunt, et increverunt, donec occiderent; excisa etiam post inductam cicatricem, tamen reverterunt, et causam mortis attulerunt: quum interim plerique nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent, sed imponendo tantum lenia medicamenta, quae quasi blandiantur, quominus ad ultimam senectutem perveniant, non prohibeantur. Discernere autem cacoethes, quod curationem recipit, a carcinomate, quod non recipit, nemo *scite potest, sed tempore et experimento. Ergo ubi primum id vitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. Si levatur malum, minuunturque ejus indicia, procedere curatio potest et ad scalpellum, et ad ustionem: si protinus irritatum est, scire licet jam carcinoma esse; removendaque sunt omnia acria, omnia vehementia. Sed si sine ulcere is locus durus est, imponi ficum quam pinguisimam, aut rhyodes emplastrum (19, 15) satis est. Si ulcus aequale est, ceratum ex rosa injiciendum est, adjiciendusque ei pulvis ex contrita testa, ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Si id nimium supercrevit, tentanda squama aeris est, quae lenissima ex adurentibus est, eatenus, ne quid eminere patiatur: sed ita, si nihil exacerbat: sin minus, eodem cerato contenti esse debemus.

3. Est etiam ulcus, quod *θηρίωμα* Graeci vocant. Id et per se nascitur, et interdum ulceri ex alia causa facto supervenit. Color est vel lividus, vel niger; odor foedus; multus, et muco similis humor: ipsum ulcus neque tactum, neque medicamentum sentit; prurigne tantum movetur: at circa dolor est, et inflammatio; interdum etiam febris oritur; nonnumquam ex ulcere sanguis erumpit: atque id quoque malum serpit. Quae omnia saepe intenduntur; fitque ex his ulcus, quod *φayέδαννα* Graeci vocant, quia celeriter serpendo, penetrandoque usque ossa, corpus vorat. Id ulcus inaequale est, coeno simile; inestque multus humor glutinosus, odor intolerabilis, majorque quam pro modo ulceris inflammatio. Utrumque, sicut omnis cancer, fit maxime in senibus, viis quorum corpora mali habitus sunt. Curatio utriusque eadem est; sed in majore malo major vis necessaria. Ac p

num a victus ratione ordiendum est: ut quiescat in lectulo: ut primis diebus a cibo abstineat, aquam quam plurimam assumat: alvus quoque ei ducatur: dein post inflammationem cibum boni succi capiat, vitatis omnibus acribus; potionis quantum volet sic, ut interdiu quidem aqua contentus sit; in coena vero etiam vini austeri aliquid bibat. Non aequè tamen fame in iis, quos *φαιέδαινα* urgebit, atque in iis, qui *θηρίωμα* adhuc habebunt, utendum erit. Et victus quidem talis necessarius est. Super ulcus vero inspergenda arida oenanthe est, et, si parum proficiet, chalcitis. Ac si quis nervus exesa carne nudatus est, contegendus ante linteolo est, ne sub eo medicamento aduratur. Si validioribus etiamnum remediis opus est, ad eas compositiones veniendum est, quae vehementius adurunt. Quidquid autem inspergitur, averso specillo infundi debet. Superdanda cum melle sunt 15 vel linamenta, vel oleae folia ex vino decocta, vel marrubium: eaque linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso: circaque, qua tumor ex inflammatione est, imponenda, quae reprimant, cataplasmata. Si sub his nihil proficitur, ferro locus aduri debet; diligenter nervis, si 20 qui apparent, ante contextis. Adustum vel medicamentis, vel ferro corpus, primum purgandum, deinde implendum esse, apparere cuilibet ex prioribus potest.

4. Sacer quoque ignis (zona; *psoriasis*, seu *herpes circinatus*) malis ulceribus annumerari debet. Ejus duae 25 species sunt. Alterum est subrubicundum, aut mixtum rubore atque pallore, exasperatumque per pusulas continuas, quarum nulla altera major est, sed plurimae perexiguæ. In his semper fere pus, et saepe rubor cum calore est: serpitiq̃ue id nonnumquam sanescente eo, quod primum 30 vitiatum est: nonnumquam etiam exulcerato, ubi ruptis pusulis ulcus continuatur, humorque exit, qui esse inter saniem et pus videri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, praecipueque in plantis. Alterum autem est in summae cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, sublividum, inaequaliter tamen; mediumque sanescit, extremis procedentibus: ac saepe id, quod jam sanum videbatur, iterum exulceratur: at circa proxima cutis,

quae vitium receptura est, tumidior et durior est, coloremque habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo fere corpora seniores tentantur, aut quae mali habitus sunt; sed in cruribus maxime. Omnis autem sacer ignis, ut minimum periculum habet ex iis, quae serpunt; sic prope difficillime tollitur. Medicamentum ejus fortuitum est, uno die febris, quae humorem noxium absumat. Pus, quo crassius et albidius est, eo periculi minus est. Prodest etiam infra os ulcerum laedi, quo plus puris exeat; et id, quo ibi corruptum corpus est, extrahatur. Sed tamen, si febricula accessit, abstinencia, lectulo, alvi ductione opus est. In omni vero sacro igni, neque lenibus et glutinosis cibis, neque salsis et acribus utendum est; sed iis, qui inter utrumque sunt: qualis est panis sine fermento, piscis, hoedus, avis, exceptoque apro, omnis fere venatio. Si non est febricula, et gestatio utilis est et ambulatio et vinum austerum et balneum. Atque in hoc quoque genere potio magis liberalis esse, quam cibus, debet. Ipsa autem ulcera, si mediocriter serpunt, aqua calida; si vehementius, vino calido fovenda sunt: deinde acupusulae, quaecumque sunt, aperiendae: tum imponenda ea, quae putrem carnem exedunt. Ubi inflammatio sublata, ulcusque purgatum est, imponi lene medicamentum debet. In altero autem genere possunt proficere mala cotonea in vino cocta atque contrita: potest emplastrum vel Herae (cf. 22, 3), vel tetrapharmacum (19, 9), cui quinta pars turis adjecta sit: potest nigra hederæ ex vino austero cocta; ac, si celeriter malum serpit, non aliud magis proficit. Purgato ulcere, quod in summa cute esse proposui, satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficient.

5. Chironium autem ulcus appellatur, quod et magnum est, et habet oras duras, callosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis; odor malus neque in ulcere, neque in ejus humore est; nulla inflammatio, dolor modicus est; nihil serpit: ideoque nullum periculum adfert; sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, ulcusque renovatur. Fit maxime in pedibus cruribus. Super id imponi debet, quod et lene aliquicū vehemens, et reprimens habeat; quale ejus rei causa f

his: squamae aeris, plumbi eloti combusti, singulorum p.)-(. IV. cadmiae, cerae, singulorum p.)-(. VIII. rosae quantum satis sit ad ceram simul cum eis molliendam.

6. Fiunt etiam ex frigore hiberno ulcera, maxime in pueris, et praecipue in pedibus digitisque eorum, nonnumquam etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est: interdum pusulae oriuntur, deinde exulceratio: dolor autem modicus; prurigo major est: nonnumquam humor exit, sed non multus, qui referre vel pus, vel saniem videtur. In primis multa calida aqua fovendum est, in qua rapa decocta sint; aut si ea non sunt, aliquae verbenae ex reprimentibus. Si nondum adaperitum ulcus est, aes, quam maxime calidum quis pati potest, admovendum est. Si jam exulceratio est, imponi debet alumen aequa portione cum ture contritum, vino adjecto, aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est, hic quoque melius lenia medicamenta proficiunt.

7. Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quaedam ex pure et sanguine quasi glandulae oriuntur: quae vel praecipue fatigare medicos solent; quoniam et febres movent, nec umquam facile maturescunt; et sive ferro, sive medicamentis curantur, plerumque iterum juxta cicatrices ipsas resurgunt; multoque post medicamenta saepius: quibus id quoque accedit, quod longo spatio detinent. Nascuntur maxime in cervice; sed etiam in alis et inguinibus. In mammis quoque feminarum se reperisse, Meges auctor est. Propter haec et album veratrum recte datur, atque etiam saepius, donec ea digerantur: et medicamenta imponuntur, quae humorem vel educant, vel dissipent; quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoque quidam utuntur, quae exedant, crustaque eum locum adstringant: tum vero ut ulcus curant. Quaecumque autem ratio curandi est, corpus, puro ulcere, exercendum atque alendum est, donec ad cicatricem perveniat. Quae quum medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum, quem struma male habet, eum, si anguem edit, liberari.

8. Furunculus vero est tuberculum acutum cum inflammatione et dolore; maximeque ubi jam in pus vertitur. Qui

ubi adapertus est, et exiit pus, apparet pars carnis in pus versa, pars corrupta, subalbida, subrubra; quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiamsi nulla curatio adhibeatur: maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quae maturius liberet. Proprium ejus medicamentum galbanum est: sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cetera desunt, imponi debet primum non pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde, si non repressit, quodlibet puri movendo accommodatum: si ne id quidem est, vel resina, vel fermentum. Expresso pure, nulla ultra curatio necessaria est.

9. Phyma vero nominatur tuberculum furunculo simile, sed rotundius et planius, saepe etiam majus. Nam furunculus ovi dimidii magnitudinem raro explet, numquam excedit: phyma etiam latius patere consuevit; sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Ubi divisum est, pus eodem modo apparet: ventriculus, ut in furunculo, non invenitur: verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris et saepius nascitur et facilius tollitur: in juvenibus rarius oritur, et difficilius curatur: ubi aetas induravit, ne nascitur quidem. Quibus vero medicamentis discuteretur, supra propositum est.

10. *Φύγεθλον* autem est tumor, non altus, latus, in quo quiddam pusulae simile est. Dolor distentioque vehemens est, et major quam pro magnitudine tumoris; interdum etiam febricula: idque tarde maturescit, neque magnopere in pus convertitur. Fit maxime aut in cervice, aut in alis, aut in inguinibus. Panum a similitudine figurae nostri vocant. Atque id ipsum quo medicamento tolleretur, supra demonstravi (18, 19; VII, 2).

11. Sed quum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium ad suppurationem spectans. Idque fere fit aut post febres, aut post dolores partis alicujus, maximeque eos, qui ventrem infestarunt. Saepiusque oculis expositum est; siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem ejus, quod phyma vocari proposui, rubetque cum calore, et paulo post etiam cum duritia, magisque nocent indolescit, et sitim vigiliamque exprimit. Interdum tamen hil horum in cute prehendi potest; maximeque ubi alti

pus movetur: sed cum siti vigiliaque sentiuntur intus aliquae punctiones. Et quod de subito durius non est, melius est; et quamvis non rubet, coloris tamen aliter mutati est. Quae signa jam pure oriente nascuntur: tumor ruborque multo ante incipiunt. Sed si locus mollis est, avertendus materiae aditus est per cataplasmata, quae simul et reprimunt, et refrigerant: qualia et alias et paulo ante in erysipellate proposui. Si jam durior est, ad ea veniendum est, quae digerant et resolvant: qualis est ficus arida contusa; aut faex mixta cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit; aut cucumeris radix (cf. 18, 7 et 13), cui ex farina duae partes adjectae sint, ante ex mulso decoctae. Licet etiam miscere aequis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum; pondusque adjicere myrrhae dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque et malagmata idem efficiunt, quae supra explicui (cap. 18 et 19). Quod per haec discussum non est necesse est maturescat. Idque quo celerius fiat, imponenda est farina hordeacea ex aqua cocta *** recte miscetur¹⁾. Eadem autem haec in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina proprietatesque supra reddidi, recte fiunt. Eademque omnium curatio: tantum modo distat. Crudum est autem, in quo major quasi venarum motus est et gravitas et ardor et distentio et dolor et rubor et durities; et, si major abscessus est, horror, aut etiam febricula permanet: penitusque condita suppuratione, si pro his, quae alibi cutis ostendit, punctiones sunt. Ubi ista se remiserunt, jamque is locus prurit, et aut sublividus, aut subalbidus est, matura suppuratio est: eaque, ubi vel per ipsa medicamenta, vel etiam ferro aperta est, pus debet emitti (cf. II, 7). Tum si qua in alis, vel inguinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In ceteris quoque partibus, si plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si valet corpus, aequae linamenta supervacua sunt: in reliquis parce

1) Desunt aliqua. Lacunam ita ex Cod. Med. I. restituit Milligan: *imponenda est farina hordeacea, quae ex aqua cocta recte miscetur*. Miscere enim pro eo quod praeparare est, veteres dixisse quis nescit?

tamen, nec, nisi magna plaga est, imponi debent. Commode vero vel super linamenta, vel sine his imponitur lentacula ex melle, aut malicorium ex vino coctum: quae et per se et mixta idonea sunt. Si qua circa duriora sunt, ad ea
 5 mollienda vel malva contrita, vel foeni graeci linive semen ex passo coctum superdandum est. Quidquid deinde impositum est, non adstringi, sed modice deligari debet. Illo neminem decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cetera, quae pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, conveniunt quae in vulneribus exposita
 10 sunt (cap. 26 et 27).

12. Nonnumquam autem ex ejusmodi abscessibus, et ex aliis ulcerum generibus fistulae oriuntur. Id nomen est ulceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis; habetque quaedam in singulis locis propria. Prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt: siquidem aliae breves sunt, aliae altius penetrant; aliae recte intus feruntur, aliae multoque plures transversae; aliae simplices sunt, aliae duplices triplicesve, ab uno ore orsae, aut etiam
 20 in plures sinus dividuntur: aliae rectae, aliae flexae, et tortuosae sunt; aliae intra carnem desinunt, aliae ad ossa aut cartilaginem penetrant, aut, ubi neutrum horum subest, ad interiora perveniunt; aliae deinde facile, aliae cum difficultate curantur, atque etiam quaedam insanabiles reperiuntur.
 25 Expedita curatio est in fistula simplici recenti, intra carnem: adjuvatque ipsam corpus, si juvenile, si firmum est. Inimica contraria his sunt: itemque, si fistula os, vel cartilaginem, vel nervum, vel musculum laesit; si articulum occupavit; si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vulvam, vel ad
 30 grandes venas arteriasve, vel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracem penetravit. Ad intestina quoque eam tendere, semper periculosum, saepe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel aegrum, vel senile, vel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fistulam convenit, ut quo tendat, et quam alte perveniat, scire possimus; simul etiam protinus humida, an siccior sit: quod
 35 extracto specillo patet. Si vero os in vicino est, id quoque disci potest si jam nec ne eo fistula penetraverit, et quaten

nocuerit; nam si molle est quod ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est: si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si labitur specillum, nondum caries est: si non labitur, sed aequali innititur, caries quidem, verum adhuc levis est: si inaequale quoque et asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago ubi subsit, ipsa sedes docet; perventumque esse ad eam ex renisu patet. Et ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxae. Simples vero eae sint, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris; cuius si plus fertur, quam quod simplici spatio convenit, plures sinus esse manifestum est. Quumque fere iuxta sint caro, et nervus, et aliqua nervosa, quales fere tunicae membranaeque sunt, genus quoque puris docebit, num plures sinus intus diversa corporis genera per-roserint. Siquidem ex carne pus laeve, album, copiosius fertur: at ex nervoso loco, coloris quidem ejusdem, sed tenuius: ex nervo, pingue et oleo non dissimile. Denique etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae penetrarint; quia saepe, quum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocavit, pus ferri, quod jam desierat, iterum incipit; testaturque, non solum alium sinum esse, ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere. Sed si et in carne et recens et simplex est, ac neque rugosa neque cava sede, neque in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore movetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam aeris, vel aeruginem, vel ex metallicis aliquid: exque eo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius, idque ea parte, qua tenuius est, antecedente demitti oportet in fistulam, donec purus sanguis se ostendat: quae in omnibus fistularum collyriis perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo superimponendum, supraque injicienda spongia est in acetum ante demissa: solvique quinto die satis est. Genusque victus adhibendum est, quo carnem alii docui. Ac si longius a praecordiis fistula est, ex intervallo jejunum radículas esse, deinde vomere, necessarium est. Vetustate callosa fit fistula. Callus autem neminem fallit,

quia durus est, et aut albus, aut pallidus. Sed tum validioribus medicamentis opus est: quale est, quod habet papaveris lacrimae p.)-(I. gummis p.)-(III. z. cadmiae p.)-(IV. atramenti sutorii p.)-(VIII. ex quibus aqua coactis
 5 collyrium fit: aut in quo sunt gallae p.)-(z. aeruginis, sandarachae, aluminis aegyptii, singulorum p.)-(I. atramenti sutorii combusti p.)-(II. aut quod constat ex chalcitide, et saxo calcis; quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est, adjicitur, eaque melle cocto excipiuntur.
 10 Expeditissimum autem est ex praecepto Megetis, aeruginis rasae p.)-(II. contere, deinde ammoniaci thymiamatis p.)-(II. aceto liquare, eoque infuso aeruginem cogere: idque ex primis medicamentis est. Sed ut haec maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est callum
 15 quibuslibet adurentibus medicamentis erodere: satisque est vel papyrus intortum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrii adstrictum eo illinere. Scilla quoque cocta et mixta cum calce, callum exest. Si quando vero longior et transversa fistula est, demisso specillo, contra principium hujus
 20 incidi commodissimum est, et collyrium utrimque demitti. At si duplicem esse fistulam aut multiplicem existimamus, sic tamen, ut brevis, intraque carnem sit, collyrio uti non debemus quod unam partem curet, reliquas omittat; sed eadem medicamenta arida in calamus scriptorium conjicienda
 25 sunt, isque ori fistulae aptandus, inspirandumque, ut ea medicamenta intus compellantur: aut eadem ex vino liquanda; vel si sordidior fistula est, ex mulso; si callosior, ex aceto sunt; idque intus infundendum. Quidquid inditum est, superponenda sunt, quae refrigerent et reprimant: nam fere, quae
 30 circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque alienum est, ubi quis resolverit, antequam rursus alia medicamenta conjiciat, per oricularium clysterem fistulam eluere, si plus puris fertur, vino; si callus durior est, aceto; si jam purgatur, mulso, vel aqua, in qua ervum coctum sit, sic, ut
 35 huic mellis quoque paulum adjiciatur. Fere vero fit, ut ea tunica, quae inter foramen et integram carnem est, victa medicamentis tota exeat, infraque ulcus purum sit. Quod ubi contigit, imponenda glutinantia sunt; praecipueque spongia

melle cocto illita. Neque ignoro multis placuisse, linamentum in modum collyrii compositum tinctum melle demitti: sed celerius id glutinatur, quam impletur. Neque verendum est, ne purum corpus puro corpori junctum non coeat; adjectis quoque medicamentis ad id efficacibus; quum saepe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo in unum eos jungat.

13. Est etiam ulceris genus, quod a favi similitudine *νηρόν* a Graecis nominatur: idque duas species habet. Alterum est subalbidum, furunculo simile; sed majus, et cum dolore majore: quod ubi maturescit, habet foramina, per quae fertur humor glutinosus et purulentus; neque tamen ad justam maturitatem pervenit. Si divisum est, multo plus intus corrupti, quam in furunculo, apparet, altiusque descendit. Raro fit in capillis. Alterum est minus, super corpus eminens, durum, latum, subviride, subpallidum, magis exulceratum: siquidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quae fertur humor glutinosus, subpallidus, crassitudinem mellis, aut visci referens, interdum olei: si inciditur, viridis intus caro apparet. Dolor autem et inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoque febrem movere consuerint. Super id, quod minus crebris foraminibus exasperatum est, recte imponitur et ficus arida, et lini semen in mulso coctum, et emplastra ac malagmata materiam educantia, aut quae proprie huc pertinentia supra posui. Super alterum et eadem medicamenta, et farina ex mulso cocta, sic, ut ei dimidium resinae terebinthinae misceatur; et ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adjectum; et uvae taminiae pars quarta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt, totum ulcus usque ad sanam carnem excidi oportebit. Ulcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt, primum, quae pus citent; deinde, quae purgent; tum, quae impleant.

14. Sunt vero quaedam verrucis similia; quorum diversa nomina, ut vitia sunt. *Ἀκροχορδόνα* Graeci vocant, ubi sub cute coit aliquid durius, et interdum paulo asperius, coloris ejusdem; supra latius, ad cutem tenue: idque modicum est,

quia raro fabae magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur; sed fere plura, maximeque in pueris: eaque nonnumquam subito desinunt, nonnumquam mediocrem inflammationem excitant; sub qua etiam in pus
 5 convertuntur. — At *θύμιον* nominatur, quod super corpus quasi verrucula eminet, ad cutem latius, supra tenue, subdurum, et in summo perasperum: idque summum colorem floris thymi repraesentat, unde ei nomen est; ibique facile finditur, et cruentatur; nonnumquam aliquantum sanguinis
 10 fundit: fereque citra magnitudinem fabae aegyptiae est, raro majus, interdum perexiguum. Modo autem unum, modo plura nascuntur vel in palmis, vel in inferioribus pedum partibus: pessima tamen in obscoenis sunt; maximeque ibi sanguinem fundunt. — *Μυρμηκία* autem vocantur humiliora thymio durioraque: quae radices altius exigunt, majoremque dolorem movent; infra lata, supra autem tenuia; minus sanguinis mittunt; magnitudinē vix umquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoque aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. — Clavus autem nonnumquam quidem
 20 etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, praecipue ex contuso; quamvis interdum aliter: doloremque, etiamsi non alias, tamen ingredienti movet. Ex his acrochordon et thymium saepe etiam per se finiuntur; et quo minora sunt, eo magis: myrmecia et clavi sine curatione vix um-
 25 quam desinunt. Acrochordon, si excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem; thymio clavoque excisis, subter rotunda radícula nascitur, quae penitus descendit ad carnem; eaque relicta idem rursus exigit: myrmecia latissimis radicibus inhaerent; ideoque ne excidi quidem sine magna exulceratione possunt. Clavum subinde rade-
 30 dere commodissimum est: nam sine ulla vi sic mollescit; ac, si sanguinis quoque aliquid emissum est, saepe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulveris paulum, quem ex lapide molari contrito fecit. Cetera vero genera medicamentis adu-
 35 rendi sunt: aliisque id, quod ex faece vini; myrmeciis id, quod ex alumine et sandaracha fit, aptissimum est. Sed ea, quae circa sunt, foliis contegi debent, ne ipsa quoque exul-

cerentur: deinde postea lenticula imponi. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

15. At pusulae maxime vernis temporibus oriuntur. Earum plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus partemve aspritudo quaedam fit, similis iis pusulis, quae ex urtica, vel ex sudore nascuntur: *ἐξανθήματα* Graeci vocant. Eaeque modo rubent, modo colorem cutis non excedunt. Nonnumquam plures, similes varis oriuntur; nonnumquam maiores, lividae, aut pallidae, aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato: subestque iis humor; ubi eae ruptae sunt, infra quasi exulcerata caro apparet; *φλύκταιναι* graece nominantur. Fiunt vel ex frigore, vel ex igni, vel ex medicamentis. — *Φλυξάκιον* autem paulo durior pusula est, subalbida, acuta; ex qua ipsa quod exprimitur humidum est. Ex pusulis vero nonnumquam etiam ¹⁵ ulcuscula fiunt aut aridiora, aut humidiora; et modo tantum cum prurigne, modo etiam cum inflammatione ac dolore; exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id evenit in aetate puerili; raro in medio corpore; saepe in eminentibus partibus. Pessima pusula est, quae *ἐπινυκτίς* ²⁰ vocatur (cf. Hipp. *De aëre, aq. et loc.* 3, et in mea edit. p. 372). Ea colore vel sublivida, vel nigra, vel alba esse consuevit: circa hanc autem vehemens inflammatio est; et quum adaperata est, reperitur intus exulceratio mucosa, colore humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem ²⁵ ejus est: neque enim ea faba major est. Atque haec quoque oritur in eminentibus partibus, et fere noctu; unde nomen quoque a Graecis ei impositum est. In omnium vero pusularum curatione primum est, multum ambulare atque exerceri; si quid ista prohibet, gestari: secundum est, ³⁰ cibum minuere; abstinere ab omnibus acribus et extenuantibus: eademque nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Praeter haec is qui jam robustus est, si pusulae minutae sunt, desudare in balneo debet; simulque super eas nitrum inspergere, oleoque vinum miscere, et sic ³⁵ ungi; tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si majus pusularum genus occupavit, imponenda lenticula detractaque summa pellicula, ad medicamenta lenia

transeundum. Epinyctis post lenticulam recte herba quoque sanguinali, vel viridi coriandro curatur. Ulcera ex pusulis facta tollit spuma argenti cum semine foeni graeci mixta, sic, ut his invicem rosa atque intubi succus adjiciatur, dum
 5 mellis crassitudo ei fiat. Proprie ad eas pusulas, quae infantes male habent, lapidis, quem pyriten vocant, p.)-(VIII. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adjiciunturque olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pusulae debent, tum hoc illini.

16. Scabies vero est durior cutis (cf. Paul. Aeg. IV, 2),
 10 rubicunda; ex qua pusulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam sicciores. Exit ex quibusdam sanies, fitque ex his continuata exulceratio pruriens, serpitque in quibusdam cito. Atque in aliis quidem ex toto desinit, in aliis vero certo tempore anni revertitur. Quo asperior est, quoque prurit
 15 magis, eo difficilius tollitur. Itaque eam, quae talis est, ἀγρία Graeci appellant. In hac quoque victus ratio eadem, quae supra, necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est quod fit ex spodii, croci, aeruginis, singulorum p.)-(z. piperis albi, omphacii, singulorum p.)-(I. I.
 20 cadmiae p.)-(VIII. At ubi jam exulceratio est, id, quod fit ex sulphuris p.)-(I. cerae p.)-(IV. picis liquidae hemina, olei sextariis duobus: quae simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam, quod ad Protarchum auctorem refertur (18, 18). Habet farinae lupinorum sextarium,
 25 nitri cyathos quatuor, picis liquidae heminam, resinae humidae selibram, aceti cyathos tres. Crocum quoque, lycium, aerugo, myrrha, cinis, aequis portionibus recte miscentur, et ex passo coguntur: idque omnem pituitam utique sustinet (id est *reprimi*). Ac si nihil aliud est, amurca ad tertiam
 30 partem decocta, vel sulphur pici liquidae mixtum, sicut in pecoribus proposui (*videl. in libris De agricultura*), hominibus quoque scabie laborantibus opitulatur.

17. Impetiginis vero species sunt quatuor. Minime mala est quae similitudine scabiem repraesentat: nam et rubet,
 35 et durior est, et exulcerata est, et rodit. Distat autem ab ea, quod magis exulcerata est, et varis similes pusulas habet; videnturque esse in ea quasi bullulae quaedam, ex quibus interposito tempore squamulae resolvuntur; certiori-

busque haec temporibus revertitur. Alterum genus pejus est, simile papulae fere, sed asperius rubicundiusque, figuras varias habens: squamulae ex summa cute discedunt, rosio major est, celerius et latius procedit, certioribusque etiamnum, quam prior, temporibus et fit, et desinit. Rubra cognominatur. Tertia etiamnum deterior est: nam et crassior est, et durior, et magis tumet; in summa cute finditur, et vehementius rodit; ipsa quoque squamosa, sed nigra; proceditque et late, nec tarde; et minus errat in temporibus, quibus aut oritur, aut desinit; neque ex toto tollitur. Nigrae¹⁰ cognomen est. Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore: nam subalbidum est, et recenti cicatrici simile; squamulasque habet pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenticulae similes; quibus demtis nonnumquam profluit sanguis. Alioquin vero humor ejus albidus¹⁵ est, cutis dura atque fissa est; proceditque latius. Haec vero omnia genera maxime oriuntur in pedibus et manibus; atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quam quod ad scabiem quoque pertinere sub auctore Protarcho retuli (18, 18). Serapion autem, nitri²⁰ p.)-(^{II}. sulphuris p.)-(^{IV}. excipiebat resina copiosa, eoque utebatur.

18. Papularum vero duo genera sunt. Alterum, in quo per minimas pusulas cutis exasperatur, et rubet, leviterque roditur; medium habet pauxillo laevius; tarde serpit: idque²⁵ vitium maxime rotundum incipit, eademque ratione in orbem procedit. Altera autem est, quam *ἀργίαν* Graeci appellant: in qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur exulceraturque, ac vehementius et roditur, et rubet, et interdum etiam pilos remittit. Quae minus rotunda est, difficilior³⁰ sanescit: nisi sublata est, in impetiginem vertitur. Sed levis papula etiam, si jejuna saliva quotidie defricatur, sanescit: major, commodissime murali herba tollitur, si super eadem trita est. Ut vero ad composita medicamenta veniamus, idem illud Protarchi (18, 19) tanto valentius in his est,³⁵ quanto minus in his vitii est. Alterum ad idem Myronis (cf. § 19): nitri rubri, turis, singulorum p.)-(^I. cantharidum purgatarum p.)-(^{II}. sulphuris ignem non experti tantum-

dem, resinae terebinthinae liquidae p.)-(. XX. farinae lolii sext. i. gith cyathos tres, picis crudae sext. i.

19. Vitiligo quoque, quamvis per se nullum periculum adfert, tamen et foeda est, et ex malo corporis habitu fit. 5 Ejus tres species sunt. — *Ἀλφός* vocatur, ubi color albus est, fere subasper et non continuus, ut quaedam quasi guttae dispersae esse videantur: interdum etiam latius, et cum quibusdam intermissionibus serpit. — *Μέλας* colore ab hoc differt, quia niger est, et umbrae similis: cetera eadem sunt.
- 10 — *Ἀσύνη* habet quiddam simile alphi, sed magis albida est, et altius descendit; in eaque albi pili sunt, et lanugini similes. Omnia haec serpunt: sed in aliis celerius, in aliis tardius alphos et melas in quibusdam variis temporibus et oriuntur et desinunt: leuce, quem occupavit, non facile 15 dimittit. Priora curationem non difficillimam recipiunt: ultimum vix umquam sanescit; ac, si quid ei vitio demtum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Utrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facile colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi: si sanguis 20 exit, quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est; si humor albidus, sanari non potest. Itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id vero quod curationem recipit, imponenda lenticula mixta cum sulphure et ture, sic, ut ea contrita ex aceto sint. Aliud ad idem, quod ad Irenaeum 25 auctorem refertur. Alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus portionibus contunduntur, adjecto aceto. His in sole vitiligo perungitur; deinde non ita multo post, ne nimis erodatur, eluitur. Proprie quidam, Myrone auctore (cf. § 18), eos, quos alphos vocari dixi, hoc medicamento perungunt:
- 30 sulphuris p.)-(. z. aluminis scissilis p.)-(. z. nitri p.)-(. z. myrti aridae contritae acetabulum miscent; deinde in balneo super vitiliginem inspergunt farinam ex faba, tum haec inducunt. Ii vero, quos melanas vocari dixi, curantur, quum simul contrita sunt alcyonium, tus, hordeum, faba, 35 eaque sine oleo in balneo ante sudorem insperguntur; tum genus id vitiliginis defricatur.

A. CORNELII CELSI ARTIUM LIBER UNDECIMUS

IDEM

MEDICINAE SEXTUS.

CAPUT I.

De vitiis singularum corporis partium.

Dixi de iis vitiis, quae, per totum corpus orientia, medicamentorum auxilia desiderant: nunc ad ea veniam, quae non nisi in singulis partibus incidere consuerunt, orsus a capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem saepe radendo succurritur. Adjicit autem vim quamdam ad continendum ladanum cum oleo mixtum. Nunc de iis capillis loquor, qui post morbum fere fluunt. Nam, quo minus caput quibusdam aetate nudetur, succurri nullo modo potest. 10

CAPUT II.

De porrigne.

Porrigo autem est, ubi inter pilos quaedam quasi squamulae surgunt, eaeque a cute resolvuntur; et interdum madent, multo saepius siccae sunt. Idque evenit modo sine ulcere, modo exulcerato loco: huic quoque modo malo odore, modo nullo accedente. Fereque id in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio: ac neque sine aliquo vitio corporis nascitur, neque ex toto inutile est. Nam bene integro capite non exit: ubi aliquod in eo vitium est, non incommodum est summam cutem potius subinde 20

corrumpi, quam id, quod nocet, in aliam partem magis necessariam verti. Commodius est ergo subinde pectendo repurgare, quam id ex toto prohibere. Si tamen ea res nimium offendit, quod humore sequente fieri potest, magisque si is
 5 etiam mali odoris est, caput saepe radendum est; dein id superadjuvandum aliquibus ex leniter reprimentibus; quale est nitrum cum aceto, vel ladanum cum murteo et vino, vel myrobalanum cum vino. Si parum per haec proficitur, vehementioribus uti licet; cum eo, ut sciamus, utique in
 10 recenti vitio id inutile esse.

CAPUT III.

De Sycosi.

Est etiam ulcus, quod a fici similitudine *σύκωσις* a Graecis nominatur. Caro excrescit: et id quidem generale est.
 15 Sub eo vero duae species sunt. Alterum ulcus durum et rotundum est: alterum humidum et inaequale. Ex duro exiguum quiddam et glutinosum exit: ex humido plus, et mali odoris. Fit utrumque in iis partibus, quae pilis conteguntur: sed id quidem, quod callosum et rotundum est, maxime in barba;
 20 id vero, quod humidum, praecipue in capillo. Super utrumque oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum et aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum. Terra quoque cretria ex aceto liquata recte illinitur.

25

CAPUT IV.

De Areis.

Arearum quoque duo genera sunt. Commune utrique est, quod emortua summa pellicula pili primum extenuantur, deinde excidunt: ac, si ictus is locus est, sanguis exit liqui-
 30 dus, et mali odoris: increscitque utrumque in aliis celeriter, in aliis tarde. Pejus est, quod densam cutem, et subpingu- et ex toto glabram fecit. — Sed ea, quae *ἀλωπεκία* non

tur, sub qualibet figura dilatatur. Fit et in capillo, et in barba. — Id vero, quod a serpentis similitudine *ὄφιασις* appellatur, incipit ab occipitio; duorum digitorum latitudinem non excedit; ad aures duobus capitibus serpit; quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priore parte committant. Illud vitium in qualibet aetate fit; hoc fere in infantibus: illud vix umquam sine curatione, hoc per se saepe finitur. Quidam haec genera arearum scalpello exasperant: quidam illinunt adurentia ex oleo; maximeque chartam combustam: quidam resinam terebinthinam cum thapsia inducunt. Sed nihil melius est, quam novacula quotidie radere: quia, quum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radicae. Neque ante oportet desistere, quam frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur, illini atramento scriptorio satis est. 15

CAPUT V.

De varis, lenticulis et ephelidis.

Paene ineptiae sunt curare varos, et lenticulas, et ephelidas: sed eripi tamen feminis cura cultus sui non potest. Ex his autem, vari lenticulaeque vulgo notae sunt; quamvis rarior ea species est, quam semion Graeci vocant; quum sit ea lenticula rubicundior et inaequalior. Ephelis vero a plerisque ignoratur: quae nihil est, nisi asperitas quaedam et durities mali coloris. Cetera non nisi in facie: lenticula etiam in alia parte nonnumquam nasci solet; de qua per se scribere alio loco visum operae pretium non est. Sed vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quam ipsa est, aluminis scissilis, et paulum mellis adjectum sit. Lenticulam tollunt galbanum et nitrum, quum pares portiones habent, contritaque ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum, et, interpositis pluribus horis, mane eluendum est, oleoque leniter ungendum. Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis et paulum mellis adjectum sit. Ad omnia vero ista, atque etiam ad colorandas cicatrices

potest ea compositio, quae ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani magmatis, cretae cimoliae subcaeruleae, nucum amararum, farinae hordei atque ervi, struthii albi, sertulae campanae seminis: quae omnia contrita, melle quam amarissimo coguntur, illitumque vespere, mane eluitur.

CAPUT VI.

De oculorum morbis.

1. Sed haec quidem mediocria sunt. Ingentibus vero et
 10 variis casibus oculi nostri patent: qui quum magnam partem
 ad vitae simul et usum et dulcedinem conferant, summa cura
 tuendi sunt. Protinus autem orta lippitudine, quaedam notae
 sunt, ex quibus, quid eventurum sit, colligere possumus.
 Nam si simul et lacrima et tumor et crassa pituita coeperint;
 15 si ea pituita lacrimae mixta est; neque lacrima calida est,
 pituita vero alba et mollis, tumor non durus, longae valetu-
 dinis metus non est. At si lacrima multa et calida, pituitae
 paulum, tumor modicus est, idque in uno oculo est; longum
 id, sed sine periculo, futurum est. Idque lippitudinis genus
 20 minime cum dolore est; sed vix ante vicesimum diem tollitur
 (*Prorrh.* II. 18): nonnumquam per duos menses durat. Quan-
 documque finitur, pituita alba et mollis esse incipit, lacrimae-
 que miscetur. At si simul ea utrumque oculum invaserunt,
 potest esse brevior, sed periculum ulcerum est. Pituita
 25 autem sicca et arida dolorem quidem movet, sed maturius
 desinit; nisi quid exulceravit. Tumor magnus, si sine dolore
 est, et siccus, sine ullo periculo est: si siccus quidem, sed
 cum dolore est, fere exulcerat; et nonnumquam ex eo casu
 fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Ejusdem exulcera-
 30 tionis timor in palpebris pupillisve est, ubi super magnum
 dolorem lacrimae salsae calidaeque eunt; aut etiam si, tu-
 more jam finito, diu lacrima cum pituita profluit. Pejus
 etiamnum est, ubi pituita pallida aut livida est, lacrima ca-
 lida et multa profluit, caput calet, a temporibus ad oculos
 35 dolor pervenit, nocturna vigilia urget: siquidem sub his

oculus plerumque rumpitur; votumque est, ut tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula juvat: si foras jam ruptus procidit, sine auxilio est. Si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. At si asperum et crassum est, etiam post curationem vestigium aliquod relinquit. Curari vero oculos sanguinis detractio, medicamento (sc. *purgante*), balneo, vino, vetustissimus auctor Hippocrates (*Aph.* VI, 31) memoriae prodidit. Sed eorum tempora et causas parum explicuit: in quibus medicinae summa est. Neque minus in abstinentia et alvi ductione saepe auxilii est.¹⁰ Hos igitur interdum inflammatio occupat: ubi cum tumore in his dolor est; sequiturque pituitae cursus, nonnumquam copiosior vel acrior, nonnumquam utraque parte moderatior. In ejusmodi casu prima omnium sunt quies et abstinentia. Ergo primo die, loco obscuro cubare debet sic, ut a ser-¹⁵ mone quoque abstineat; nullum cibum assumere; si fieri potest, ne aquam quidem; sin minus, certe quam minimum ejus. Quod si graves dolores sunt, commodius secundo die; si tamen res urget, etiam primo sanguis mittendus est; utique si in fronte venae tument, si firmo corpore materia²⁰ superest. Si vero minor impetus minus acrem curationem requirit, alvum, sed nonnisi secundo tertiove die, duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat; satisque est uti quiete et abstinentia. Neque tamen in lippientibus longum jejunium necessarium est, ne pituita²⁵ tenuior atque acrior fiat: sed secundo die dari debet id, quod levissimum videri potest ex iis, quae pituitam faciunt crassiorem; qualia sunt ova sorbilia: si minor vis urget, pulicula quoque, aut panis ex lacte. Insequentibusque diebus, quantum inflammationi detrahetur, tantum adjici cibis³⁰ poterit; sed generis ejusdem: utique ut nihil salsum, nihil acre, nihil ex iis, quae extenuant, sumatur; nihil potui praeter aquam. Et victus quidem ratio talis maxime necessaria est. Protinus autem primo die croci p.)-(*I.* et farinae candidae quam tenuissimae p.)-(*II.* excipere oportet³⁵ ovi albo, donec mellis crassitudinem habeat: idque in lin-teolum illinere, et fronti agglutinare, ut, compressis venis, pituitae impetum cohibeat. Si crocum non est, tus idem

facit. Linteolo an lana excipiat, nihil interest. Superinungi vero oculi debent sic, ut croci quantum tribus digitis comprehendi potest, sumatur, myrrhae ad fabae, papaveris lacrimae ad lenticulae magnitudinem, eaque cum passo contendantur, et specillo super oculum inducantur. Aliud ad idem: myrrhae p.)-(. z. mandragorae succi p.)-(. I. papaveris lacrimae p.)-(. II. foliorum rosae, cicutae seminis, singulorum p.)-(. III. acaciae p.)-(. IV. gummis p.)-(. VIII. Et haec quidem interdiu: noctu vero, quo commodior quies
 10 veniat, non alienum est, superimponere candidi panis interioriorem partem ex vino subactam: nam et pituitam reprimat, et, si quid lacrimae processit, absorbet, et oculum glutinari non patitur. Si grave id et durum, propter magnum oculorum dolorem, videtur, ovi et album et vitellus in vas defundendum est; adjiendumque eo mulsi paulum, idque digito permiscendum: ubi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quae id excipiat, superque oculis imponi. Ea res et levis est, et refrigerando pituitam coercet, et non exarescit, et glutinari oculum non patitur. Farina quoque
 20 hordeacea cocta, et cum malo cotoneo cocto mixta, commode imponitur. Neque ab ratione abhorret, etiam penicillo potissimum uti expresso, si levior impetus est, ex aqua; si major, ex posca. Priora fascia deliganda sunt, ne per somnum cadant: at hoc superimponi satis est, quia et reponi ab
 25 ipso commode potest; et quum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum aliquid dandum est, quae *ἀνώδυνα* Graeci appellant: satisque est puero, quod ervi; viro, quod fabae magnitudinem impleat. In ipsum vero oculum primo die, nisi modica inflammatio est, nihil recte conjicitur; saepe enim potius concitatur eo pituita, quam minuitur. A secundo die, gravi quoque lippitudini per indita medicamenta recte succurritur, ubi vel jam sanguis missus, vel alvus ducta est, aut neutrum necessarium esse manifestum est.

35 2. Multa autem multorumque auctorum collyria ad id apta sunt; novisque etiamnum mixturis temperari possunt: quum lenia medicamenta, et modice reprimentia, facile varie misceantur. Ego nobilissima exsequar.

3. Est igitur Philonis, quod habet cerussae elotae, spodii, gummis, singulorum p.)-(I. papaveris lacrimae combustae p.)-(II. Illud scire oportet hic quoque omnia medicamenta, singula primum per se teri, deinde mixta iterum, adjecta paulatim vel aqua, vel alio humore: gummi, quum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime praestare, ut, ubi collyria facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur.

4. Dionysii vero collyrium est: papaveris lacrimae combustae, donec tenerescat, p.)-(I. aeris combusti, gummi, singulorum p.)-(II. spodii p.)-(IV. ¹⁰

5. Cleonis nobile admodum: papaveris lacrimae frictae p.)-(I. croci p.)-(z. gummis p.)-(I. quibus, dum teruntur, adjicitur rosae succus. Aliud ejusdem valentius: squamae aeris, quod *στόμαμα* appellant, p.)-(I. croci p.)-(II. spodii p.)-(IV. plumbi eloti et combusti p.)-(VI. ¹⁵ gummis tantundem. Attalium (*Attalicum*?) quoque ad idem est, maxime ubi multa pituita profluit: castorei p.)-(z. aloes p.)-(z. croci p.)-(I. myrrhae p.)-(II. lycii p.)-(III. cadmiae curatae p.)-(VIII. stibis tantundem, acaciae succi p.)-(XII. Quod gummi hoc non habet, liquidum in 20 pyxidicula servatur. Theodotus vero huic compositioni adjecit papaveris lacrimae combustae p.)-(z. aeris combusti et eloti p.)-(II. nucleos palmarum combustos numero XX. gummis p.)-(XII.

6. At ipsius Theodoti, quod a quibusdam *ἀράριον* ²⁵ nominatur, ejusmodi est: castorei, nardi indici, singulorum p.)-(I. lycii p.)-(z. papaveris lacrimae tantundem, myrrhae p.)-(II. croci, cerussae elotae, aloes, singulorum p.)-(III. cadmiae botryitidis elotae, aeris combusti, singulorum p.)-(VIII. gummis p.)-(XVIII. acaciae succi 30 p.)-(XX. stibis tantundem; quibus aqua pluvialis ad-jicitur.

7. Praeter haec, ex frequentissimis collyriis est, id quod quidam *cythion*, quidam a cinereo colore *τέφριον* appellant: Anyli, tragacanthae, acaciae succi, gummis, singulorum 35 p.)-(I. papaveris lacrimae p.)-(II. cerussae elotae p.)-(IV. spumae argenti elotae p.)-(VIII. quae aequae ex aqua pluviali conteruntur.

8. Euelpides autem, qui aetate nostra maximus fuit ocularius medicus, utebatur eo, quod ipse composuerat: trygodes nominabat: Castorei p.)-(z z. lycii, nardi, papaveris lacrimae, singulorum p.)-(I. croci, myrrhae, aloes, singulorum p.)-(IV. aeris combusti p.)-(VIII. cadmiaae et stibis, singulorum p.)-(XII. acaciae succi p.)-(XXVI. gummi tantumdem.

Quo gravior vero quaeque inflammatio est, eo magis leniri medicamentum debet, adjecto vel albo ovi, vel muliebri lacte. Ac si neque medicus, neque medicamentum praesto est, saepius utrumlibet horum in oculos penicillo ad id ipsum facto infusum, id malum lenit. Ubi vero aliquis relevatus est, jamque cursus pituitae constitit, reliquias fortasse leviores futuras discutiunt balneum et vinum. Igitur lavari debet, leviter ante ex oleo perfricatus, diutiusque in cruribus et feminibus; multaque calida aqua fovere oculos; deinde per caput prius calida, tum egelida perfundi: a balneo cavere ne quo frigore afflatus laedatur: post haec cibo paulo pleniore, quam ex eorum dierum consuetudine, uti, vitatis tamen omnibus pituitam extenuantibus; vinum bibere leve, subausterum, modice vetus, neque effuse, neque timide; ut neque cruditas ex eo, et tamen somnus fiat, lenianturque intus latentia acria. Sed si quis in balneo sensit majorem oculorum perturbationem, quam attulerat; quod incidere iis solet, qui manente adhuc pituitae cursu festinant; quamprimum discedere debet; nihil eo die vini assumere, cibi minus etiam, quam pridie: deinde quum primum satis pituita substitit, iterum ad usum balnei redire. Solet tamen evenire nonnumquam, sive tempestatum vitio, sive corporis, ut pluribus diebus neque dolor, neque inflammatio, et minime pituitae cursus finiatur. Quod ubi incidit, jamque ipsa vetustate res matura est, ab iisdem auxilium petendum est, id est balneo ac vino. Haec enim ut in recentibus malis aliena sunt, quia concitare ea possunt et accendere; sic in veteribus, quae nullis auxiliis cesserunt, admodum efficacia esse consuerunt: videlicet hic quoque, ut alibi, quum secunda vana fuerint, contrariis adjuvantibus. Sed ante tonderi ad cutem convenit: deinde in balneo aqua calida quamplurima

caput atque oculos fovere: tum utrumque penicillo detergere, et ungere caput irino; continereque in lectulo se, donec omnis calor, qui conceptus est, finiatur, desinatque sudor, qui necessario in capite collectus est: tum ad idem cibi vinique genus veniendum, sic, ut potiones meracae sint; obtegendumque caput, et quiescendum. Saepe enim post haec gravis somnus, saepe sudor, saepe alvi dejectio pituitae cursum finit. Si levatum malum est; quod aliquanto saepius fit; per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas restituatur. Si diebus iisdem alvus nihil reddit, du-¹⁰ cenda est, quo magis superiores partes leventur.

Nonnumquam autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat: *πρόπτωσις* id, quoniam oculi procidunt, Graeci appellant. His utique, si vires patiuntur, sanguinem mitti; si id fieri non potest, alvum¹⁵ duci, longioremque inediam indici, necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est: ideoque Cleonis collyrio quidam, quod ex duobus ante positum est, utuntur. Sed optimum est Nilei; neque de ullo magis inter omnes auctores convenit.

9. Id habet nardi indici, papaveris lacrimae, singulorum p.)-(. —. gummis p.)-(. I. croci p.)-(. II. foliorum rosae recentium p.)-(. IV. quae vel aqua pluviatili, vel vino levi, subaustero coguntur. Neque alienum est malicorium, vel sertulam campanam ex vino coquere, deinde conterere; aut²⁵ murtam nigram cum rosae foliis miscere; aut hyoscyami folia cum ovi cocti vitello; aut farinam cum acaciae succo, vel passo, aut mulso: quibus si folia quoque papaveris adjiciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo praeparato, penicillo fovere oculos oportet ex aqua calida expresso, in³⁰ qua ante vel murti vel rosae folia decocta sint: deinde ex illis aliquid imponi. Praeter haec ab occipitio, incisa cute, cucurbitula adhibenda est. Quod si per haec restitutus oculus in sedem suam non est, eodemque modo prolapsus permanet, scire oportet lumen esse amissum; deinde futurum, sicut aut indurescat is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo, qui tempori propior est, incidi oculus debet; ut, effuso pure, et inflammatio ac dolor finiatur,

et intus tunicae resident, quo minus foeda postea facies sit: utendum deinde vel iisdem collyriis est ex lacte aut ovo; vel croco, cui album ovi misceatur. At si induruit, et sic emortuus est, ne in pus verteretur, quatenus foede prominebit, excidendum erit sic, ut hamo summa tunica apprehendatur, infra id deinde scalpellus incidat: tum eadem medicamenta erunt conjicienda, donec omnis dolor finiatur. Iisdem medicamentis in eo quoque oculo utendum est, qui primum procidit, deinde per plura loca fissus est.

10 10. Solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnumquam in ipsis oculis, nonnumquam in palpebris: et in his ipsis, modo ab interiore, modo ab exteriori parte. In hoc casu alvus ducenda est; cibis minuendus; lac potui dandum, ut acria, quae laeserunt, leniantur. Quod ad cataplasmata et medicamenta pertinet, iis utendum quae adversus inflammationes proposita sunt: atque hic quoque Nilei collyrium optimum est. Si tamen carbunculus in exteriori palpebrae parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen ex mulso coctum; aut, si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

11. Pusulae quoque ex inflammatione interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit, magis etiam servanda sunt, quae de sanguine et quiete supra proposui: sin serius quam ut sanguis mitti possit, alvus tamen ducenda est: si 25 id quoque aliqua res inhibet, utique victus ratio servanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est, quale Nilei, quale Cleonis est.

12. Id quoque, quod Philalethes vocatur, huc aptum est. Myrrhae, papaveris lacrimae, singulorum p.)-(. I. 30 plumbi eloti, terrae samiae, quae ἀσθήρ vocatur, tragacanthae, singulorum p.)-(. IV. stibis cocti, amyli, singulorum p.)-(. VI. spodii eloti, cerussae elotae, singulorum p.)-(. VIII. quae aqua pluviali excipiuntur. Usus collyrii vel ex ovo, vel ex lacte est.

35 13. Ex pusulis ulcera interdum fiunt; eaque recenti aequae lenibus medicamentis nutrienda sunt, et iisdem fe quae supra (V, 28, 15) in pusulis posui. Fit quoque p prie ad haec, quod διὰ λιβάνου vocatur. Habet aeris et

busti et eloti, papaveris lacrimae frictae, singulorum p.)-(. I. spodii eloti, turis, stibis combusti et eloti, myrrhae, gummis, singulorum p.)-(. II.

14. Evenit etiam, ut oculi, vel ambo, vel singuli, minores fiant, quam esse naturaliter debeant: idque et acer pituitae cursus in lippitudine efficit, et continuati fletus, et ictus parum bene curati. In his quoque iisdem lenibus medicamentis ex muliebri lacte utendum est: cibis vero iis, qui maxime corpus alere et implere consuerunt: vitandaque omni modo causa, quae lacrimas excitet, curaque domesticorum: 10 quorum etiam si quid tale incidit, ejus notitiae subtrahendum. Atque acria quoque medicamenta, et acres cibi non alio magis nomine his nocent, quam quod lacrimas movent.

15. Genus quoque vitii est, quo inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur: *φθειρίσιν* Graeci nominant. Quod 15 quum ex malo corporis habitu fiat, raro non ultra procedit: sed fere tempore interposito pituitae cursus acerrimus sequitur; exulceratisque vehementer oculis, aciem quoque ipsam corrumpit. His alvus ducenda est; caput ad cutem tondendum, diuque quotidie jejunis perfricandum; his ambulationibus aliisque exercitationibus diligenter utendum; gar- 20 garizandumque ex mulso, in quo nepeta et pinguis ficus decocta sit; saepe in balneo multa calida aqua fovendum caput; vitandi acres cibi; lacte vinoque pingui utendum; bibendumque liberalius, quam edendum est. Medicamenta 25 vero intus quidem lenia danda sunt, ne quid acrioris pituitae concitent; super ipsos vero pediculos alia, quae necare eos, et prohibere, ne similes nascantur, possint. Ad id ipsum spumae nitri p.)-(. I. sandarachae p.)-(. I. uvae taminiae p.)-(. I. simul teruntur, adjiciturque vetus oleum pari por- 30 tione, atque acetum, donec ei mellis crassitudo sit.

16. Hactenus oculorum morbi lenibus medicamentis nutriantur. Genera deinde alia sunt, quae diversam curationem desiderant; fereque ex inflammationibus nata, sed finitis quoque his manentia. Atque in primis in quibusdam perse- 35 verat tenuis pituitae cursus. Quibus alvus inferiore parte evocanda est, demendumque aliquid ex cibo. Neque alienum est illini frontem compositione Andreae: quae habet gummis

p.)-(I. cerussae, stibis, singulorum p.)-(II. spumae argenti coctae et elotae p.)-(IV. Sed ea spuma ex aqua pluviatili coquitur, et arida haec medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, cataplasma quoque superinijciendum est ex farina, quae frigida aqua coacta sit, cuique aut acaciae succus, aut cupressus adjecta sit. Cucurbitula quoque, inciso vertice, recte accommodatur; aut ex temporibus sanguis mittitur. Inungi vero eo debet, quod habet squamae aeris, papaveris lacrimae, singulorum p.)-(I. cervinicornus combusti et eloti, plumbi eloti, gummis, singulorum p.)-(IV. turis p.)-(XII. Hoc collyrium, quia cornus habet, *διὰ κέρατος* nominatur. Quotiescumque non adjicio, quod genus humoris adjiciendum sit, aquam intelligi volo.

17. Ad idem Euelpidis, quod *μειγμένον* nominabat. 15 In eo papaveris lacrimae, et albi piperis, singulae unciae sunt, gummi libra, aeris combusti p.)-(I. s. Inter has autem curationes, post intermissionem aliquam, prosunt balneum et vinum. Quumque omnibus lippientibus vitandi cibi sint, qui extenuant; tum praecipue, quibus tenuis humor diu 20 fertur. Quod si jam fastidium est eorum, quae pituitam crassiorem reddunt, sicut in hoc genere materiae maxime promptum est; confugiendum est ad ea, quae, quia ventrem, corpus quoque adstringunt.

18. At ulcera, si cum inflammatione finita non sunt, aut 25 supercrescentia, aut sordida, aut cava, aut certe vetera esse consuerunt. Ex his supercrescentia collyrio, quod *μειγμένον* vocatur, optime reprimuntur. Sordida purgantur et eodem, et eo, quod *σμύλλον* nominatur.

19. Habet aeruginis p.)-(IV. gummistantumdem, amoniaci, minii sinopici, singulorum p.)-(XVI. quae quidam ex aqua, quidam, quo vehementiora sint, ex aceto terunt.

20. Id quoque Euelpidis, quod *χέλωνα* appellabat, huc utile est: Croci p.)-(I. papaveris lacrimae, gummis, singulorum p.)-(II. aeris combusti et eloti, myrrhae, singulorum 35 p.)-(IV. piperis albi p.)-(VI. Sed ante leni, tum huius inungendum est.

21. Id quoque ejusdem, quod *σφαίριον* nominabat, dem valet: Lapidis haematitis eloti p.)-(I. z, piperis g

sex, cadmiae elotae, myrrhae, papaveris lacrimae, singulorum p.)-(. II. croci p.)-(. IV. gummi p.)-(. VIII. quae cum vino amineo conteruntur.

22. Liquidum quoque medicamentum ad idem componebat, in quo erant haec: aeruginis p.)-(. z. misy combusti, 5 atramenti sutorii, cinnamomi, singulorum p.)-(. I. croci, nardi, papaveris lacrimae, singulorum p.)-(. I. z. myrrhae p.)-(. II. aeris combusti p.)-(. III. cineris ex odoribus p.)-(. IV. piperis grana xv. Haec ex vino austero teruntur; deinde cum passi tribus heminis decoquuntur, donec corpus 10 unum sit: idque medicamentum vetustate efficacius fit.

23. Cava vero ulcera commodissime implent ex iis, quae supra posita sunt, σφαιρίον, et id, quod φιλαλήθους (φιλάληδες?) vocatur. Idem σφαιρίον vetustis ulceribus, et vix ad cicatricem venientibus optime succurrit. 15

24. Est etiam collyrium, quod quum ad plura valeat, plurimum tamen proficere in his ulceribus videtur: refertur ad Hermonem auctorem. Habet piperis longi p.)-(. I. z. albi p.)-(. —. cinnamomi, costi, singulorum p.)-(. I. atramenti sutorii, nardi, casiae, castorei, singulorum p.)-(. II. 20 gallae p.)-(. V. myrrhae, croci, turis, lycii, cerussae, singulorum p.)-(. VIII. papaveris lacrimae p.)-(. XII. aloes, aeris combusti, cadmiae, singulorum p.)-(. XVI. acaciae, stibis, gummis, singulorum p.)-(. xxv.

25. Factae vero ex ulceribus cicatrices duobus vitiis 25 periclitantur; ne aut cavae, aut crassae sint. Si cavae sunt, potest eas implere id, quod σφαιρίον vocari dixi; vel id, quod Ἀσκληπιός nominatur. Habet papaveris lacrimae p.)-(. II. sagapeni, opopanacis, singulorum p.)-(. III. aeruginis p.)-(. IV. gummis p.)-(. VIII. piperis p.)-(. XII. cadmiae elo- 30 tae, cerussae, singulorum p.)-(. XVI. At si crassae cicatrices sunt, extenuat vel σμύλλον, vel Canopitae collyrium: quod habet cinnamomi, acaciae, singulorum p.)-(. I. cadmiae elotae, croci, myrrhae, papaveris lacrimae, gummis, singulorum p.)-(. II. piperis albi, turis, singulorum p.)-(. 35 III. aeris combusti p.)-(. VIII. Vel Euelpidis pyximum, quod ex his constat: salis fossilis p.)-(. IV. ammoniaci thymiamatis p.)-(. VIII. papaveris lacrimae p.)-(. XII. ce-

russae p.)-(. XV. piperis albi, croci siculi, singulorum p.)-(. XXXII. gummis p.)-(. XIII. cadmiae elotae p.)-(. VIII. Maxime tamen tollere cicatricem videtur id, quod habet gummis p.)-(. z. aeruginis p.)-(. I. crocomagmatis p.)-(. IV.

26. 27. Est etiam genus inflammationis, in qua, si cui tument ac distenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte mitti necessarium est; multaque aqua calida caput atque oculos fovere; gargarizare ex lenticula, vel ex fici cremore; inungi acribus medicamentis, quae supra comprehensa sunt; maximeque eo, quod *σφαιρίον* nominatur, quod lapidem haematiten habet. Atque alia quoque utilia sunt, quae ad extenuandam aspritudinem fiunt; de qua protinus dicam.

Haec autem inflammationem oculorum fere sequitur; interdum major, interdum levior. Nonnumquam etiam ex aspritudine lippitudo fit; ipsa deinde aspritudinem auget, fitque ea in aliis brevis, in aliis longa, et quae vix umquam finiat. In hoc genere valetudinis quidam crassas durasque palpebras, et ficulneo folio, et asperato specillo, et interdum scalpello eradunt; versasque quotidie medicamentis suffricant. Quae neque nisi in magna vetustaque aspritudine, neque saepe facienda sunt: nam melius eodem ratione victus et idoneis medicamentis pervenitur. Ergo exercitationibus utemur, et balneo frequentiore; multaque oculos aqua calida fovebimus: cibos autem sumemus acres et extenuantes; medicamentum id, quod caesarianum vocatur. Habet atramenti sutorii p.)-(. I. misy p.)-(. I. z. piperis albi p.)-(. z. z. papaveris lacrimae, gummis, singulorum p.)-(. II. cadmiae elotae p.)-(. III. stibis p.)-(. VI. Satisque constat hoc collyrium adversus omne genus oculorum valetudinis idoneum esse; exceptis iis, quae lenibus nutriuntur.

28. Id quoque, quod Hieracis nominatur, ad aspritudinem potest. Habet myrrhae p.)-(. I. ammoniaci thymiamatis p.)-(. I. aeruginis rasae p.)-(. IV. Ad idem idoneum est etiam id, quod Canopitae est, et id quod *σμύλλον* vocatur, et id quod pyxinum, et id quod *σφαιρίον*. Si composita medicamenta non adsunt, felle caprino, vel quam optimo melle satis commode aspritudo curatur.

29. Est etiam genus aridae lippitudinis: *ξηροφθαλμία*

Graeci appellant. Neque tument, neque fluunt oculi, sed rubent tantum, et cum dolore quodam graves sunt, et noctu prae gravi pituita inhaerescunt: quantoque minor generis hujus impetus, tanto finis minus expeditus est. In hoc vitio multum ambulare, multum exerceri, lavari saepe, ibique desudare, multaque frictione uti necessarium est. Cibi neque ii qui implent, neque nimium acres, apti sunt, sed inter hos medii. Mane, ubi concoxisse manifestum est, non est alienum ex sinapi gargarizare; tum deinde caput atque os diutius defricare.

10

30. Collyrium vero aptissimum est, quod *ὀφθαλμικόν* vocatur. Habet myrrhae p.)-(z. papaveris lacrimae, acaciae succi, piperis, gummi, singulorum p.)-(I. lapidis haematitis, lapidis phrygii, lycii, lapidis scissilis, singulorum p.)-(II. aeris combusti p.)-(IV. Ac pyxinum quoque eodem accommodatum est.

31. Si vero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse *ὀφθαλμικόν*; potest similiter id, quod habet aeruginis rasae, piperis longi, papaveris lacrimae, singulorum p.)-(II. piperis albi, gummi, singulorum p.)-(IV. cadmiae elotae, cerussae, singulorum p.)-(VI. Nullum tamen melius est quam Euelpidis, quod *βασιλικόν* nominabat. Habet papaveris lacrimae, cerussae, lapidis assii, singulorum p.)-(II. gummi p.)-(III. piperis albi p.)-(IV. croci p.)-(VI. psorici p.)-(XIII. Nulla autem per se materia est, quae psoricum nominetur; sed chalcitidis aliquid, et cadmiae dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idque in vas fictile additum, et contextum ficulneis foliis, sub terra reponitur, sublatumque post dies viginti rursus teritur, et sic appellatur. Verum de basilico quoque collyrio convenit, ad omnes affectus oculorum id esse idoneum, qui non lenibus medicamentis curantur. Ubi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos laevant et mel et vinum: succurritque et his et aridae lippitudini, si quis panem ex vino subactum super oculum imponit. Nam quum fere sit humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulos, aut palpebras exasperat, sic, et si quid prodit humoris, extrahitur, et si quid iuxta est, repellitur.

10

32. Caligare vero oculi nonnumquam ex lippitudine, nonnumquam etiam sine hac, propter senectutem imbecillitatemve aliam, consuerunt. Si ex reliquiis lippitudinis id vitium est, adjuvat collyrium, quod Ἀσκληπιός nominatur; adjuvat id,
 5 quod ex crocomagmate fit.

33. Proprie etiam ad id componitur, quod διὰ κρόκου vocant. Habet piperis p.)-(. I. croci cilicii, papaveris lacrimae, cerussae, singulorum p.)-(. II. psorici, gummis, singulorum p.)-(. IV.

10 34. At si ex senectute aliave imbecillitate id est, recte inungi potest et melle quam optimo, et cyprino, et oleo veterere. Commodissimum tamen est balsami partem unam, et olei veteris, aut cyprini partes duas, mellis quam acerrimi partes tres miscere. Utilia huc quoque medicamenta sunt,
 15 quae ad caliginem proxime, quaeque ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt. Cuicumque vero oculi caligabunt, huic opus erit multa ambulatione atque exercitatione; frequenti balneo; ubi totum quidem corpus perfricandum est, praecipue tamen caput, et quidem irino, donec insudet; ve-
 20 landumque postea, nec detegendum, antequam sudor et calor domi conquierint. Tum cibis utendum acribus et extenuantibus; interpositisque aliquibus diebus, ex sinapi gargarizandum.

35. Suffusio quoque, quam Graeci ὑπόχυσιν nominant, interdum oculi potentiae, qua cernit, se opponit. Quod si
 25 inveteravit, manu curandum est: inter initia nonnumquam certis observationibus discutitur. Sanguinem ex fronte vel naribus mittere; in temporibus venas adurere; gargarizando pituitam evocare; suffumigare; oculos acribus medicamentis inungere, expedit. Victus optimus est, qui pituitam extenuat.

30 36. Ac ne resolutio quidem oculorum, quam παράλυσιν Graeci nominant, alio victus modo, vel aliis medicamentis curanda est. Exposuisse tantum genus vitii satis est. Igitur interdum evenit, modo in altero oculo, modo in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione
 35 nervorum, qua vehementer ipse oculus concussus est, ut ita neque quoquam intendi possit, neque omnino consisti huc illucve sine ratione moveatur, ideoque ne cons
 quidem rerum praestet.

37. Non multum ab hoc malo distat id, quod *μυδράσις* Graeci vocant. Pupilla funditur et dilatatur, aciesque ejus hebetescit, ac paene *. Difficillime genus id imbecillitatis eliditur. In utraque vero pugnandum est per eadem omnia, quae in caligine oculorum praecepta sunt (§ 32—34),⁵ paucis tantum mutatis: siquidem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum adjiciendum est; melle inungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis usi relevatique: quidam sine ulla manifesta causa subito obcaecati sunt. Ex quibus nonnulli, quum aliquamdiu nihil vidissent, repentina¹⁰ profusione alvi lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, et recenti re, et interposito tempore, medicamentis quoque moliri dejectiones, quae omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

38. Praeter haec imbecillitas oculorum est, ex qua quidam¹⁵ interdiu satis, noctu nihil cernunt: quod in feminam bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet sanie jecinoris, maxime hircini, sin minus caprini, ubi id assum coquitur, excepta: atque edi quoque ipsum jecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis²⁰ non inutiliter uti, quae vel cicatrices, vel aspritudinem extenuant. Quidam contrito semini portulacae mel adjiciunt eatenus, ne id ex specillo destillet, eoque inungunt. Exercitationibus, balneo, frictionibus, gargarizationibus iisdem his quoque utendum est.²⁵

39. Et haec quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus vero interdum sic ictus oculum laedit, ut sanguis in eo suffundatur. Nihil commodius est, quam sanguine vel columbae, vel palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit; quum horum acies extrinsecus laesa inter-³⁰posito tempore in antiquum statum redeat, celerrimeque hirundinis. Unde etiam locus fabulae factus est, per parentes id herba restitui (cf. Plin. XXV, 8, 50), quod per se sanescit. Eorum ergo sanguis nostros quoque oculos ab externo casu commodissime tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minime efficax columbae, et illi ipsi, et nobis. Supra percussum vero oculum, ad inflammationem leniendam, non est alienum imponere etiam

cataplasma. Sal ammoniacus, vel quilibet alius quam optimus teri debet, sic, ut ei paulatim oleum adjiciatur, donec crassitudo strigmenti fiat; id deinde miscendum est cum hordeacea farina, quae ex mulso decocta sit. Facile autem, 5 recognitis omnibus, quae medici prodiderunt, apparere cuilibet potest vix ullum ex iis, quae supra comprehensa sunt, oculi vitium esse, quod non simplicibus quoque, et promptis remediis submoveri possit.

CAPUT VII.

10

De aurium morbis.

1. Hactenus in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimum possunt: ideoque ad aures transeundum est, quarum usum proximum a luminibus natura nobis dedit. Sed in his aliquanto majus periculum est: nam vitia oculorum 15 intra ipsos nocent; aurium inflammationes doloresque (cf. *Aph.* V, 40; *Cels.* II, 7) interdum etiam ad dementiae mortemque praecipitant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est, ne majori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere et continere se 20 debet. Postero die, si vehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere et operire. At magnus cum febre vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. Si id aliquae causae prohibent, alvus solvenda est. Cataplasmata quoque calida, subinde mutata, proficiunt; 25 sive foeni graeci, sive lini, sive alia farina ex mulso decocta est. Recte etiam subinde admoventur spongiae ex aqua calida expressae. Tum, levato dolore, ceratum circumdari debet ex irino, aut cyprino factum: in quibusdam tamen melius, quod ex rosa est, proficit. Si vehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adjici cataplasmati debent papaveris cortices fricti atque contriti, sic, ut ex his pars dimidia sit; eaque tum simul ex passo mixto decoquantur. In aurem vero infundere aliquod medicamentum oportet; quod semper ante tepesceri convenit: commodissimeque 35 per strigilem instillatur. Ubi auris repleta est, super lana

mollis addenda est, quae humorem intus contineat. Et haec quidem communia sunt. Medicamentum vero est et rosae, et radicum arundinis succus, et oleum, in quo lumbrici cocti sint, et humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali persici expressus. Composita vero ad inflammationem dolorem-⁵ que leniendum haec fere sunt: castorei, papaveris lacrimae pares portiones conteruntur, deinde adjicitur his passum: vel papaveris lacrimae, croci, myrrhae par modus sic teritur, ut invicem modo rosa, modo passum instilletur: vel id, quod amarum in aegyptia faba est, conteritur, rosa adjecta;¹⁰ quibus myrrhae quoque paulum a quibusdam miscetur: vel papaveris lacrima, aut tus cum muliebri lacte: vel amararum nucum cum rosa succus: vel castorei, myrrhae, papaveris lacrimae pares portiones cum passo: vel croci p.)-(. Ξ . myrrhae, aluminis scissilis, singulorum p.)-(. z. quibus,¹⁵ dum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, mellis minus cyatho; idque ex primis medicamentis est: vel papaveris lacrima ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis; quae habet castorei, opopanax, papaveris lacrimae, singulorum p.)-(. II. spumae lycii p.)-(. IV. quae contrita passo excipiuntur, donec cerati crassitudinem habeant, atque ita reponuntur. Ubi usus requirit, rursus id medicamentum, adjecto passo, teritur. Illud perpetuum est, quotiescumque crassius medicamentum est, quam ut in aurem instillari possit, adjiciendum eum esse²⁵ humorem, ex quo id componi debet, donec satis liquidum sit.

2. Si vero pus quoque aures habent, recte lycium per se infunditur, aut irinum unguentum; aut porri succus cum melle; aut centaurii succus cum passo; aut dulcis mali punici succus in ipsius cortice tepefactus, adjecta myrrhae exigua parte. Recte etiam miscentur myrrhae, quam *σταντήν* cognominant, p.)-(. I. croci tantumdem, nuces amarae XXV. mellis sesquicyathus: quae contrita, quum utendum est, in cortice mali punici tepefiunt. Ea quoque medicamenta, quae³⁵ oris exulcerati causa componuntur, aequae ulcera aurium sanant. Quae si vetustiora sunt, et multa sanies fluit, apta compositio est, quae ad auctorem Erasistratum refertur:

piperis p.)-(z. croci p.)-(Ξ . myrrhae, misy cocti, singulorum p.)-(I. aeris combusti p.)-(II. Haec ex vino teruntur: deinde ubi inaruerunt, adjiciuntur passi heminae tres, et simul incoquantur: quum utendum est, adjicitur
 5 his mel et vinum. Est etiam Ptolemaei medicamentum, quod habet lentisci p.)-(z. gallae p.)-(z. omphacii p.)-(I. succum punici mali. Est Menophili validum admodum, quod ex his constat: piperis longi p.)-(I. castorei p.)-(II. myrrhae, croci, papaveris lacrimae, nardi syriaci,
 10 turis, malicorii, ex aegyptia faba partis interioris, nucum amararum, mellis quam optimi, singulorum p.)-(IV. quibus, dum teruntur, adjicitur acetum quam acerrimum, donec crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis: cinnamomi, casiae, singulorum p.)-(z. lycii, nardi, myrrhae, singulorum
 15 p.)-(I. aloes p.)-(II. mellis cyathi tres, vini sextarius: ex quibus lycium cum vino decoquitur, deinde his alia miscentur. At si multum puris, malusque odor est, aeruginis rasae, turis, singulorum p.)-(II. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquantur: ubi utendum est, dulce vinum
 20 miscetur. Aut aluminis scissilis, papaveris lacrimae, acaciae succi par pondus miscetur, hisque adjicitur hyoscyami succi dimidio minor, quam unius ex superioribus, portio; eaque trita ex vino diluuntur. Per se quoque hyoscyami succus satis proficit.

25 3. Commune vero auxilium adversus omnes aurium casus, jamque usu comprobatum Asclepiades composuit. In eo sunt cinnamomi, casiae, singulorum p.)-(I. floris junci rotundi, castorei, albi piperis, longi, amomi, myrobalani, singulorum p.)-(II. turis masculi, nardi syriaci, myrrhae
 30 pinguis, croci, spumae nitri, singulorum p.)-(III. quae separatim contrita, rursus mixta, ex aceto conteruntur: atque ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. Quod si et sanies profluit, et tumor est, non alienum est, mixto vino per oricularium clysterem eluere; et tum infundere
 35 vinum austerum cum rosa mixtum, cui spodii paulum sit adjectum, aut lycium cum lacte, aut herbae sanguinalis succum cum rosa, aut mali punici succum cum exigua myrrhae parte.

4. Si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur; et tum aliquod ex iis, quae supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur. Si magis pus profluit, et caput utique tondendum est, et multa calida aqua perfundendum, et gargarizandum, et usque ad lassitudinem ambulandum, et cibo modico utendum est. Si cruor quoque ex ulceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundi; vel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbae sanguinalis, aut acaciae adjecto. Quod si super ulcera caro increvit, eaque mali odoris saniem fundit, aqua tepida elui debet; tum infundi id, quod ex ture et aerugine et aceto et melle fit; aut mel cum aerugine incoctum. Squama quoque aeris cum sandaracha contrita per fistulam recte instillatur.

5. Ubi vero vermes orti sunt, si juxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt: si longius, medicamentis enecandi; 15 cavendumque ne postea nascantur. Ad utrumque proficit album veratrum cum aceto contritum. Elui quoque aurem oportet vino, in quo marrubium decoctum sit. Sub his emortui vermes in primam auris partem prolabantur, unde facillime educi possunt. 20

6. Si foramen auris compressum est, et intus crassa sanies subest, mel quam optimum addendum est. Si id parum proficit, mellis cyatho et dimidio, aeruginis rasae p.)-(. II. adjiciendum est, incoquendumque, et eo utendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item galbani p. 25)-(. II. myrrhae et fellis taurini, singulorum p.)-(. z. z. vini quantum satis est ad myrrham diluendam.

7. Ubi vero gravius aliquis audire coepit, quod maxime post longos capitis dolores evenire consuevit, in primis aurem ipsam considerare oportet: apparebit enim aut crusta, qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle aerugo, vel porri succus, aut cum mulso nitri paulum: atque ubi crusta a corpore jam recedit, eluenda auris aqua tepida est; quo facilius ea per se diducta oriculario 35 specillo protrahatur. Si sordes, eaeque molles sunt, eodem specillo eximendae sunt: at si durae sunt, acetum et cum eo nitri paulum conjiciendum est; quumque emollitae sunt,

eodem modo elui aurem purgarique oportet. Quod si capitis gravitas manet, attendendum idem, et leniter, sed diu perfricandum est, adjecto vel irino vel laureo oleo, sic, ut utrilibet paulum aceti misceatur; tum diu ambulandum, leniterque post unctionem aqua calida caput fovendum; cibisque utendum ex imbecillissima et media materia; magisque assumendae dilutae potiones; nonnumquam gargarizandum est. Infundendum autem in aurem castoreum cum aceto et laureo oleo et succo radiculæ corticis; aut cucumeris agrestis succus, adjectis contritis rosae foliis. Immaturae quoque uvæ succus cum rosa instillatus adversus surditatem satis proficit.

8. Aliud vitii genus est, ubi aures intra se ipsas sonant; atque hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant. Levissimum est, ubi id ex gravedine est: pejus, ubi ex morbo, capitisve longis doloribus incidit; pessimum ubi, magnis morbis venientibus, maximeque comitali, provenit. Si ex gravedine est, purgare aurem oportet, et spiritum continere, donec inde humor aliquis expumet. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad exercitationem, frictionem, perfusionem, gargarizationemque pertinet, eadem facienda sunt: cibis non utendum nisi extenuantibus; in aurem dandus radiculæ succus cum rosa, vel cum succo radicis ex cucumere agresti: vel castoreum cum aceto et laureo oleo. Veratrum quoque ex aceto conteritur, deinde melle cocto excipitur, et inde collyrium factum in aurem demittitur. Si sine his coepit, ideoque novo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto, vel irino, aut laureo oleo; aut huic mixtum castoreum cum succo nucum amararum; aut myrrha et nitrum cum rosa et aceto. Plus tamen in hoc quoque proficit victus ratio: eademque facienda sunt, quae supra comprehendit, cum majore quoque diligentia; et praeterea, donec is sonus finiatur, a vino abstinendum. Quod si simul et sonus est, et inflammatio, laureum oleum conjecisse abunde est, aut id, quod ex amaris nucibus exprimitur; quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

9. Solet etiam interdum in aurem aliquid incidere, calculus, aliquodve animal. Si pulex intus est, compelle

dum eo lanae paulum est; quo ipse is subit, et simul extrahitur. Si non est sequutus, aliudve animal est, specillum lana involutum in resinam quam glutinosissimam, maximeque terebinthinam demittendum, idque in aurem conjiciendum, ibique vertendum est: utique enim comprehendet et eximet. Sin aliquid exanime est, specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso paulum recurvato: si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoque admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoque collocatur, media inhaerens, capitibus utrimque pendentibus, superque eam homo deligatur in id latus versus, cujus auris eo modo laborat, sic, ut extra tabulam non emineat: tum malleo caput tabulae, quod a pedibus est, feritur; atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

15

CAPUT VIII.

De narium morbis.

1. Nares vero exulceratas fovere oportet vapore aquae calidae. Id et spongia expressa atque admota fit, et subjecto vase oris angusti, calida aqua repleto. Post id fomentum illinenda ulcera sunt aut plumbi recremento, aut cerussa, aut argenti spuma; quum quodlibet horum aliquis conterit, eique, dum teritur, invicem vinum et oleum murteum adjicit, donec mellis crassitudinem fecerit. Sin autem ea ulcera circa os sunt, pluresque crustas et odorem foetidum habent; quod genus Graeci ὀξυανν appellunt; sciri quidem debet vix ei malo posse succurri: nihilo minus tamen haec tentari possunt, ut caput ad cutem tondeatur, assidueque vehementer perfricetur; multa calida aqua perfundatur; multa item ambulatio sit; cibus modicus, neque acer, neque valentissimus; tum in narem ipsam mel cum exiguo modo resinae terebinthinae conjiciatur, quod specillo quoque involuto lana fit; attrahaturque spiritu is succus, donec in ore gustus ejus sentiatur; sub his enim crustae resolvuntur, quae tum per sternutamenta elidi debent. Puris ulceribus

35

vapor aquae calidae subjiciendus est: deinde adhibendum aut lycium ex vino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut mentae, aut marrubii succus; aut atramentum sutorium, quod candens factum, deinde contritum sit; aut interior
 5 scillae pars contrita, sic, ut horum cuilibet mel adjiciatur: cujus in ceteris admodum exigua pars esse debet; in atramento sutorio tanta, ut ea mixtura liquida fiat; cum scilla utique pars major. Involvendumque lana specillum est, et in eo medicamento tingendum, eoque ulcera implenda sunt.
 10 rursusque linamentum involutum et oblongum eodem medicamento illinendum, demittendumque in narem, et ab inferiore parte leniter deligandum. Idque per hiemem et ver bis die; per aestatem et autumnum ter die fieri debet.

2. Interdum vero in naribus etiam carunculae quaedam
 15 similes muliebribus mammis nascuntur; eaeque imis partibus, quae carnosissimae sunt, inhaerent. Has curare oportet medicamentis adurentibus, sub quibus ex toto consumuntur. Polypus vero est caruncula modo alba, modo subrubra, quae narium ossibus inhaeret; ac modo ad labra tendens
 20 narem implet, modo retro per id foramen, quo spiritus a naribus ad fauces descendit, adeo increscit, uti post uvam conspici possit; strangulatque hominem, maxime austro aut euro flante: fereque mollis est, raro dura; eaque magis spiritum impedit, et nares dilatat; quae fere *καρκινώδης*
 25 est; itaque attingi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur; interdum tamen inarescit, si addita in narem per linamentum aut penicillum ea compositio est, quae habet minii sinopici, chalcitidis, calcis, sandarachae, singulorum p.)-(I. atramenti sutorii p.)-(II.

In dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, vinum ex toto circumcidendum est; a cibo quoque primo abstinendum, deinde eo modico
 35 mollique utendum, ne mandentis dentes irritet: tum extrin-

secus admovendus per spongiam vapor aquae calidae, imponendumque ceratum ex cyprino aut irino factum, lanaque id comprehendendum, caputque velandum est. Quod si gravior is dolor est, utiliter et alvus ducitur, et calida cataplasmata super maxillas imponuntur, et ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, saepiusque mutatur. Cujus rei causa et quinquefolii radix in vino mixto coquitur; et hyoscyami radix vel in posca, vel in vino mixto sic, ut paulum his salis adjiciatur; et papaveris non nimium aridi cortices, et mandragorae radix eodem modo. Sed in his tribus utique vitandum est, ne, quod haustum erit, devoretur. Ex populo quoque alba cortex radice in hunc usum in vino mixto recte coquitur; et in aceto cornus cervini ramentum; et nepeta cum teda pingui, ac ficus item pinguis vel in mulso, vel in aceto et melle, ex quibus quum ficus decocta est, is humor percolatur. Specillum quoque lana involutum in calidum oleum demittitur, eoque ipse dens fovetur. Quin etiam quaedam quasi cataplasmata in dentem ipsum illinuntur: ad quem usum ex malo punico acido atque arido malicorii pars interior cum pari portione et gallae et pinei corticis conteritur, misceturque his minium; eaque contrita aqua pluviali coguntur: aut panacis, papaveris lacrimae, peucedani, uvae taminiae sine seminibus pares portiones conteruntur: aut galbani partes tres, papaveris lacrimae pars quarta. Quidquid dentibus admotum est, nihilominus supra maxillas ceratum, quale supra posui, esse debet, lana obtectum. Quidam etiam myrrhae, cardamomi, singulorum p.)-(I. croci, pyrethri,*ficorum partes, singulorum p.)-(IV. sinapis p.)-(VIII. contrita linteolo illinunt, imponuntque in humero partis ejus, qua dens dolet; si is superior est, a scapulis; si inferior, a pectore: idque dolorem levat; et, quum levavit, protinus submovendum est. Si vero exesus est dens, festinare ad eximendum eum, nisi res cogit, non est necesse: sed tum omnibus fomentis, quae supra posita sunt, adjiciendae quaedam valentiores compositiones sunt, quae dolorem levant; qualis Herae est. Habet autem papaveris lacrimae p.)-(I. piperis p.)-(II. soreos p.)-(X. quae contrita galbano excipiuntur, idque circumdatur. Aut

Menemachi, maxime ad maxillares dentes; in qua sunt croci p.)-(I. cardamomi, turis fuliginis, *ficorum partes, pyrethri, singulorum p.)-(IV. sinapis p.)-(VIII. Quidam autem miscent pyrethri, piperis, elaterii, singulorum p.)-(I. 5 aluminis scissilis, papaveris lacrimae, uvae taminiae, sulphuris ignem non experti, bituminis, lauri baccarum, sinapis, singulorum p.)-(II. Quod si dolor eximi eum cogit, et piperis semen cortice liberatum, et eodem modo bacca hederæ coniecta in id foramen dentem findit, isque per 10 testas excidit: et plani piscis, quam pastinacam nostri, *τρυνόνα* Graeci vocant, aculeus torretur, deinde conteritur, resinaque excipitur, quae denti circumdata hunc solvit; et alumen scissile in id foramen coniectum dentem citat. Sed id tamen involutum lanula demitti commodius est, quia sic, 15 dente servato, dolorem levat. Haec a medicis accepta sunt. Sed agrestium experimento cognitum est, quum dens dolet, herbam mentastrum cum suis radicibus evelli debere, et in pelvem conjici, supraque aquam infundi, collocarique iuxta sedentem hominem undique veste contextum; tum in pelvem 20 candentes silices demitti sic, ut aqua tegantur, hominemque eum hiant ore vaporem excipere, ut supra dictum est, undique inclusum. Nam et sudor plurimus sequitur, et per os continens pituita defluit (cf. IV, 4, 1); idque saepe longiorem, semper annuam valetudinem bonam praestat.

25

CAPUT X.

De tonsillarum inflammatione.

Si vero tonsillae sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput velandum est; extrinsecus is locus vapore calido fovendus; multa ambulatione utendum; caput 30 in lecto sublime habendum; gargarizandumque reprimentibus. Radix quoque ea, quam dulcem appellant, contusa et in passo mulsove decocta idem praestat. Leniterque quibusdam medicamentis eas illini non alienum est; quae hoc modo fiunt. Ex malo punico dulci succus exprimitur, et ejus sex- 35 tarius leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit; tum

croci, myrrhae, aluminis scissilis, singulorum p.)-(. II. per se conteruntur, paulatimque his adjiciuntur vini lenis cyathi duo, mellis unus; deinde priori succo ista miscentur, et rursus leniter incoquantur: aut ejusdem succi sextarius eodem modo coquitur, atque eadem ratione trita haec adjiciuntur; nardi p.)-(. —. omphacii p.)-(. I. cinnamomi, myrrhae, casiae, singulorum p.)-(. I. Eadem autem haec et auribus et naribus purulentis accommodata sunt. Cibus in hac quoque valetudine lenis esse debet, ne exasperet. Quod si tanta inflammatio est, ut spiritum impediat, in lecto con-¹⁰ quiescendum; a cibo abstinendum, neque assumendum quidquam praeter aquam calidam est; alvus quoque ducenda est; gargarizandum ex fico et mulso; illinendum mel cum omphacio; extrinsecus admoendus, sed aliquanto diutius, vapor calidus, donec ea suppurent, et per se aperiantur. Si¹⁵ pure substante non rumpuntur hi tumores, incidendi sunt: deinde ex mulso calido gargarizandum. At si modicus quidem tumor, sed exulceratio est, furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adjiciendum est, illinendaque ulcera hoc medicamento: passi quam dulcissimi tres heminae²⁰ ad unam coquantur; tum adjicitur turis p.)-(. I. croci, myrrhae, singulorum p.)-(. — leniterque omnia rursus fervescent. Ubi pura ulcera sunt, eodem furfurum cremore, vel lacte gargarizandum est. Atque hic quoque cibus lenibus opus est, quibus adjici dulce vinum potest.

25

CAPUT XI.

De oris ulceribus.

Ulcera autem oris, si cum inflammatione sunt, et parum pura ac rubicunda sunt, optime iis medicamentis curantur, quae supra posita ex malis punicis (cf. p. 246, l. 19) fiunt: ³⁰ continendusque saepe ore reprimens cremor est, cui paulum mellis sit adjectum. Utendum ambulationibus, et non acri cibo. Simul atque vero pura ulcera esse coeperunt, lenis humor, inter-
terdum etiam quam optima aqua ore continenda est: prodest-
que assumtum purum vinum, pleniorque cibus, dum acribus³⁵

vacet: inspergigue ulcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallae immaturae sit adjectum. Si jam crustas habent, quales in adustis esse consuerunt, adhibendae sunt eae compositiones, quas Graeci *ἀνθηράς* nominant. Junci
 5 quadrati, myrrhae, sandarachae, aluminis, pares portiones: aut croci, myrrhae, singulorum p.)-(. II. iridis p.)-(. I. aluminis scissilis, sandarachae, singulorum p.)-(. IV. junci quadrati p.)-(. VIII. aut gallae, myrrhae, singulorum p.)-(. I. aluminis scissilis p.)-(. II. rosae foliorum p.)-(. IV. Quidam autem croci p.)-(. z. aluminis scissilis, myrrhae, singulorum p.)-(. I. sandarachae p.)-(. II. junci quadrati p.)-(. IV. miscent. Priora arida insperguntur; hoc cum melle illinitur; neque ulceribus tantum, sed etiam tonsillis.

Verum ea longe periculosissima ulcera sunt, quas *ἄφθας*
 15 Graeci appellant; sed in pueris: hos enim saepe consumunt. In viris et mulieribus idem periculum non est. Haec ulcera a gingivis incipiunt: deinde palatum, totumque os occupant: tum ad uvam faucesque descendunt; quibus obsessis, non facile fit ut puer convalescat. Ac miserius etiam est, si
 20 lactans adhuc infans est; quo minus imperari remedium aliquod potest. Sed in primis nutrix cogenda est exerceri et ambulationibus, et iis operibus, quae superiores partes movent: mittenda in balneum, jubendaque ibi calida aqua mammas perfundere: tum alenda cibus lenibus, et iis qui
 25 non facile corrumpuntur; potione, si febricitat puer, aquae; si sine febre est, vini diluti. Ac si alvus nutrici substitit, ducenda est: si pituita in os ejus coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera perungenda sunt melle, cui rhus, quem syriacum vocant, aut amarae nuces adjectae sint: vel mixtis inter
 30 se rosae foliis aridis, pineis nucleis, mentae coliculo, melle: vel eo medicamento, quod ex moris fit; quorum succus eodem modo quo punici mali, ad mellis crassitudinem coquitur, eademque ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, mel miscetur. Neque quidquam dandum, a quo humor
 35 evocari possit. Si vero jam firmior puer est, gargarizare debet iis fere, quae supra comprehensa sunt: ac si lenia medicamenta in eo parum proficiunt, adhibenda su quae adurendo crustas ulceribus inducant, quale est

alumen, vel chalcitis, vel atramentum sutorium. Prodest etiam fames et abstinencia quanta maxima imperari potest. Cibus esse debet lenis: ad purganda tamen ulcera interdum caseus ex melle recte datur.

CAPUT XII.

5

De linguae ulceribus.

Linguae quoque ulcera non aliis medicamentis egent, quam quae prima parte superioris capitis exposita sunt. Sed quae in latere ejus nascuntur, diutissime durant. Videndumque est num contra dens aliquis acutior sit, qui sanescere 10 saepe ulcus eo loco non sinit; ideoque limandus est.

CAPUT XIII.

De parulidibus et ulceribus gingivarum.

Solent etiam interdum juxta dentes in gingivis tubercula quaedam oriri dolentia: *παρουλίδας* Graeci appellant. Haec 15 initio leniter sale contrito perfricare oportet; aut inter se mixtis sale fossili combusto, cupresso, nepeta; deinde eluere os cremore lenticulae, et inter haec hiare, donec pituitae satis profluat. In majore vero inflammatione iisdem medicamentis utendum est, quae ad ulcera oris supra posita 20 sunt (cap. XI): et mollis linamenti paulum involvendum aliqua compositione ex iis quas *ἀνθηράς* vocari dixi (p. 249, l. 4); demittendumque id inter dentem et gingivam. Quod si tumor id prohibebit, extrinsecus admovendus erit spongia vapor calidus, imponendumque ceratum. Si suppuratio se ostendat, diutius eo vapore utendum erit; et continendum ore calidum mulsum in quo ficus decocta sit: idque subcrudum incidendum, ne, si diutius ibi pus permanserit, os laedat. Quod si major is tumor est, commodius totus exciditur sic, ut ex utraque parte dens liberetur. Pure exemto, si levis plaga est, 30 satis est ore calidam aquam continere, et extrinsecus fovere eodem vapore; si major est, lenticulae cremore uti, iisdem-

que medicamentis, quibus cetera ulcera oris curantur. Alia quoque ulcera in gingivis plerumque oriuntur; quibus eadem, quae in reliquo ore, succurrunt: maxime tamen mandere ligustrum oportet, succumque eum ore continere. Fit etiam interdum, ut ex gingivae ulcere, sive *παρονίς* fuit, sive non fuit, diutius pus feratur: quod aut corrupto dente, aut fracto, vel aliter vitiatō osse: maximeque id per fistulam venire consuevit. Ubi incidit, locus aperiendus; dens eximendus; testa ossis, si qua abscessit, recipienda est; si quid vitiosi est, radendum. Post quae, quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est. Si vero a dentibus gingivae recedunt, eadem antherae succurrunt. Utile est etiam pira aut mala non permatura mandere, et ore eum humorem continere. Idemque praestare non acre acetum in ore retentum potest.

CAPUT XIV.

De uvae morbo.

Uvae vehemens inflammatio terrere quoque debet. Itaque in hac et abstinencia necessaria est; et sanguis recte mittitur; et, si id aliqua res prohibet, alvus utiliter ducitur: caputque super haec velandum, et sublimius habendum est: tum aqua gargarizandum, in qua simul rubus et lenticula decocta sit. Illinenda quoque ipsa uva vel omphacio, vel galla, vel alumine scissili sic, ut cuilibet eorum mel adjiciatur. Est etiam medicamentum huic aptum, quod Andronium appellatur. Constat ex his: alumine scissili, squama aeris rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy: quae per se contrita mixtaque, rursus paulatim adjecto vino austero teruntur, donec his mellis crassitudo sit. Ubi horum aliquo illita uva est, fere multa pituita decurrit: quumque ea quievit, ex vino calido gargarizandum est. Quod si minor ea inflammatio est, laser terere, eique adjicere frigidam aquam satis est, eamque aquam cochleari exceptam ipsi uvae subjicere. Ac mediocriter eam tumentem aqua quoque frigida eodem modo subjecta reprimit. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est.

CAPUT XV.

De cancro oris.

Si quando autem ulcera oris cancer invasit, primum considerandum est, num malus corporis habitus sit, eique occurrendum; deinde ipsa ulcera curanda. Quod si in summa parte id vitium est, satis proficit *ἀνθηρά*, humido ulceri arida inspersa; sicciori, cum exigua parte mellis illita: si paulo altius, chartae combustae partes duae, auripigmenti pars una: si penitus malum descendit, chartae combustae partes tres, auripigmenti pars quarta; aut pares portiones salis fricti, et iridis frictae; aut item pares portiones chalcitidis, calcis, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere, et super adurentia medicamenta imponere; ne vicinum et sanum locum laedant. Quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem conjiciunt, donec tabescere desinat; deinde id acetum coquunt, donec exsiccetur; eumque salem contritum inspergunt. Quoties autem medicamentum injicitur, et ante et post os eluendum est vel cremore lenticulae, vel aqua, in qua aut ervum, aut oleae, aut verbenae decoctae sint, sic, ut cuilibet eorum paulum mellis misceatur. Acetum quoque ex scilla retentum ore satis adversus haec ulcera proficit: et ex aceto cocto sali, sicut supra demonstratum est, rursus mixtum acetum. Sed et diu continere utrumlibet, et id bis aut ter die facere, prout vehemens malum est, necessarium est. Quod si puer est, cui id incidit, specillum lana involutum in medicamentum demittendum est, et super ulcus tenendum; ne per imprudentiam adurentia devoret. Si dolor in gingivis est, moventurque aliqui dentes, refigi eos oportet: nam curationem vehementer impediunt. Si nihil medicamenta proficient, ulcera erunt adurenda. Quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius est. Et id quidem aequè adustum atque excisum sine ea curatione, quae manu adhibetur, impleri non potest. Gingivarum vero ossa, quae hebetia sunt, in perpetuum ustione nudantur: neque enim postea caro increscit. Imponenda tamen adustis lenticula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

CAPUT XVI.

De parotidibus.

Haec in capite fere medicamentis egent. Sub ipsis vero auribus oriri parotides solent; modo in secunda valetudine, sibi inflammatione orta; modo post longas febres, illuc impetu morbi converso. Id abscessus genus est: itaque nullam novam curationem desiderat. Animadversionem tantummodo hanc habet necessariam; quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experimentum est; si ex adversa valetudine, illud inimicum est, maturarique et quam primum aperiri commodius est.

CAPUT XVII.

De umbilico prominente.

Ad umbilicos vero prominentes, ne manu ferroque utendum sit, ante tentandum est ut abstineant; alvus his ducatur; imponatur super umbilicum id, quod ex his constat: cicutae et fuliginis, singulorum p.)-(I. cerussae elotae p.)-(VI. plumbi eloti p.)-(VIII. ovis duobus; quibus etiam solani succus adjicitur. Hoc diutius impositum esse oportet: et interim conquirere hominem; cibo modico uti sic, ut videntur omnia infantia.

CAPUT XVIII.

De obscoenarum partium vitiis.

1. Proxima sunt ea, quae ad partes obscoenas pertinent: quarum apud Graecos vocabula et tolerabilius se habent, et accepta jam usu sunt; quum in omni fere medicorum volumine atque sermone jactentur: apud nos foediora verba, ne consuetudine quidem aliqua verecundius loquentium commendata sunt: ut difficilior haec explanatio sit simul et pudorem et artis praecepta servantibus. Neque tamen ea res a scribendo detertere me debuit: primum, ut omnia, quae salutaria accepi, comprehenderem: dein, quia in vulgus eorum curatio etiam praecipue cognoscenda est, quae invitissimus quisque alteri ostendit.

2. Igitur si ex inflammatione coles intumuit, reducique summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fovendus locus est. Ubi vero glans contacta est, oriculario quoque clystere inter eam cutemque aqua calida inserenda est. Si mollita sic et extenuata cutis ducenti paruit, expeditior reliqua curatio est: si tumor vicit, imponenda est vel lenticula, vel marrubium, vel oleae folia ex vino cocta, sic, ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum adjiciatur: sursumque coles ad ventrem deligandus est, quod in omni curatione ejus necessarium est. Isque homo continere se, et abstinere a cibo debet, et potione aquae tantum a siti vindicari. Postero die rursus abhibendum iisdem rationibus aquae fomentum est, et cum vi quoque experiendum, an cutis sequatur: eaque, si non parebit, leviter summa scapello concidenda erit: nam quum sanies profluxerit, extenuabitur is locus, et facilius cutis ducetur. Sive autem hoc modo victa erit, sive numquam repugnaverit, ulcera vel in cutis posteriore parte, vel in glande, ultrave eam in cole reperientur: quae necesse est aut pura siccaeque sint, aut humida et purulenta. Si sicca sunt, primum aqua calida fovenda sunt: deinde imponendum lycium ex vino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum. Si levis iis humor inest, vino eluenda sunt: tum butyro et rosae mellis paulum, et resinae terebinthinae pars quarta adjicienda est, eoque utendum. At si pus ex iis profluit, ante omnia elui mulso calido debent: tum imponi piperis p.)-(I. myrrhae p.)-(I. croci, misy cocti, singulorum p.)-(II. quae ex vino austero coquantur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, uvae madenti, oris nariumque ulceribus accommodata est. Aliud ad eadem: piperis p.)-(z. myrrhae p.)-(z. croci p.)-(z. misy cocti p.)-(I. aeris combusti p.)-(II. quae primum ex vino austero conteruntur; deinde, ubi inaruerunt, iterum teruntur ex passibus cyathis, et incoquantur, donec visci crassitudinem habeant. Aerugo quoque cum cocto melle, et ea, quae ad oris ulcera supra comprehensa sunt; aut Erasistrati compositio, aut Cratonis recte super purulenta naturalia imponitur. Folia quoque oleae ex novem cyathis vini coquantur; his

adjicitur aluminis scissilis p.)-(IV. lycii p.)-(VIII. mellis
 sesquicyathus: ac, si plus puris est, id medicamentum ex
 melle; si minus, ex vino diluitur. Illud perpetuum est, post
 curationem, dum inflammatio manet, quale supra positum
 5 est, cataplasma superdare, et quotidie ulcera eadem ratione
 curare. Quod si pus et multum, et cum malo odore coepit
 profluere, elui cremore lenticulae debet sic, ut ei mellis
 paulum adjiciatur: aut oleae, vel lentisci folia, vel marru-
 bium decoquendum est, eoque humore eodem modo cum
 10 melle utendum: imponendaque eadem; aut etiam omphacium
 cum melle; aut id, quod ex aerugine et melle ad aures fit;
 aut compositio Andronis; aut *ἀνδρονιά* sic, ut ei paulum mellis
 adjiciatur. Quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum
 est, lycio ex vino curant. Si vero ulcus latius atque altius
 15 serpit, eodem modo elui debet: imponi vero aut aerugo aut
 omphacium cum melle; aut Andronis compositio; aut mar-
 rubii, myrrhae, croci, aluminis scissilis cocti, rosae folio-
 rum aridorum, gallae, singulorum p.)-(I. minii sinopici
 p.)-(II. quae per se singula primum teruntur, deinde
 20 juncta iterum melle adjecto, donec liquidi cerati crassitudi-
 nem habeant; tum in aeneo vase leniter coquantur, ne su-
 perfluant; quum jam guttae indurescunt, vas ab igne remo-
 vetur: idque medicamentum, prout opus est, aut ex melle
 aut ex vino liquatur. Idem autem per se etiam ad fistulas
 25 utile est¹⁾. Solet etiam interdum ad nervos ulcus descendere;
 profluitque pituita multa, sanies tenuis malique odoris, non
 coacta, at aquae similis, in qua caro recens lota est; dolo-
 resque is locus, et punctiones habet. Id genus quamvis
 inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum
 30 est; quale est emplastrum *τετραφάρμακον* ex rosa liqua-
 tum sic, ut turis quoque paulum ei misceatur; aut id, quod
 ex butyro, rosa, resina, melle fit; supra vero a me positum
 est (cf. p. 254, l. 23—25). Praecipueque id ulcus multa
 calida aqua fovendum est, velandumque, neque frigori com-
 35 mittendum. Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute

1) Haec verba mihi valde suspecta. Nonne ex margine ad tex-
 tum fluxerunt?

exesus est sic, ut glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. Perpetuumque est, quoties glans, aut ex cole aliquid vel excidit, vel abscinditur, hanc non esse servandam, ne considat, ulcerique agglutinetur, ac neque reduci possit postea, et fortasse fistulam quoque urinae claudat. ⁵

Tubercula etiam, quae *φύματα* Graeci vocant, circa glandem oriuntur: quae vel medicamentis, vel ferro aduruntur; et quum crustae exciderunt, squama aeris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

3. Haec citra cancerum sunt; qui quum in reliquis partibus, tum in his quoque vel praecipue ulcera infestat. Incipit a nigritie: quae si cutem occupavit, protinus specillum subjiciendum, eaque incidenda est; deinde orae vulsellaeprehendendae; tum, quidquid corruptum est, excidendum sic, ut ex integro quoque paulum dematur, idque ad-¹⁵urendum. Quoties quid ustum est, id quoque sequitur, ut imponenda lenticula sit; deinde, ubi crustae exciderunt, ulcera sicut alia curentur. At si cancer ipsum colem occupavit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeque id quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. Si²⁰ medicamenta vincuntur, hic quoque scalpello, quidquid corruptum est, sic, ut aliquid etiam integri trahat, praecidi debet. Illud quoque aequè perpetuum est, exciso cancro vulnus esse adurendum. Sed sive ex medicamentis, sive ex ferro crustae occalluerunt, magnum periculum est, ne his²⁵ decidentibus, ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete, et immobili paene corpore opus est, donec ex ipso crustae leniter resolvantur. At si vel volens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur, immature crustas diduxit, et fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est: si haec parum³⁰ valet, decurrendum est ad medicamenta, quae sanguinem supprimunt (cf. V, 18, 22; 22, 6): si ne haec quidem succurrunt, aduri diligenter et timide debet: neque ullo postea motu dandus eidem periculo locus est.

4. Nonnumquam etiam id genus ibi cancri, quod *φάγέ-³⁵δαινα* a Graecis nominatur, oriri solet. In quo minime differendum, sed protinus iisdem medicamentis, et, si parum valent, ferro adurendum. Quaedam etiam nigrities est,

quae non sentitur, sed serpit, ac, si sustinuiamus, usque ad vesicam tendit; neque succurri postea potest. Si id in summa glande circa fistulam urinae est, prius in eam tenue specillum demittendum est, ne claudatur; deinde id ferro adurendum: si vero alte penetravit, quidquid occupatum est, praecidendum est. Cetera eadem, quae in aliis cancris, facienda sunt.

5. Occallescit etiam in cole interdum aliquid; idque omni paene sensu caret: quod ipsum quoque excidi debet. 10 Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, per oricularium clysterem eluendus est: deinde ipse quoque medicamenti urendus, maximeque chalcitide cum melle, aut aerugine cum cocto melle, aut ovillo stercore fricto et contrito cum eodem melle. Ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quae ad oris ulcera componuntur.

6. In testiculis vero, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est: a cibo abstinendum; imponenda ex faba farina ex mulso cocta cum cumino contrito et ex melle coacto; aut contritum cuminum cum cerato ex 20 rosa facto; aut lini semen frictum, contritum, et in mulso coctum; aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso; aut lili radix contrita. At si iidem induruerunt, imponi debet lini vel foeni graeci semen ex mulso coctum; aut ex cyprino ceratum; aut simila ex vino contrita, cui paulum croci sit adjectum. Si vetustior jam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita. Si ex ictu tument, sanguinem mitti necessarium est; magisque, si etiam livent: imponendum vero utrumlibet ex iis, quae cum cumino componuntur, supraque posita sunt; aut ea composio, quae habet nitri cocti p.)-(. I. resinae pineae, cumini, singulorum p.)-(. II. uvae taminiae sine seminibus p.)-(. IV. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculis aliquid haesit, fere pus quoque increscit; neque aliter succurri potest, quam si, inciso scroto, et pus emissum, 35 et ipse testiculus excisus est.

7. Anus quoque multa taediique plena mala recipit, quae inter se multum abhorrentes curationes habet. Ac prius in eo saepe, et quidem pluribus locis, cutis scinditur:

γάδια Graeci vocant. Id si recens est, quiescere homo debet, et in aqua calida desidere. Columbina quoque ova coquenda sunt, et, ubi induruerunt, purganda: deinde alterum jacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus sic, ut invicem utroque aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, aut rhyphodes rosa diluendum est; aut oesypum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa facto; aut eidem cerato plumbum elotum adjiciendum; aut resinae terebinthinae myrrha; aut spumae argenti vetus oleum; et quolibet ex his id perungendum. Si quidquid laesum est, extra est, neque intus 10 reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum superdandum est, et quidquid ante adhibuimus, cerato contegendum. In hoc autem casu neque acribus cibis utendum, neque asperis, nec alvum comprimentibus: ne aridum quidem quidquam satis utile est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia, 15 pinguis, glutinosa meliora sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

8. Condyloma autem est tuberculum, quod ex quadam inflammatione nasci solet. Id ubi ortum est, quod ad quietem cibos potionesque pertinet, eadem servari debent, quae proxime scripta sunt. Iisdem etiam ovis recte tuberculum id fovetur: sed desidere ante homo in aqua debet, in qua verbernae decoctae sint ex reprimentibus. Tum recte imponitur et lenticula cum exigua mellis parte; et sertula campana ex vino cocta; et rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto; 25 et cum eodem cerato contritum vel cotoneum malum, vel malicorii ex vino cocti pars interior; et chalcitis cocta atque contrita, deinde oesypo ac rosa excepta; et ex ea compositione, quae habet turis p.)-(. I. aluminis scissilis p.)-(. II. cerussae p.)-(. III. spumae argenti p.)-(. V. quibus, dum 30 teruntur, invicem rosa et vinum instillatur. Vinculum autem ei loco linteolum aut panniculus quadratus est, qui ad duo capita duas ansas, ad altera duo totidem fascias habet; quumque subjectus est, ansis ad ventrem datis, a posteriore parte in eas adductae fasciae conjiciuntur, atque, ubi arcatae sunt, 35 dexterio sinistra, sinisterio dextra procedit, circumdataeque circa alvum inter se novissime deligantur. Sed si vetus condyloma jam induruit, neque sub his curationibus desidit,

aduri medicamento potest, quod ex his constat: aeruginis p.)-(. II. myrrhae p.)-(. IV. gummi p.)-(. VIII. turis p.)-(. XII. stibis, papaveris lacrimae, acaciae, singulorum p.)-(. XVI. Quo medicamento quidam etiam ulcera, de quibus
 5 proxime dixi (§ 2), renovant. Si hoc parum in condylomate proficit, adhiberi possunt etiam vehementius adurentia. Ubi consumptus est tumor, ad medicamenta lenia transeundum est.

9. Tertium vitium est, ora venarum tamquam capitulis
 10 quibusdam surgentia, quae saepe sanguinem fundunt: *αλμοφοῖδας* Graeci vocant. Idque etiam in ore vulvae feminarum incidere consuevit. Atque in quibusdam parum tuto supprimitur, qui sanguinis profluvio imbecilliores non sunt: habent enim purgationem hanc, non morbum. Ideoque curati
 15 quidam, quum sanguis exitum non haberet, inclinata in praecordia ac viscera materia, subitis et gravissimis morbis correpti sunt. Si cui vero id nocet, is desiderare in aqua ex verbenis debet: imponere maxime malicorium cum aridis rosae foliis contritum; aut ex iis aliqua, quae sanguinem supprimunt
 20 (cf. § 3; fine). Solet autem oriri inflammatio, maxime ubi dura alvus eum locum laesit. Tum in aqua dulci desidendum est, et id fovendum ovis: imponendi vitelli cum rosae foliis ex passo subactis: idque, si intus est, digito illinendum; si extra, superillitum panniculo imponendum est. Ea quoque medica-
 25 menta, quae in recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt. Cibis vero in hoc casu iisdem, quibus in prioribus, utendum est. Si ista parum juvant, solent imposita medicamenta adurentia ea capitula absumere. Ac si jam vetustiora sunt, sub auctore Dionysio inspergenda sandaracha est:
 30 deinde imponendum id, quod ex his constat: squamae aeris, auripigmenti, singulorum p.)-(. V. saxi calcis p.)-(. VIII. postero die acu compungendum. Adustis (*adsutis*?) capitulis fit cicatrix, quae sanguinem fundi prohibet. Sed quoties is suppressus est, ne quid periculi afferat, multa exercitatione digerenda materia est; praetereaque et viris, et femi-
 35 nis, quibus menstrua non proveniunt, interdum ex brachii sanguis mittendus est.

10. At si anus ipse, vel os vulvae procidit, nam id

que interdum fit, considerari debet, purum ne id sit, quod provolutum est, an humore mucoso circumdatum. Si purum est, in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cum verbenis vel malicorio incotta: si humidum, vino austero subluendum est, illinendumque faece vini combusta. Ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est; imponendaque plantago contrita, vel folia salicis in aceto cocta; tum linteolum et super lana: eaque deliganda sunt, cruribus inter se devinctis.

11. Fungo quoque simile ulcus in eadem sede nasci solent. Id, si hiems est, egelida; si aliud tempus, frigida aqua fovendum est: dein squama aeris inspergenda, supraque ceratum ex murteo factum, cui paulum squamae, fuliginis, calcis sit adjectum. Si hac ratione non tollitur, vel medicamentis vehementioribus, vel ferro adurendum est.

CAPUT XIX.

De digitorum ulceribus.

Digitorum autem vetera ulcera commodissime curantur aut lycio, aut amurca cocta, quum utrilibet vinum adjectum est. In iisdem recedere ab ungue caruncula cum magno dolore consuevit: *πτερόν* Graeci appellant. Oportet alumen melinum rotundum in aqua liquare, donec mellis crassitudinem habeat: tum, quantum ejus aridi fuit, tantumdem mellis infundere, et rudicula miscere, donec similis croco colore fiat, eoque illinere. Quidam ad eundem usum decoquere simul malunt, quum paria pondera aluminis aridi et mellis miscuerunt. Si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fovendi aqua ex verbenis, imponendumque super medicamentum ita factum: chalcitis, malicorium, squama aeris excipiuntur fico pingui leniter cocta ex melle; aut charatae combustae, auripigmenti, sulphuris ignem non experti par modus cerato miscetur ex murteo facto: aut aeruginis rasae p.)-(I. squamae aeris p.)-(XII. mellis cyatho coguntur: aut pares portiones miscentur saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. Quidquid horum impositum est, tegendum

linoleo aqua madefacto est. Tertio die digitus resolvendus, et, si quid aridi est, iterum excidendum, similisque adhibenda curatio est. Si non vincitur, purgandum est scalpello; tenuibusque ferramentiis adurendum, et, sicut reliqua usta, curandum est. At, ubi scabri unguis sunt, circumaperiri debent, qua corpus contingunt: tum super eos ex hac compositione aliquid imponi: sandarachae, sulphuris, singulorum p.)-(. II. nitri, auripigmenti, singulorum p.)-(. IV. resinae liquidae p.)-(. VIII. tertioque id die resolvendum est. Sub quo medicamento vitiosi unguis cadunt, et in eorum locum meliores renascuntur.

A. CORNELII CELSI
ARTIUM LIBER DUODECIMUS

IDEM

MEDICINAE SEPTIMUS.

PRAEFATIO.

De chirurgia, ejusque historia, et de optimi Chirurgi qualitatibus.

Tertiam esse medicinae partem, quae manu curet, et vulgo notum, et a me propositum est. Ea non quidem medicamenta atque victus rationem omittit; sed manu tamen plurimum praestat: estque ejus effectus inter omnes medicinae partes evidentissimus. Siquidem in morbis quum multum fortuna conferat, eademque saepe salutaria, saepe vana sint; potest dubitari secunda valetudo medicinae, an corporis beneficio contigerit. In iis quoque, in quibus medicamentis maxime nitimur, quamvis profectus evidentior est, tamen sanitatem et per haec frustra quaeri, et sine his reddi saepe, manifestum est: sicut in oculis quoque deprehendi potest; qui a medicis diu vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea parte, quae manu curat, evidens est, omnem profectum, ut aliquid ab aliis adjuvetur, hinc tamen plurimum trahere.

Haec autem pars, quum sit vetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicinae Hippocrate, quam a prioribus excolta est: deinde, posteaquam diducta ab aliis habere profectum fessores suos coepit, in Aegypto quoque increvit, Philoxeno maxime auctore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque et Sostratus et Heron et Apollonii duo et Ammonius Alexandrinus, multique

alii celebres viri, singuli quaedam reppererunt. Ac Romae quoque non mediocres professores, maximeque nuper Tryphon pater, et Euelpistus, et, ut ex scriptis ejus intelligi potest, horum eruditissimus Meges, quibusdam in melius
5 mutatis, aliquantum ei disciplinae adjecerunt.

Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentiae propior; manu strenua, stabili, nec umquam intremiscente, eaque non minus sinistra, quam dextra promptus; acie oculorum acri claraque; animo intrepidus, misericors
10 sic, ut sanari velit eum, quem accepit, non ut clamore ejus motus vel magis, quam res desiderat, properet, vel minus, quam necesse est, secet; sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriatur. Potest autem requiri, quid huic parti proprie vindicandum sit: quia vulnerum quoque ulcerumque multorum curationes, quas alibi exsecutus sum, chirurgi sibi vindicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista praestare concipio: atque ubi se diviserunt, eum laudo, qui quamplurimum percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus,
20 non accipit; et in quibus vulneribus ulceribusque plus profici manu, quam medicamento, credo: tum quidquid ad ossa pertinet. Quae deinceps exsequi aggrediar; dilatisque in aliud volumen ossibus, in hoc cetera explicabo; praepositisque iis, quae in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quae proprias sedes habent, transibo (cf. P. Aeg. VI, 1).

CAPUT I.

De luxatis.

Luxata (Gallice: *distorsions, distensions, entorses*) igitur in quacumque parte corporis sunt, quamprimum sic curari debent, ut, qua dolor est, ea scalpello cutis crebro incidatur, detergeaturque eodem averso profluens sanguis. Quod si paulo tardius subvenitur, jamque etiam rubor est, qua rubet corpus; si tumor quoque accessit, quacumque is est, id optimum auxilium est. Tum superdanda reprimentia sunt; maximeque
35 lana succida ex aceto et oleo. Quod si levior is casus est, possunt etiam sine scalpello, imposita eadem mede

nihil aliud est, cinis quoque, maxime ex sarmentis; si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

CAPUT II.

De his, quae per se intumescunt, quomodo incidenda, et curanda sint.

Verum hoc quidem promptum est. In iis autem negotium majus est, quae per se, vitio intus orto, intumescunt, et ad suppurationem spectant. Ea omnia genera abscessuum esse alias proposui, medicamentaque his idonea exsequutus sum (cf. V, 28): nunc superest, ut dicam, in iisdem quae manu fieri debeant. Ergo, priusquam indurescant, cutem incidere,¹⁰ et cucurbitulam accommodare oportet, quae quidquid illuc malae corruptaeque materiae coit, extrahat: idque iterum, tertioque recte fit, donec omne indicium inflammationis excedat. Neque tamen fas non est, nihil cucurbitulam agere. Interdum enim fit, sed raro, ut quidquid abscedit, velamento suo includatur. Id antiqui tunicam nominabant. Meges, quia tunica omnis nervosa est, dixit non nasci sub eo vitio nervum, quo caro consumeretur, sed, subjecto jam vetustiore pure, callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo loco pertinet; quia quidquid, si tunica est, idem, si callus est,²⁰ fieri debet. Neque ulla res prohibet, etiamsi callus est, tamen, quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoque maturior haec interdum esse consuevit: ideoque, quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. Sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo, sive id incidit, sive jam durities est, in hac auxilii nihil est; et, ut alias scripsi (II, 23; V, 3, 11, 12—16), vel avertenda concurrens eo materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil praeterea necessarium est. Si pus maturuit, in alis quidem et inguinibus³⁰ raro secandum est; item ubicumque mediocris abscessus est; item quoties in summa cute, vel etiam carne vitium est: nisi festinare cubantis imbecillitas cogit: satisque est cataplasmatibus efficere, ut per se pus aperiatur. Nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Si autem³⁵

altius malum est, considerari debet, nervosusne is locus sit an non sit. Nam si sine nervis est, candenti ferramento aperiri debet: cujus haec gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus evocandum patet, parvaeque postea cicatrix fit.

⁵ At si nervi juxta sunt, ignis alienus est, ne vel distendantur hi, vel membra debilitent: necessaria vero opera scalpelli est. Sed cetera etiam subcruda aperiri possunt: inter nervos ultima exspectanda maturitas est, quae cutem extenuet, eique pus jungat, quo propius reperiatur. Itemque alia rectam

¹⁰ plagam desiderant: in pano, quia fere vehementer cutem extenuat, tota ea super pus excidenda est. Semper autem, ubi scalpellus admovetur, id agendum est, ut et quam minimae et quam paucissimae plagae sint: cum eo tamen, ut necessitati succurramus et in modo, et in numero (P. Aeg.

¹⁵ VI, 34). Nam majores sinus latius; interdum etiam duabus, aut tribus lineis incidendi sunt. Dandaque opera, ut imus sinus exitum habeat; ne quis humor intus subsidat, qui proxima et adhuc sana rodendo sinuet. Est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit. Nam, ubi post longos morbos

²⁰ totus corporis habitus vitiatus est, lateque se sinus suffudit, et in eo jam cutis pallet; scire licet eam jam emortuam esse, et inutilem futuram: ideoque excidere commodius est; maxime, si circa articulos majores id evenit, cubantemque aegrum fluens alvus exhaurit, neque per alimenta quidquam

²⁵ corpori accedit. Sed excidi ita debet, ut plaga ad similitudinem myrtei folii fiat, quo facilius sanescat (P. Aeg. VI, 34): idque perpetuum est, ubicumque medicus et quacumque de causa cutem excidit. Pure effuso, in alis vel inguinibus linamento opus non est; spongia ex vino imponenda est. In

³⁰ ceteris partibus, si aequae linamenta supervacua sunt, purgationis causa paulum mellis infundendum; dein glutinantia superdanda: si illa necessaria sunt, super ea quoque similiter dari spongia eodem modo ex vino expressa debet. Quando autem linamentis opus sit, quando non sit, alias dictum est.

³⁵ Cetera eadem, incisa suppuratione, facienda sunt, quae, ubi per medicamenta rupta est, facienda esse proposui (cf. V, 26, 23 sqq.).

CAPUT III.

De bonis, malisve signis suppurationum.

Protinus autem quantum curatio efficiat, quantumque aut sperari aut timeri debeat, ex quibusdam signis intelligi potest, fereque iisdem, quae in vulneribus exposita sunt (cf. V, 26, 5 2 sqq.). Nam bona signa sunt somnum capere; facile spirare; siti non confici; cibum non fastidire, si febricula fuit, ea vacare; itemque habere pus album, laeve, non foedi odoris (*Aph.* VII, 44). Mala sunt vigilia, spiritus gravitas, sitis, cibi fastidium, febris, pus nigrum, aut foeculentum, et foedi odoris; 10 item procedente curatione eruptio sanguinis; aut, si antequam sinus carne impleatur, orae carnosae fiunt, illa quoque ipsa carne hebet, nec firma. Deficere tamen animam, vel in ipsa curatione, vel postea pessimum omnium est. Quin etiam morbus ipse, sive subito solutus est, dein suppuratio exorta 15 est; sive effuso pure permanet, non injuste terret. Estque inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut haec ipsa fortuna huc illucve discernit, sic medici partium est eniti ad reperiendam sanitatem (cf. V, 26, 26). Ergo quoties ulcus resolverit, eluere id, si reprimendus humor 20 videbitur, vino ex aqua pluviali mixto, vel aqua, in qua lentacula cocta sit, debebit; si purgandum erit, mulso; rursusque imponere eadem. Ubi jam repressus videbitur humor, ulcusque purum erit, produci carnem conveniet, et foveri pari portione vini ac mellis, superque imponi spongiam ex vino et rosa 25 tinctam. Per quae quum caro producatur, plus tamen, ut alias quoque dixi (cf. V, 26, 34), victus ratio eo confert; id est, solutis jam febribus et cibi cupiditate reddita, balneum rarum; quotidiana, sed lenis gestatio; cibi potionesque corpori faciendo aptae. Quae omnia, per medicamenta quoque suppuratione 30 rupta, sequuntur: sed, quia magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reservata sunt.

CAPUT IV.

De fistulis.

1. Adversus fistulas quoque, si altius penetrant, ut ad ultimas demitti collyrium non possit, si tortuosae sunt, si mul-

tiplices, majus in manu quam in medicamentis praesidium est: minusque operae est, si sub cute transversae feruntur, quam si rectae intus tendunt. Igitur, si sub cute transversa fistula est, demitti specillum debet, supraque id ea incidi⁵ (P. Aeg. VI, 77). Si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo et ferro persequendi sunt: idemque faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Ubi ad fines fistulae ventum est, excidendus ex ea totus callus est, superque fibulae dandae, et medicamentum, quo glutinetur. At si recta subter¹⁰ tendit, ubi, quo maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet: dein fibula oris cutis injicienda est, et aequae glutinantis medicamenta superdanda sunt; aut, si corruptum ulcus est, quod interdum osse vitiatum fit, ubi id quoque curatum est, pus moventia.

¹⁵ 2. Solent autem inter costas fistulae subter ire. Quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte praecidenda et eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur. Solent, ubi costas transierunt, septum id, quod transversum a superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intelligi et²⁰ ex loco, et ex magnitudine doloris potest; et quia nonnumquam spiritus ea cum humore quasi bullante prorumpit; maximeque, si hunc ore ille continuit. In eo medicinae locus nullus est. In ceteris vero, quae circa costas sanabilia sunt, pingua medicamenta inimica sunt; ceteris, quae ad vulnera²⁵ accommodantur, uti licet; optime tamen sicca linamenta, vel, si purgandum aliquid videtur, in melle tincta imponuntur.

3. Ventri nullum os subest; sed ibi perniciosae admodum fistulae fiunt; adeo ut Sostratus insanabiles esse crediderit. Id non ex toto ita se habere usus ostendit. Et quidem, quod³⁰ maxime mirum videri potest, tutior fistula est contra jecur et lienem et ventriculum, quam contra intestina: non quo perniciosior ibi sit, sed quo alteri periculo locum faciat. Cujus experimento moti quidam auctores parum modum rei cognoverunt. Nam venter saepe etiam telo perforatur, pro-³⁵ lapsaque intestina conduntur, et oras vulneris suturae comprehendunt: quod, quemadmodum fiat, mox indicabo. Itaque etiam ubi tenuis fistula abdomen perrupit, excidere eam licet, suturaque oras conjungere. Si vero ea fistula latius patuit,

excisa necesse est latius foramen relinquat: quod nisi magna vi, utique ab interiore parte, sui non potest. Ergo, ubi aliquis ingredi ac moveri coepit, rumpitur illa sutura, atque intestina evolvuntur: quo fit, ut pereundum homini sit. Sed non omni modo res ea desperationem habet: ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

4. Propriam etiamnum animadversionem desiderant eae, quae in ano sunt (P. Aeg. VI, 78). In has demisso specillo, ad ultimum ejus caput incidi cutis debet: dein novo foramine specillum educi lino sequente, quod in aliam ejus partem, ob id ipsum perforatam, conjectum sit. Ibi linum prehendum vinciendumque cum altero capite est, ut laxa cutem, quae super fistulam est, teneat: idque linum esse debet crudum, et duplex triplexve, sic tortum, ut unitas facta sit. Interim autem licet negotia gerere, ambulare, lavari, cibum capere perinde atque sanissimo. Tantummodo id linum bis die, salvo nodo, ducendum est sic, ut subeat fistulam pars quae superior fuit. Neque committendum est, ut id linum putrescat: sed tertio quoque die nodus resolvendus est, et ad caput alterum recens linum alligandum, eductoque vetere, id in fistula cum simili nodo relinquendum. Sic enim id paulatim cutem, quae supra fistulam est, incidit: simulque et id sanescit, quod a lino relictum est; et id, quod ab eo mordetur, inciditur. Haec ratio curationis longa, sed sine dolore est (Hipp. *De fistul.* § 4). Qui festinant, adstringere cutem lino debent, quo celerius secant; noctuque ex penicillo tenuia quaedam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur, quo extenditur. Sed haec dolorem movent. Adjicitur celeritati, sicut tormento quoque, si et linum, et id quod ex penicillo est, aliquo medicamento illinitur ex iis, quibus callum exedi posui (V, 28, 12). Potest tamen fieri, ut ad scalpelli curationem etiam illo loco veniendum sit, si intus fistula fert, si multiplex est. Igitur in haec genera demisso specillo, duabus lineis incidenda cutis est, ut media inter eas habenula tenuis admodum ejiciatur, ne protinus orae coeant, sitque locus aliquis linamentis, quae quam paucissima superinjicienda sunt: omniaque eodem modo facienda, quae in abscessibus posita sunt (V, 28, 11—12).

Si vero ab uno ore plures sinus erunt, recta fistula scalpello erit incidenda: ab eo ceterae, quae jam patebunt, lino excipiendae. Si intus aliqua procedet, quo ferrum tuto pervenire non poterit, collyrium demittendum erit. Cibus autem in omnibus ejusmodi casibus, sive manu, sive medicamentis agitur, dari debet humidus; potio liberalis, diuque aqua. Ubi jam caro increscit, tum demum et balneis raris utendum erit, et cibis corpus implentibus.

CAPUT V.

De telis e corpore extrahendis.

10

1. Tela quoque, quae illata corporibus intus haeserunt, magno negotio saepe ejiciuntur (P. Aeg. VI, 88). Suntque quaedam difficultates ex generibus eorum; quaedam ex iis sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua venit, aut ab ea, in quam tetendit: illic viam, qua redeat, ipsum sibi fecit; hic a scalpello accipit; nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non alte telum insedit, et in summa carne est, aut certe magnas venas et loca nervosa non transiit; nihil melius est, quam, 20 qua venit, id evellere. Si vero plus est per quod telo revertendum, quam quod perrumpendum est, jamque venas nervosque id transiit, commodius est aperire quod superest, eaque extrahere. Nam et propius petitur, et tutius evellitur: et in majore membro, si medium mucro transiit, facilius 25 sanescit, quod pervium est; quia utrimque medicamento fovetur. Sed, si retro telum recipiendum est, amplianda scalpello plaga est; quo facilius id sequatur, quoque minor oriatur inflammatio: quae major fit, si ab illo ipso telo, dum redit, corpus laniatur. Item, si ex alia parte vulnus aperitur, 30 laxius esse debet, quam ut telo postea transeunte ampliatur. Summa autem utraque parte habenda cura est, ne nervus, ne vena major, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso est, abducendumque a scalpello. Ubi autem satis incisum est, telum eximendum est: 35 tunc quoque eodem modo, et eadem cura habita, ne sub eo, quod eximitur, aliquid eorum laedatur, quae tuenda esse prop

2. Haec communia sunt. Propria quaedam in singulis telorum generibus sunt, quae protinus subijciam. Nihil tam facile in corpus quam sagitta conditur, eademque altissime insidit. Haec autem eveniunt, et quia magna vi fertur illa, et quia ipsa in angusto est. Saepius itaque ab altera parte, quam ex qua venit, recipienda est; praecipueque, quia fere spiculis cingitur; quae magis laniant, si retrorsus, quam si contra eximatur. Sed inde aperta via, caro diduci debet ferramento facto ad similitudinem graecae litterae (Y): deinde, ubi apparuit mucro, si arundo inhaeret, propellenda est, donec ab altera parte apprehendi et extrahi possit: si jam illa decidit, solumque intus ferrum est, mucro vel digitis apprehendi, vel forcipe, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte, qua venit, evelli magis placuit. Nam, ampliato vulnere, aut arundo, si inest, evellenda est; aut, si ea non inest, ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaque brevia et tenuia sunt, forcipe ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi: si ea majora valentioraque sunt, fissis scriptoriis calamis contegenda, ac, ne quid lacerent, sic evellenda sunt (P. Aeg. VI, 88, p. 354 ed. Briau). Et in sagittis quidem haec observatio est.

3. Latum vero telum, si conditum est, ab altera parte educi non expedit; ne ingenti vulnere ipsi quoque ingens vulnus adjiciamus. Evellendum est ergo genere quodam ferramenti, quod *Διοκλείον καθαδίσκον* Graeci vocant; quoniam auctorem Dioclem habet: quem inter priscos maximosque medicos fuisse jam posui (I, prooem.). Lamina vel ferrea, vel etiam aenea, ab altero capite duos utrimque deorsum conversos uncus habet; ab altero duplicata lateribus, leviterque extrema in eam partem inclinata, quae sinuata est, insuper ibi etiam perforata est. Haec juxta telum transversa demittitur: deinde, ubi ad imum mucronem ventum est, paulum torquetur, ut telum foramine suo excipiat: quum in cavo mucro est, duo digiti, subjecti partis alterius uncis, simul et ferramentum id extrahunt et telum.

4. Tertium genus telorum est, quod interdum evelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod, perrupta cute, integrum intus insedit. In omnibus his latius

vulnus aperiendum, idque, quod inest, ea qua venit forcipe extrahendum est. Accedit vero aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum vel ossi inhaesit, vel in articulo se inter duo ossa demersit. In osse usque eo movendum est, donec laxetur is locus, qui mucronem momordit; et tunc vel manu vel forcipe telum extrahendum est: quae ratio in dentibus quoque ejiciendis est. Vix umquam ita telum non sequitur: sed, si morabitur, excuti quoque ictum aliquo ferramento poterit. Ultimum est, ubi non evellitur, terebra juxta forare, ab eo-
 10 que foramine, ad speciem litterae V, contra telum os excidere sic, ut lineae, quae diducuntur, ad telum spectent: eo facto, id necesse est labet, et facile auferatur. Inter duo vero ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fasciis habenisve deliganda, et per has in diversas
 15 partes diducenda sunt, ut nervos distendant: quibus extensis, laxius inter ossa spatium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Illud videndum est, sicut in aliis locis posui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria a telo laedatur, dum id extrahitur: eadem scilicet ratione, quae supra (cap. 2) po-
 20 sita est.

5. At si venenato quoque telo quis ictus est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis, adjicienda curatio est, quae vel epoto veneno, vel a serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius, extracto telo, medicina non
 25 alia est, quam quae esset, si corpore icto nihil inhaesisset: de qua satis alio loco dictum est (V, 26, 27).

CAPUT VI.

De gangliis, de meliceride, et atheromate, et steatomate, capitis tuberculis.

30 Haec evenire in qualibet parte corporis possunt: reliqua certas sedes habent. De quibus dicam, orsus a capite. In hoc multa variaque tubercula oriuntur; γάγγλια, μελικηρί-
 δας, ἀδερῶματα nominant; aliisque etiamnum vocabulis quaedam alii discernunt: quibus ego στεατώματα quoque
 35 adjiciam. Quae quamvis et in cervice, et in alis, et in 1-

teribus oriri solent; per se tamen non posui; quum omnia ista mediocres differentias habeant, ac neque periculo ter-
reant, neque diverso genere curentur. Omnia vero ista et
ex parvulo incipiunt, et diu paulatimque increscunt, et tunica
sua includuntur. Quaedam ex his dura ac renitentia, quae-
dam mollia cedentiaque sunt: quaedam spatio nudantur, quae-
dam tecta capillo suo permanent: fereque sine dolore sunt.
Quid intus habeant, ut conjectura praesagiri potest, sic ex
toto cognosci, nisi quum ejecta sunt, non potest. Maxime
tamen in iis, quae renitentur, aut lapillis quaedam similia, 10
aut concreti confertique pili reperiuntur: in iis vero, quae
cedunt, aut melli simile aliquid, aut tenui puliculae, aut
quasi rasae cartilagini, aut carni hebeti et cruentae; quibus
alii alique colores esse consuerunt. Fereque ganglia reni-
tentur: atheromati subest quasi tenuis pulicula: meliceridi 15
liquidior humor; ideoque pressus circumfluit: steatomati
pingue quiddam; idque latissime patere consuevit, resolvit-
que totam cutem superpositam sic, ut ea labet; quum in ce-
teris sit adstrictior. Omnia, derasa ante, si capillis conte-
guntur, per medium oportet incidere. Sed steatomatis tunica 20
quoque secanda est, ut effundatur quidquid intus coit; quia
non facile a cute et subjecta carne ea separatur: in ceteris
ipsa tunica inviolata servanda est. Protinus autem alba et
intenta se ostendit. Tum scalpelli manubriolo diducenda a
cute et carne est, ejiciendaque cum eo, quod intus tenet. 25
Si quando tamen ab inferiore parte tunicae musculus inhae-
sit, ne is laedatur, superior pars illius decidenda, alia inibi
relinquenda est. Ubi tota exenta est, committendae orae,
fibulaque his injicienda, et super medicamentum glutinans
dandum est. Ubi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum 30
est, pus moventia adhibenda sunt.

CAPUT VII.

De oculorum vitiis, quae scalpello et manu curantur.

1. Sed ut haec neque genere vitii, neque ratione cura-
tionis inter se multum distant; sic in oculis, quae manum 35

postulant, et ipsa diversa sunt, et aliter aliterque curantur. Igitur in superioribus palpebris vesicae nasci solent pingues gravesque, quae vix attollere oculos sinunt, levesque pituitae cursus, sed assiduos, in oculis movent. Fere vero in
 5 pueris nascuntur. Oportet, compresso digitis duobus oculo, atque ita cute intenta, scalpello transversam lineam incidere, suspensa leviter manu, ne vesica ipsa vulneretur: et, ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat; tum digitis eam apprehendere, et evellere (P. Aeg. VI, 14). Facile autem
 10 quitur. Dein superinungi collyrio debet ex iis aliquo, quo lipientes oculi superinunguntur (cf. VI, 6): paucissimisque diebus cicatrix inducitur. Molestius est ubi incisa vesica est: effundit enim humorem; neque postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si forte id incidit, eorum aliquid imponen-
 15 dum est, quae puri movendo sunt (cf. V, 3 et 9, 10 sqq.).

2. In eadem palpebra supra pilorum locum tuberculum parvulum nascitur, quod a similitudine hordei, a Graecis *κριθή* nominatur. Tunica quiddam, quod difficulter maturescit, comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde
 20 calefacta foveri oportet sic, ne nimius is calor sit, sed facile ea parte sustineatur: hac enim ratione saepe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello dividi debet, et, quidquid intus humoris est, exprimi: eodem deinde vapore postea quoque foveri et superinungi, donec ad sani-
 25 tatem perveniat.

3. Alia quoque quaedam in palpebris huic non dissimilia nascuntur; sed neque utique figurae ejusdem et mobilia, simul atque digito vel huc vel illuc impelluntur: ideoque ea *χαλαζία* Graeci vocant (P. Aeg. VI, 16). Haec incidi debent,
 30 si sub cute sunt, ab exteriore parte; si sub cartilagine, ab interiore: dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt. Ac, si intus plaga est, inungendum primo lenibus, deinde acrioribus: si extra, superdandum emplastrum, quo id glutinetur.

35 4. Unguis vero, quod *περύγιον* Graeci vocant (P. Aeg. VI, 18), est membranula nervosa oriens ab angulo, quae nonnumquam ad pupillam quoque pervenit, eique officit. Saepius a narium, interdum etiam a temporum parte nascitur.

Hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur: si inveteravit, jamque ei crassitudo quoque accessit, excidi debet. Post abstinentiam vero unius diei, vel adversus in sedili contra medicum is homo collocandus est, vel sic aversus, ut in gremium ejus caput resupinus effundat. Quidam, si in sinistro oculo vitium est, adversum: si in dextro, resupinum collocari volunt. Alteram autem palpebram a ministro diduci oportet, alteram a medico: sed ab hoc, si ille adversus est, inferiorem; si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum,¹⁰ paulum mucrone intus recurvato, subjicere extremo ungui debet, eumque infigere; atque eam quoque palpebram tradere alteri: ipse, hamulo apprehenso, levare unguem, eumque acu trajicere linum trahente: deinde acum ponere, lini duo capita apprehendere, et per ea erecto ungue, si qua¹⁵ parte oculo inhaeret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum veniat: deinde invicem modo remittere, modo attrahere, ut sic et initium ejus, et finis anguli reperiatur. Duplex enim periculum est; ne vel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem; vel²⁰ ex angulo caruncula quoque abscindatur, quae, si vehementius unguis ducitur, sequitur; ideoque decipit. Abscissa, patet foramen, per quod postea semper humor descendit: *φράδα* Graeci vocant. Verus ergo anguli finis utique noscendus est, qui ubi satis constitit, non nimium adducto ungue, scalpellus adhibendus est; deinde sic excidenda ea membranula, ne quid ex angulo laedatur. Eo deinde ex melle linamentum superdandum est, supraque linteolum, et aut spongia aut lana succida: proximisque diebus diducendus²⁵ quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebrae glutinantur; siquidem id quoque tertium periculum accedit, eodemque modo linamentum imponendum, ac novissime inungendum collyrio, quo ulcera ad cicatricem perducantur. Sed ea curatio vere esse debet, aut certe ante hiemem: de qua³⁰ re ad plura loca pertinente, semel dixisse satis erit. Nam duo genera curationum sunt: alia in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod incidit; sicut in vulneribus: alia, in quibus nullus dies urget, et exspectare tutissi-

num et facile est; sicut evenit in iis, quae et tarde incre-
scent, et dolore non cruciant. In his ver expectandum est:
aut, si quid magis pressit, melior tamen autumnus est quam
aestas, vel hiems; atque is ipse medius, jam fractis aesti-
bus, nondum ortis frigoribus. Quo magis autem necessaria
pars erit quae tractabitur, hoc quoque majori periculo sub-
jecta est: et saepe, quo major plaga facienda, eo magis haec
temporis ratio servabitur.

5. Ex curatione vero unguis, ut dixi, vitia nascuntur,
10 quae ipsa aliis quoque de causis oriri solent. Interdum enim
fit in angulo, parum ungue exciso, vel aliter, tuberculum,
quod palpebras parum diduci patitur: *ἐγκανθίς* graece no-
minatur (P. Aeg. VI, 17). Excipi hamulo, et circumcidi
debet; hic quoque diligenter temperata manu, ne quid ex
15 ipso angulo abscindat. Tum exiguum linamentum resper-
gendum est vel cadmia, vel atramento sutorio; inque eum
angulum, diductis palpebris, inserendum, supraque eodem
modo deligandum: proximisque diebus similiter nutriendum;
tantum ut primis aqua egelida, vel etiam frigida foveatur.
20 6. Interdum inter se palpebrae coalescunt, aperiri-
que non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, ut
palpebra cum albo oculi cohaerescat; scilicet quum in utro-
que fuit ulcus negligenter curatum. Sanescendo enim, quod
diduci potuit et debuit, glutinavit. *Ἀγκυλοβλεφάρους* sub
25 utroque vitio Graeci vocant (P. Aeg. VI, 15). Palpebrae
tantum inter se cohaerentes non difficulter diducuntur; sed
interdum frustra: nam rursus glutinantur. Experiri tamen
oportet; quia bene res saepius cedit. Igitur aversum specil-
lum inserendum, diducendaeque eo palpebrae sunt: deinde
30 exigua penicilla interponenda, donec exulceratio ejus loci
finiatur. At ubi albo ipsius oculi palpebra inhaesit, Hera-
clides Tarentinus auctor est, adverso scalpello subsecare,
magna cum moderatione, ut neque ex oculo, neque ex pal-
pebra quidquam abscindatur; ac, si necesse est, ex pal-
35 pebra potius. Post haec inungatur oculus medicamentis, qui-
bus aspritudo curatur: quotidieque palpebra vertatur, non
solum ut ulceri medicamentum inducatur, sed etiam ne rur-
sus inhaereat: ipsique etiam praecipiat, ut saepe eam

duobus digitis attollat. Ego sic restitutum esse neminem memini. Meges se quoque multa tentasse, neque umquam profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhaeserit, memoriae prodidit.

7. Etiamnum in angulo qui naribus proprius est, ex ali-⁵ quo vitio quasi parva fistula aperitur, per quam pituita assidue destillat: *αγγίλωπα* Graeci vocant (P. Aeg. VI, 22). Idque assidue male habet oculum: nonnumquam etiam, exeso osse, usque ad nares penetrat. Atque interdum naturam carcinomatis habet; ubi intentae venae et recurvatae sunt, color¹⁰ pallet, cutis dura est, et levi tactu irritatur, inflammationemque in eas partes, quae conjunctae sunt, evocat. Ex his eos, qui quasi carcinoma habent, curare periculosum est: nam mortem quoque ea res maturat; eos vero, quibus ad nares tendit, supervacuum: neque enim sanescunt. At, qui-¹⁵ bus id in angulo est, potest adhiberi curatio; cum eo, ne ignotum sit esse difficilem: quantoque angulo propius id foramen est, tanto difficilior est; quoniam perangustum est, in quo versari manus possit. Recenti tamen re mederi facilius est. Ergo hamulo summum ejus foraminis excipiendum;²⁰ deinde totum id cavum, sicut in fistulis dixi (cap. 4), usque ad os excidendum; oculoque et ceteris junctis partibus bene obtectis, os ferramento adurendum est; vehementiusque, si jam carie vexatum est, quo crassior squama abscedat. Quidam adurentia imponunt, ut atramentum sutorium, vel²⁵ chalcitidem, vel aeruginem rasam: quod et tardius et non idem facit. Osse adusto, curatio sequitur eadem, quae in ceteris ustis.

8. Pili vero, qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consuerunt (P. Aeg. VI, 13). Nam modo³⁰ palpebrae superioris summa cutis relaxatur, et procidit; quo fit, ut ejus pili ad ipsum oculum convertantur, quia non simul cartilago quoque se remisit: modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrecit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes hae sunt. Si pili nati sunt, qui non de-³⁵ buerunt, tenuis acus ferrea ad similitudinem spathae lata, in ignem conjicienda est: deinde candens, sublata palpebra sic, ut ejus perniciosi pili in conspectum curantis veniant, sub

ipsis pilorum radicibus ab angulo immittenda est, ut ea ter-
 tiam partem palpebrae transsuat; deinde iterum, tertioque
 usque ad alterum angulum: quo fit, ut omnes pilorum radices
 adustae emoriantur. Tum superimponendum medicamentum
 5 est, quod inflammationem prohibeat: atque ubi crustae exci-
 derunt, ad cicatricem perducendum. Facillime autem id ge-
 nus sanescit. Quidam (cf. P. Aeg. l. l.) aiunt acu transsui
 juxta pilos exteriorem partem palpebrae oportere, eamque
 transmitti duplicem capillum muliebrem ducentem; atque ubi
 10 acus transiit, in ipsius capilli sinum, qua duplicatur, pilum
 esse conjiciendum, et per eum in superiorem palpebrae par-
 tem attrahendum, ibique corpori agglutinandum, et impo-
 nendum medicamentum, quo foramen glutinetur: sic enim
 fore, ut is pilus in exteriorem partem postea spectet. Id
 15 primum fieri non potest, nisi in pilo longiore; quum fere
 breves eo loco nascantur. Deinde, si plures pili sunt, ne-
 cesse est longum tormentum, toties acu trajecta, magnam in-
 flammationem moveat. Novissime quum humor aliquis ibi
 subsit, oculo et ante per pilos et tum per palpebrae fora-
 20 mina affecto, vix fieri potest, ut gluten, quo vinctus est pi-
 lus, non resolvatur: eoque fit, ut is eo, unde vi abductus
 est, redeat. Ea vero curatio quae palpebrae laxioris ab
 omnibus frequentatur, nihil habet dubii. Siquidem oportet
 25 contacto oculo mediam palpebrae cutem, sive ea superior,
 sive inferior est, apprehendere digitis, ac sic levare: tum
 considerare quantulo detracto futurum sit, ut naturaliter se
 habeat. Siquidem hic quoque duo pericula circumstant: si
 nimium fuerit excisum, ne contegi oculus non possit; si pa-
 rum, ne nihil actum sit, et frustra sectus aliquis sit. Qua
 30 deinde incidendum videbitur, per duas lineas atramento no-
 tandum est sic, ut inter oram, quae pilos continet, et pro-
 piores ei lineam, aliquid relinquatur, quod apprehendere
 acus postea possit. His constitutis, scalpellus adhibendus
 est: et si superior palpebra est, ante; si inferior, postea
 35 propius ipsis pilis incidendum: initiumque faciendum in sini-
 stro oculo, ab eo angulo, qui tempore, in dextro, ab eo qui
 naribus propior est: idque, quod inter duas lineas est, exci-
 dendum. Deinde orae vulneris inter se simplici sutura

mittendae, operiendusque oculus est. Si parum palpebra descendet, laxanda sutura; si nimium, aut adstringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ulteriore ora excidenda: ubi secta est, aliae suturae adjiciendae, quae supra tres esse non debent. Praeter haec in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent: idque, si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, sponsia ex aqua frigida expressa superdeliganda est: postero die glutinans emplastrum injiciendum: quarto suturae tollendae,¹⁰ et collyrio, quod inflammationes reprimat, superinungendum.

9. Nonnumquam autem, nimium sub hac curatione excisa cute, evenit, ut oculus non contegatur: idque interdum etiam alia de causa fit. *Λαγωφθάλμους* Graeci appellant (P. Aeg. VI, 10). In quo si nimium palpebrae deest, nulla id resti-¹⁵ tuere curatio potest: si exiguum, mederi licet. Paulum infra supercilium cutis incidenda est lunata figura, cornibus ejus deorsum spectantibus. Altitudo esse plagae usque ad cartilaginem debet, ipsa illa nihil laesa: nam, si ea incisa est, palpebra concidit, neque attolli postea potest. Cute igitur²⁰ tantum diducta fit, ut paulum ima ora descendat; hiante scilicet super plaga; in quam linamentum conjiciendum est, quod et conjungi diductam cutem prohibeat, et in medio carunculam citet: quae ubi eum locum implevit, postea recte oculus operitur.²⁵

10. Ut superioris autem palpebrae vitium est, quo parum descendit, ideoque oculum non contegit; sic inferioris, quo parum sursum attollitur, sed pendet et hiat, neque potest cum superiore committi. Atque id quoque evenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute. *Ἐκτροό-³⁰πιον* Graeci nonniant (P. Aeg. VI, 12). Si ex mala curatione est, eadem ratio medicinae est, quae supra posita est (§ 9): plagae tantum cornua ad maxillas, non ad oculum convertenda sunt. Si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum: a quarto³⁵ die vapore aquae calidae fovendum, inungendumque medicamentis ad cicatricem perducentibus (cf. V, 14 et 26, 36).

11. Haec fere circa oculum in angulis palpebrisque in-

cidere consuerunt. In ipso autem oculo nonnumquam summa attollitur tunica, sive ruptis intus membranis aliquibus, sive laxatis; et similis figura acino fit: unde id *σταφύλωμα* Graeci vocant (P. Aeg. VI, 19). Curatio duplex est: altera, ad ipsas radices per medium transsuere acu duo lina ducente; deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex inferiore adstringere inter se; quae paulatim secando id excidunt: altera in summa parte ejus ad lenticulae magnitudinem excidere: deinde spodium aut cadmiam infriare. Utro-
 10 libet autem facto, album ovi lana excipiendum et imponendum; posteaque vapore aquae calidae fovendus oculus, et lenibus medicamentis inungendus est.

12. Clavi autem vocantur callosa in albo oculi tubercula; quibus nomen a figurae similitudine est. Hos ad imam
 15 radicem perforare acu commodissimum est, infraque eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

13. Suffusionis jam alias (VI, 6, 35) feci mentionem; quia, quum recens incidit, medicamentis quoque saepe discutitur: sed, ubi vetustior facta est, manus curationem des-
 20 siderat: quae inter subtilissimas haberi potest. De qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est: cujus cognitio, quum ad plura loca pertineat, tum vel praecipue ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas: ex quibus superior a Graecis *κερατοειδής* vocatur. Ea, qua
 25 parte alba est, satis crassa, pupillae loco extenuatur. Huic interior adjuncta est, media parte, qua pupilla est, modico foramine concava; circa tenuis, ulterioribus partibus ipsa quoque plenior: quae *χοριοειδής* a Graecis nominatur. Hae duae tunicae, quum interiora oculi cingant, rursus sub his
 30 coeunt; extenuataeque et in unum coactae per foramen, quod inter ossa est, ad membranam cerebri perveniunt, eique inhaerescunt. Sub his autem, qua parte pupilla est, locus vacuus est: deinde infra rursus tenuissima tunica, quam Herophilus *ἀραχνοειδής* nominavit. Ea media subsidit; eoque
 35 cavo continet quiddam, quod a vitri similitudine *ύαλοειδής* Graeci vocant. Id neque liquidum, neque aridum est, sed quasi concretus humor: ex cujus colore pupillae color vel niger est, vel caesius, quum summa tunica tota alba sit. Id

autem superveniens ab interiore parte membranula includit. Sub his gutta humoris est, ovi albo similis; a qua videndi facultas proficiscitur: *κρυσταλλοειδής* a Graecis nominatur.

14. Igitur vel ex morbo, vel ex ictu concrevit humor sub duabus tunicis, qua locum vacuum esse proposui (p. 279, l. 32); isque paulatim indurescens, interiori potentiae se opponit. Vitiique ejus plures species sunt; quaedam sanabiles, quaedam quae curationem non admittunt. Nam si exigua suffusio est, si immobilis, colorem vero habet marinae aquae, vel ferri nitentis, et a latere sensum aliquem fulgoris relinquit, spes superest. Si magna est, si nigra pars oculi, amissa naturali figura, in aliam vertitur, si suffusioni color caeruleus est, aut auro similis, si labat, et hac atque illac movetur, vix umquam succurritur. Fere vero peior est, quo ex graviore morbo majoribusve capitis doloribus, vel ictu vehementiore orta est. Neque idonea curationi senilis aetas est, quae sine novo vitio, tamen aciem hebetem habet: ac ne puerilis quidem; sed inter has media. Oculus quoque curationi neque exiguus, neque concavus, satis opportunus est. Atque ipsius suffusionis quaedam maturitas est. Expectandum igitur est, donec jam non fluere, sed duritie quadam concrevisse videatur. Ante curationem autem modico cibo uti, bibere aquam triduo debet; pridie ab omnibus abstinere. Post haec in adverso sedili collocandus est loco lucido, lumine adverso sic, ut contra medicus paulo altius sedeat: a posteriore autem parte caput ejus minister contineat, ut immobile id praestet: nam levi motu eripi acies in perpetuum potest. Quin etiam ipse oculus immobilior faciendus est, super alterum lana imposita et deligata. Curari vero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. Tum acus admovenda est acuta ut foret, sed non nimium tenuis; eaque demittenda recta est per summas duas tunicas medio loco inter oculi nigrum et angulum temporis propiorem, e regione mediae suffusionis sic, ne qua vena laedatur. Neque tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur. Ad quem quum ventum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest; quia prementi nihil renititur. Ubi eo ventum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est,

leniterque ibi verti, et paulatim eam deducere infra regionem pupillae debet; ubi deinde eam transiit, vehementius imprimi, ut inferiori parti insadat. Si haesit, curatio expleta est: si subinde redit, eadem acu concidenda, et in plures partes dissipanda est; quae singulae et facilius conduntur, et minus late officiunt. Postea educenda recta acus est, imponendumque lana molli exceptum ovi album, et supra quod inflammationem coerceat, atque ita devinciendum. Post haec opus est quiete, abstinencia, lenium medicamentorum inunctionibus, cibo, qui postero die satis mature datur, primum liquido, ne maxillae laborent; deinde, inflammatione finita, tali, qualis in vulneribus propositus est. Quibus ut aqua quoque diutius bibatur necessario accedit.

15 15. De pituitae quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamentis agendum est, jam explicui (cf. VI, 6). Nunc ad ea veniam, quae curationem manus postulant. Animadvertimus autem quibusdam numquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere: quae res aspritudinem continuat, ex levibus momentis inflammationes et lipitudines excitat, totam denique vitam hominis infestat. Idque in quibusdam nulla ope adjuvari potest, in quibusdam sanabile est. Quod primum discrimen nosse oportet, ut alteris succurratur, alteris manus non injiciatur. Ac primum supervacua curatio est in iis, qui ab infantibus id vitium habent; quia necessario mansurum est usque mortis diem. Deinde non necessaria etiam in iis, quibus non multa, sed acris pituita est: siquidem manu nihil adjuvantur; medicamentis, et victus ratione, quae crassiorem pituitam reddit, ad sanitatem perveniunt. Lata etiam capita vix medicinae patent. Tum interest, venae pituitam mittant, quae inter calvariam et cutem sunt, an quae inter membranam cerebri et calvariam. Superiores fere per tempora oculos rigant; inferiores per eas membranas, quae ab oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem adhiberi remedium iis, quae supra os fluunt; non potest iis, quae sub osse ¹⁾). Ac ne iis quidem

1) Id est, per eas venas quae sunt inter membranas cerebri, et calvariam; ut explicat Morgagnus.

succurritur, quibus pituita utrimque descendit: quia levata altera parte, nihilominus altera infestat. Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, a superciliis usque ad verticem illini debent: si sicci oculi esse coeperunt, apparet per eas venas, quae sub cute sunt, irrigari: si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere: si est humor, sed levior, duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venae exerceant; ideoque pluribus etiam opitulari licet. Idque non in Graecia 10 tantummodo, sed in aliis quoque gentibus celebre est: adeo ut nulla medicinae pars magis per nationes quasque exposita sit (P. Aeg. VI, 6). Reperti in Graecia sunt, qui novem lineis cutem capitis inciderent: duabus in occipitis rectis, una super eas transversa: dein duabus super aures, una inter 15 eas item transversa: tribus inter verticem et frontem rectis. Reperti sunt, qui a vertice rectas eas lineas ad tempora deducerent; cognitisque ex motu maxillarum musculorum initiis, leviter super eos cutem inciderent, diductisque per retusos hamos oris, insererent linamenta, ut neque inter se cutis 20 antiqui fines committerentur, et in medio caro increaseret, quae venas, ex quibus humor ad oculos transiret, adstringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt a media aure ad mediam alteram aurem, deinde a naribus ad verticem: tum ubi lineae mittebantur, scalpello inciderunt; 25 et post, sanguine effuso, os ibidem adusserunt. Nihilominus autem et in temporibus, et inter frontem atque verticem eminentibus venis idem candens ferrum admoverunt. Frequens curatio est, venas in temporibus adurere: quae fere quidem in ejusmodi malo tument; sed tamen, ut inflentur 30 magisque se ostendant, cervix ante modice deliganda est: tenuibusque ferramentis, et retusis venae adurendae; donec in oculis pituitae cursus conquiescat. Id enim signum est quasi excaecatorum itinerum, per quae humor ferebatur. Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditaeque venae 35 sunt, ideoque legi non possunt, eodem modo cervice deligata, retentoque ab ipso spiritu, quo magis venae prodeant, atramento notare eas contra tempora, et inter verticem ac

frontem: deinde cervice resoluta, qua notae sunt, venas incidere, et sanguinem mittere: ubi satis fluxit, tenuibus fer-
 ramentis adurere: contra tempora quidem timide, ne subjecti
 musculi, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem vero et
 5 verticem vehementer, ut squama ab osse secedat. Efficacior
 tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem usque ad
 os adurunt sic, ut squamam remittat. Sed nihil melius est,
 quam quod in Gallia quoque Comata fit, ubi venas in tempo-
 ribus et in superiore capitis parte legunt. Adusta quo modo
 10 curanda sint, jam explicui. Nunc illud adjicio; neque ut
 crustae decendant, neque ut ulcus impleatur, adustis venis,
 esse properandum; ne vel sanguis erumpat, vel cito pus
 supprimatur: quum per hoc siccescere eas partes opus sit;
 per illud exhauriri opus non sit; si quando tamen sanguis
 15 eruperit, infrianda medicamenta esse, quae sic sanguinem
 suppriment, ne adurant. Quemadmodum autem venae legen-
 dae sint, quidque lectis his faciendum sit, quum venero ad
 crurum varices, dicam (cap. 31).

CAPUT VIII.

20

De aurium morbis qui manu et scalpello curantur.

Verum ut oculi multiplicem curationem, etiam manus
 exigunt; sic in auribus admodum pauca sunt, quae in hac
 medicinae parte tractentur. Solet tamen evenire vel a primo
 natali die protinus, vel postea facta exulceratione, deinde
 25 per cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit,
 ideoque audiendi usu careat. Quod ubi incidit, specillo ten-
 tandum est, altene id repletum, an in summo tantum gluti-
 natum sit. Nam si alte est, prementi non cedit: si in sum-
 mo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet,
 30 ne sine effectus spe distentio oriatur nervorum, et ex ea
 mortis periculum sit: hoc facile curatur. Nam qua cavum
 esse debet, vel medicamentum aliquod imponendum est ex
 adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scal-
 pello incidendum. Quumque id patefactum, et jam ulcus
 35 purum est, conjicienda eo pinna est, illita medicam

catricem inducente; circaque idem medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat: quo fit, ut ea remota, postea facultas audiendi sit. At ubi aures, in viro puta, perforatae sunt, et offendunt (cf. Plin. XI, 37, 50), trajicere id cavum celeriter candente acu satis est, ut leviter ejus orae exulcerentur; aut etiam adurente medicamento idem exulcerare: postea deinde imponere id quod purget; tum quod eum locum repleat, et sic cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est, sicut solet esse in iis, qui majora pondera auribus gesserunt, incidere quod superest ad extremum oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare, et postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire: quae res quum in labris quoque et naribus fieri possit, eandemque etiam rationem (*curandi rationem?*) habeat, simul explicanda est.

CAPUT IX.

Curta in auribus, labrisque, ac naribus, quomodo sarciri, et curari possint.

Curta igitur in his tribus, si qua parva sunt, curari possunt: si qua majora sunt, aut non recipiunt curationem, aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora ante fuerint. Atque in aure quidem et naribus deformitas sola timeri potest: in labris vero, si nimium contracta sunt, usus quoque necessario jactura fit, quia minus facile et cibus assumitur, et sermo explicatur. Neque enim creatur ibi corpus, sed ex vicino adducitur: quod in levi mutatione et nihil eripere, et fallere oculum potest; in magna non potest. Neque senile autem corpus, neque quod mali habitus est, neque in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinae idoneum est; quia nusquam celerius cancer occupat, aut difficilius tollitur. Ratio curationis ejusmodi est (cf. P. Aeg. VI, 26; Antyll. in Oribas. *Coll. med.* XLV, 21): id quod curtum est in quadratum redigere; ab interioribus ejus angulis lineas transversas incidere, quae citeriorem partem ab ulteriore ex toto diducant; deinde ea, quae sic resolvimus, in

unum adducere. Si non satis junguntur, ultra lineas, quas ante fecimus, alias duas lunatas, et ad plagam conversas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur: sic enim fit, ut facilius quod adducitur, sequi possit. Quod non est cogendum; sed ita adducendum, ut facilius subsequatur, et dimissum non multum recedat ¹⁾. Interdum tamen ab altera parte cutis haud omnino adducta deformem, quem relinquit, locum reddit. Hujusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta habenda est ²⁾. Ergo neque ex imis auribus, neque ex medio naso imisve narium partibus, neque ex angularis labrorum quidquam attrahere tentabimus. Utrumque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut mediis naribus, aut mediis labris deerit. Quae tamen interdum etiam duobus locis curta esse consue- runt: sed eadem ratio curandi est. Si cartilago in eo, quod incisum est, eminet, excidenda est: neque enim aut glutinatur, aut acu tuto trajicitur. Neque longe tamen excidi debet, ne inter duas oras liberae cutis utrimque coitus puris fieri possit. Tum junctae orae inter se suendae sunt, utrimque cute apprehensa; et qua priores lineae sunt, ea quoque suturae injiciendae sunt. Siccis locis, uti naribus, illita spuma argenti satis proficit. In ultiores vero lunatasque plagas linamentum dandum est, ut caro increscens vulnus impleat. Summaque cura, quod ita sutum est, tuendum esse, apparere ex eo potest quod de cancro supra posui (V, 28). Ergo etiam tertio quoque die fovendum erit vapore aquae calidae; rursusque idem medicamentum injiciendum: fereque

1) Eduard. Zeis hanc figuram exhibet operationis Celsi labro inferiori accommodatae;



Ego vero eam figuram hoc modo correxi. Vide *Gaz. méd. de Paris*; année 1847, p. 105 sqq.



2) ()

septimo die glutinatum est. Tum suturae eximi, et ulcus ad sanitatem perducere debet.

CAPUT X.

De polypo.

Polypum vero, qui in naribus nascitur (P. Aeg. VI, 25),⁵ ferro praecipue curari jam alias posui (VI, 8). Ergo hunc ferramento acuto, in modum spathae facto, resolvere ab osse oportet: adhibita diligentia, ne infra cartilago laedatur; in qua difficilis curatio est. Ubi abscissus est, unco¹⁰ ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentum, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur, eoque naris leviter implenda. Sanguine suppresso, linamento ulcus purgandum est. Ubi purum est, eo pinna, eodem modo, quo in aure supra positum est (p. 283, l. 34), medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus de-¹⁵ mittenda, donec ex toto id sanescat.

CAPUT XI.

De ozaena.

Id autem vitium, quod ὄζαινα a Graecis vocatur (cf. VI, 8), si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos chirurgos non reperi: credo, quia res raro ad sanitatem satis proficit, quum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. Apud quosdam tamen positum est, vel fictilem fistulam, vel enodem scriptorium calamus in narem esse conjiciendum, donec sursum ad os perveniat: tum²⁵ per id tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum os: deinde adustum locum purgandum esse aerugine et melle: ubi purus est, lycio ad sanitatem perducendum. Vel narem incidendam esse ab ima parte ad os, ut et conspici locus possit, et facilius candens ferramentum admoveri. Tum sui³⁰ narem debere; et adustum quidem ulcus eadem ratione curari: suturam vero illini vel spuma argenti, vel alio glutinante.

CAPUT XII.

De oris vitiiis, quae manu, et ferro curantur.

1. In ore quoque quaedam manu curantur. Ubi in primis dentes nonnumquam moventur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter gingivarum arescentium vitium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingivis admove-
 5 re, ut attingat leviter, non insadat. Adustae gingivae melle illinendae, et mulso eluendae sunt. Ut pura ulcera esse coeperunt, arida medicamenta infrienda sunt ex iis, quae reprimunt. Si vero dens dolores movet, eximique eum, quia
 10 medicamenta nihil adjuvant, placuit, circumradi debet, ut gingiva ab eo resolvatur: tum is concutiendus est: eaque facienda, donec bene moveatur: nam dens haerens cum summo periculo evellitur, ac nonnumquam maxilla loco movetur.
 15 Idque etiam majore periculo in superioribus dentibus fit; quia potest tempora oculosque concutere. Tum, si fieri potest, manu; si minus, forcipe (id est *ὀδοντάγχα*) dens excipiendus est: ac, si exesus est, ante id foramen vel linamento, vel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forcipe
 20 confringatur. Recta vero forceps ducendus est, ne inflexis radicibus os rarum, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur. Neque ideo nullum ejus rei periculum est; utique in dentibus brevibus, qui fere longiores radices habent: saepe enim forceps, quum dentem comprehendere non possit, aut
 25 frustra comprehendat, os gingivae prehendit et frangit (P. Aeg. VI, 28). Protinus autem, ubi plus sanguinis profluit, scire licet aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo conquirenda est testa, quae recessit, et vulsella protrahenda est: si non sequitur, incidi gingiva debet, donec labans os-
 30 sis testa recipiatur. Quod si factum statim non est, indure-scit extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit. Imponendum calidum ex farina et fico cataplasma est, donec ibi pus moveatur: tum incidi gingiva debet. Pus quoque multum profluens, ossis fracti nota est. Itaque etiam tunc id extrahi
 35 convenit. Nonnumquam etiam, eo laeso, fissura fit: quae eradi debet. Dens autem scaber, qua parte niger est, radendus

est, illinendusque rosae flore contrito, cui gallae quarta pars et altera myrrhae sit adjecta: continendūque ore crebro vinum meracum. Atque in eo casu velandum caput, ambulatione multa, frictione capitis, cibo non acri utendum est. At si ex ictu vel alio casu aliqui labant dentes, auro cum iis, qui bene haerent, vinciendi sunt; continendaque ore reprimentia: ut vinum, in quo malicorium decoctum, aut in quod galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris ante alter dens nascitur, quam prior excidat, is, qui cadere debuit, circumpurgandus et evellendus est; is, qui natus est, in locum prioris quotidie digito adurgendus, donec ad justam magnitudinem perveniat. Quotiescumque dente exento radix relicta est, protinus ea quoque ad id facto forceipe, quam *ῥιζάρα* Graeci vocant, eximenda est.

2. Tonsillas autem, quae post inflammationes induruerunt, *ἀντιάδες* autem a Graecis appellantur, quum sub levi tunica sint, oportet digito circumradere et evellere: si ne sic quidem resolvuntur, hamulo excipere, et scalpello excidere: tum os aceto eluere, et illinere vulnus medicamento, quo sanguis supprimatur (cf. p. 256, l. 32; et P. Aeg. VI, 30). 20

3. Uva (P. Aeg. VI, 31), si cum inflammatione descendit, dolorique est, et subrubicundi coloris, praecidi sine periculo non potest: solet enim multum sanguinem effundere: itaque melius est iis uti, quae alias proposita sunt (VI, 14). Si vero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra justum modum a pituita deducta est, et tenuis, acuta, alba est, praecidi debet: itemque, si ima, livida et crassa; summa tenuis est. Neque quidquam commodius est, quam vulsella prehendere, sub eaque, quod volumus, excidere. Neque enim ullum periculum est, ne plus minusve praecidatur: 30 quum liceat tantum infra vulsellam relinquere, quantum inutile esse manifestum est; idque praecidere, quo longior uva est, quam esse naturaliter debet. Post curationem eadem facienda sunt, quae in tonsillis proxime posui (§ 2).

4. Lingua vero quibusdam cum subjecta parte a primo natali die juncta est; qui ob id ne loqui quidem possunt (P. Aeg. VI, 29). Horum extrema lingua vulsella prehenda est; sub eaque membrana incidenda: magna cura habita, ne

venae, quae juxta sunt, violentur, et profusione sanguinis noceant. Reliqua curatio vulneris in prioribus posita est. Et plerique quidem, ubi consanuerunt, loquuntur. Ego autem cognovi qui, succisa lingua, quum abunde super dentes eam promeret, non tamen loquendi facultatem consequutus est. Adeo in medicina, etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id, quod sequi convenit.

5. Sub lingua quoque interdum aliquid abscedit (*gre-nouillette*); quod fere consistit in tunica, doloresque magnos movet. Quod, si exiguum est, incidi semel satis est: si majus, summa cutis usque ad tunicam excidenda est, deinde utrimque orae hamulis excipiendae, et tunica undique circumdata liberanda est: magna diligentia per omnem curationem habita, ne qua major vena incidatur.

6. Labra autem saepe finduntur; eaque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur; qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has, si in summo sunt, medicamentis curare commodius est, quae ad ulcera oris fiunt: si vero altius descenderunt, necessarium est tenui ferramento adurere, quod spathae simile, quasi transcurrere, non imprimi debet. Postea facienda eadem sunt, quae in auribus adustis exposita sunt.

CAPUT XIII.

De cervicis vitio.

At in cervice, inter cutem et asperam arteriam, tumor increscit: *βρογχοκήλην* Graeci vocant (P. Aeg. VI, 38). Quo modo caro hebes, modo humor aliquis, melli aquaeve similis, includitur; interdum etiam minutis ossibus pilli mixti. Ex quibus quidquid est, tunica continetur. Potest autem adurentibus medicamentis curari: quibus summa cutis cum subiecta tunica exeditur. Quo facto, sive humor est, profluit; sive quid densius, digitis educitur: tum ulcus sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio brevior est. Medio tumore una linea inciditur usque ad tunicam.

vitiosus sinus ab integro corpore digito separatur, totusque cum velamento suo eximitur: tum aceto, cui vel salem vel nitrum aliquis adjecit, eluitur; oraeque una sutura junguntur; ceteraque eadem, quae in aliis suturis, superinjiciuntur: leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur. Si quando autem tunica eximi non potuit, intus inspergenda adurentia, linamentisque id curandum est, et ceteris pus moventibus (cf. V, 3).

CAPUT XIV.

De umbilici vitiiis.

10

Sunt etiam circa umbilicum plura vitia: de quibus propter raritatem inter auctores parum constat. Verisimile est autem, id a quoque praetermissum, quod ipse non cognoverat: a nullo id, quod non viderat, fictum. Commune omnibus est, umbilicum indecore prominere (P. Aeg. VI, 51): 15 causae requiruntur. Meges tres has posuit: modo intestinum eo irrupere, modo omentum, modo humorem. Sostratus nihil de omento dixit: duobus iisdem adjecit, carnem ibi interdum increscere; eamque modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem 20 omisit; sed eadem tria causatus, spiritum quoque interdum eo dixit irrupere. Heron omnibus his quatuor positus, et omenti mentionem habuit, et ejus, quod simul et omentum et intestinum habuerit. Quid autem horum sit, his indicis cognoscitur. Ubi intestinum prolapsum est, tumor neque durus, neque mollis est; omni frigore minuitur; non solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit; sonat interdum; atque ubi resupinatus est aliquis, delapso intestino, ipse desidit. Ubi vero omentum est, cetera similia sunt; tumor mollior, et ab ima parte latus, extenuatus in vertice 30 est; si quis apprehendit, elabitur. Ubi utrumque est, indicia quoque mixta sunt, et inter utrumque mollities. At caro durior est, semperque etiam resupinato corpore tumet, prementique non cedit, prioribus facile cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. Humor autem, si premitur, circumfluit. At spiritus pressus ce-

dit, sed protinus redit: resupinato quoque corpore tumorem in eadem figura tenet. Ex his id, quod ex spiritu vitium est, medicinam non admittit. Caro quoque carcinomati similis cum periculo tractatur: itaque omittenda est. Sana excidi debet; idque vulnus linamentis curari. Humorem quidem vel inciso summo tumore effundunt, et vulnus iisdem linamentis curant. In reliquis variae sententiae sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse, res ipsa testatur; ut in uterum, sive intestinum, sive omentum est, delabatur. Sinus vero umbilici, tum vacuus, a quibusdam duabus regulis exceptus est; vehementerque earum capitibus deligatis, ibi emoritur: a quibusdam, ad imum acu trajecta, duo lina ducente, deinde utriusque lini duobus capitibus diversae partes adstrictae; quod in uva quoque oculi fit: nam sic id, quod supra vinculum est (cf. supr. 7, 11), emoritur. Adjecerunt quidam, ut, antequam vincirent, summum una linea inciderent, exciderentque; quo facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent: tum deinde vinxerunt. Sed abunde est, jubere spiritum continere, ut tumor, quantus maximus esse potest, se ostendat: tum imam basim ejus atramento notare; resupinatoque homine, digitis tumorem eum premere, ut si quid delapsum non est, manu cogatur: post haec umbilicum attrahere, et qua nota atramenti est, lino vehementer adstringere: deinde partem superiorem aut medicamentis, aut ferro adurere, donec emoriatur: atque, ut cetera usta, ulcus nutrire. Idque non solum ubi intestinum, vel omentum, vel utrumque est; sed etiam ubi humor est, optime proficit. Sed ante quaedam visenda sunt, ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est; sed a septimo fere anno ad quartumdecimum. Deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est: at quod mali habitus est, quodque papulas, impetigines, similiaque habet, idoneum non est. Levibus quoque tumoribus facile subvenitur: at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni et autumnale, et hibernum vitandum est: ver idoneum maxime est: ac prima aestas non aliena est. Praeter haec abstinere pridae debet. Neque id satis est; sed alvus quoque ei du-

ceda est; quo facilius omnia quae excesserunt, intra uterum considant.

CAPUT XV.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.

Aquam iis, qui hydropici sunt, emitti oportere, alias dixi (III, 21). Nunc, quemadmodum id fiat, dicendum est (cf. P. Aeg. VI, 50). Quidam autem sub umbilico, fere quatuor interpositis digitis a sinistra parte: quidam, ipso umbilico perforato, id facere consuerunt: quidam, cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso; quia, quod per ignem divisum est, minus celeriter coit. Ferramentum autem demittitur magna cura habita, ne qua vena incidatur. Id tale esse debet, ut fere tertiam digiti partem latitudo mucronis impleat; demittendumque ita est, ut membranam quoque transeat, qua caro ab interiore parte finitur: eo tum plumbea aut aenea fistula con-¹⁵ jicienda est, vel recurvatis in exteriorem partem labris, vel in media circumsurgente quadam mora, ne tota intus delabi possit. Hujus ea pars, quae intra, paulo longior esse debet, quam quae extra; ut ultra interiorem membranam procedat. Per hanc effundendus humor est: atque ubi major pars ejus²⁰ evocata est, claudenda demisso linteolo fistula est; et in vulnere, si id ustum non est, relinquenda. Deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquae vestigium appareat. Quidam tamen etiam non usta cute, protinus fistulam recipiunt, et super vulnus spongiam ***¹⁾²⁵ expressam deligant: deinde postero die rursus fistulam demittunt, quod recens vulnus paulum diductum patitur, ut, si quid humoris superest, emittatur: idque bis ita fecisse contenti sunt.

1) Verba aliqua desunt. Forsan *ex aceto*. Vide proximo cap. 16; p. 294, l. 10: spongiam, aut succidam lanam *ex aceto* expressam. Paulus habet *l. l.* (p. 220 ed. Briau): *μόρον σφραγίσματα*.

CAPUT XVI.

De ventre ictu perforato, et intestinis vulneratis.

Nonnumquam autem venter ictu aliquo perforatur; sequiturque, ut intestina evolvantur (P. Aeg. VI, 52). Quod ubi incidit, protinus considerandum est, an integra ea sint; deinde, an iis color suus maneat. Si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse, jam retuli. Latius intestinum sui potest: non quod certa fiducia sit; sed quod dubia spes certa desperatione sit potior; interdum enim glutinatur. Tum si utrumlibet intestinum lividum, aut pallidum, aut nigrum est, quibus illud quoque necessario accedit, ut sensu careat, medicina omnis inanis est. Si vero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est: momento enim alienantur externo et insueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est, coxis erectioribus; et, si angustius vulnus est, quam ut intestina commode refundantur, incidendum est, donec satis pateat: ac, si jam sicciora intestina sunt, perluenda aqua sunt, cui paulum admodum olei sit adjectum. Tum minister oras vulneris leniter diducere manibus suis, vel etiam duobus hamis interiori membranae injectis, debet: medicus priora semper intestina, quae posteriora prolapsa sunt, condere sic, ut orbium singulorum locum servet. Repositis omnibus, leniter homo concutiendus est: quo fit ut per se singula intestina in suas sedes deducantur, et in his considant. His conditis, omentum quoque considerandum est: ex quo, si quid jam nigri et emortui est, forcice excidi debet: si integrum est, leniter super intestina deduci. Sutura autem neque summae cutis, neque interioris membranae per se satis proficit; sed utriusque: et quidem duobus linis injicienda est, spissior quam alibi; quia et rumpi facilius motu ventris potest, et non aequè magnis inflammationibus pars ea exposita est. Igitur in duas acus fila conjicienda, eaeque duabus manibus tenendae; et prius interiori membranae sutura injicienda est sic, ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinistiore a principio vulneris orsa, ab interiori parte in exteriorem acum immittat: quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acuum sit, quae retusa est. Se-

mel utraque parte trajecta, permutandae acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quae fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra continuit: iterumque eodem modo per oras immittendae sunt: atque ita tertio et quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus plaga includenda.⁵ Post haec, eadem fila, eademque acus ad cutem transferendae, similique ratione ei quoque parti sutura injicienda; semper ab interiore parte acubus venientibus, semper inter manus trajectis: dein glutinantia injicienda. Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto expressam accedere debere manifestius est, quam ut semper dicendum sit. Impositis his leniter deligari venter debet.

CAPUT XVII.

De interiore membrana abdominis rupta.

1. Interdum autem vel ex ictu aliquo, vel retento diutius¹⁵ spiritu, vel sub gravi fasce, interior abdominis membrana, superiore cute integra, rumpitur. Quod feminis quoque ex utero saepe evenire consuevit: fitque praecipue circa ilia. Sequitur autem, quum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intenta cutis indecora intumescat.²⁰ Atque id quoque aliter ab aliis curatur. Quidam enim per acum duobus linis ad imam basim immissis sic utrimque devinciunt, quemadmodum et in umbilico, et in uva positum est, ut, quidquid super vinculum est, emoriatur. Quidam medium tumorem excidunt ad similitudinem murtacei folii;²⁵ quod semper eodem modo servandum esse jam posui; et tum oras sutura jungunt. Commodissimum est autem, resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est, ea parte rupta membrana sit; quaque integra est, ea magis obnitatur: tum, qua rupta³⁰ videbitur, immittendae scalpello duae lineae sunt, ut, exciso medio, interior membrana utrimque recentem plagam habeat; quia, quod vetus est, sutura non coit. Loco patefacto, si qua parte membrana non novam plagam, sed veterem habet, tenuis excidenda habena est, quae tantum oras ejus exulceret.³⁵

Cetera, quae ad suturam reliquamque curationem pertinent, supra (cap. 16) comprehensa sunt.

2. Praeter haec evenit, ut in quorundam ventribus varices sint, quarum quia nulla alia curatio est, quam quae in scuribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus, hanc quoque eo differo (cap. 31).

CAPUT XVIII.

De testiculorum morbis.

Venio autem ad ea, quae naturalibus partibus circa testiculos oriri solent: quae quo facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur testiculi simile quiddam medullis habent: nam sanguinem non emittunt, et omni sensu carent: dolent autem in ictibus et inflammationibus tunicae, quibus ii continentur. Dependent vero ab inguinibus per singulos nervos, quos *κρεμαστήρας* Graeci nominant: cum quorum utroque binae descendunt et venae et arteriae. Haec autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba, quae *ἐλντροειδής* a Graecis nominatur. Super eam valentior tunica est, quae interiori vehementer ima parte inhaeret: *δακτόν* Graeci vocant. Multae deinde membranulae venas et arterias, eosque nervos comprehendunt; atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus leves parvulaeque sunt. Hactenus propria utrique testiculo et velamenta et auxilia sunt. Communis deinde utrique, omnibusque interioribus sinus est, qui jam conspicitur a nobis: *δσχος* Graeci, scrotum nostri vocant. Isque ab ima parte mediis tunicis leviter innexus, a superiore tantum circumdatus est. Sub hoc igitur plura vitia esse consuerunt; quae modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui, modo his integris fiunt. Siquidem interdum vel ex morbo primum inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur; vel ex ictu aliquo protinus rumpitur tunica, quae deducere ab inferioribus partibus intestina debuit: tum pondere eo devolvitur aut omentum, aut etiam intestinum: idque ibi reperta via, paulatim ab inguinibus in inferiores quoque partes nisum, subinde nervosas tunicas, et ob id ejus rei patientes, diducit. *Ἐντεροκήλην*, et *ἐπιπλοκήλην* Graeci vo-

cant: apud nos indecorum, sed commune his, herniae nomen est. Deinde si descendit omentum, numquam in scroto tumor tollitur, sive inedia fuit, sive corpus huc illucve conversum, aut alio quo modo collocatum est: itemque, si retentus est spiritus, non magnopere increscit, tactu vero inaequalis est et mollis et lubricus. At si intestinum quoque descendit, tumor is sine inflammatione modo minuitur, modo increscit; estque fere sine dolore, et quum conquiescit aliquis aut jacet, interdum ex toto desidit, interdum sic dividitur, ut in scroto exiguae reliquiae maneant: at clamore, et satietate, et si sub aliquo pondere is homo nisus est, crescit: frigore omni contrahitur, calore diffunditur; estque tum scrotum et rotundum, et tactu laeve: idque, quod subest, lubricum est; si pressum est, ad inguen revertitur; dimissumque, iterum cum quodam quasi murmure devolvitur. Et id quidem in levioribus malis evenit. Nonnumquam autem stercore accepto vastius tumet, retroque compelli non potest: adfertque tum dolorem et scroto et inguinibus et abdomini: nonnumquam stomachus quoque affectus primum rufam bilem per os reddit, deinde viridem, quibusdam etiam nigram. In tegris vero membranis interdum eam partem humor distringit. Atque ejus quoque species duae sunt. Nam vel inter tunicas is increscit, vel in membranis quae ibi circa venas et arterias sunt, ubi eae gravatae occalluerunt. Ac ne ei quidem humori, qui inter tunicas est, una sedes est. Nam modo inter summam et mediam, modo inter mediam et imam consistit. Graeci communi nomine, quidquid est, *ὄδρονήλην* appellant: nostri, ut scilicet nullis discriminibus satis cognititis, haec quoque sub eodem nomine, quo priora, habent. Signa autem quaedam communia sunt, quaedam propria; communia, quibus humor deprehenditur; propria, quibus locus. Humorem subesse discimus, si tumor est, numquam ex toto se remittens, sed interdum levior aut propter famem, aut propter febriculam, maximeque in pueris: isque mollis est, si non nimius humor subest; at si is vehementer increvit, renititur sicut uter repletus et arcte adstrictus: venae quoque in scroto inflantur; et, si digito pressimus, cedit humor, circumfluensque id, quod non premitur, attollit, et

tamquam in vitro cornuve per scrotum apparet; isque, quantum in ipso est, sine dolore est. Sedes autem ejus sicprehenditur. Si inter summam mediamque tunicam est, quum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertens
 5 subit: scrotum albidius est; si ducitur, aut nihil, aut parvulum intenditur: testiculus ea parte neque visu, neque tactu sentitur. At si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior coles sub tumore eo delitescat.

Praeter haec aequae integris tunicis ramex innascitur: *κρο-
 10 σοκήλην* Graeci appellant (P. Aeg. 64, 63, 66). Venae intumescunt; eaeque intortae, conglomerataeque a superiore parte vel ipsum scrotum implent, vel mediam tunicam, vel imam: interdum etiam sub ima tunica, circa ipsum testiculum nervumque ejus, increscunt. Ex his eae, quae in ipso
 15 scroto sunt, oculis patent: eae vero, quae mediae imaeve tunicae insidunt, ut magis conditae, non aequae quidem cernuntur, sed tamen etiam visui subjectae sunt: praeterquam quod et tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine ac modo, et id prementi magis renititur, ac per ipsos venarum
 20 toros inaequale est; et, qua parte id est, testiculus magis justo dependet. Quum vero etiam super ipsum testiculum nervumque ejus id malum increvit, aliquanto longius testiculus ipse descendit, minorque altero fit utpote alimento amisso. Raro, sed aliquando caro quoque inter tunicas increscit:
 25 *σαρκοκήλην* Graeci vocant. Interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque affert; et, nisi celeriter ea inflammatio conquievit, dolor ad inguina atque ilia pervenit, partesque eae intumescunt; nervus ex quo testiculus dependet plenior fit, simulque indurescit. Super
 30 haec inguen quoque nonnumquam ramice impletur: *βουβα-
 νοκήλην* appellant.

CAPUT XIX.

De testiculorum curationibus, et primo de incisione, et curatione inguinis vel scroti.

35 His cognitis, de curatione dicendum est: in qua quaedam communia omnium sunt, quaedam propria singulorum.

Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc de iis, quae scalpellum desiderant: nam quae vel sanari non possint, vel aliter nutriri debeant, dicendum erit, simul ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. In utraque curatione homo ante triduum bibere aquam; pridie abstinere etiam a cibo debet, ipso autem die collocari supinus; deinde, si inguen incidendum est, idque jam pube contegitur, ante radendum est; et tum, extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, quae cum abdomine tunicae inferiores committuntur. Aperientum autem audacter est, donec summa tunica, quae ipsius scroti est, incidatur, perveniaturque ad eam, quae media est. Plaga facta, foramen deorsum versus subest. In id demittendus est sinistrae manus digitus index, ut diductis intervenientibus membranulis, sinum laxet. Minister autem, sinistra manu comprehenso scroto, sursum versus id debet extendere, et quam maxime ab inguinibus abducere; primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas, quae super mediam tunicam sunt, si digito diducere non potest, scalpello abscindat: deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagae jungatur, digitoque inde promatur, et super ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde, si qua vitiosa sunt, circumcidenda sunt. In quibus quum multae venae discurant, tenuiores quidem praecidi protinus possunt: majores vero ante longiore lino deligandae sunt, ne periculose sanguinem fundant. Sin media tunica vexata erit, aut sub ea malum increverit, excidenda erit sic, ut alte ad ipsum inguen praecidatur. Infra tamen non tota demenda est: nam quod ad basim testiculi vehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo non potest: itaque ibi relinquendum est. Idem in ima quoque tunica, si laesa est, faciendum est. Sed non a summa inguinis plaga, verum infra paulum ea abscindenda, ne laesa abdominis membrana inflammationes moveat. Neque tamen nimium ex ea sursum relinquendum est, ne postea sinuetur, et sedem eidem malo praestet. Purgatus ita testiculus per ipsam plagam cum venis et arteriis et nervo suo leniter demittendus est; videndumque ne sanguis in scrotum descendat, neve concretus

aliquo loco maneat. Quae ita fient, si venis vinciendo medicus prospexerit. Lina, quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debebunt: quae, pure orto, sine ullo dolore excident. Ipsi autem plagae injiciendae duae
5 fibulae sunt; et insuper medicamentum, quo glutinetur. Solet autem interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix major et latior fiat. Quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leviter tantum imponenda sunt; supraque ea, quae inflammationem repellant, id est ex
10 aceto vel lana succida, vel spongia: cetera eadem, quae, ubi pus moveri debet, adhibenda sunt. At quum infra incidi oportet, resupinato homine, subjicienda sub scroto sinistra manus est; deinde id vehementer apprehendendum, et incidendum; si parvulum est quod nocet, modice, ut tertia pars
15 integra, ad sustinendum testiculum, infra relinquatur: si majus est, etiam amplius, ut paulum tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit, integrum maneat. Sed primo rectus scalpellus quam levissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat: tum inclinandus mucro est, ut
20 transversas membranas secet, quae inter summam mediamque tunicam sunt. Ac, si vitium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet: si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est; sicut tertia quoque, si illa vitium tegit. Ubicumque autem repertum malum est, ministrum ab
25 inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet: medicum, digito manubriolove scalpelli diductam inferiore parte tunicam extra collocare; deinde eam ferramento, quod a similitudine corvum vocant, incidere sic ut intrare duo digiti, index et medius, possint: his deinde conjectis, excipienda re-
30 liqua pars tunicae et inter digitos scalpellus immittendus est, eximendumque aut effundendum quidquid est noxium. Quamcumque autem tunicam quis violavit, illam quoque debet excidere; ac mediam quidem, ut supra dixi, quam altissime ad inguen; imam autem, paulo infra. Ceterum antequam exci-
35 dantur, venae quoque vinciri lino summae debent; et ejus lini capita extra plagam relinquenda sunt, sicut in aliis
que venis, quae id requisierint. Eo facto, testicul-
reponendus est: oraeque scroti suturis inter se con-

dae, neque paucis, ne parum glutinentur, et longior fiat curatio; neque multis, ne inflammationem augeant. Atque hic quoque videndum est, ne quid in scroto sanguinis maneat: tam imponenda glutinantia sunt. Si quando autem in scroto sanguis defluxit, aliquidve concretum ex eo decidit, incidi subter id debet; purgatoque eo, spongia acri aceto madens, circumdari. Deligatum autem vulnus omne quod ex his causis factum est, si dolor nullus est, quinque primis diebus non est resolvendum, sed bis die tantum aceto irroranda lana, vel spongia: si dolor est, tertio die resolvendum; et, ubi fibulae sunt, hae incidendae; ubi linamentum, id mutandum est; rosaque et vino madefaciendum id, quod imponitur. Si inflammatio increscit, adjiciendum prioribus cataplasma ex lenticula et melle; vel ex malicorio, quod in austero vino coctum sit; vel ex his mixtis. Si sub his inflammatio non conquieverit, post diem quintum multa calida aqua vulnus fovendum, donec scrotum ipsum et extenuetur, et rugosius fiat: tum imponendum cataplasma ex triticea farina, cui resina pinea adjecta sit: quae ipsa, si robustus curatur, ex aceto; si tener, ex melle coquenda sunt. Neque dubium est, quodcumque vitium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quae pus movent, imponenda sint. Quod si pus in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus detur; linamentumque eatenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter nervos priore cataplasmate, dein cerato utendum est. Haec proprie ad ejusmodi vulnera pertinent: cetera et in curatione, et in victu, similia iis esse debent, quae in alio quoque vulnerum genere praecepimus.

CAPUT XX.

De intestini in scrotum devoluti curatione.

30

His propositis ad singulas species veniendum est. Ac si cui parvulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experienda vinctura est. Fascia ejus rei causa fit, cui imo loco pila assuta est ex panniculis facta, quae ad repellendum intestinum ipsi illi subjicitur: deinde reliqua fasciae pars arcte circumdatur. Sub quo saepe et intus compellitur intestinum,

et inter se tunicae glutinantur. Rursus, si aetas processit, multumque intestini descendisse ex tumore magno patet, ad-
jiciunturque dolor et vomitus; quae ex stercore, ex crudi-
tate eo delapso, fere accidunt, scalpellum adhiberi sine per-
niciē non posse manifestum est: levandum tantummodo ma-
lum, et per alias curationes extrahendum est. Sanguis mitti
ex brachio debet: deinde, si vires patiuntur, imperanda tri-
dui abstinentia est; si minus, certe pro vi corporis quam
longissima. Eodem vero tempore superhabendum cataplasma
10 ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post
haec, et farina hordeacea cum resina injicienda; et is demit-
tendus in solium aquae calidae, cui oleum quoque adjectum
sit; dandumque aliquid cibi levis, calidi. Quidam etiam al-
vum ducunt. Id deducere aliquid in scrotum potest, educere
15 ex eo non potest. Per ea vero, quae supra scripta sunt, le-
vato malo, si quando alias dolor reverterit, eadem erunt fa-
cienda. Sine dolore quoque si multa intestina prolapsa sunt,
secari supervacuum est: non quo excludi a scroto non pos-
sint; nisi tamen id inflammatio prohibuit; sed quod repulsa
20 inguinibus immorentur, ibique tumorem excitent, atque ita
fiat mali non finis, sed mutatio. At in eo, quem scalpello
curari oportebit, simul atque ad mediam tunicam vulnus in
inguine factum pervenerit, duobus hamulis ea juxta ipsas
oras apprehendi debebit, dum diductis omnibus membranulis
25 medicus eam liberet. Neque enim cum periculo laeditur,
quae excidenda est; quum intestinum esse nisi sub ea non
possit. Ubi diducta autem erit, ab inguine usque ad testicu-
lum incidi debebit sic, ne is ipse laedatur; tum excidi. Fere
tamen hanc curationem puerilis aetas, et modicum malum
30 recipit. Si vir robustus est, majusque id vitium est, extrahi
testiculus non debet, sed in sua sede permanere. Id hoc
modo fit. Inguen eadem ratione usque ad mediam tunicam
scalpello aperitur; eaque tunica eodem modo duobus hamis
excipitur sic, ut a ministro testiculus eatenus contineatur, ne
35 per vulnus exeat: tum ea tunica deorsum versus scalpello
inciditur; sub eaque index digitus sinistrae manus ad imum
testiculum demittitur, eumque ad plagam compellit:
dextrae manus duo digiti, pollex atque index, venarum

teriam et nervum tunicamque eorum a superiore tunica diducunt. Quod si aliquae membranulae prohibent, scalpello resolvuntur, donec ante oculos tota jam tunica sit. Excisis, quae excidenda sunt, repositoque testiculo, ab ora quoque ejus vulneris, quod in inguine est, demenda habenucla paulo s latior est, quo major plaga sit, et plus creare carnis possit.

CAPUT XXI.

De omenti in scrotum prolapsi curatione.

1. At si omentum descendit, eodem quidem modo, quo supra scriptum est (cap. 19, 20), aperiendum inguen, diducendaeque tunicae sunt: considerandum autem est, majorne is modus, an exiguus sit. Nam quod parvulum est, super inguen in uterum vel digito vel averso specillo repellendum est: si plus est, sinere oportet dependere quantum ex utero prolapsum est; idque adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur et excidat. Quidam hic quoque duo lina acutrajiciunt, binisque singulorum capitibus diversas partes adstringunt; sub quo aequae, sed tardius emoritur. Adjicitur tamen hic quoque celeritati, si omentum super vinculum illinitur medicamentis, quae sic exedunt, ne erodant: *σηπτά* Graeci vocant. Fuerunt etiam qui omentum forfice praeciderent: quod in parvulo non est necessarium; si majus est, potest profusionem sanguinis facere; siquidem omentum quoque venis quibusdam, etiam majoribus illigatum est. Neque vero, si discisso ventre id prolapsum forfice praeciditur, quum et emortuum sit, et aliter tutius avelli non possit, inde huc exemplum transferendum est. Vulnus autem curari, si relictum omentum est, sutura debet: si id amplius fuit, et extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est.

2. Si vero humor intus est, incidendum est, in pueris quidem, inguen; nisi in his quoque id liquoris ejus major modus prohibet: in viris vero, et ubicumque multus humor subest, scrotum. Deinde, si inguen incisum est, eo protractis tunicis, humor effundi debet: si scrotum, et sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quam humor effundendus, abscindendaeque membranae sunt, si quae eum continuerunt;

deinde eluendum id ex aqua, quae vel salem adjectum, vel nitrum habeat: si sub media, imave tunica, totae eae extra scrotum collocandae excidendaeque sunt.

CAPUT XXII.

5

De ramicis curatione.

Ramex (cf. cap. 18, fine — P. Aeg. VI, 64) autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus et acutis ferramentis, quae ipsis venis infligantur; cum eo, ne amplius quam has urant; maximeque ubi inter se implicatae glomere-
 10 rantur, eo ferrum id admovendum est; tum super farina ex aqua frigida subacta injicienda est; utendumque eo vinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui: tertio die lentacula cum melle imponenda est: post, ejectis crustis, ulcera melle purganda, rosa implenda, ad cicatricem aridis lina-
 15 mentis perducenda sunt. Quibus vero super mediam tunicam venae tument, incidendum inguen est, atque tunica promenda, ab eaque venae digito vel manubriolo scalpelli separandae. Qua vero inhaerebunt, et ab superiore et ab inferiore parte lino vinciendae; tum sub ipsis vinculis praeci-
 20 cidendae, reponendusque testiculus est. At ubi supra tertiam tunicam ramex insedit, mediam excidi necesse est. Deinde, si duae tresve venae tument, et ita pars aliqua obsidetur, ut major eo vitio vacet, idem faciendum, quod supra scriptum est (cf. cap. 18, in fine); ut et ab inguine, et a
 25 testiculo deligatae venae praecidantur, isque condatur. Sin totum id ramex obsederit, per plagam demittendus digitus index erit, subjiciendusque venis sic, ut paulatim eas protrahat; eaeque adducendae, donec is testiculus par alteri fiat: tum fibulae oris sic injiciendae, ut simul eas quoque venas
 30 comprehendant. Id hoc modo fit. Acus ab exteriori parte oram vulneris perforat: tum non per ipsam venam, sed per membranam ejus immittitur, per eamque in alteram oram compellitur. Vena vulnerari non debet, ne sanguinem fundat. Membrana semper inter has venas est, ac neque periculum affert, et filo comprehensa illas abunde tenet. Id
 etiam satis est duas fibulas esse. Tum venae, quaec

protractae sunt, in ipsum inguen averso specillo compelli debent. Solvendi fibulas tempus, inflammatione finita, et purgato vulnere est; ut una simul et oras et venas cicatrix devinciat. Ubi vero inter imam tunicam et ipsum testiculum nervumque ejus ramex ortus est, una curatio est, quae totum testiculum abscindit. Nam neque ad generationem quidquam is confert, et omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed tum quoque inguen incidendum; media tunica promenda, atque excidenda est; idem in ima faciendum; nervusque, ex quo testiculus dependet, praecidendus: post id venae et arteriae ad inguen lino deligandae, et infra vinculum abscindendae sunt.

CAPUT XXIII.

De carne quae inter tunicas testiculorum increvit, et de nervo indurato.

15

Caro quoque, si quando inter tunicas increvit, nihil dubii est, quin eximenda sit: sed id, ipso scroto inciso, fieri commodius est. At si nervus induruit, curari res neque manu, neque medicamento potest. Urgent enim febres ardentes, et aut virides, aut nigri vomitus; praeter haec, ingens sitis, et linguae aspritudo; fereque a die tertio spumans bilis alvo cum rosione redditur: ac neque assumi facile cibus, neque contineri potest: neque multo post extremae partes frigescent, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur; deinde in fronte frigidus sudor, eumque mors sequitur.

25

CAPUT XXIV.

De ramice inguinis.

Ubi vero in ipso inguine ramex est, si tumor modicus est, semel incidi; si major, duabus lineis debet, ut medium excidatur: deinde, non extracto testiculo, sicut intestinis quoque prolapsis interdum fieri docui, colligendae venae vinciendaeque, ubi tunicis inhaerebunt, et sub his nodis praecidendae sunt. Neque quidquam novi curatio vulneris ejus requirit.

CAPUT XXV.

Ad tegendam glandem colis, si nuda est.

1. Ab his ad ea transeundum est, quae in cole ipso fiunt. In quo si glans nuda est (P. Aeg. VI, 53), vultque aliquis
 5 eam decoris causa tegere, fieri potest: sed expeditius in puero, quam in viro; in eo, cui id naturale est, quam in eo, qui quarundam gentium more circumcisis est; in eo, cui glans parva juxtaque eam cutis spatiosior, brevis ipse coles est, quam in quo contraria his sunt. Curatio autem
 10 eorum, quibus id naturale est, ejusmodi est. Cutis circa glandem prehenditur et extenditur, donec illam ipsam condant; ibique deligatur: deinde, juxta pubem, in orbem tergus inciditur, donec coles nudetur; magnaue cura cavetur, ne vel urinae iter, vel venae, quae ibi sunt, incidantur. Eo
 15 facto, cutis ad vinculum inclinatur, nudaturque circa pubem velut circulus; eoque linamenta dantur, ut caro increseat, et id impleat, satisque velamenti supra latitudo plagae praestet. Sed, donec cicatrix sit, vinctum esse id debet, in medio tantum relicto exiguo urinae itinere. At in eo, qui circumcisis est, sub circulo glandis scalpello diducenda cutis
 20 ab interiore cole est. Non ita dolet, quia, summo soluto, diduci deorsum usque ad pubem manu potest; neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem: tum multa frigida aqua foveatur; emplastrumque
 25 circa datur, quod valenter inflammationem reprimat; proximisque diebus ¹⁾ et prope a fame victus est, ne forte eam partem satietas excitet. Ubi jam sine inflammatione est, deligari debet a pube usque circum: super glandem autem, adverso emplastro imposito, induci. Sic enim fit, ut inferior pars glutinetur; superior ita sanescat, ne inhaereat.

2. Contra, si glans ita contacta est, ut nudari non pos-

1) Veteres libri habent *proximis diebus, ut prope a fame victus est*. Sed evidens est, post verba *proximis diebus* aliqua deesse. Palavicinus legit *proximis diebus ut prope a fame victus est, abstinere*. Lindenius vero ita supplet, *proximis diebus abstinere, donec prope a fame victus sit*. Haec quidem videtur esse Celsi sententia; sed constructio laborat, nisi nova adhibita licentia, verere additur *debet*.

sit, quod vitium Graeci *φίμωσιν* appellant, aperienda est; quod hoc modo fit (P. Aeg. VI, 55): subter a summa ora, cutis inciditur recta linea usque ad frenum; atque ita superius tergus relaxatum, cedere retro potest. Quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est sic, ut vertex ejus ad frenum, basis in tergo extremo sit. Tum superdanda linamenta sunt, aliaque medicamenta quae ad sanitatem perducant. Necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiescere: nam ambulatio atterendo ulcus sordidum reddit.

Infibulare quoque adolescentulos interdum vocis, interdum valetudinis causa, quidam consuerunt: ejusque haec ratio est. Cutis, quae super glandem est, extenditur, notaturque utrimque a lateribus atramento, qua perforetur; deinde remittitur. Si super glandem notae revertuntur, nimis apprehensum est, et ultra notari debet: si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulae est. Tum, qua notae sunt, cutis acu filum ducente transsuitur, ejusque filii capita inter se deligantur, quotidieque id movetur, donec circa foramina cicatriculae fiant. Ubi eae confirmatae sunt, exempto filo fibula additur, quae quo levior, eo melior est. Sed hoc quidem saepius inter supervacua, quam inter necessaria est.

CAPUT XXVI.

De mingendi difficultate, et curatione.

25

1. Res vero interdum cogit emoliri manu urinam, quum illa non redditur, aut quia senectute iter ejus collapsum est, aut quia calculus, vel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit: ac mediocris quoque inflammatio saepe eam reddi naturaliter prohibet (P. Aeg. VI, 60). Idque non in viris tantummodo, sed in feminis quoque interdum necessarium est. Ergo aeneae fistulae fiunt; quae, ut omni corpori ampliori minorique sufficiant, ad mares tres; ad feminas duae medico habendae sunt: ex virilibus maxima decem et quinque digitorum; media duodecim; minima novem: ex muliebribus major novem; minor sex. Incurvas vero esse eas

paulum, sed magis viriles oportet, laevesque admodum; ac neque nimis plenas, neque nimis tenues. Homo tum resupinus, super subsellium aut lectum collocandus est. Medicus autem a dextro latere sinistra quidem manu colem masculi
 5 continere, dextra vero fistulam demittere in iter urinae debet: atque ubi ad cervicem vesicae ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam vesicam compellere, eamque, urina reddita, recipere. Femina brevius urinae iter, simul et rectius habet; quod mammulae simile, inter imas oras
 10 super naturale positum, non minus saepe auxilio eget, aliquanto minus difficultatis exigit. Nonnumquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, quia subinde ea extenuatur, non longe ab exitu inhaerescit. Eum, si fieri potest, oportet evellere vel oriculario specillo, vel eo ferramento,
 15 quo in sectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit, cutis extrema quam plurimum attrahenda, et, condita glande, lino vincienda est: deinde a latere recta plaga coles incidendus, et calculus eximendus est: tum cutis remittenda. Sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat,
 20 et urina naturaliter profluat.

2. Quum vesicae vero calculique facta mentio sit; locus ipse exigere videtur, ut subjiciam quae curatio calculosis, quum aliter succurri non potest, adhibeatur (P. Aeg. VI, 60). Ad quam festinare, quum praeceps sit, nullo modo convenit. Ac neque omni tempore, neque in omni aetate, neque
 25 in omni vitio id experiendum est: sed solo vere; in eo corpore, quod jam novem annos, nondum quatuordecim excessit; et si tantum mali subest, ut neque medicamentis vinci possit, neque jam trahi posse videatur, quominus interposito aliquo spatio interimat. Non quo non interdum etiam temeraria medicina proficiat; sed quo saepius utique in hoc fallat, in quo plura et genera et tempora periculi sunt. Quae simul cum ipsa curatione proponam. Igitur, ubi ultima experiri
 30 statutum est, ante aliquot diebus victu corpus praeparandum est: ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi vero inter haec exercitatione utatur, quo magis calculus ad vesicae cervicem descendat. Quod an inciderit, digitis quoque, sic


tione docebo, demissis cognoscitur. Ubi ejus rei fides est, pridie is puer in jejunio continendus est; et tum loco calido curatio adhibenda, quae hoc modo ordinatur. Homo praevalens et peritus in sedili alto consedit, supinumque eum et aversum, super genua sua coxis ejus collocatis, comprehēdit; reductisque ejus cruribus, ipsum quoque jubet, manibus ad suos poplites datis, eos, quam maxime possit, attrahere; simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus ejus est, *qui curatur*, duobus sedilibus junctis, duo valentes insidunt; quorum et sedilia et interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint: tum is super duorum genua eodem modo collocatur; atque alter, prout consedit, sinistrum crus ejus, alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. Sive autem unus, sive duo continent, super humeros ejus suis pectoribus incumbunt. Ex quibus evenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extentus, et, in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Praeter haec, etiamnum a lateribus duo valentes obijciuntur, qui circumstantes labare vel unum vel duos, qui puerum continent, non sinunt. Medicus deinde, diligenter unguibus circumcisis, unctaque sinistra manu ¹⁾, duos ejus digitos, indicem et medium, leniter prius unum, deinde alterum in anum ejus demittit; dextraeque digitos super imum abdomen leniter imponit; ne si utrimque digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam laedant. Neque vero festinanter in hac re, ut in plerisque, agendum est; sed ita, ut quam maxime id tuto fiat: nam laesa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. Ac primum circa cervicem quaeritur calculus: ubi repertus, minore negotio expellitur. Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi quum hoc indicibus suis cognitum est. Si vero aut ubi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam vesicam dantur; paulatimque dextra quoque ma-

1) Locus maxime vexatus. Libri antiqui habent *atque sinistra manu*. Targa pro *atque* reposuit *unctaque*; sic et sententia et constructio recte constant, cf. Cap. 29 hujus lib. — P. Aeg. I, I, p. 252 ed. Briaui exhibet: τὸν λιχανὸν τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς δάκτυλον εἰ παιδὶον εἰς τὸ νοσούν ἢ καὶ τὸν μέσον ἑὺν τελειότερον, ἀλλ' ἐφ' αὐτῆς ἐλάλῃ καθίσταμεν εἰς τὴν ἔδραν.

nus ultra translata subsequitur. Atque ubi repertus est calculus; qui necesse est in manus incidat; eo curiosius deducitur, quo minor laeviorque est; ne effugiat, id est ne saepius agitanda vesica sit. Ergo ultra calculum dextra semper manus opponitur, sinistrae digiti deorsum eum compellunt, donec ad cervicem pervenitur. In quam, si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat; si planus, sic, ut transversus sit; si quadratus, ut duobus angulis sedeat; si altera parte plenior, sic, ut prius ea, qua tenuior sit, evadat. In
 10 rotundo nihil interesse, ex ipsa figura patet; nisi, si laevior altera parte est, ut ea antecedit. Quum jam eo venit, incidi juxta anum cutis plaga lunata usque ad cervicem vesicae debet, cornibus ad coxas spectantibus paulum: deinde ea parte, qua resima plaga est, etiamnum sub cute altera transversa
 15 plaga facienda est, qua cervix aperiatur; donec urinae iter pateat sic, ut plaga paulo major, quam calculus sit. Nam qui metu fistulae, quam illo loco *φυσάδα* Graeci vocant, parum patefaciunt cum majore periculo eodem revolvuntur: quia calculus iter, quum vi promitur, facit, nisi accipit: id
 20 que etiam perniciosius est, si figura quoque calculi, vel aspritudo aliquid eo contulit. Ex quo et sanguinis profusio, et distentio nervorum fieri potest: quae si quis evasit, multo tamen patientiorem fistulam habiturus est rupta cervice, quam habuisset incisa. Quum vero ea patefacta est, in conspectum
 25 calculus venit: in cujus colore nullum discrimen est. Ipse, si exiguus est, digitis ab altera parte propelli, ab altera protrahi potest: si major, injiciendus a superiore parte uncus est, ejus rei causa factus. Is est ad extremum tenuis, in semicirculi speciem retusae latitudinis; ab exteriori parte laevis, qua corpori jungitur; ab interiori asper, qua calculum attingit. Isque longior potius esse debet: nam brevis extrahendi vim non habet. Ubi injectus est, in utrumque latus inclinandus est, ut appareat, an calculus teneatur; quia, si apprehensus est, ille simul inclinatur. Idque eo nomine opus
 35 est, ne quum adduci uncus coeperit, calculus intus effugiat, hic in oram vulneris incidat, eamque convulneret. ¹ quod periculum esset, jam supra proposui. Ubi calculum patet, eodem paene momento triplex mo

dus est: in utrumque latus; deinde extra, sic tamen, ut leniter id fiat, paulumque primo calculus attrahitur: quo facto, attollendus uncus extremus est, uti intus magis maneat, faciliusque illum producat. Quod si quando a superiore parte calculus parum commode comprehendetur, a latere erit apprehendendus. 5

Haec est simplicissima curatio. Sed varietas rerum quasdam etiamnum animadversiones desiderat. Sunt enim quidam non asperi tantummodo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in cervicem, sine ullo periculo eximuntur: in vesica vero non tuto vel hi conquiruntur, vel attrahuntur; quoniam, ubi illam convulnerant, ex distentione nervorum mortem maturan; multoque magis, si spina aliqua vesicae inhaeret, eamque quum duceretur, duplicavit. Colligitur autem eo, quod difficilius urina redditur, in cervice calculus esse; eo, quod cruenta destillat illum esse spinosum: maximeque id subjectis digitis quoque experiundum est, neque adhibenda manus, nisi id constitit. Ac tum quoque leniter intus digiti obijciendi, ne violenter promovendo convulnerent: tum incidendum. Multi hic quoque scalpello usi sunt. Megetes, quoniam is infirmior est, postestque in aliquam prominentiam incidere, incisoque super illam corpore, qua cavum subest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi necesse sit, ferramentum fecit rectum, in summa parte labrosum, in ima semicirculatum acutumque ¹). 20



1) 1. Ferramentum Megetis secundum Vulpes (ex instrumentis Pompejanis in R. Musaeo Neap. collectis). 2. Id. ex conjectura des Etangs. 3. Idem ex mea conjectura. Vide *Gaz. méd. de Paris* 1847, p. 103 sqq.

Id receptum inter duos digitos, indicem ac medium, super pollice imposito sic deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret: quo consequebatur, ut semel, quantum satis esset, aperiret. Quocumque autem modo cervix patefacta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet; nulla, propter festinationem, vi admota.

3. At calculus arenosus, et ante manifestus est; quoniam urina quoque redditur arenosa: et in ipsa curatione; quoniam inter subjectos digitos neque aeque renititur, et insuper dilabitur. Item molles calculos, et ex pluribus minutisque, sed inter se parum adstrictis, compositos indicat urina, trahens quasdam quasi squamulas. Hos omnes, leniter permutatis subinde digitorum vicibus, sic oportet adducere, ne vesicam laedant, neve intus aliquae dissipatae reliquiae maneant, quae postmodum curationi difficultatem faciant. Quidquid autem ex his in conspectum venit, vel digitis, vel unco eximendum est. At si plures calculi sunt, singuli protrahi debent; sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur: siquidem in vesica difficulter invenitur, inventusque celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica laeditur, excitatque inflammationes mortiferas; adeo ut quidam secti, quum diu frustra per digitos vesica esset agitata, decesserint. Quibus accedit etiam, quod exiguus calculus ad plagam urina postea promovetur, et ex-
cidit. Si quando autem is major non videtur nisi rupta cer-
vice extrahi posse, findendus est: cujus repertor Ammonius, ob id *λιδωτόμος* cognominatus est. Id hoc modo fit: Uncus injicitur calculo sic, ut facile eum concussum quoque teneat, ne is retro revolvatur: tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicae, prima parte tenui, sed retusa, quod admotum calculo, et ex altera parte ictum, eum findit; magna cura habita, ne aut ad ipsam vesicam ferramentum perveniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

4. Hae vero curationes in feminis quoque similes sunt; de quibus tamen proprie quaedam dicenda sunt. Siquidem in his, ubi parvulus calculus est, scalpellus supervacuum est; quia is urina in cervicem compellitur; quae et brevior quam in maribus, et laxior est. Ergo et per se saepe ex-

si in primo, quod est angustius, inhaeret, eodem tamen unco sine ulla noxa educitur. At in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subjici digiti tamquam masculo, mulieri per naturale ejus debent. Tum virgini quidem sub ima sinisteriore ora; mulieri vero inter urinae iter, et os⁵ pubis incidendum est sic, ut utroque loco plaga transversa sit. Neque terreri convenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

5. Calculo evulso, si valens corpus est, neque magnopere vexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor¹⁰ inflammatio oriatur: atque ingredi quoque eum paulum non alienum est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. Quod si per se non destitit, rursus, ne vis omnis intereat, suppressi debet: idque protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est: siquidem, ut distentione ner-¹⁵vorum periclitatur aliquis, dum vesica ejus agitur; sic alter metus excipit, ne tantum sanguinis profluat, ut occidat. Quod ne incidat, desiderare is debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adjectum: sub quo et sanguis fere conquiescit, et adstringitur vesica, ideoque minus inflammatur.²⁰ Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est et inguinibus, et coxis, et super pubem. Ubi jam satis vel evocatus est sanguinis, vel prohibitus, resupinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxae paulum excitentur: ac super ulcus imponendum est duplex aut triplex linteolum,²⁵ aceto madens. Deinde, interpositis duabus horis, in solium is aquae calidae resupinus demittendus est sic, ut a genibus ad umbilicum aqua teneat, cetera vestimentis circumdata sint; manibus tantummodo pedibusque nudatis, ut et minus digeratur, et ibi diutius maneat. Ex quo multus sudor oriri³⁰ solet; qui spongia subinde in facie detergendus est: finisque ejus fomenti est, donec infirmando offendat. Tum multo is oleo perungendus, inducendusque hapsus lanae mollis, tepido oleo repletus, qui pubem, et coxas, et inguina, et plagam ipsam, contactam eodem ante linteolo, protegat: isque sub-³⁵inde oleo tepido madefaciendus est; ut neque frigus ad vesicam admittat, et nervos leniter molliat. Quidam cataplas-
matis calefacientibus utuntur. Ea plus pondere nocent, quo

vesicam urgendo vulnus irritant, quam calore proficiunt. Ergo ne vinculum quidem ullum necessarium est. Proximo die, si spiritus difficilius redditur, si urina non excedit, si locus circa pubem mature intumuit, scire licet in vesica
 5 sanguinem concretum remansisse. Igitur, demissis eodem modo digitis, leniter pertractanda vesica est, et discutienda si qua coierunt: quo fit, ut per vulnus postea procidant. Non alienum etiam est, oriculario clystere acetum nitro mixtum per plagam in vesicam compellere: nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coierunt. Eaque facere etiam primo
 10 die convenit, si timemus ne quid intus sit: maximeque ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit. Cetera eadem facienda sunt: ut demittatur in solium, ut eodem modo panniculus, eodem lana superinjiciatur. Sed neque saepe, neque tamdiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens
 15 est; infirmus, quam valens; levi, quam graviore inflammatione affectus; is, cujus corpus digeritur, quam is, cujus adstrictum est. Inter haec vero, si somnus est, et aequalis spiritus, et madens lingua, et sitis modica, et venter imus
 20 sedet, et mediocris est cum febre modica dolor, scire licet recte curationem procedere. Atque in his inflammatio fere quinto vel septimo die finitur: qua levata, solium supervacuum est: supini tantummodo vulnus aqua calida fovendum est, ut, si quid urinae rodit, eluatur. Imponenda autem medi-
 25 camenta sunt pus moventia; et, si purgandum vulnus videbitur, melle linendum. Id si rodet, rosa temperabitur. Linamenta vero tum super vulnus non sunt necessaria; super medicamentum, ad id continendum, recte imponuntur. At ubi vulnus purgatum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est.
 30 Quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, varia pericula oriuntur. Quae praesagire protinus licet, si continua vigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vulnus hiat, si transfluens urina id non rodit, si ante tertium diem quae-
 35 dam livida excedunt, si is aut nihil, aut tarde respondet; si vehementes dolores sunt, si post diem quintum magna fa-
 bres urgent, et fastidium cibi permanet, si cubari-
 trem jucundius est. Nihil tamen pejus est distentioni

rum, et ante nonum diem vomitu bilis. Sed quum inflammationis sit metus, succurri abstinence, modicis et tempestivis cibis; inter haec fomentis, et quibus supra scripsimus, oportet.

CAPUT XXVII.

5

De cancro qui excisa vesica nascitur.

Proximus canceri metus est. Is cognoscitur, si et per vulnus, et per ipsum colem fluit sanies mali odoris, cumque ea quaedam a concreto sanguine non abhorrentia, tenuesque carunculae lanulis similes: praeter haec, si orae vulneris aridae sunt, si dolent inguina, si febris non desinit, eaque in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est in quam partem cancer is tendat. Si ad colem, indurescit is locus, et rubet, et tactu dolorem excitat, testiculique intumescunt: si in ipsam vesicam, ani dolor sequitur, coxae durae sunt, non facile crura extendi possunt: at si in alterutrum latus, oculis id expositum est, paresque utrimque easdem notas, sed minores, habet. Primum autem ad rem pertinet corpus recte jacere, ut superior pars semper ea sit, in quam vitium fertur. Ita, si ad colem it, supinus is collocari debet; si ad vesicam, in ventrem; si in latus, in id quod integrius est. Deinde, ubi ventum fuerit ad curationem, homo in aquam demittetur in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, aut myrtus; idemque humor clystere intus adigetur: tum superponetur lenticula cum malicorio mixta; quae utraque ex vino decocta sint; vel rubus, aut oleae folia eodem modo decocta; aliave medicamenta, quae ad cohibendos purgandosque canculos proposuimus (cf. V, 28, 2). Ex quibus, si qua erunt arida, per scriptorium calamum inspirabuntur. Ubi stare coeperit cancer, mulso vulnus eluatur: vitabiturque eo tempore ceratum, quod, ad recipiendum id malum, corpus emollit: potius plumbum elotum cum vino inungetur; superque idem linteolo illitum imponetur. Sub quibus perveniri ad sanitatem potest: cum eo tamen, quod non ignoremus, orto cancro saepe affici stomachum, cui cum ve-

sica quaedam consortio est: exque eo fieri, ut neque retineatur
cibus, neque, si quis retentus est, concoquatur, neque corpus
alatur; ideoque ne vulnus quidem aut purgari, aut ali
possit: quae necessario mortem maturant. Sed ut his suc
5 curri nullo modo potest, sic a primo tamen die tenenda ratio
curationis est. In qua quaedam observatio, ad cibum quoque
potionemque pertinens, necessaria est. Nam cibus inter prin
cipia non nisi humidus dari debet: ubi vulnus purgatum est;
ex media materia: olera et salsamenta semper aliena sunt.
10 Potione opus est modica. Nam, si parum bibitur, accenditur
vulnus, et vigilia urget, et vis corporis minuitur: si plus ae
quo assumitur, subinde vesica impletur, eoque irritatur. Non
nisi aquam autem bibendam esse manifestius est, quam ut sub
inde dicendum sit. Solet vero sub ejusmodi victu evenire,
15 ut alvus non reddatur. Haec aqua ducenda est, in qua vel
foenum graecum, vel malva decocta sit. Idem humor rosa
mixtus in ipsum vulnus oriculario clystere agendus est, ubi
id rodit urina, neque purgari patitur. Fere vero primo per
vulnus exit haec: deinde, eo sanescente, dividitur, et pars
20 per colem descendere incipit, donec ex toto plaga clauda
tur. Quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum,
nonnumquam exacto quoque anno fit. Neque desperari de
bet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer rupta
cervix est, aut ex cancro multae magnaevae carunculae, si
25 mulque nervosa aliqua exciderunt. Sed, ut vel nulla ibi fistula,
vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum
est. Ergo, quum jam ad cicatricem vulnus tendit, extentis
jacere feminibus et cruribus oportet: nisi tamen molles are
nosive calculi fuerunt. Sub his enim tardius vesica purga
30 tur: ideoque diutius plagam patere necessarium est; et tum
demum, ubi jam nihil tale extra fertur, ad cicatricem per
duci. Quod si, antequam vesica purgata est, orae se gluti
narunt, dolorque et inflammatio redierunt, vulnus digitis vel
averso specillo diducendum est; ut torquentibus exitus de
35 tur: hisque effusis, quum diutius pura urina descendit, tum
demum, quae cicatricem inducant, imponenda sunt; exten
dendique, ut supra docui, pedes quam maxime juncti. Quod
si fistulae metus ex his causis, quas proposui, subesse vic

bitur, quo facilius claudatur ea, vel certe coangustetur, in anum quoque danda plumbea fistula est, extensisque cruribus femina talique inter se deligandi sunt, donec, qualis futura est, cicatrix sit.

CAPUT XXVIII.

De naturalium feminarum concubitus non admittentium curatione.

Et hoc quidem commune esse maribus et feminis potest. Proprie vero quaedam ad feminas pertinent: ut in primis, quod earum naturalia nonnumquam, inter se glutinatis oris, concubitus non admittunt (P. Aeg. VI, 72). Idque interdum evenit protinus in utero matris: interdum exulceratione¹⁰ in his partibus facta, et per malam curationem his oris sanescendo junctis. Si ex utero est, membrana ori vulvae opposita est: si ex ulcere, caro id replet. Oportet autem membranam duabus lineis inter se transversis incidere ad similitudinem litterae X, magna cura habita, ne urinae iter¹⁵ violetur: deinde undique eam membranam excidere. At si caro increvit, necessarium est recta linea patefacere: tum ab ora vel vulsella, vel hamo apprehensa, tamquam habenu- lam excidere; et intus implicitum in longitudinem linamen- tum; *ληνύλον* Graeci vocant; in aceto tinctum demittere,²⁰ supraque succidam lanam aceto madentem deligare: tertio die solvere, et ulcus, sicut alia ulcera, curare. Quumque jam ad sanitatem tendet, plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamque intus dare: supra- que idem medicamentum injicere, donec ad cicatricem plaga²⁵ perveniat.

CAPUT XXIX.

Qua ratione partus emortuus ex utero excutitur.

Ubi concepit autem aliqua, si jam prope maturus par- tus intus emortuus est, neque excidere per se potest, adhi-³⁰ benda curatio est: quae numerari inter difficillimas potest

(P. Aeg. VI, 74, 75). Nam et summam prudentiam moderationemque desiderat, et maximum periculum affert. Sed vulvae natura mirabilis, quum in multis aliis, tum in hac re quoque facile cognoscitur. Oportet autem ante omnia resu-
5 pinam mulierem transverso lecto sic collocare, ut feminibus ejus ipsius ilia comprimantur: quo fit, ut et imus venter in conspectu medici sit, et infans ad os vulvae compellatur: quae, emortuo partu, id comprimit: ex intervallo vero paulum dehiscit. Hac occasione usus medicus, unctae manus
10 indicem digitum primum debet inserere, atque ibi continere, donec iterum id os aperiatur, rursusque alterum digitum demittere, et per easdem occasiones alios, donec tota esse intus manus possit. Ad cujus rei facultatem multum confert et magnitudo vulvae, et vis nervorum ejus, et corporis totius
15 habitus, et mentis etiam robur: quum praesertim intus nonnumquam etiam duae manus dari debeant. Pertinet etiam ad rem, quam calidissimum esse imum ventrem, et extrema corporis; nequedum inflammationem coepisse, sed recenti re protinus adhiberi medicinam. Nam, si corpus jam intumuit,
20 neque demitti manus, neque educi infans nisi aegerime potest: sequiturque saepe cum vomitu, et cum tremore mortifera nervorum distentio. Verum intus emortuo corpori manus injecta protinus habitum ejus sentit: nam aut in caput, aut in pedes conversum est; aut transversum jacet;
25 fere tamen sic, ut vel manus ejus, vel pes in propinquo sit. Medici vero propositum est, ut eum manu dirigat vel in caput, vel etiam in pedes, si forte aliter compositus est. Ac, si nihil aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus rectius reddit: nam manus in caput, pes in pedes eum convertit.
30 Tum, si caput proximum est, demitti debet uncus undique laevis, acuminis brevis qui vel oculo, vel auri, vel ori, interdum etiam fronti recte injicitur; deinde attractus infantem educit. Neque tamen quolibet is tempore extrahi debet. Nam, si compresso vulvae ore id tentatum est, non emit-
35 tente eo, infans abrumpitur, et unci acumen in ipsum os vulvae delabitur; sequiturque nervorum distentio, et ingens periculum mortis. Igitur, compressa vulva, conquiescere; hiantem, leniter trahere oportet; et per has occasiones pau-

latim eum educere. Trahere autem dextra manus uncum; sinistra intus posita infantem ipsum, simulque dirigere eum debet. Solet etiam evenire, ut is infans humore distendatur, exque eo profluat foedi odoris sanies. Quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut effuso humore extenuetur; ⁵ tum id leniter per ipsas manus recipiendum est; nam uncus injectus hebeti corpusculo facile elabitur: in quo, quid periculi sit, supra positum est. In pedes quoque conversus infans non difficulter extrahitur; quibus apprehensis per ipsas manus commodè educitur. Si vero transversus est, neque dirigi ¹⁰ potuit, uncus alae injiciendus, paulatimque attrahendus est. Sub quo fere cervix replicatur, retroque caput ad reliquum corpus spectat. Remedio est, cervix praecisa; ut separatim utraque pars auferatur. Id unco fit, qui, priori similis, in interiore tantum parte per totam aciem exacuitur. Tum id ¹⁵ agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur: quia fere, majore parte extracta, caput in vacuum vulvam prolabitur, extrahique sine summo periculo non potest. Si tamen id incidit, super ventrem mulieris duplici panniculo injecto, valens homo, non imperitus, a sinistro latere ejus ²⁰ debet assistere, et super imum ventrem ejus duas manus imponere, alteraque alteram premere: quo fit, ut illud caput ad os vulvae compellatur; idque eadem ratione, quae supra posita est, unco extrahitur. At si pes alter juxta repertus est, alter retro cum corpore est, quidquid protractum est, ²⁵ paulatim abscindendum est: et, si clunes os vulvae urgere coeperunt, iterum retro repellendae sunt, conquisitusque pes ejus adducendus. Aliaeque etiamnum difficultates faciunt, ut, qui solidus non exit, concisus eximi debeat. Quoties autem infans protractus est, tradendus ministro est. Is eum ³⁰ supinis manibus sustinere; medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet ita, ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas secundas vocant, quod velamentum infantis intus fuit; hisque ultimis apprehensis, venulas membranulasque omnes eadem ratione manu diducere a ³⁵ vulva, totumque illud extrahere, et si quid intus praeterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in unum feminibus, illa conclavi collocanda est, modicum calorem, sine

ullo perflatu, habente; et super imum ventrem ejus imponenda lana succida in aceto et rosa tincta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, et in iis vulneribus, quae in nervosis locis sunt, adhibetur.

5

CAPUT XXX.

De ani vitiis.

1. Ani quoque vitia, ubi medicamentis non vincuntur, manus auxilium desiderant. Ergo, si qua scissa in eo vetustate induruerunt, jamque callum habent, commodissimum
 10 est ducere alvum, tum spongiam calidam admove, ut relaxentur illa, et foras prodeant: ubi in conspectu sunt, scalpello singula excidere et ulcera renovare; deinde imponere linamentum molle, et super linteolum illitum melle; locumque eum molli lana implere, et ita vincere: altero die, deincepsque ceteris, lenibus medicamentis uti, quae ad recentia
 15 eadem vitia necessaria esse, alias proposui: et utique per primos dies sorbitionibus eum sustinere; paulatim deinde cibis adjicere aliquid, generis tamen ejus, quod eodem loco praeceptum est. Si quando autem ex inflammatione pus in
 20 his oritur, ubi primum id apparuit, incidendum est; ne anus ipse suppuret. Neque tamen ante properandum est: nam, si crudum incisum est, inflammationis multum accedit, et puris aliquanto amplius concitatur. His quoque vulneribus, lenibus cibis, iisdemque medicamentis opus est.

25 2. At tubercula, quae *κονδυλώματα* appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur (P. Aeg. VI, 80): Alvus ante omnia ducitur; tum vulsella tuberculum apprehensum juxta radices praeciditur. Quod ubi factum est, eadem sequuntur, quae supra post curationem adhibenda esse proposui: tantummodo, si quid increscit, squama aeris coer-
 30 cendum est.

3. Ora etiam venarum, fundentia sanguinem, sic tolluntur. Ubi sanguini, qui effluit, sanies adjicitur, alvus acribus ducitur; quo magis ora promoveantur: eoque fit, ut omnia
 35 venarum quasi capitula conspicua sint. Tum si capitulum exiguum est, basimque tenuem habet, adstringendum

paulum supra est, quam ubi cum ano committitur: imponenda spongia ex aqua calida est, donec id liveat: deinde aut ungue, aut scalpello supra nodum id exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur; interdum etiam urinae difficultas. Si id majus est, et basis latior, hamulo uno aut altero excipiendum est, paulumque supra basim incidendum: neque relinquendum quidquam ex eo capitulo, neque quidquam ex ano demendum est; quod consequitur is, qui neque nimium, neque parum hamos ducit. Qua incisum est, acus debet immitti, infraque eam lino id capitulum alligari. Si duo triave sunt, imum quodque primum curandum est: si plura, non omnia simul; ne tempore eodem undique tenerae cicatrices sint. Si sanguis profluit, excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum, ungenda femina, et inguina, et quidquid juxta ulcus est, ceratumque superdandum, et farina hordeacea calida implendus is locus, et sic deligandus est. Postero die is desiderare in aqua calida debet, eodemque cataplasmate foveri. Ac bis die, et ante curationem, et post eam, coxendices ac femina liquido cerato perungenda sunt; tepidoque is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda; si capitula simul non exciderunt, digito promovenda: tum lenibus medicamentis, iisdemque, quae alibi posui (V; passim), ulcera ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, jam alias exposui.

25

CAPUT XXXI.

De varicibus.

Ab his ad crura proximus transitus est; in quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem et earum varicarum, quae in capite nocent; et eorum varicum, qui in ventre (cap. 17) sunt, curationem distuli: quoniam ubique eadem est. Igitur vena omnis, quae noxia est, aut adusta tabescit, aut manu eximitur. Si recta; si, quamvis transversa, tamen simplex; si modica est, melius aduritur. Si curva est, et velut in orbes quosdam implicatur, pluresque inter se involvuntur, ss

utilius eximere est. Adurendi ratio haec est. Cutis super-
 inciditur: tum patefacta vena, tenui et retuso ferramento
 candente modice premitur; vitaturque, ne plagae ipsius orae
 adurantur: quas reducere hamulis facile est. Id interpositis
 5 fere quaternis digitis per totum varicem fit: et tum superim-
 ponitur medicamentum, quo adusta sanantur. At exciditur
 hoc modo: cute eadem ratione super venam incisa, hamulo
 orae excipiuntur; scalpelloque undique a corpore vena didu-
 citur; caveturque, ne inter haec ipsa laedatur; eique retusus
 10 hamulus subjicitur; interpositoque eodem fere spatio, quod
 supra positum est, in eadem vena idem fit; quae, quo ten-
 dat, facile hamulo extento cognoscitur. Ubi jam idem, qua-
 cumque varices sunt, factum est, uno loco adducta per ha-
 mulum vena praeciditur: deinceps, qua proximus hamus est,
 15 attrahitur et evellitur; ibique rursus abscinditur. Ac sic un-
 dique varicibus crure liberato, plagarum orae committuntur,
 et super emplastrum glutinans injicitur.

CAPUT XXXII.

De digitis cohaerentibus, et curvatis.

20 At, si digiti vel in utero protinus, vel propter commu-
 nem exulcerationem postea cohaeserunt, scalpello diducun-
 tur: dein separatim uterque non pingui emplastro circumda-
 tur: atque ita per se uterque sanescit. Si vero fuit ulcus in
 digito, posteaque male inducta cicatrix curvum eum reddit;
 25 primum malagma tentandum est: dein si id nihil prodest,
 quod et in veteri cicatrice, et ubi nervi laesi sunt, evenire
 consuevit, videre oportet, nervine id vitium, an cutis sit. Si
 nervi est, attingi non debet; neque enim sanabile est. Si cu-
 tis, tota cicatrix excidenda; quae fere callosa extendi digi-
 30 tum minus patiebatur: tum rectus sic ad novam cicatricem
 perducendus est.

CAPUT XXXIII.

De gangraena.

Gangraenam inter ungues alasque aut inguina nasci; et,
 35 si quando medicamenta vincuntur, membrum praecidi oportet.
 CELSUS.

tere (P. Aeg. VI, 84), alio loco mihi dictum est (V, 26, 34). Sed id quoque cum periculo summo fit; nam saepe in ipso opere vel profusione sanguinis, vel animae defectione moriuntur. Verum hic quoque nihil interest, an satis tutum praesidium sit, quod unicum est. Igitur inter sanam vitia-
 tamque partem incidenda scalpello caro usque ad os est sic, ut neque contra ipsum articulum id fiat, et potius ex sana parte aliquid excidatur, quam ex aegra relinquatur. Ubi ad os ventum est, reducenda ab eo sana caro, et circa os subsecanda est, ut ea quoque parte aliquid os nudetur: dein id
 serrula praecidendum est, quam proxime sanae carni etiam inhaerenti: ac tum frons ossis, quam serrula exasperavit, laevanda est, supraque inducenda cutis; quae sub ejusmodi curatione laxa esse debet, ut quam maxime undique os conte-
 tegat. Quo cutis inducta non fuerit, id linamentis erit conte-
 gendum, et super id spongia ex aceto deliganda. Cetera postea sic facienda, ut in vulneribus, in quibus pus moveri debet ¹⁾, praeceptum est (V, 26, 16 sqq.).

1) Hanc veterum librorum lectionem firmat P. Aeg. p. 338, ed. Briau: *Τῇ πύσσει χρησθαι θεραπεύειν*.

A. CORNELII CELSI
ARTIUM LIBER DECIMUS TERTIUS.

IDEM
MEDICINAE OCTAVUS.

CAPUT I.

De positu et figura ossium totius humani corporis.

Superest ea pars, quae ad ossa pertinet: quae quo facilius accipi possit, prius positus figurasque eorum indicabo. Igitur calvaria incipit ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrimque laevis, et qua cerebri membranam contegit, et qua cute, capillum gignente, contegitur: eaque simplex ab occipitio et temporibus; duplex usque in verticem a fronte est: ossaque ejus ab exterioribus partibus dura ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt: interque ea venae discurrent, quas his alimentum subministrare, credibile est. Raro autem calvaria solida sine suturis est: locis tamen aestuosis facilius invenitur; et id caput firmissimum, atque a dolore tutissimum est. Ex ceteris, quo suturae pauciores sunt, eo capitis valetudo commodior est. Neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem. Fere tamen duae super aures tempora a superiore capitis parte discernunt (*s. squamosa*): tertia ad aures per verticem tendens, occipitium a summo capite diducit (*s. lambdoides*): quarta ab eodem vertice per medium caput ad frontem procedit (*s. biparietalis*); eaque modo sub imo capillo desinit, modo frontem ipsam secans (*s. frontalis*) inter supercilia finitur. Ex his ceterae quidem suturae in unguem committuntur: eae vero, quae super aures transver-
sae sunt, totis oris paulatim extenuantur; atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Crassissimum vero in

capite os post aurem est, qua capillus, ut verisimile est, ob id ipsum non gignitur. Sub iis quoque musculis, qui tempora connectunt, os medium (cf. Gal. *De ossibus*, et *Oribas. Coll. med.* XXIV, 3), in exteriorem partem inclinatum, positum est (*o. cuneiforme*). At facies suturam habet maximam; quae a tempore incipiens, per medios oculos naresque transversa pervenit ad alterum tempus. A qua breves duae sub interioribus angulis deorsum spectant. Et malae quoque in summa parte singulas transversas suturas habent. A mediisque naribus, aut superiorum dentium gingivis per medium palatum una procedit; aliaque transversa idem palatum secat. Et suturae quidem in plurimis hae sunt. Foramina autem intra caput maxima oculorum sunt; deinde narium; tum quae in auribus habemus. Ex his quae oculorum sunt, recta simplicitateque ad cerebrum tendunt. Narium duo foramina osse medio discernuntur: siquidem hae primum a superciliis, angulisque oculorum osse inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilaginem versae, quo propius ori descendunt, eo magis caruncula quoque molliuntur. Sed ea foramina, quae a summis ad imas nares simplicitate sunt, ibi rursus in bina itinera dividuntur: aliaque ex his ad fauces pervia, spiritum et reddunt et accipiunt; alia, ad cerebrum tendentia, ultima parte in multa et tenuia foramina dissipantur, per quae sensus odoris nobis datur. In aure quoque primo rectum et simplex iter, procedendo flexuosum, juxta cerebrum in multa et tenuia foramina diducitur, per quae facultas audiendi est. Juxtaque ea duo parvuli quasi sinus sunt; superque eos finitur os, quod transversum a genis tendens, ab inferioribus ossibus sustinetur. Jugale appellari potest ab eadem similitudine, a qua id Graeci *ξυγωμα* appellant. Maxilla vero est molle os, eaque una est: cujus eadem et media, et ima pars mentum est: a quo utrimque procedit ad tempora; solaque ea movetur. Nam malae cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. Verum ipsius maxillae partes extremae quasi bicornes sunt. Alter processus, infra latior, vertice ipso tenuatur, longiusque procedens sub osse jugali subit, et super id temporum musculis illigatur. Alter brevior et rotundior, et in eo sinu,

qui juxta foramina auris est, cardinis modo fit; ibique huc et illuc se inclinans maxillae facultatem motus praestat. Duriores osse dentes sunt: quorum pars maxillae, pars superiori ossi malarum haeret. Ex his quaterni primi, quia secant, *τομῆς* a Graecis nominantur. Hi deinde quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrimque fere maxillares quini sunt, praeterquam in iis, in quibus ultimi, qui sero gigni solent, non increverunt. Ex his primores singulis radicibus; maxillares utique binis, quidam etiam
 10 ternis, quaternisve nituntur. Fereque longior radix breviorrem dentem edit; rectique dentis recta etiam radix, curvi flexa est. Exque eadem radice in pueris novus dens subit, qui multo saepius priorem expellit: interdum tamen supra infrave eum se ostendit.

15 Caput autem spina excipit. Ea constat ex vertebra quatuor et viginti. Septem in cervice sunt, duodecim ad costas, reliquae quinque sunt proximae costis. Eae teretes brevesque ab utroque latere processus duos exigunt: mediae perforatae, qua spinae medulla cerebro commissa descendit:
 20 circa quoque per duos processus tenuibus cavis perviae, per quae a membrana cerebri similes membranulae deducuntur. Omnesque vertebrae, exceptis tribus summis, a superiore parte in ipsis processibus paulum desidentes sinus habent: ab inferiore alios deorsum versus processus exigunt¹⁾. Summa
 25 igitur protinus caput sustinet, per duos sinus receptis exiguis ejus processibus; quo fit, ut caput sursum deorsum versum tuberibus exasperetur; secunda superiori parti inferiori. Quod ad circuitum pertinet, pars summa angustiore orbe finitur: ita superior ei summae circumdata in latera
 30 quoque caput moveri sinit. Tertia eodem modo secundam excipit: ex quo facilis cervici mobilitas est. Ac ne sustineri quidem caput posset, nisi utrimque recti valentesque nervi collum continerent, quos *τένοντας* Graeci appellant: siquidem horum inter omnes flexus alter semper intentus ultra
 35 prolabi superiora non patitur. Jamque vertebra tertia tuber-

1) Locus hic maxime vexatus, mihi videtur integerrimus si ad simias specto.

cula, quae inferiori inserantur, exigit. Ceterae processibus deorsum spectantibus in inferiores insinuantur, ac per sinus quos utrimque habent, superiores accipiunt; multisque nervis et multa cartilagine continentur. Ac sic uno flexu modico in primum dato, ceteris negatis, homo et rectus insistit, 5 et aliquid ad necessaria opera curvatur. Infra cervicem vero summa costa contra humerum sita est. Inde sex inferiores usque ad imum pectus proveniunt: eaeque, primis partibus rotundae, et leniter quasi capitulatae, vertebrarum transversis processibus ibi quoque paulum sinuatis, inhaerent: inde latescunt, et in exteriorem partem recurvatae paulatim in cartilaginem degenerant; eaque parte rursus in interiora leniter flexae committuntur cum osse pectoris. Quod valens et durum a faucibus incipit, ab utroque latere lunatum, et a praecordiis, jam ipsum quoque cartilagine mollium, terminatur. 15 Sub costis vero prioribus quinque, quas *νόθας* Graeci nominant, breves tenuioresque, atque ipsae quoque paulatim in cartilaginem versae, extremis abdominis partibus inhaerescunt; imaque ex his, majore jam parte nihil, nisi cartilago est. Rursus a cervice duo lata ossa utrimque ad scapulas tendunt: nostri scutula operta, *ώμοπλάτας* Graeci nominant. Ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula, paulatimque latescentia ad spinam tendunt; et quo latiora quaque parte sunt, hoc hebetiora. Atque ipsa quoque, in imo cartilaginosa, posteriore parte velut innatant; quoniam, 25 nisi in summo, nulli ossi inhaerescunt. Ibi vero validis musculis nervisque constricta sunt. At a summa costa paulo interius, quam ubi ea media est, os excrescit (*acromion spinae scapulae*), ibi quidem tenue, procedens vero, quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius latiusque et paulum in exteriora curvatum, quod altera verticis parte modice intumescens, sustinet jugulum. Id autem ipsum recurvum, ac neque inter durissima ossa numerandum, altero capite in eo, quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit, paulumque motu brachii movetur, et cum lato osse 35 scapularum infra caput ejus nervis et cartilagine connectitur.

Hinc humerus incipit, extremis utrimque capitibus tumidis, mollis, sine medulla, cartilagenosus: medius teres, du-

rus, medullusus leniter gibbus in priorem et posteriorem
 et interiorem; cavus in anteriorem partem. Prior autem
 pars est, quae a pectore est; posterior, quae ab scapulis;
 interior, quae ad latus tendit; exterior, quae ab eo rece-
 dit: quod ad omnes articulos pertinere in ulterioribus pate-
 bit. Superius autem humeri caput rotundius, quam cetera
 ossa, de quibus adhuc dixi, parvo excessu vertici lati sca-
 pularum ossis inseritur, ac maiore parte extra situm nervis
 deligatur. At inferius duos processus habet: inter quos,
 quod medium est, magis etiam extremis partibus sinuatur.
 Quae res sedem brachio praestat: quod constat ex ossibus
 duobus. Radius, quem *κερκίδα* Graeci appellant, superior
 breviorque, et primo tenuior, rotundo et leniter cavo ca-
 pite exiguum humeri tuberculum recipit; idque ibi nervis et
 cartilagine continetur. Cubitus inferior longiorque, et pri-
 mo plenior, in summo capite duobus quasi verticibus ex-
 stantibus in sinum humeri, quem inter duos processus ejus
 esse proposui, se inserit. Primo vero duo brachii ossa jun-
 cta paulatim, dirimuntur, rursusque ad manum coeunt, modo
 crassitudinis mutato: siquidem ibi radius plenior, cubitus ad-
 modum tenuis est. Dein radius, in caput cartilagosum con-
 surgens, in vertice sinuatur: cubitus rotundus in extremo,
 parte altera paulum procedit. Ac, ne saepius dicendum sit,
 illud ignorari non oportet, plurima ossa in cartilagine de-
 sinere, nullum articulum non sic finiri. Neque enim aut mo-
 veri posset, nisi laevi inniteretur; aut cum carne nervisque
 conjungi, nisi ea media quaedam materia committeret. In
 manu vero prima palmae pars ex multis minutisque ossibus
 constat, quorum numerus incertus est. Sed oblonga omnia
 et triangula, structura quadam inter se connectuntur, quum
 invicem superior alterius angulus alterius planities sit: eoque
 fit ex his unius ossis paulum in interiora concavi species. Ve-
 rum ex manu duo exigui processus in sinum radii conjiciuntur.
 Tum ex altera parte recta quinque ossa, ad digitos tendentia,
 palmam explent. A quibus ipsi digiti oriuntur; qui ex ossibus
 ternis constant: omniumque eadem ratio est. Interius os
 in vertice sinuatur, recipitque exterioris exiguum tuber-
 culum; nervique ea continent. A quibus orti ungues indu-

rescunt: ideoque non ossi, sed carni magis radicibus suis inhaerent.

Ac superiores quidem partes sic ordinatae sunt. Ima vero spina in coxarum osse desidit; quod transversum longueque valentissimum, vulvam, vesicam, rectum intestinum tuetur. Idque ab exteriori parte gibbum; ad spinam resupinatum; a lateribus, id est in ipsis coxis, sinus rotundos habet. A quibus oritur os, quod pectinem vocant; idque super intestina sub pube transversum, ventrem firmat: rectius in viris, recurvatum magis in exteriora in feminis, ne partum prohibeat. Inde femina ordiuntur, quorum capita rotundiora etiam quam humerorum sunt; quum illa ex ceteris rotundissima sint. Infra vero duos processus a priore et a posteriore parte habent. Dein dura et medullosa et ab exteriori parte gibba, rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt. Superiora in sinus coxae, sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, conjiciuntur: tum infra introrsus leniter tendunt, quo aequalius superiora membra sustineant. Atque inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi a cruribus possint. Quae commissura osse parvo, molli, cartilaginoso tegitur: patellam vocant. Haec super innatans, neque ulli ossi inhaerens, sed carne et nervis deligata, pauloque magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus juncturam tuetur. Ipsum autem crus est ex ossibus duobus. Etenim per omnia femur humero, crus brachio simile est: adeo ut habitus quoque et decor alterius ex altero cognoscatur: quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. Verum alterum os ab exteriori parte surae positum est; quod ipsum quoque sura nominatur. Id brevius, supraque tenuius, ad ipsos talos intumescit. Alterum a priore parte positum, cui tibiae nomen est, longius et in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur; sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa, infra supraque conjuncta, media, ut in brachio, dehiscent. Excipitur autem crus infra osse transverso talorum; idque ipsum super os calcis situm est, quod quadam parte sinuatum, quadam excessus habens, et procedentia ex talo recipit, et in sinum ejus inseritur. Idque sine medulla du-

rum, magisque in posteriorem partem projectum, teretem ibi figuram repraesentat. Cetera pedis ossa ad eorum, quae in manu sunt, similitudinem structa sunt: planta palmae, digiti digitis, ungues unguibus respondent.

5

CAPUT II.

Ossa vitiata et corrupta quibus signis cognoscantur, et quae ratione curentur.

Omne autem os, ubi injuria accessit, aut vitiatum, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco
 10 movetur. Id, quod vitiatum est, primo fere pingue fit; deinde vel nigrum, vel cariosum: quae, supernatis gravibus ulceribus aut fistulis, hisque vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis, eveniunt. Oportet autem ante omnia os nudare, ulcere exciso; et, si latius est ejus vitium, quam
 15 ulcus fuit, carnem subsecare, donec undique os integrum pateat; tum id, quod pingue est, semel iterumve satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo squama secedat; aut radere, donec jam aliquid cruoris ostendatur, quae integri ossis nota est. Nam necesse est aridum sit id, quod vitiatum est. Idem in cartilagine quoque laesa faciendum est:
 20 siquidem ea quoque scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquitur. Deinde, sive os sive cartilago rasa est, nitro bene trito respergenda est. Neque alia facienda sunt, ubi caries, nigritiesve in summo osse est: siquidem
 25 id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum, vel radendum est. Qui radit haec, audacter imprimere ferramentum debet, ut et agat aliquid, et maturius desinat. Finis est, quum vel ad album os, vel ad solidum ventum est. Albo finiri ex nigritye vitium, soliditate quadam ex carie, manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro supra dictum est. Si quando autem an altius descenderit utrumlibet dubium est, in carie quidem expedita cognitio est. Specillum tenue in foramina demittitur: quod magis minusve in-
 30 trando, vel in summo cariem esse, vel altius descend testatur. Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolo

ex febre, quae ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest. Manifestior tamen adacta terebra fit: nam finis vitii est, ubi scobis nigra esse desiit. Igitur, si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est, quae altitudine vitium aequent: tum in ea foramina demittenda⁵ candentia ferramenta sunt, donec siccum os ex toto fiat. Simul enim post haec et resolvetur ab inferiore osse, quodcumque vitiatum est; et is sinus carne replebitur; et humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigrities, ad alteram quoque partem ossis transiit, oportet excidi¹⁰. Atque idem quoque in carie, ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. Sed, quod totum vitiatum totum excimendum est: si inferior pars integra est, eatenus, quod corruptum est, excidi debet. Item sive capitis, sive pectoris os, sive costa cariosa est, inutilis ustio est, et excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt qui, osse nudato, diem tertium expectant, ut tunc excidant: ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque, quantum fieri potest, eodem momento et cutis incidenda est, et os detegendum, et omni vitio liberandum est. Longeque perniciosissimum²⁰ est, quod in osse pectoris est: quia vix, etiamsi recte cessit curatio, veram sanitatem reddit.

CAPUT III.

Quomodo os excidatur.

Exciditur vero os duobus modis; si parvulum est, quod²⁵ laesum est, modiolus, quam *χοιρινίδα* Graeci vocant: si spatiosius, terebris. Utriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concavum, teres est, imis oris serratum; per quod medium clavus, ipse quoque interiore orbe cinctus, demittitur. Terebrarum autem duo genera³⁰ sunt: alterum simile ei, quo fabri utuntur: alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit; atque iterum ab alio principio paulo minus quam aequaliter sursum procedit. Si vitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille po-³⁵

tius aptatur: et, si caries subest, medius clavus in foramen demittitur; si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clavum recipiat, ut eo insistente, circumactus modiolus delabi non possit: deinde is habena, quasi terebra, convertitur. Estque quidam premendi modus, ut et foret, et circumagatur: quia, si leviter imprimitur, parum proficit; si graviter, non movetur. Neque alienum est instillare paulum rosae vel lactis, quo magis lubrico circumagatur; quod ipsum tamen, si copiosius est, aciem ferramenti hebetat.

10 Ubi jam iter modiolio impressum est, medius clavus educitur, et ille per se agitur: deinde, quum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus removetur. At si latius vitium est, quam ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso fine vitiosi ossis atque integri;

15 deinde alterum non ita longe, tertiumque, donec totus is locus, qui excidendus est, his cavis cinctus sit. Atque ibi quoque, quatenus terebra agenda sit, scobis significat. Tum excisorius scalper ab altero foramine ad alterum malleolo adactus, id, quod inter utrumque medium est, excidit; ac sic

20 ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem modiolio imprimitur. Utro modo vero id circumductum est, idem excisorius scalper in osse corrupto planus summam quamque testam laevet, donec integrum os relinquatur. Vix umquam nigrities caries, interdum totum os perrumpit; maximeque ubi

25 vitiosa calvaria est. Id quoque specillo significatur: quod depressum in id foramen, quod infra solidam sedem habet, et ob id renitens aliquid invenit, et madens exit: si pervium invenit, altius descendens inter os et membranam, nihil oppositum invenit, educiturque siccum: non quo non subsit

30 aliqua vitiosa sanies; sed quoniam ibi, ut in latiore sede, diffusa sit. Sive autem nigrities, quam terebra detexit, sive caries, quam specillum ostendit, os transiit, modioli quidem usus fere supervacuus est; quia latius pateat necesse est, quod jam alte processit. Terebra vero ea quam secundo

35 loco posui, utendum; eaque, ne nimis incalescat, subinde in aquam frigidam demittenda est. Sed tunc majore cura agendum est, quum jam aut simplex os dimidium perforatum est; aut in duplici superius: illud spatium ipsum; hoc san-

guis significat. Ergo tum lentius ducenda habena, suspendendaque magis sinistra manus est, et saepius attollenda, et foraminis altitudo considerata; ut quandocumque os perumpatur, sentiamus, neque periclitemur, ne mucrone cerebri membrana laedatur: ex quo graves inflammationes 5 cum periculo mortis oriuntur. Factis foraminibus, eodem modo media septa, sed multo circumspectius, excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eandem membranam violet; donec fiat aditus, per quem membranae custos immittatur; *μηνυγγοφύλακα* Graeci vocant. Lamina aenea est, firma, paulum 10 resima, ab exteriori parte laevis; quae demissa sic, ut exterior pars ejus cerebro propior sit, subinde ei subjicitur, quod scalpro discutiendum est: ac, si excipit ejus angulum, ultra transire non patitur: eoque et audacius, et tutius, scalprum malleolo medicus subinde ferit, donec undique exci- 15 sum os eadem lamina levetur, tollique sine ulla noxa cerebri possit. Ubi totum os ejectum est, circumradendae laevandaeque orae sunt, et, si quid scobis membranae insecidit, colligendum. Ubi, superiore parte sublata, inferior relicta est, non orae tantum, sed os quoque totum laevandum 20 est; ut sine noxa postea cutis increseat, quae aspero ossi innascens protinus non sanitatem, sed novos dolores movet. Patefacto cerebro, qua ratione agendum sit, dicam, quum ad fracta ossa venero. Si basis aliqua servata est, superimponenda sunt medicamenta non pingua, quae recentibus 25 vulneribus accommodantur: supraque imponenda lana succida, oleo atque aceto madens. Ubi tempus processit, ab ipso osse caro increscit, eaque factum manu sinum complet. Si quod etiam os adustum est, a parte sana recedit; subitque inter integram atque emortuam partem caruncula, quae, quod 30 abscessit, expellit. Potest etiam evenire, ut ex ictu neque findatur os, neque perfringatur; sed summum tamen collidatur, exaspereturque. Quod ubi incidit, radi et laevari satis est. Haec quamvis maxime fiunt in capite, tamen ceteris quoque ossibus communia sunt: ut, ubicumque idem in- 35 cidit, eodem remedio sit utendum. At quae fracta, fissae, forata, collisa sunt, quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requi-

runt: de quibus protinus dicam, initio ab eadem calvaria accepto.

CAPUT IV.

De calvaria fracta.

5 Igitur, ubi ea percussa est, protinus requirendum est, num bilem is homo vomuerit; num oculi ejus obcaecati sint; num obmutuerit; num per nares auresve sanguis ei effluerit; num conciderit; num sine sensu quasi dormiens jacuerit. Haec enim non nisi osse fracto eveniunt: atque, ubi incide-
 10 runt, scire licet, necessariam, sed difficilem curationem esse. Si vero etiam torpor accessit; si mens non constat; si nervorum vel resolutio vel distentio sequuta est; verisimile est, etiam cerebri membranam esse violatam: eoque in angusto magis spes est. At si nihil horum sequutum est, pot-
 15 est etiam dubitari, an os fractum sit: et protinus considerandum est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo percussus sit, et hoc ipso laevi an aspero, mediocri an vastiore, vehementer an leviter; quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius est,
 20 quam certiore id nota explorare. Ergo, qua plaga est, demitti specillum oportet neque nimis tenue, neque acutum; ne, quum in quosdam naturales sinus inciderit, opinionem fracti ossis frustra faciat: neque nimis plenum; ne parvulae rimae fallant. Ubi specillum ad os venit, si nihil nisi laeve et lu-
 25 bricum occurrit, integrum id videri potest: si quid asperi est, utique qua suturae non sint, fractum os esse testatur. A suturis se deceptum esse, Hippocrates memoriae prodidit (*Epid. V. § 27. cf. De vuln. cap. § 12 init. et fine*); more scilicet magnorum virorum, et fiduciam magnarum rerum habentium. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil
 30 sibi detrahunt: magno ingenio, multaque nihilominus habituro, convenit etiam simplex veri erroris confessio; praecipueque in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur; ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis ante de-
 35 ptus est. Sed haec quidem alioquin memoria magni professoris, uti interponeremus, effecit. Potest autem sutura

nomine fallere, quia aequae aspera est; ut aliquis hanc esse, etiamsi rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc verisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet: sed os aperire tutissimum est. Nam neque utique certa sedes, ut supra posui (cap. 1, *init.*), suturarum est; et potest idem et naturaliter commissum et ictu fissum esse, juxtave aliquid fissum habere. Quin etiam, ubi ictus fuit vehementior, quamvis specillo nihil invenitur, tamen aperire commodius est. Ac si ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os atramentum scriptorium est (cf. Hipp. *De vuln. cap.* § 10 14), deinde scalpro id deradendum: nigritiem enim continet, si quid fissum est. Solet etiam evenire, ut altera parte fuerit ictus, et os altera fiderit (*Ib.* § 8). Itaque, si graviter aliquis percussus est, si mala indicia subsequuta sunt, neque ea parte, qua cutis discissa est, rima reperitur; non 15 incommodum est, parte altera considerare, num quis locus mollior sit, et tumeat; eumque aperire: siquidem ibi fissum os reperietur. Nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiamsi frustra secta est. Os fractum, nisi si succursum est, gravibus inflammationibus afficit, difficilisque postea tracta- 20 tur. Raro, sed aliquando tamen, evenit, ut os quidem totum integrum maneat, intus vero ex ictu vena aliqua in cerebri membrana rupta aliquid sanguinis mittat; isque ibi concretus magnos dolores moveat, oculosque obcaecet. Sed fere contra id dolor est, et, eo loco cute incisa pallidum os reperi- 25 tur: ideoque id quoque os excidendum est.

Quaecumque autem de causa curatio haec necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec, quidquid laesum est, in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsa membranula, quae sub cute cal- 30 variam cingit, super os relinquantur: siquidem haec scalpro terebrisve lacerata vehementes febres cum inflammationibus excitat. Itaque eam commodius est ex toto ab osse deduci. Plagam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus: si manu facienda est, ea fere commodissi- 35 ma est, quae duabus transversis lineis litterae X figuram accipit: tum deinde a singulis procedentibus lingulis cutis subsecatur. Inter quae, si sanguis fertur, sponsia subinde in

aceto tincta cohibendus est, occupandusque objectis linamentis, et caput altius excitandum. Neque id ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, affert: sed ibi quoque nihil tutius fit (*Ib.*, § 13, *fine*). In omni vero fissio
 5 fractove osse protinus antiquiores medici ad ferramenta veniebant, quibus id exciderent. Sed multo melius est ante emplastra experiri, quae calvariae causa componuntur: eorumque aliquod oportet ex aceto mollium per se super fissum fractumve os imponere: deinde super id aliquanto
 10 tius, quam vulnus est, eodem medicamento illitum linteolum, et praeterea succidam lanam aceto tinctam: tum vulnus deligare, et quotidie resolvere; similiterque curare usque ad diem quintum. A sexto die etiam vapore aquae calidae per spongiam fovere: ceteraque eadem facere. Quod si caruncula increscere coeperit, et febricula aut soluta erit, aut
 15 levior, et cupiditas cibi reverterit, satisque somni accedet, in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum, adjecto cerato ex rosa factum; quo facilius carnem producat: nam per se reprimendi vim habet. Hac ratione saepe rimae callo quodam implentur; estque ea ossis velut cicatrix: et latius fracta ossa, si qua inter se non cohaerebunt, eodem callo glutinantur; estque id aliquanto melius velamentum cerebro, quam caro, quae exciso osse increscit. Si vero sub prima curatione fe-
 25 bris intenditur, brevesque somni, et iidem per somnia tumultuosi sunt, ulcus madet, neque alitur, et in cervicibus glandulae oriuntur, magni dolores sunt, cibique super haec fastidium increscit; tum demum ad manum scalprumque veniendum est.

30 Duo vero sub ictu calvariae pericula sunt; ne vel findatur, vel medium desidat. Si fissum est, possunt orae esse compressae, vel quia altera super alteram excessit; vel etiam quia vehementer se rursus commiserunt. Ex quo evenit, ut humor ad membranam quidem descendat, exitum vero non habeat; ac sic eam irritet, et graves inflammationes moveat. At ubi medium desedit, eandem cerebri membranam os urget: interdum etiam ex fractura quibusdam velut aculeis pungentibus. His ita succurrendum est, ut tamen

minimum ex osse dematur. Ergo, si ora alteri insedit, satis est id, quod eminet, plano scalpro excidere: quo sublato, jam rima hiat quantum curationi satis est. At si orae inter se comprimuntur, a latere ejus, interposito digiti spatio, terebra foramen faciendum est: ab eoque scalper duabus lineis ad rimam agendus, ad similitudinem litterae V sic, ut vertex ejus a foramine, basis a rima sit. Quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet: ita nihil latens in eo osse cavum est, abundeque exitus datur intus laedentibus. Ne si fractum quidem os desedit, totum excidi necesse est: sed, sive totum perfractum est, et ab alio ex toto recessit, sive circumpositae calvariae inhaeret exigua parte, ab eo, quod naturaliter se habet, scalpro dividendum est. Deinde in eo, quod desedit, juxta rimam, quam fecimus, foramina addenda sunt, si in angusto noxa est, duo; si latius patet, tria; septaque eorum excidenda; et tum scalper utrimque ad rimam agendus sic, ut lunatum sinum faciat, imaque pars ejus intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. Deinde, si qua labant, et ex facili removeri possunt, forcipe ad id facto colligenda sunt, maximeque ea, quae acuta membranam infestant: si id ex facili fieri non potest, subjicienda lamina est, quam custodem ejus membranae esse proposui (p: 332, l. 9—10); et super eam, quidquid spinosum est, et intus eminet, excidendum est: eademque lamina, quidquid deorsum insedit, attollendum. Hoc genus curationis efficit, ut, qua parte fracta ossa tamen inhaerent, solidentur: qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub medicamentis tempore excidant; spatiumque inter haec satis illis magnum ad extrahendam saniem relinquatur; plusque in osse propugnaculi cerebrum habeat, quam habiturum fuit, eo exciso. His factis, ea membrana acri aceto respergenda est; ut, sive aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur, sive intus concretus cruor remanet, discutiatur: tum idem medicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollitum, ipsi membranae imponendum est: ceteraque eodem modo facienda sunt quae ad linteolum illitum, et lanam succidam pertinent: collocandusque is loco tepido; et curandum quotidie vulnus; bis etiam aestate. Quod si membrana per in-

flammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepida: si usque eo tumebit ut super ossa quoque emineat, coercet eam bene trita lenticula, vel folia vitis contrita et cum recenti vel butyro vel adipe anserina mixta; cervixque mol-
5 liri debeat liquido cerato ex irino facto. Ac si parum pura membrana videbitur, par modus ejus emplastri et mellis miscendus erit: idque superinfundendum: ejusque continendi causa unum aut alterum linamentum injiciendum, et super linteolo, cui emplastrum illitum sit, contegendum. Ubi pura mem-
10 brana est, eadem ratione adjiciendum emplastro ceratum, ut carnem producat. Quod ad abstinentiam vero, et primos ulterioresque cibos potionesque pertinet, eadem, quae in vulneribus praecepi, servanda sunt, eo magis, quo periculosius haec pars afficitur. Quin etiam, quum jam non solum susti-
15 neri, sed ali quoque cibus oportebit, tamen erunt vitanda quaecumque mandenda sunt: item fumus, et quidquid excitat sternutamentum. Spem vero certam faciunt membrana mobilis ac sui coloris, caro increscens rubicunda, facilis motus maxillae atque cervicis. Mala signa sunt, membrana
20 immobilis, nigra, vel livida, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, nervorum vel resolutio vel distentio, caro livida, maxillarum rigor, atque cervicis. Cetera, quae ad somnum, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent, eadem quae in ceteris vulneribus vel salutaria, vel
25 mortifera sunt. Ubi bene res cedit, incipit ab ipsa membrana; vel si os eo loco duplex est, inde quoque caro increscere; eaque id, quod inter ossa vacuum est, replet: nonnumquam etiam super calvariam excrescit. Quod si incidit, inspergenda squama aeris est, ut id reprimat et cohi-
30 beat: eaque superdanda, quae ad cicatricem perducant. omnibusque ea locis commode inducitur, excepta frontis ea parte, quae paulum super id est, quod inter supercilia est. Ibi enim vix fieri potest, ut non per omnem aetatem sit exulceratio: quae linteolo medicamentum habente contegenda
35 est. Illa utique, capite fracto, servanda sunt, ut, donec jam valida cicatrix sit, vitentur sol, venus, frequens balneum, major vini modus.

CAPUT V.

De naso fracto.

In naribus vero et os, et cartilago frangi solet; et quidem modo adversa, modo a latere. Si adversa fracta sunt, alterumve ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur. Si a latere os fractum est, is locus cavus est: si cartilago, in alteram partem nares declinantur. Quidquid in cartilagine incidit, excitanda ea leniter est, aut subjecto specillo, aut duobus digitis utrimque compressis: deinde in longitudinem implicata linamenta, et molli pellicula cincta circumsumtaque intus adigenda sunt; aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo; aut grandis pinna, gummi, vel fabrili glutine illita, et molli pellicula circumdata, quae desiderare cartilaginem non sinat (Hipp. *De artic.* § 36 sq.). Sed, si adversa ea fracta est, aequaliter utraque naris implenda est: si a latere, crassius esse debet ab ea parte, in quam nasus jacet, ab altera tenuius id, quod inseritur. Extrinsecus autem circumdanda habena est mollis, media illita mixtis inter se similia et turis fuligine: eaque ultra aures duenda, et fronti duobus capitibus agglutinanda est (*Ib.* § 38). Id enim corpori quasi gluten inhaerescit, et quum induruit, nares commode continet. Sin quod intus inditum est laedit, sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, excitatae nares eadem tantummodo habena continendae sunt: deinde post quatuordecim dies id ipsum demendum est. Resolvitur autem aqua calida; eaque tum is locus quotidie fovendus est. Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est, atque ubi adversum id ictum est, utraque naris implenda est; ubi a latere, ea in quam os impulsus est: imponendumque ceratum, et paulo vehementius deligandum est; quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increscit; a tertio die fovendum id aqua calida est tantoque magis, quanto propius esse sanitati debet. Quod si plura erunt fragmenta, nihilo minus singula in suas sedes digitis erunt compellenda; imponendaque extrinsecus eadem habena, et super eam ceratum; neque ultra fascia adhibenda est. At si quod fragmentum undique resolutum cum ceteris

non glutinabitur, intelligetur quidem ex humore, qui multus ex vulnere feretur; vulsella vero extrahetur: finitisque inflammationibus, imponetur aliquid medicamentum ex iis, quae leniter reprimunt. Pejus est ubi aut ossi aut cartilagini fractae cutis quoque vulnus accessit. Id admodum raro fit. Si incidit, illa quidem nihilo minus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt: cuti vero superimponendum emplastrum aliquod ex iis, quae recentibus vulneribus accommodata sunt (cf. V, 2; 19, § 20): sed insuper nullo vinculo deligandum
 10 est (*Ib.* § 39).

CAPUT VI.

De auribus fractis.

In aure quoque interdum rumpitur cartilago. Quod si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentum est (*Ibid.* § 40): saepe enim suppurationem prohibet,
 15 et aurem confirmat. Illud et in hac et in naribus ignorari non oportet; non quidem cartilaginem ipsam glutinari, circa tamen carnem increscere, solidarique eum locum. Itaque, si cum cute cartilago rupta est, cutis utrimque suitur. Nunc
 20 autem de ea dico, quae, cute integra, frangitur. In ea vero si jam pus natum est, aperienda altera parte cutis, et ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est ¹⁾: deinde utendum est medicamento leniter supprimente, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat: tum imponen-
 25 dum linteolum cum emplastro sic, ut pingue omne vitetur; et a parte posteriore lana mollis auri subjicienda est, quae, quod est inter hanc et caput, compleat: tum ea leniter deliganda est; et a tertio die vapore, ut in naribus posui (cap. 5), fovenda. Atque in his quoque generibus abstinencia primi
 30 temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

1) Τάχιστα μὲν ὄγλις γίνεται, ἣν τις πέρην διακυσσῇ . . . Ἦν δὲ μὴ πέρην καίηται, τάμνειν χρὴ τὸ μετέωρον μὴ πάνυ συμ-
 κρῆν τομήν. Hipp. De artic. § 40.

CAPUT VII.

De maxilla fracta, et quibusdam ad omnia ossa pertinentibus.

Ab his ad maxillam venturus, indicanda quaedam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne saepius eadem dicenda sint. Omne igitur os modo rectum, ut lignum in longitudinem finditur; modo frangitur transversum; interdum obliquum; atque id ipsum nonnumquam retusa habet capita, nonnumquam acuta; quod genus pessimum est; quia neque facile committuntur, quae nulli retuso innituntur, et carnem vulnerant, interdum nervum quoque, aut musculum. Quin etiam aliquando plura fragmenta fiunt. Sed in aliis quidem ossibus ex toto saepe fragmentum a fragmento recedit: maxillae vero semper aliqua parte, etiam vexata ossa inter se cohaerent. Igitur inprimis digitis duobus utrimque prementibus, et ab ore et ab cute, omnia ossa in suam sedem compellenda sunt. Deinde, si maxilla transversa fracta est; sub quo casu fere dens super proximum dentem excedit; ubi ea in suam sedem collocata est, duo proximi dentes, aut, si hi labant, posteriores inter se seta deligandi sunt. Id in alio genere fracturae supervacuum est: cetera eadem facienda sunt (cf. Hipp. *De artic.* § 32). Nam linteolum duplex, madens vino et oleo, superinjiciendum cum eadem similia et eadem turis fuligine est (vid. cap. 5); deinde aut fascia, aut mollis habena, media in longitudinem incisa, ut utrumque mentum complectatur, et inde capita ejus super caput adducta ibi deligentur. Illud quoque ad omnia ossa pertinens dictum erit; famem primum esse necessariam: deinde a die tertio humidum cibum: sublata inflammatione, paulo plenior, eumque, qui carnem alat: vinum per omne tempus esse alienum; deinde tertio die resolvi debere; foveri per spongiam vapore aquae calidae; eademque, quae primo fuerunt, superdari: idem die quinto fieri, et donec inflammatio finiat; quae vel nono die, vel septimo fere solvitur (*Ib.* § 33); ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut, si quod fragmentum loco suo non est, reponatur: neque id esse solvendum, nisi duae partes ejus temporis, intra quod quaeque ossa confervent transierint. Fere vero inter quartumdecimum et

unum et vicesimum diem sanescunt maxilla, malae, jugulum, pectus, latum os scapularum, costae, spina, coxarum os, tali, calx, manus, planta: inter vicesimum et tricesimum crura, brachiaque (cf. 8, § 2): inter septimum et vicesimum et
 5 quadragesimum humeri et femina. Sed de maxilla illud quoque adjiendum est, quod humidus cibus diu assumendus est: atque etiam, quum tempus processit, in lagano similibusque aliis perseverandum est, donec ex toto maxillam cal-
 10 lus firmarit. Itemque, utique primis diebus, habendum si-

CAPUT VIII.

De jugulo fracto.

1. Jugulum vero, si transversum fractum est, nonnumquam per se rursus recte coit, et, nisi movetur, sanari sine
 15 vinctura potest: nonnumquam vero, maximeque ubi motum est, elabitur; fereque id, quod a pectore est, superid, quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur (Hipp. *De artic.* § 14) ¹). Cujus ea ratio est, quod per se non movetur, sed cum humeri motu consentit; itaque, eo subsistente,
 20 subit humerus agitatus. Raro vero admodum in priorem partem jugulum inclinatur ²); adeo ut magni professores numquam se vidisse memoriae mandarint. Sed locuples tamen ejus rei auctor Hippocrates est (*De artic.* § 15). Verum, ut dissimilis uterque casus est, sic quaedam dissimilia
 25 requirit. Ubi ad scapulas jugulum tendit, simul dextra manu plana propellendus in posteriorem partem humerus est, et illud in priorem attrahendum. Ubi ad pectus conversum est, ipsum quidem retro dandum, humerus autem in priorem par-

1) Τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ στήθεος περὶνὸς ὁστέον ἐς τὸ ἄνω μέρος ὑπερέχειν, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἀκρωμῆος . . . ἐν τῷ κάτω μέρει εἶναι. *De artic.* § 14.

2) Τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἀκρωμῆος ὁστέον ὑπερέχειν καὶ ἐποχέεσθαι ἐπὶ τοῦ ἑτέρου. *Ibid.* Hoc capitulum aut male ex Hippocrate a Celso excerptum, aut inepte a librario depravatum.

tem adducendus est: ac, si is inferior est, non id, quod a pectore est, deprimendum est, quia immobile est, sed humerus ipse attollendus (*Ibid.* § 14, *medio*): si casu superior est, id, quod a pectore est, implendum lana, et humerus ad pectus deligandus est. Si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet (Paul. Aeg. VI, 93, ed. Briau); ex ossibus ea, quae carnem vulnerant, praecidenda; tum retusa ossa committenda sunt; si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est, in vino et oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo,¹⁰ eodemque intus incerato, ne fascia diducatur. Quae jugulo composito circumdanda est saepius potius quam valentius: quod ipsum quoque in omnibus ossibus fractis perpetuum est. A dextro vero jugulo, si id fractum est, ad alam sinistram; a sinistro ad dextram, rursusque sub ala sana fascia¹⁵ dari debet: post haec, si jugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus; si in partem priorem, ad cervicem deligandum est: supinusque homo collocandus. Cetera eadem facienda, quae supra comprehensa sunt.

2. Sunt vero plura ossa fere immobilia, vel dura, vel cartilaginosa, quae vel franguntur, vel forantur, vel colliduntur, vel finduntur; ut malae, pectus, latum os scapularum, costae, spina, coxarum os, tali, calx, manus, planta (cf. 7, p. 341). Horum omnium eadem curatio est. Si supra vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est: quo sanescente, rimas²⁵ quoque ossis, aut, si quod foramen est, callus implet. Si cutis integra est, et os laesum esse ex dolore colligimus, nihil aliud, quam quiescendum; imponendumque ceratum est, et leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

CAPUT IX.

30

De costis fractis.

1. Proprie tamen quaedam de costa dicenda sunt; quia juxta viscera est, gravioribusque periculis is locus expositus est. Haec quoque igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars ejus, quae rara est, lae-³⁵

datur: interdum sic, ut eam totam is casus perruperit. Si tota fracta non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quidquam suppurat, nisi admodum raro, nec dolor magnus est; tactu tamen is locus leviter indolescit (Hipp. *De artic.* § 49). Sed abunde est eadem, quae supra scripta sunt (cap. 8), facere; et a media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem haec cutem inclinet: ab uno vero et vicesimo die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum cibis uberioribus est, ut corpus quam plenissimum fiat, quo
 10 melius os vestiat; quod illo loco tenerum adhuc injuriae sub tenui cute expositum est. Per omne autem tempus curationis vitandus clamor, sermo quoque multus, ira, motus vehementior corporis, fumus, pulvis, et quidquid vel tussim vel sternutamentum movet: ne spiritum quidem magnopere
 15 continere expedit. At si tota costa perfracta est, casus asperior est: nam et graves inflammationes, et febris, et suppuratio, et saepe vitae periculum sequitur. Ergo, si vires patiuntur, ab eo brachio, quod super eam costam est, sanguis mittendus est: si non patiuntur, alvus tamen sine ullo
 20 acri ducenda est; diutiusque inedia pugnandum. Panis vero ante septimum diem non assumendus; sed una sorbitione vivendum: imponendumque ei loco ceratum ex irino (cf. cap. 4, et IV, 4, 2) factum, cui cocta quoque resina adjecta sit; aut Polyarchi (cf. V, 18, 8) malagma; aut panni ex vino et rosa et
 25 oleo; superque imponenda lana succida mollis, et duae fasciae a mediis orsae, minimeque adstrictae: multo vero magis omnia vitanda, quae supra posui; adeo ut ne spiritus quidem saepius movendus sit. Quod si tussis infestabit, potio sumenda erit vel ex trixagine, vel ex ruta, vel ex stoechade, vel ex
 30 cumino et pipere. Gravioribus vero doloribus urgentibus, cataplasma imponi quoque conveniet vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adjecta. Et id quidem interdum superjacebit: noctu vero idem aut ceratum, aut malagma, aut panni; quia potest cataplasma decidere. Ergo
 25 quotidie quoque resolvetur, donec jam cerato aut malagma possimus esse contenti. Et decem quidem diebus extentur fame corpus: ab undecimo vero ali incipiet; ideoque etiam laxior, quam primo, fascia circumligabitur. Fereque

ea curatio ad quadragesimum diem perveniet. Quod si **me-**
tus erit suppurationis, plus malagma, quam ceratum ad **dige-**
rendum proficiet. Si suppuratio vicerit, neque per quae **su-**
pra scripta sunt, discuti potuerit; omnis mora vitanda erit,
 ne os infra vitietur: sed, qua parte maxime tumebit, **demi-**
tendum erit candens ferramentum, donec ad pus perveniat;
 idque effundendum. Si nusquam caput se ostendet, ubi **ma-**
xime pus subsit sic intelligemus: creta cimolia totum locum
 illinemus, et siccari patiemur: quo loco maxime humor in
 ea perseverabit, ibi pus proximum erit; eoque uri **debebit.** 10
 Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit **perfo-**
randum; demittendumque linamentum, aut aliquid ex **peni-**
cillo, quod summum lino sit devinctum, ut facile educatur.
 Reliqua eadem, quae in ceteris adustis, facienda sunt. Ubi
 purum erit ulcus, ali corpus **debebit**, ne tabes, pernicio **fu-**
tura, id malum subsequatur. Nonnumquam etiam, levius ipso
 osse affecto, et inter initia neglecto, non pus, sed humor
 quidam mucis similis intus coit; mollescitque contra cutis:
 in qua simili ustione utendum est (cf. Hipp. *loc. laud.* § 50).

2. In spina quoque est, quod proprie notemus. Nam si 20
 id, quod ex vertebra excedit, aliquo modo fractum est, lo-
 cus quidem concavus fit; punctiones autem in eo sentiuntur;
 quia necesse est ea fragmenta spinosa esse, quo fit, ut homo
 in anteriorem partem subinde nitatur. Haec noscendae rei
 causa sunt. Medicamentis vero iisdem opus est, quae prima 25
 parte hujus capitis exposita sunt.

CAPUT X.

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum
 fractorum curatione.

1. Similes rursus ex magna parte casus curationesque 30
 sunt humeri et femoris: communia etiam quaedam humeris,
 brachiis, feminibus, cruribus, digitis. Siquidem ea minime
 periculose media franguntur: quo propior fractura capiti vel
 superiori vel inferiori est, eo peior est: nam et majores do-
 lores adfert, et difficilior curatur. Ea maxime tolerabilis est 35

simplex, transversa: pejor ubi obliqua, atque ubi multa frag-
 menta: pessima, ubi eadem acuta sunt. Nonnumquam autem
 fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo saepius
 excidunt, aliudque super aliud effertur: idque ante omnia
 5 considerari debet; et sunt notae certae. Si suis sedibus sunt,
 mota resonant, punctionisque sensum repraesentant; tactu
 inaequalia sunt. Si vero non adversa, sed obliqua jungun-
 tur, quod fit ubi loco suo non sunt, membrum id altero bre-
 vius est, et musculi ejus tument. Ergo, si hoc deprehen-
 10 sum est, protinus id membrum oportet extendere: nam nervi
 musculique, intenti per ossa, contrahuntur; neque in suum
 locum veniunt, nisi illos per vim aliquis intendit. Rursus, si
 primis diebus id omissum est, inflammatio oritur; sub qua et
 difficile et periculose vis nervis adhibetur: nam distentio
 15 nervorum, vel cancer sequitur; vel certe, ut mitissime aga-
 tur, pus. Itaque, si ante reposita ossa non sunt, postea re-
 ponenda sunt. Intendere autem digitum, vel aliud quoque
 membrum, si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest;
 quum alteram partem dextra, alteram sinistraprehendit. Val-
 20 lentius membrum duobus eget, qui in diversa contendant.
 Si firmiores nervi sunt, ut in viris robustis, maximeque eo-
 rum feminibus et cruribus, habenis quoque, vel linteis fa-
 sciis utrimque capita articulorum deliganda, et per plures in
 diversa ducenda sunt. Ubi paulo longius quam naturaliter
 25 esse debet, membrum vis fecit, tum demum ossa manibus
 in suam sedem compellenda sunt: indiciumque ossis repo-
 siti est dolor sublatus, et membrum alteri aequatum. Invol-
 vendum duplicibus triplicibusve pannis in vino et oleo tin-
 ctis; quos linteos esse, commodius est. Fere vero fasciis
 30 sex opus est: prima brevissima, quae circa fracturam ter vo-
 luta sursum versum feratur, et quasi in cochleam serpat;
 satisque est eam ter hoc quoque modo circuire (Hipp. *De*
fract. § 4): altera dimidio longiore; eaque, si qua parte os
 eminet, ab ea; si totum aequale est, undelibet super fra-
 35 cturam debet incipere, priori adversa, deorsumque tendere;
 atque iterum ad fracturam reversa, in superiore parte ultra
 priorem fasciam desinere. Super has injiciendum latiore lin-
 teo ceratum est, quod eas contineat. Ac, si qua parte os

eminet, triplex ea pannus objiciendus, eodem vino et oleo madens. Haec tertia fascia comprehendenda sunt, quartaque sic, ut semper insequens priori adversa sit, et tertia tantum in inferiore parte, tres in superiore finiuntur: quia satius est saepius circumire, quam adstringi: siquidem id, quod adstrictum est, alienatur, et cancro opportunum est. Articulum autem quam minime vincire opus est: sed, si juxta hunc os fractum est, necesse est. Deligatum vero membrum in diem tertium continendum est: eaque vinclura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit, non tamen laxa visa sit; secundo laxior; tertio jam paene resoluta. Ergo tum rursus id membrum deligandum, adjiciendaque prioribus quinta fascia est: iterumque quinto die resolvendum est, et sex fasciis involvendum sic, ut tertia et quinta infra, ceterae supra finiuntur. Quotiescumque autem solvitur membrum, calida aqua fove-¹⁵ dum est. Sed, si juxta articulum fractura est, diu instillandum vinum est, exigua parte olei adjecta; eademque omnia facienda, donec adeo inflammatio solvatur, et tenuius quoque, quam ex consuetudine, id membrum fiat: quod si septimus dies non dedit, certe nonus exhibet: tum facillime ossa²⁰ tractantur. Rursus ergo, si parum commissa sunt, committi debent: si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt: deinde eodem modo membrum deligandum, ferulaeque super accommodandae sunt, quae fissae circumpositaeque ossa in sua sede contineant: et in quam partem fractura inclin-²⁵ at, ab ea latior valentiorque ferula imponenda est. Easque omnes circa articulum esse oportet resimas, ne hunc laedant; nec ultra adstringi, quam ut ossa contineant: et quum spatio laxentur, tertio quoque die paulum habenis suis coarctari: ac, si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere, donec duae partes ejus temporis, quo quodque os confervet, compleantur: postea levius aqua calida fovere, quia primo digeri materiam opus est, tum evocari. Ergo cerato quoque liquido id leniter est ungendum, perfricandaque summa cutis est; laxiusque id deligandum, et tertio quo-³⁰ que die solvendum sic, ut, remota calida aqua, cetera eadem fiant; tantummodo singulae fasciae, quoties resolutae fuerint, subtrahantur.

2. Haec communia sunt: illa propria. Siquidem humerus fractus non sic, ut membrum aliud, intenditur¹⁾: sed homo collocatur alto sedili, medicus autem humiliore adversus.



Una fascia (a), brachium amplexa, ex cervice ipsius, id sustinet: altera (b), ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum: tertia (c) vincto imo humero deorsum demittitur, ibi quoque capitibus ejus inter se vinctis. Deinde ab occipitio ipsius minister sub ea fascia, quam secundo loco posui, porrecto, si dexter humerus ducendus est, dextro, si sinister, sinistro brachio, demissum inter femina ejus baculum (A) tenet: medicus super eam fasciam, de qua tertio loco dixi, plantam injicit dextram, si sinister; sinistram, si dexter humerus curatur; simulque alteram fasciam minister attollit, alteram premit medicus: quo fit, ut leniter humerus extendatur. Fasciis vero, si medium aut imum os fractum est, brevioribus opus est; si summum, longioribus: ut ab eo sub altera quoque ala per pectus et scapulas porrigantur. Protinus vero brachium, quum deligatur, sic inclinandum est; idque efficit, ut ante fascias quo-

1) Cf. *Gazette médicale de Paris*; 1847, p. 126.

que sic figurandum sit; ne postea suspensum aliter atque quum deligabatur, humerum inclinet (cf. Hipp. *De fract.* 8). Brachioque suspenso, ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est: per quae fit, ut minime moveatur: ideoque ossa sic se habeant, ut aliquis composuit. Quum ad ferulas⁵ ventum est, extrinsecus esse earum longissimae debent; a lacerto breviores: sub ala brevissimae: saepiusque eae resolvendae sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est; ne ibi nervi rigescant, et inutile brachium efficiant. Quoties solutae sunt, fractura manu continenda; cubitus aqua calida¹⁰ fovendus, et mollicerato perfricandus; ferulaeque vel omnino non imponendae contra eminentia cubiti, vel aliquanto breviores sunt.

3. At si brachium fractum est, in primis considerandum est, alterum os, an utrumque comminutum sit (*Ibid.* § 4):¹⁵ non quo alia in ejusmodi casu curatio sit admovenda; sed primum, ut valentius extendatur, si utrumque os fractum est; quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosque intendente; deinde, ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam,²⁰ ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fasciis ferulisque est. Deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato; siquidem is maxime brachii naturalis habitus est: idque involutum mitella commodissime excipitur; quae latitudine ipsi brachio, perangustis capitibus collo injici-²⁵ tur: atque ita commode brachium ex cervice suspensum est. Idque paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet.

4. Quod si ex summo cubito quid fractum sit, glutinare id vinciendo alienum est: fit enim brachium immobile. At si nihil aliud quam dolori occursum est, idem, qui fuit, ejus usus est.³⁰

5. In crure aequae ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. Commune vero ei femorique est, quod, ubi deligatum est, in canalem conjiciendum est. Is canalis et inferiore parte foramina habere debet, per quae, si quis humor excesserit, descendat: et a planta moram, quae si-³⁵ mul et sustineat eam, et delabi non patiatur; et a lateribus cava, per quae loris datis, morae quaedam crus femurque, ut collocatum est, detineant. Esse etiam is debet a planta,

si crus fractum est, circa poplitem; si femur, usque ad coxam; si juxta superius caput femoris sic, ut ipsa quoque ei coxa insit. Neque tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri brevius; quia numquam in antiquum statum revertitur; 5 summisque digitis postea cruris ejus insisti: sed multo tamen foedior debilitas est, ubi fortunae negligentia quoque accessit.

6. Digitum satis est ad unum surculum post inflammationem deligari.

7. His proprie ad singula membra pertinentibus, rursus 10 illa communia sunt: primis diebus fames; deinde tum, quum jam increscere callum oportet, liberalius alimentum; longa a vino abstinentia; fomentum aquae calidae, dum inflammatio est, liberale; quum ea desiit, modicum: tum etiam longior ulterioribus e liquido cerato membris, et mollis tamen 15 unctio. Neque protinus exercendum id membrum, sed paulatim ad antiquos usus reducendum est. Gravius aliquanto est, quum ossis fracturae carnis quoque vulnus accessit; maximeque si id musculi femoris aut humeri senserunt: nam et inflammationes multo graviores, et promptiores canculos ha- 20 bent. Ac femur quidem, si ossa inter se recesserunt, fere praecidi necesse est. Humerus quoque in periculum venit; sed facilius conservatur. Quibus periculis etiam magis id expositum, quod juxta ipsos articulos ictum est. Curiosius igitur agendum est; et musculus quidem per mediam 25 plagam transversus praecidendus: sanguis vero, si parum fluxit, mittendus: corpus inedia extenuandum. Ac reliqua quidem membra lentius intendenda, et lenius in iis ossa in suam sedem reponenda sunt: in his vero neque intendi nervos, neque ossa tractari, satis expedit: ipsique homini permittendum est, ut sic ea collocata habeat, quemadmodum 30 minime laedunt. Omnibus autem his vulneribus imponendum primo linamentum est, vino madens, cui rosae paulum admodum adjectum sit. Deligandaque fasciis sunt aliquanto laxioribus quam si ea plaga non esset (cf. V, 26, 24); quanto 35 facilius et alienari et occupari cancro vulnus potest: numero potius fasciarum id agendum est, ut laxae quoque aequae contineant. Quod in femore humeroque sic fiet, si ossa forte recte concurrerint: sin aliter se habebunt, eatenus circum-

dari fascia debebit, ut impositum medicamentum contineat. Cetera eadem, quae supra scripsi, facienda sunt: praeterquam quod neque ferulis, neque canalibus, inter quae vulnus sanescere non potest, sed pluribus tantummodo et laxioribus fasciis opus est: ingerendumque subinde in eas est calidum oleum, et vinum; magisque in primo fame utendum; vulnus calida aqua fovendum; frigusque omni ratione vitandum; et transeundum ad medicamenta, quae puri movendo sunt: majorque vulneri, quam ossi cura adhibenda. Ergo quotidie solvendum nutriendumque est. Inter quae si quod parvulum fragmentum ossis eminet, id, si retusum est, in suam sedem dandum: si acutum, ante acumen ejus; si longius est, praecidendum; si brevius, limandum, et utrumque scalpro laevandum: tum ipsum recondendum est: ac, si id manus facere non potest, vulsella, quali fabri utuntur, injicienda est recte se habenti capiti ab ea parte, qua sima est; ut ea parte qua gibba est, eminens os in suam sedem compellat. Si id majus est, membranulisque cingitur, sinere oportet eas sub medicamentis solvi, idque os, ubi jam nudatum est, abscindere; quod maturius scilicet faciendum est: potestque ea ratione et os coire, et vulnus sanescere: illud suo tempore; hoc, prout se habet. Nonnumquam etiam in magno vulnere evenit, ut fragmenta quaedam velut emorian-
tur, neque cum ceteris coeant: quod hic quoque ex modo fluentis humoris colligitur. Quo magis necessarium est, saepius vulnus resolvere, atque nutrire. Sequitur vero, ut id os per se post aliquot dies excidat. Quum tam misera antea conditio vulneris sit, tamen id interdum manus diutiusque facit; saepe enim integra cute os abrumpitur, protinusque prurigo et dolor oritur. Quod solvere, si accidit, maturius oportet, et fovere aqua; per aestatem, frigida; per hiemem, egelida: deinde ceratum murteum imponere. Interdum fractura quibusdam velut aculeis carnem vexat. Quo a prurigine et punctionibus cognito, aperire id medicus, eosque aculeos praecidere necesse habet. Reliqua vero curatio in utroque hoc casu eadem est, quae ubi plagam ictus protinus intulit. Puro jam ulcere, cibus hic quoque utendum est carnem producentibus. Si brevius adhuc membrum est, et ossa loco

suo non sunt, paxillus tenuis quam laevissimi generis inter ea demitti debet sic, ut capite paulum supra ulcus emineat; isque quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. Tum paxillus removendus; vulnus sanandum est; 5 cicatrix inducta fovenda frigida aqua est, in qua myrtus, hederæ, aliaevæ similes verbenæ decoctæ sint, illinendumque medicamentum est, quod siccet: et magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur. Si quando vero ossa non conferbuerunt, quia sæpe soluta, sæpe mota sunt, 10 in aperto deinde curatio est: possunt enim coire. Si vetustas occupavit, membrum extendendum est; ossa inter se manu dividenda, ut concurrendo exasperentur, et si, quid pingue est, eradatur, totumque id quasi recens fiat: magna tamen cura habita, ne nervi musculive laedantur. Tum vino 15 fovendum est, in quo malicorium decoctum sit; imponendumque id ipsum ovi albo mixtum: tertio die resolvendum, fovendumque aqua in qua verbenæ, de quibus supra dixi (l. 6), decoctæ sint: quinto die idem faciendum, ferulæque circumdandæ: cetera, et ante, et post, eadem faciendæ, quæ supra scripsi. Solent tamen interdum transversa inter se ossa 20 confervere: eoque et brevius membrum, et indecorum fit; et, si capita acutiora sunt, assiduæ punctiones sentiuntur. Ob quam causam frangi rursus ossa et dirigi debent. Id hoc modo fit. Calida aqua multa membrum id fovetur, et ex 25 cerato liquido perfricatur, intenditurque: inter hæc medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo, manibus ea diducit, compellitque id quod eminet in suam sedem: et, si parum valuit, ab ea parte, in quam os se inclinat, involutam lana regulam objicit; atque ita deligando, assuescere iterum vetustæ sedi cogit. Nonnumquam autem recte quidem ossa coierunt, superincrevit vero nimius callus; ideoque locus is intumuit. Quod ubi incidit, diu leniterque id membrum perfricandum est ex oleo et sale et nitro; multaue aqua calida salsa fovendum; et imponendum malagma, quod digerat; ad- 30 strictiusque alligandum; oleribusque, et præterea vomitu utendum: per quæ cum carne callus quoque extenuatur. Confertque aliquid sinapi cum ficu in alterum membrum positum, donec id paulum erodat, eoque evocet mate

Ubi is tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitae revertendum est.

CAPUT XL

De ossibus luxatis.

Ac de fractis quidem ossibus hactenus dictum sit. ⁵ Movetur autem ea sedibus suis duobus modis; nam modo, quae juncta sunt inter se dehiscunt; ut quum latum scapularum os ab humero recedit; et in brachio radius a cubito; et in crure tibia a sura; et interdum a salta calcis os a talo, quod raro tamen fit; modo articuli suis sedibus excidunt. Ante de prio- ¹⁰ ribus dicam. Quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus cavus est, depressusque digitus sinum invenit: deinde gravis inflammatio oritur; atque in talis praecipue: siquidem febres quoque, et caneros, et nervorum vel distentiones, vel rigores, qui caput scapulis annectunt, movere consuevit. Quo- ¹⁵ rum vitandorum causa facienda eadem sunt, quae in ossibus mobilibus laesis proposita sunt; ut dolor tumorque per ea tollantur. Nam diducta ossa numquam rursus inter se junguntur; et, ut aliquid decoris eo loco, sic nihil usus amittitur. Maxilla vero, et vertebra, omnesque articuli, quum ²⁰ validis nervis comprehendantur, excidunt aut vi expulsi, aut aliquo casu nervis vel ruptis, vel infirmatis; faciliusque in pueris et adolescentulis, quam in robustioribus. Hique elaborantur in priorem [et in posteriorem, in interiorem] et in exteriorem partem; quidam omnibus modis, quidam certis: ²⁵ suntque quaedam communia omnium signa, quaedam propria cujusque. Siquidem semper ea parte tumor est, in quam os prorumpit; ea sinus, a qua recessit. Et haec quidem in omnibus deprehenduntur: alia vero in singulis; quae simul atque de quoque dicam, proponenda erunt. Sed ut excidere ³⁰ omnes articuli possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim numquam compellitur, neque in spina vertebra, neque ea maxilla, quae, utraque parte prolapsa, antequam reponeretur, inflammationem movit. Rursum, qui nervorum vitio prolapsi sunt, compulsi quoque in suas sedes iterum excidunt. ³⁵

Ac quibus in pueritia exciderunt, neque repositi sunt, minus quam ceteri crescunt. Omniumque, quae loco suo non sunt, caro emacrescit, magisque in proximo membro, quam in ulteriore: ut, puta, si humerus loco suo non est, major in eo ipso fit, quam in brachio; major in hoc, quam in manu, macies. Tum pro sedibus, et pro casibus, qui inciderunt, aut major aut minor usus ejus membri relinquitur: quoque in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur. Quidquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illa occupavit, dum conquiescat, non lacerandum est: ubi finita est, tentandum est in iis membris, quae id patiuntur. Multum autem eo confert et corporis et nervorum habitus; nam, si corpus tenue, si humidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponitur: sed et primo facilius excidit, et postea minus fideliter continetur. Quae contraria his sunt, melius continent: sed id, quod expulsum est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem levare, super succida lana ex aceto imposita: a cibo, si valentioris articuli casus est, triduo: interdum etiam quinque diebus abstinere: bibere aquam calidam, dum sitim finiat: curiosiusque haec facere, iis ossibus motis, quae validis plenisque musculis continentur: si vero etiam febris accessit, multo magis; deinde ex die quinto fovere aqua calida, remotaque lana, ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoque adjecto, donec omnis inflammatio finiatur; tunc frictionem ei membro adhibere; cibis uti bonis; vino modice: jamque ad usus quoque suos id membrum promovere; quia motus, ut in dolore pestifer, sic alias saluberrimus corpori est. Haec communia sunt; nunc de singulis dicam.

30

CAPUT XII.

De maxilla luxata.

Maxilla in priorem partem propellitur; sed modo altera parte, modo utraque. Si altera, in contrariam partem ipsa mentumque inclinatur: dentes paribus non respondent; sed sub iis, qui secant, canini sunt (cf. Hipp. *De artic.* § 23). At si utraque, totum mentum in anteriorem partem prae-

CELSUS.

vetur; inferioresque dentes longius quam superiores excedunt; intentique super musculi apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est sic, ut minister a posteriore parte caput ejus contineat, vel sic, ut juxta parietem is se deat, subjecto inter parietem et caput ejus scorteo pulvino 5 duro; eoque caput per ministrum urgeatur, quo sit immobilius: tum digiti pollices linteolis vel fasciis, ne delabantur, involuti in os ejus conjiciendi, ceteri extrinsecus admovendi sunt. Ubi vehementer maxilla apprehensa est, si una parte procidit, concutiendum mentum, et ad guttur adducendum 10 est: tum simul et caput apprehendendum, et, excitato mento, maxilla in suam sedem compellenda, et os ejus comprimentum est sic, ut omnia paene uno momento fiant. Sin utraque parte prolapsa est, eadem omnia facienda; sed aequaliter retro maxilla agenda est. Reposito osse, si cum dolore 15 oculorum et cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Quum omnibus vero, quorum ossa mota sunt, primo liquidior cibus conveniat, tum his praecipue: adeo ut sermo quoque frequens, motu oris per nervos, laedat.

CAPUT XIII.

20

De capite luxato.

Caput duobus processibus in duos sinus summae vertebrae demissis super cervicem contineri, in prima parte proposui (cap. 1). Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt: quo fit, ut nervi sub occipitio extendantur, 25 mentum pectori agglutinetur, neque bibere is, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emittat: quibus celerime mors supervenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio ejus rei ulla sit; sed ut res indicii cognosceretur, et non putarent sibi medicum defuisse, si qui sic 30 aliquem perdidissent.

CAPUT XIV.

De spina luxata.

Idem casus manet eos, quorum in spina vertebrae exciderunt. Id enim non potest fieri, nisi et medulla, quae per 35

medium, et duabus membranulis, quae per duos a lateribus processus feruntur, et nervis, qui continent, ruptis. Excidunt autem et in posteriorem partem, et in priorem; et supra septum transversum, et infra. In utram partem exciderint, a posteriore parte vel tumor, vel sinus oritur. Si super
 5 septum id incidit, manus resolvuntur, vomitus, aut distentio nervorum insequitur, spiritus difficulter movetur, dolor urget, et aures obtusae sunt. Si sub septo, femina resolvuntur, urina supprimitur, interdum etiam sine voluntate prorumpit. Ex ejusmodi casibus, ut tardius, quam ex capitis,
 10 sic tamen intra triduum homo moritur. Nam quod Hippocrates (*De artic.* § 47; T. IV p. 208) dixit, vertebra in anteriorem prolapsa, primum hominem collocandum esse, et extendendum, tum calce aliquem super ipsum os debere
 15 consistere, et id intus impellere: in iis accipiendum est, quae paulum excesserunt; non in iis, quae totae loco motae sunt. Nonnumquam enim nervorum imbecillitas efficit, ut, quamvis non exciderit vertebra, paulum tamen aut in posteriorem, aut in priorem partem promineat. Id non jugulat: sed
 20 ab interiore parte ne contingi quidem potest: ab exteriori si propulsum est, plerumque iterum redit; nisi, quod admodum rarum est, vis nervis restituta est.

CAPUT XV.

De humero luxato.

25 Humerus autem modo in alam excidit, modo in partem priorem. Si in alam delapsus est, cubitus recedit ab latere; sursum juxta ejusdem partis aurem cum humero porrigi non potest; longiusque altero id brachium est. Si in priorem partem, summum quidem brachium extenditur, minus
 30 tamen quam naturaliter; difficilisque in priorem partem, quam in posteriorem cubitus porrigitur. Igitur, si in alam humerus excidit, et vel puerile adhuc est corpus, vel molle certe, et imbecillis nervis intentum est, satis est collocare id in sedili; et ex duobus ministris alteri imperare, ut caput
 35 lati scapularum ossis leniter reducat ¹⁾; alteri, ut brachium

1) Hipp. l. l. § 2: ἐμβάλλων τὴν ἐκαστοῦ κεφαλὴν εἰς τὸ ἄμιον ἀντερείσιος ἕνεκα. Quod verisimilius videtur.

extendat: ipsum posteriore parte residentem, manum sub alam ejus conjicere, simulque et illa os, et altera manu brachium ejus ad latus impellere. At si vastius corpus, nervi robustiores sunt, necessaria est spatha lignea, quae et crassitudinem duorum digitorum habet, et longitudine ab ala⁵ usque ad digitos pervenit: in qua summa capitulum est rotundum et leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit. In ea bina foramina tribus locis sunt, inter se spatio distantibus; in quae lora mollia conjiciuntur. Eaque spatha, fascia involuta, quo minus tactu laedat, ad¹⁰ alam brachio dirigitur sic, ut caput ejus summae alae subjiciatur: deinde loris suis ad brachium deligatur; uno loco paulum infra humeri caput; altero paulum supra cubitum; tertio supra manum: cui rei protinus intervalla quoque foraminum aptata sunt. Sic brachium deligatum super scalae gal-¹⁵ linariae gradum trajicitur ita alte, ut consistere homo ipse non possit; simulque in alteram partem corpus demittitur, in alteram brachium intenditur: eoque fit, ut capite ligni caput humeri impulsum in suam sedem, modo cum sono, modo sine hoc compellatur. Multas alias esse rationes scire facile est²⁰ uno Hippocrate lecto; sed non alia magis usu comprobata est (*Ibid.* § 6—7). At si in partem priorem humerus excidit, supinus homo collocandus est; fasciaque, aut habena media alae circumdanda est, capitaque ejus post caput hominis ministro tradenda, brachium alteri; praecipendumque, ut²⁵ ille habenam, hic brachium extendat: deinde medicus caput quidem humeri sinistra debet repellere: dextra vero cubitum cum humero attollere, et os in suam sedem compellere: faciliusque id in hoc casu, quam in priore revertitur. Reposito humero, lana alae subjicienda est; si in interiore³⁰ parte os fuit, ut ei opponatur; si in priore, ut tamen commodius deligetur. Tum fascia, primum sub ala obvoluta, caput ejus debet comprehendere, deinde per pectus ad alteram alam, ab eaque ad scapulas, rursusque ad ejusdem humeri caput tendere, saepiusque eadem ratione circummagi, donec³⁵ bene id teneat. Vincitur, hac ratione humerus commodius continetur, si adductus ad latus, ad id quoque fascia deligatur.

CAPUT XVI.

De cubito luxato.

In cubito autem tria coire ossa, humeri, radii, et cubiti ipsius, ex iis, quae prima parte hujus voluminis posita sunt, intelligi potuit. Si cubitus, qui annexus humero est, ab hoc excidit, radius, qui adjunctus est, interdum trahitur, interdum subsistit. In omnes vero quatuor partes excidere cubitus potest (cf. Hipp. *De artic.* § 17 sqq.): sed, si in priorem prolapsus est, extensum brachium est, neque recurvatur: si in posteriorem, brachium curvum est, neque extenditur, breviusque altero est; interdum febrem, vomitumque bilis movet: si in anteriorem, anterioremve, brachium porrectum est, sed paulum in eam partem, a qua os recessit, recurvatum. Quidquid incidit, reponendi ratio una est; neque in cubito tantum, sed in omnibus quoque membris longis, quae per articulum longa testa junguntur: utrumque membrum in diversas partes extendere, donec spatium inter ossa liberum sit; tum id os, quod excidit, ab ea parte, in quam prolapsum est, in contrariam impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout aut nervi valent, aut ossa huc illuc se dederunt. Ac modo manibus solis utendum est, modo quaedam alia adhibenda. Ergo, si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duos manus, interdum etiam habenis adjectis, satis est: deinde rotundum aliquid a lacerti parte ponendum est, et super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in aliis casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quae fracto humero supra posita est, et tum ossa reponere. Reliqua curatio eadem est, quae in omnibus. Celerius tantum, et saepius id resolvendum est; multo magis aqua calida fovendum; diutius ex oleo et nitro ac sale perfricandum. In cubito enim celerius, quam in ullo alio articulo, sive extra remansit, sive intus revertit, callus circumdatur; isque, si per quietem increvit, flexus illius postea prohibet.

que sic figurandum sit; ne postea suspensum aliter atque quum deligabatur, humerum inclinet (cf. Hipp. *De fract.* 8). Brachioque suspenso, ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est: per quae fit, ut minime moveatur: ideoque ossa sic se habeant, ut aliquis composuit. Quum ad ferulas⁵ ventum est, extrinsecus esse earum longissimae debent; a lacerto breviores: sub ala brevissimae: saepiusque eae resolvendae sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est; ne ibi nervi rigescant, et inutile brachium efficiant. Quoties solutae sunt, fractura manu continenda; cubitus aqua calida¹⁰ fovendus, et mollicerato perfricandus; ferulaeque vel omnino non imponendae contra eminentia cubiti, vel aliquanto breviores sunt.

3. At si brachium fractum est, in primis considerandum est, alterum os, an utrumque comminutum sit (*Ibid.* § 4):¹⁵ non quo alia in ejusmodi casu curatio sit admovenda; sed primum, ut valentius extendatur, si utrumque os fractum est; quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosque intendente; deinde, ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam,²⁰ ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fasciis ferulisque est. Deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato; siquidem is maxime brachii naturalis habitus est: idque involutum mitella commodissime excipitur; quae latitudine ipsi brachio, perangustis capitibus collo injicitur: atque ita commode brachium ex cervice suspensum est. Idque paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet.

4. Quod si ex summo cubito quid fractum sit, glutinare id vinciendo alienum est: fit enim brachium immobile. At si nihil aliud quam dolori occursum est, idem, qui fuit, ejus usus est.³⁰

5. In crure aequae ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. Commune vero ei femorique est, quod, ubi deligatum est, in canalem conjiciendum est. Is canalis et inferiore parte foramina habere debet, per quae, si quis humor excesserit, descendat: et a planta moram, quae si-³⁵ mul et sustineat eam, et delabi non patiatur; et a lateribus cava, per quae loris datis, morae quaedam crus femurque, ut collocatum est, detineant. Esse etiam is debet a planta,

debent, qui vel in priorem, vel in posteriorem partem exciderunt; tum jam palma compelli; at id, quod in latus elapsus est, digitis restitui. Potest tamen conditus articulus medius, aut summus canaliculo aliquo contineri.

CAPUT XX.

De femore luxato.

Quum de his dixerim, de iis quoque, quæ in cruribus sunt, videri possum dixisse: siquidem etiam in hoc casu quaedam similitudo est femori et humero, tibiae et cubito, 10 pedi et manui. Quaedam tamen separatim quoque de his dicenda sunt. Femur in omnes quatuor partes promovetur: saepissime in interiorem; deinde in exteriorem; raro admodum in priorem, aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsus est, crus longius altero, et vatium est: extra 15 enim pes ultimus spectat; si in exteriorem, brevius, varumque fit, pes intus inclinatur; calx in gressu terram non contingit, sed planta ima; meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu, fert, minusque baculo eget; si in priorem, crus extensum est, complicarique non potest; 20 alteri cruri ad calcem par est, sed ima planta minus in priorem partem inclinatur: dolorque in hoc casu præcipuus est, et maxime urina supprimitur. Ubi cum dolore inflammatio quievit, commode ingrediuntur, rectusque eorum pes est. Si in posteriorem, extendi non potest crus, breviusque est; 25 ubi consistit, calx hic quoque terram non contingit. Magnum autem femori periculum est, ne vel difficulter reponatur, vel repositum rursus excidat. Quidam semper iterum excidere contendunt: sed Hippocrates (*De artic.* §. 70; *Gal. Comm. in h. loc.* T. XVIII^a p. 731), et Diocles, et Philotimus, et 30 Nileus, et Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoriae prodiderunt. Neque tot genera machinamentorum quoque, ad extendendum in hoc casu femur, Hippocrates, Andreas, Nileus, Nymphodorus, Pro- 35 tarchus, Heraclides, alique quidam reperissent, si id fri-
esset. Sed ut hæc falsa opinio est, sic illud verum

quum ibi valentissimi nervi musculique sint, si suum robur habent, vix admittere; si non habent, postea non continere. Tentandum igitur est, et, si tenerum membrum est, satis est habena altera ab inguine, altera a genu intendi: si validius, melius adducent, qui easdem habenas ad valida bacula de- ligarint; quumque eorum fustium imas partes oppositae morae objecerint, superiores ad se utraque manu traxerint. Etiamnum valentius intenditur membrum super scamnum, cui ab utraque parte axes sunt, ad quos habenae illae deligan- tur: qui, ut in torcularibus, conversi, rumpere quoque, si quis perseveraverit, non solum extendere nervos et muscu- los possunt. Collocandus autem homo super id scamnum¹⁾ est aut pronus, aut supinus, aut in latus sic, ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsum est; ea infe- rior, a qua recessit. Nervis extentis, si in priorem partem¹⁵ os venit, rotundum aliquid super inguen ponendum; subito- que super id genu adducendum est eodem modo, eademque de causa, qua idem in brachio fit; protinusque, si compli- cari femur potest, intus est. In ceteris vero casibus, ubi ossa per vim paulum inter se recesserunt, medicus debet id,²⁰ quod eminet, retro cogere; minister contra inde coxam pro- pellere. Reposito osse, nihil aliud novi curatio requirit, quam ut diutius is in lecto detineatur; ne, si motum adhuc nervis laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

CAPUT XXI.

25

De genu luxato.

Genu vero et in exteriorem, et in interiorem, et in po- steriorem partem excidere, notissimum est. In priorem non prolabi plerique scripserunt: potestque id vero proximum esse, quum inde opposita patella, ipsa quoque caput tibiae³⁰ contineat. Meges tamen eum, cui in priorem partem exci- disset, a se curatum esse, memoriae prodidit. In his casibus intendi nervi rationibus iisdem, quas in femore retuli, pos-

1) Cf. Hipp. ed. Littré; T. IV, p. 40, 297 — 301, 305, 311.

sunt. Et id quidem, quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoque eo crure, reconditur; cetera vero manibus simul dum ossa in diversas partes compelluntur.

CAPUT XXII.

De talo luxato.

Talus in omnes partes prolabitur. Ubi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem convertitur: ubi huic contrarius casus, contrarium etiam signum est.
 10 At si in priorem partem erumpit, a posteriore latus nervus durus et intentus est; simusque his pes est; si in posteriorem, calx paene conditur, planta major fit. Reponitur autem is quoque per manus; prius in diversa pede et crure ductis. Et in hoc quoque casu diutius in lectulo perseverandum est; ne is talus, qui totum corpus sustinet, parum confirmatis nervis ferendo oneri cedat, rursusque prorumpat.
 15 Calceamentis quoque humilioribus primo tempore utendum; ne vinctura talum ipsum laedat.

CAPUT XXIII.

De planta luxata.

Plantae ossa iisdem modis, quibus in manu, prodeunt; iisdemque conduntur. Fascia tantummodo calcem quoque debet comprehendere: ne, quum mediam plantam, imumque
 25 ejus vinciri necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorum recipiat, ideoque suppuret.

CAPUT XXIV.

De digitis luxatis.

In digitis nihil ultra fieri debet, quam quod in iis, sunt in manu, positum est (cap. 19.)

Ubi is tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitae revertendum est.

CAPUT XI.

De ossibus luxatis.

Ac de fractis quidem ossibus hactenus dictum sit. **Mo-**
5 ventur autem ea sedibus suis duobus modis; nam modo, quae juncta sunt inter se dehiscunt; ut quum latum scapularum os ab humero recedit; et in brachio radius a cubito; et in crure tibia a sura; et interdum a saltu calcis os a talo, quod raro tamen fit; modo articuli suis sedibus excidunt. Ante de prio-
10 ribus dicam. Quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus cavus est, depressusque digitus sinum invenit: deinde gravis inflammatio oritur; atque in talis praecipue: siquidem febres quoque, et caneros, et nervorum vel distentiones, vel rigores, qui caput scapulis annectunt, movere consuevit. Quo-
15 rum vitandorum causa facienda eadem sunt, quae in ossibus mobilibus laesis proposita sunt; ut dolor tumorque per ea tollantur. Nam diducta ossa numquam rursus inter se junguntur; et, ut aliquid decoris eo loco, sic nihil usus amittitur. Maxilla vero, et vertebra, omnesque articuli, quum
20 validis nervis comprehendantur, excidunt aut vi expulsi, aut aliquo casu nervis vel ruptis, vel infirmatis; faciliusque in pueris et adolescentulis, quam in robustioribus. Hique elaborantur in priorem [et in posteriorem, in anteriorem] et in anteriorem partem; quidam omnibus modis, quidam certis: suntque quaedam communia omnium signa, quaedam propria
cujusque. Siquidem semper ea parte tumor est, in quam os prorumpit; ea sinus, a qua recessit. Et haec quidem in omnibus deprehenduntur: alia vero in singulis; quae simul atque de quoque dicam, proponenda erunt. Sed ut excidere
30 omnes articuli possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim numquam compellitur, neque in spina vertebra, neque ea maxilla, quae, utraque parte prolapsa, antequam reponeretur, inflammationem movit. Rursum, qui nervorum vitio prolapsi sunt, compulsi quoque in suas sedes iterum excidunt. **35**

INDEX

LIBRORUM ET CAPITUM.

<p>LIBER PRIMUS. 1</p> <p>Prooemium. Conspectus historiae medicinae. Quae ratio medicinae potissima sit ibd.</p> <p>Cap. I. Qualiter sese sanus agere debeat 13</p> <p>II. Qualiter se agere debeant qui imbecilles sunt 14</p> <p>III. Observationes circa corporum genera, aetates et tempora anni 15</p> <p>IV. De his quibus caput infirmum est 22</p> <p>V. De his quilibetitudine, gravedine, destillatione, tonsillisque laborant 23</p> <p>VI. De alvo soluta ibd.</p> <p>VII. Remedia ad coli dolorem 24</p> <p>VIII. Stomacho laborantibus quae agenda sint ibd.</p> <p>IX. De dolore nervorum, et de affectibus caloris, frigorisque 25</p> <p>X. Regimen contra pestem 26</p> <p>LIBER SECUNDUS 27</p> <p>Prooemium. De signis adversae valetudinis, et de communibus auxiliis ibd.</p> <p>Cap. I. Quae anni tempora, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qualia corpora</p>	<p>vel tuta, vel morbis et qualibus opportuna sint 27</p> <p>Cap. II. De notis adversae valetudinis futurae 31</p> <p>III. Incipiente febre signa mala vel bona 32</p> <p>IV. Mala signa aegrotorum 33</p> <p>V. De signis longi morbi 35</p> <p>VI. De indiciis mortis 36</p> <p>VII. Ex quibus notis singula morborum genera cognoscuntur 38</p> <p>VIII. Quae notae spem salutis, quae pericula ostendunt 44</p> <p>IX. De morborum curationibus 51</p> <p>X. De sanguinis missione per venam 52</p> <p>XI. De cucurbitulis medicinalibus 55</p> <p>XII. De dejectione 56</p> <p style="padding-left: 20px;">2. De alvi ductione ibd.</p> <p>XIII. De vomitu 58</p> <p>XIV. De frictione ibd.</p> <p>XV. De gestatione 60</p> <p>XVI. De abstinencia 61</p> <p>XVII. De sudore eliciendo 62</p> <p>XVIII. De cibis et potionibus 64</p> <p>XIX. Quae natura ac proprietates cujusque rei sit qua vescimur 67</p> <p>XX. De his quae boni succi sunt</p>
--	--

Ubi is tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitae revertendum est.

CAPUT XI.

De ossibus luxatis.

Ac de fractis quidem ossibus hactenus dictum sit. Mo-
ventur autem ea sedibus suis duobus modis; nam modo, quae
juncta sunt inter se dehiscunt; ut quum latum scapularum os
ab humero recedit; et in brachio radius a cubito; et in crure
tibia a sura; et interdum a saltu calcis os a talo, quod raro
tamen fit; modo articuli suis sedibus excidunt. Ante de prio-
ribus dicam. Quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus ca-
vus est, depressusque digitus sinum invenit: deinde gravis in-
flammatio oritur; atque in talis praecipue: siquidem febres
quoque, et caneros, et nervorum vel distentiones, vel ri-
gores, qui caput scapulis annectunt, movere consuevit. Quo-
rum vitandorum causa facienda eadem sunt, quae in ossibus
mobilibus laesis proposita sunt; ut dolor tumorque per ea
tollantur. Nam diducta ossa numquam rursus inter se jun-
guntur; et, ut aliquid decoris eo loco, sic nihil usus amit-
titur. Maxilla vero, et vertebra, omnesque articuli, quum
validis nervis comprehendantur, excidunt aut vi expulsi, aut
aliquo casu nervis vel ruptis, vel infirmatis; faciliusque in
pueris et adolescentulis, quam in robustioribus. Hique ela-
buntur in priorem [et in posteriorem, in interiorem] et in ex-
teriorem partem; quidam omnibus modis, quidam certis:
suntque quaedam communia omnium signa, quaedam propria
cujusque. Siquidem semper ea parte tumor est, in quam os
prorumpit; ea sinus, a qua recessit. Et haec quidem in om-
nibus deprehenduntur: alia vero in singulis; quae simul at-
que de quoque dicam, proponenda erunt. Sed ut excidere
omnes articuli possunt, sic non omnes reponuntur. Caput
enim numquam compellitur, neque in spina vertebra, neque
ea maxilla, quae, utraque parte prolapsa, antequam repone-
retur, inflammationem movit. Rursum, qui nervorum vitio
prolapsi sunt, compulsi quoque in suas sedes iterum excidunt.

3. De tremore nervorum	119	Cap. XXVI. De ventris fluxu	151
4. Desuppuracionibus internis	ibd.	XXVII. De vulvae morbo	153
LIBER QUARTUS	120	2. De urinae nimia profusione	154
Cap. I. De humani corporis interioribus sedibus . ibd.		XXVIII. De seminis nimia ex naturalibus profusione	155
II. De curationibus morborum capitis	123	XXIX. De coxarum morbis	ibd.
III. De morbo qui circa faciem nascitur . . .	125	XXX. De genuum dolore	156
IV. De resolutione linguae	ibd.	XXXI. De manuum, pedum, articulorumque vitiis	ibd.
V. De destillatione ac gravedine	126	XXXII. De refectione convalescentium a morbo	158
VI. De cervicis morbis	127	LIBER QUINTUS	160
VII. De faucium morbis; et primum de angina	129	Prooemium. De medicamentorum facultatibus . ibd.	
VIII. De difficultate spirandi	130	Cap. I. De remediis quae sanguinem supprimunt	161
IX. De faucium exulceratione	131	II. Quae vulnus glutinent	ibd.
X. De tussi	132	III. Quae concoquant et moveant pus	ibd.
XI. De sanguinis sputo	133	IV. Quae aperiant ora in corporibus	ibd.
XII. De stomachi morbis	135	V. Quae purgent . . .	162
XIII. De latrum doloribus	138	VI. Quae rodunt . . .	ibd.
XIV. De viscerum morbis et primo de pulmone	139	VII. Quae exedant corpus	163
XV. De hepaticis . . .	140	VIII. Quae adurant . .	ibd.
XVI. De lienosis . . .	142	IX. Quae crustas ulceribus inducant . . .	ibd.
XVI. De renum morbis	143	X. Quae crustas ulceribus resolvant . . .	ibd.
XVIII. De intestinorum morbis, et primo de Cholera	ibd.	XI. Quae discutiant ea, quae in aliqua parte corporis coierunt . .	164
XIX. De coeliaco ventriculi morbo . . .	145	XII. Quae evocent et educant	ibd.
XX. De tenuioris intestini morbo	146	XIII. Quae exasperata laevent	ibd.
XXI. De morbo intestini plenioris	147	XIV. Quae carnem nutriant ut ulcus impleant	
XXII. De terminibus . ibd.			
XXIII. De laevitate intestinorum	149		
XXIV. De lumbricis alvum occupantibus . ibd.			
XXV. De tenesmo . . .	150		

Cap. XV. Quae molliant . . 165

XVI. Quae cutem purgent ibd.

XVII. De mixturis simplicium rerum et de ratione ponderum . ibd.

2. Quid malagma et emplastrum et pastillus inter se differant . . 166

XVIII. De malagmatis ibd.

1. Mal. adversus odagras ibd.
2. M. ad materiam extrahendam 167
3. M. ad jecur dolens ibd.
4. M. ad lienem ibd.
5. M. Lysiae commune pluribus ibd.
6. M. Apollopheanis ad laterum dolores. ibd.
7. M. Andrae ad idem 168
8. M. Polyarchi ad resolvendum, molliendum et digerendum ibd.
9. M. Nilei ad eadem ibd.
10. M. Moschi ad emolliendum ibd.
11. M. Medii ad digerendum ibd.
12. M. Panthemi ad eadem 169
13. 14. M. Andrae ad strumam ibd.
15. M. aliud ad idem ibd.
16. M. Arabis ad strumam et tubercula ibd.
17. M. aliud ad strumam et tubera ibd.
18. M. Protarchi ad parotidas ibd.
19. M. adversum panum et phymata ibd.
20. M. adv. ad omne tuberc. 170
21. M. ad supprimendum quod abscedit ibd.
22. M. ad sanguinem supprimendum ibd.
23. M. ad καρχινώδη lenienda ibd.
24. M. ad livorem faciei contusae ibd.
25. M. αναστομοτική ad aperiendum ibd.
26. M. Niconis ad resolvendum ibd.
27. M. Aristogenis ad ossa 171
28. M. Euthyclei ad articulos et ad omnem dolorem ibd.

29. M. Sosagorae ad dolorem articulorum 171
30. M. Chrysippi ad idem ibd.
31. M. Ctesiphontis ad idem ibd.
32. M. ad articulos ibd.
33. M. Aristonis adversus podagram ibd.
34. M. Theoxeni ad pedum dolores ibd.
35. M. Numenii ad podagram 172
36. M. Dexii ad callum in articulis ibd.

Cap. XIX. De Emplastris ibd.

1. E. barbarum nigrum, quod cruentis vulneribus injicitur ibd.
2. E. coacon ad idem ibd.
3. E. basilicon nigrum ad idem ibd.
4. E. smaragdinum ad idem 173
5. E. rufum ad idem ibd.
6. E. quod glutinat ad idem ibd.
7. E. Philotae cephalicum ibd.
8. E. viride ad idem ibd.
9. E. tetrapharmacum ad pus movendum ibd.
10. E. enneapharmacum ad idem ibd.
11. E. alia ad movendum pus et ad purgandum ibd.
12. E. ἐπισπαστική 174
13. E. aliud ad idem ibd.
14. E. Philocratis ad extrahendum ibd.
15. E. συνώδες ad extrahendum ibd.
16. E. Hecatei ad idem 175
17. E. Alexandrinum viride ad idem ibd.
18. E. exodentia ibd.
19. E. quod exest corpus, et ossa resolvit ibd.
20. E. adversus moras et vulnera, Diogenis nigrum ibd.
21. E. ephesium rubrum ibd.
22. E. ad id valens 176
23. E. lenia ibd.
24. E. elephantinum ibd.
25. E. alia lenia ibd.
26. E. aliud ad idem ibd.
27. E. Archagathi ad idem ibd.
28. E. ad leniendum apta ibd.

Cap. XX. De pastillis . . . 177

1. P. ad recentia ulnra . . . ibd.
2. P. *σφαγγίς* Polyidae . . . ibd.
3. P. ad ulcera sordida . . . ibd.
4. P. Andronis ad uvam inflatam . . . ibd.
5. P. ad ani fissam . . . ibd.
6. P. ad expellendum calculum . . . 178

Cap. XXI. De pennis . . . ibd.

1. P. ad evocandum sanguinem . . . ibd.
2. P. ad vulvam molliendam . . . ibd.
3. P. Boethi ad idem . . . ibd.
4. P. Numenii ad vulvae inflammationes . . . ibd.
5. P. ad ejiciendum infan-tem mortuum . . . ibd.
6. P. ad mulierem, quae vitio locorum concidit . . . ibd.
7. P. ad mulierem, quae non comprehendit . . . ibd.

Cap. XXII. De medicamentis quibus aridis utimur . . . 179

1. Mixturae aridae ad carnem supercrescentem . . . ibd.
2. M. a. ad carnem putrem . . . ibd.
3. Compositio Herae . . . ibd.
4. C. Judaei . . . 180
5. C. Jollae . . . ibd.
6. C. ad sanguinis profusum . . . ibd.
7. C. Timaei ad ignem sacrum . . . ibd.
8. C. ad sternumenta excitanda . . . ibd.
9. Gargarizationes quibus fieri debeant . . . ibd.

Cap. XXIII. De antidotis . . . ibd.

1. Compositio antidoti . . . 181
2. Antidotum ambrosiae . . . ibd.
3. Antidotum Mithridatis . . . ibd.

Cap. XXIV. De Acopis . . . 182

1. Acopum utile nervis . . . ibd.
2. A. *σώδες* iisdem utile . . . ibd.
3. A. *ἔχχιστα* . . . ibd.
4. A. ad ignem sacrum . . . ibd.

Cap. XXV. De catapotiiis . . . 183

1. C. *ἀνόδνα* . . . ibd.
2. C. valens ad somnum . . . ibd.
3. C. ad dolores leniendos . . . ibd.
4. C. aliud ad multa valens . . . ibd.

5. C. ad inducendum somnum, quem vulva dolens prohibuit . . . 184
6. C. ad jecur sanandum . . . ibd.
7. C. ad leniendos dolores lateris . . . ibd.
8. C. ad dolores thoracis . . . ibd.
9. C. Athenionis ad tussim . . . ibd.
10. C. Heraclidis ad tussim . . . ibd.
11. C. ad purganda ulcera in faucibus . . . ibd.
12. C. colice Cassii . . . ibd.
13. C. ad ejiciendum infan-tem mortuum . . . 185
14. Laborantibus ex partu quid dari debeat . . . ibd.
15. Ad adjuvandam vocem . . . ibd.
16. Adversus urinae difficultatem . . . ibd.
17. Arteriae . . . ibd.

Cap. XXVI. De quinque generibus nozarum corporis . . . 185

1. De vulneribus, in genere . . . 186
2. Quae vulnera insana-bilia sint . . . ibd.
3. Quae vulnera diffi-cilem curationem ha-beant . . . ibd.
4. Quae vulnera tutiorem curationem habeant . . . ibd.
5. Observationes in vul-neris genere et figura . . . 187
6. Aetatis observatio, et corporis, et vitae et temporis . . . ibd.
7. Signa eorum quae in-tus laesa sunt . . . ibd.
8. Signa percussis cordis . . . ibd.
9. „ „ pulmonis icti . . . ibd.
10. „ „ jecinoris vulne-rati . . . ibd.
11. Signa percussorum re-num . . . 189
12. Signa lienis vulnerati . . . ibd.
13. „ „ percussae vul-vae . . . ibd.
14. Signa cerebri percussis . . . ibd.
15. „ „ percussis stoma-chi . . . ibd.
16. Signa ventriculi et in-testinorum vulnerati . . . ibd.
17. Signa percussae me-dullae spinalis . . . ibd.
18. Signa septi transversis percussis . . . ibd.
19. Signa vesicae vulne-ratae . . . 189

20. De sanguine, sanie, pure et eorum speciebus 190
21. Curatio adversus profusionem sanguinis in vulneribus 190
22. Curatio adversus vulnorum inflammationem 191
23. De glutinatione vulnorum ibd.
24. Quomodo vulnus deligari conveniat 192
25. Quomodo vulnerato agendum sit 193
26. De notis vulnerum ibd.
27. De curationibus vulnerum 194
28. Curationes propriae articularum ibd.
29. Vulnus quomodo purgandum est 195
30. Quomodo vulnus implendum est ibd.
31. De ulceribus, quae extrinsecus per vulnera incidunt 196
32. Curatio veteris ulceris 197
33. " erysipelatum ibd.
34. " gangraenae 198
35. " vulnorum, ubi quid collisum est, aut detritum aut infixum 199
36. Quomodo cicatrix vulneri induenda sit ibd.
- Cap. XXVII. De curatione vulnerum, quae per morsus inferuntur 200**
1. De morsu, in genere ibd.
2. Curatio adversus rabiosi canis morsus ibd.
3. Curationes communes adversus omnes morsus serpentium 201
4. Curationes speciales adversus ictus serpentium, et primo aspidis 202
5. Adversus ictum scorpionis 203
6. Adversus aranei et scorpionis ictum ibd.
7. Adversus cerastis, et dipsadis, et haemorrhoidis ictum ibd.
8. Adversus chelydri ictum ibd.
9. Advers. phalangii ictum ibd.
10. Adversus serpentium Italorum ictum ibd.
11. Remedium generale adversus omnia venena vel in cibo, vel in potu assumpta 204.
12. Specialia remedia adversus quaedam venena 204
13. De adustis corporis locis, et quomodo curari debeant ibd.
- Cap. XXVIII. De interioribus ulceribus, quae aliqua corporum parte corrupta nascuntur 205**
1. De carbunculo ibd.
2. De carcinomate 206
3. De thieriomate 207
4. De sacro igne 206
5. De chironio ulcere 209
6. De ulceribus, quae ex frigore in pedibus et manibus oriuntur 210
7. De struma ibd.
8. De furunculo ibd.
9. De phymate 211
10. De phygethlo ibd.
11. De abscessibus ibd.
12. De fistulis 213
13. De ulcere quod *κνηφίω* Graeci vocant 216
14. De arcochordone et thymio, et myrmecis et clavo ibd.
15. De pustularum generibus 215
16. De scabie 219
17. De impetiginis speciebus 218
18. De papulis 220
19. De vitiliginis speciebus 221
- LIBER SEXTUS 222**
- Cap. I. De vitiis singulorum corporis partium ibd.**
- II. De porrigine ibd.**
- III. De Sycosi 223**
- IV. De Areis ibd.**
- V. De varis, lenticulis et ephelidis 224**
- VI. De oculorum morbis 225**
1. De ocul. morbis, in genere ibd.
2. De diversis oculorum collyriis 227
3. Collyrium Philonis 228
4. " Dionysii ibd.
5. " Cleonis ibd.
6. " Theodoli ibd.
7. " Cythion vel tephrium ibd.
8. Collyrium Euelpidis trygodes 229
9. Collyrium Nilaei, omnium optimum 230

10. De carbunculis oculorum	231	3. Compositiones ad omnia aurium vitia	241
11. De pusulis oculorum	ibd.	4. De ulcere sordido aurium	242
12. Collyrium Philalethes ad pusulas oculorum	ibd.	5. Adversus aurium vermes	ibd.
13. De ulceribus oculorum, et de collyrio <i>διὰ λίβανον</i>	ibd.	6. Ad compressa aurium foramina	ibd.
14. De immutatione oculorum	232	7. Ad gravem auditum	ibd.
15. De pediculis palpebrarum	ibd.	8. Ad sonitum aurium intra se ipsas	243
16. De oculorum gravioribus morbis	ibd.	9. Ad ea, quae in aurem inciderunt, extrahenda	ibd.
17. Collyrium Euelpidis <i>μεμιγμένον</i> nominatum	233	Cap. VIII. De narium morbis	244
18. De oculorum ulceribus supererescitibus, sordidis, cavis, veteribus	ibd.	1. De naribus exulceratis	ibd.
19. Collyrium sinilion	ibd.	2. De carnosis carunculis narium	245
20. C. Euelpidis chiron	ibd.	Cap. IX. De dentium dolore	ibd.
21. C. ejusdem sphaerion	ibd.	X. De tonsillarum inflammatione	247
22. C. ejusdem liquidum	234	XI. De oris ulceribus	248
23. De cavis oculorum ulceribus	ibd.	XII. De linguae ulceribus	250
24. Collyrium Hermonis	ibd.	XIII. De parulidibus et ulceribus gingivarum	ibd.
25. De cicatricibus oculorum; de collyriis asclepio, et canopite et pyxino	ibd.	XIV. De uvae morbo	251
26. 27. De alio genere inflammationis oculorum. Collyrium caesarianum	235	XV. De cancro oris	252
28. Collyrium Hieracis	ibd.	XVI. De parotidibus	253
29. De arida lippitudine	ibd.	XVII. De umbilico prominente	ibd.
30. Collyrium rhinion	236	XVIII. De obscoenarum partium vitiiis	ibd.
31. Collyria ad oculos scabros	ibd.	1. De obscoenis vocabulis	ibd.
32. De caligine oculorum	237	2. De collis morbis	254
33. Collyrium <i>διὰ κρόκου</i>	ibd.	3. De cancro collis	256
34. De caligine, quae propter senectutem aut aliam imbecillitatem fit	ibd.	4. De phagedaena collis	ibd.
35. De suffusione oculorum	ibd.	5. De carbunculo collis	257
36. De resolutione oculorum	ibd.	6. De testiculorum morbis	ibd.
37. De mydriasi oculorum	238	7. De ani morbis. De rhagadiis	ibd.
38. De imbecillitate oculorum	ibd.	8. De condylomate	258
39. Ad oculos, qui quum sanguine suffusi sunt, extrinsecus offenduntur	ibd.	9. De haemorrhoidibus	259
Cap. VII. De aurium morbis	239	10. Si anus, vel os vulvae procidit, qua curatione utendum sit	ibd.
1. De inflammat. et dolore aurium	ibd.	11. De fungo ani, aut vulvae	260
2. De pure et malo odore aurium	240	Cap. XIX. De digitorum ulceribus	ibd.
		LIBER SEPTIMUS	262
		Praef. De chirurgia, ejusque historia, et de optimi Chirurgi qualitatibus	i

- Cap. I. De luxatis . . . 263
- II. De his quae per se intumescunt, quomodo incidenda et curanda sint . . . 264
- III. De bonis malisque signis suppuratorum 266
- IV. De fistulis . . . ibd.
1. De fistulis, in genere . . . ibd.
2. De costarum fistulis . . . 267
3. De ventris fistulis . . . ibd.
4. De ani fistulis . . . 265
- V. De telis e corpore extrahendis . . . 269
1. De telis, in genere . . . ibd.
2. De sagittis recipiendis . . . 270
3. De latis telis educendis . . . ibd.
4. De alio telorum genere . . . ibd.
5. De venenato telo evellendo . . . 271
- VI. De gangliis, de meliceride, et atheromate, et steatomate, et capitis tuberculis . . . ibd.
- VII. De oculorum vitiis, quae scalpello et manu curantur . . . 272
1. De vesicis palpebrarum . . . ibd.
2. De erithis . . . 273
3. De chalaziis . . . ibd.
4. De ungue oculorum . . . ibd.
5. De encanthis . . . 275
6. De ancyloblepharo . . . ibd.
7. De aegilope . . . 276
8. De pilis palpebrarum . . . ibd.
9. De lagophtholmo . . . 275
10. De ectropio . . . ibd.
11. De staphylomate . . . ibd.
12. De clavis oculorum . . . 279
13. De oculorum natura . . . ibd.
14. De suffusione oculorum . . . 280
15. De pituita oculorum . . . 281
- Cap. VIII. De aurium morbis, qui manu et scalpello curantur . . . 283
- IX. Curta in auribus, labrisque ac naribus, quomodo sarciri et curari possint . . . 284
- X. De polypo . . . 286
- XI. De ozaena . . . ibd.
- Cap. XII. De oris vitiis, quae manu et ferro curantur . . . 287
1. Si dentes moveantur . . . ibd.
2. De tonsillis induratis . . . 288
3. De inflamm. uvulae . . . ibd.
4. De lingua fremata . . . ibd.
5. De abscessu sub lingua . . . 289
6. De labris fissis . . . ibd.
- XIII. De cervicis vitio . . . 290
- XIV. De umbilici vitiis . . . 290
- XV. Quomodo aqua hydropicis emittatur . . . 292
- XVI. De ventre ictu perforato, et intestinis vulneratis . . . 293
- XVII. De interiori membrana abdominis rupta . . . 294
2. De varicibus ventris . . . 295
- XVIII. De testiculorum morbis . . . ibd.
- XIX. De testiculorum curationibus, et primo de incisione, et curatione inguinis vel scroti . . . 297
- XX. De intestini in scrotum devoluti curatione . . . 300
- XXI. De omenti in scrotum prolapsi curatione . . . 302
2. De herniae aquosae curatione . . . ibd.
- XXII. De ramicis curatione . . . 303
- XXIII. De carne quae inter tunicas testiculorum increvit, et de nervo indurato . . . 304
- XXIV. De ramice inguinis . . . ibd.
- XXV. Ad tegendam glandem colicis, si nuda est . . . 305
2. Quomodo glans colicis contacta aperiri possit . . . ibd.
3. Infibulandi ratio . . . 306
- XXVI. De mingendi difficultate et curatione . . . ibd.

2. Calculosis quae curatio adhibenda	307	nia ossa pertinenti- bus	340
3. Signa calculorum vel arenosorum, vel mol- lium	311	Cap. VIII. De jugulo fracto	341
4. De calculis mulierum	ibid.	2. De diversis ossium cu- ris	342
5. Quae curatio calculo evulso habenda sit	312	IX. De costis fractis	ibid.
Cap. XXVII. De cancro qui, excisa vesica, nasci- tur	314	2. De spina fracta	344
XXVIII. De naturalium feminarum concubi- tum non admitten- tium curatione	316	X. De humerorum, bra- chiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum curatione	ibid.
XXIX. Qua ratione par- tus emortuus ex utero excutiatur	ibid.	1. De membris fractis, in genere	ibid.
XXX. De ani vitiis	319	2. De humero fracto	347
1. De callis in ano	ibid.	3. De brachio fracto	348
2. De condylomat.	ibid.	4. De cubito fracto	ibid.
3. De haemorrhoidibus	ibid.	5. De cruribus, femori- busque fractis	ibid.
XXXI. De varicibus	320	6. De digito fracto	349
XXXII. De digitis co- haerentibus et cur- vatis	321	7. Communes curationes ad humeros, brachia, femora, crura, digitos- que contractos perti- nentes	ibid.
XXXIII. De gangraena	ibid.	XI. De ossibus luxatis	352
LIBER OCTAVUS	323	XII. De maxilla luxata	353
Cap. I. De positu et figura ossium totius humani corporis	ibid.	XIII. De capite luxato	354
II. Ossa vitiata et cor- rupta quibus signis cognoscantur, et qua ratione curentur	329	XIV. De spina luxata	ibid.
III. Quomodo os exci- datur	330	XV. De humero luxato	355
IV. De calvaria fracta	333	XVI. De cubito luxato	357
V. De naso fracto	338	XVII. De manu luxata	358
VI. De auribus fractis	339	XVIII. De palmarum luxata	ibid.
VII. De maxilla fracta, et quibusdam ad om- nia ossa pertinenti- bus		XIX. De digitis luxatis	ibid.
		XX. De femore luxato	359
		XXI. De genu luxato	360
		XXII. De talo luxato	361
		XXIII. De planta lu- xata	ibid.
		XXIV. De digitis lu- xatis	ibid.
		XXV. De his, quae cum vulnere loco moven- tur	362

INDEX

NOMINUM PROPRIORUM.

Prior numerus paginam, posterior versum indicat.

- | | |
|--|------------------------------------|
| Aesculapius 1, 10. | Ctesiphon 171, 23. |
| Agamemnon 1, 13. | Democritus 2, 13. 38, 10. |
| Ajax 101, 33. | Dexius 172, 10. |
| Ammonius 262, 24. 311, 26. | Diocles Carystius 2, 17. 115, 16 |
| Andreas 160, 9. 168, 3. 169, 7. | 146, 6. 270, 26. 359, 29. |
| 232, 38. 359, 23. | Diogenes 175, 26. 200, 26. |
| Andron 177, 26. 251, 25 (<i>medicam.</i> | Dionysius 228, 8. 259, 29. |
| <i>andronium</i>). 255, 12, 16. | Empedocles 2, 13. |
| Antigoni Regis Medicus, Chry- | Epicurus 106, 25. |
| sippi discipulus 106, 15. | Erasistratus 2, 18. 3, 27. 4, 17. |
| Apollonius empiricus 2, 30. | 4, 37. 8, 29. 9, 28. 10, 13, 27. |
| Apollonii duo 262, 24. | 79, 16. 80, 9. 91, 4, 17. 92, |
| Apollonius Mys 160, 9. | 19. 109, 7. 135, 1. 144, 21. |
| Apollophanes 167, 34. | 146, 20. 158, 27. 160, 5. 240, |
| Arabs medicus (?) 169, 22. | 38. 254, 36. |
| Archagathus 176, 26. | Euelpides 229, 1. 233, 14, 32. |
| Aristogenes 171, 3. | 234, 36. 236, 22. |
| Ariston 171, 33. | Euelpistus 263, 3. |
| Asclepiades 2, 36. 3, 28. 4, 20. | Euthycleus 171, 10. |
| 5, 26. 17, 3. 18, 25. 38, 15. | Glaucias 2, 30. |
| 56, 34. 58, 23, 31. 60, 30. | Gorgias 262, 23. 290, 20. |
| 62, 25. 78, 21. 31. 79, 24. 80, | Hecataeus 175, 4. 199, 32. |
| 35. 81, 28. 87, 13. 95, 11. 99, | Heracclides Tarentinus 2, 31. 85, |
| 4, 15. 100, 26. 107, 27. 115, | 17. 96, 18. 184, 26. 275, 31. |
| 28. 128, 8. 132, 7. 135, 3. | 359, 30, 34. |
| 151, 29. 160, 11. 241, 26. | Heras 179, 37. 209, 24. 246, 36. |
| Atthenion 184, 21. | Heron 234, 18. |
| * Attalum (<i>medicam.</i>) 174, 3. 228, | Heron 262, 24. 290, 22. |
| 16. | Herophilus 2, 18. 3, 22. 4, 37. |
| Boëthus 178, 21. | 5, 26. 91, 4, 17. 160, 6. 279, 33. |
| Cassius 11, 38. 147, 20. 184, 35. | Hierax 235, 31. |
| Chrysippus 2, 18. 106, 14. 171, 21. | Hippocrates 2, 14. 3, 22. 4, 19. |
| Cleon 228, 11. 230, 17. 231, 27. | 5, 25. 8, 29. 11, 18. 27, 5. |
| Cleophantus 95, 8. | 59, 2. 80, 27. 81, 10. 91, 5, 15. |
| Craton 241, 13. 254, 37. | 115, 13. 126, 16. 149, 26. 226, |

7. 262, 19. 333, 27. 341, 23. Philippus Epirotes 106, 17.
 355, 11. 356, 21. 359, 28, 33. Philon 228, 1.
 362, 10. Philocrates 174, 28. 199, 31.
 Homerus 1, 15. Philotas 173, 16.
 Iollas 180, 8. Philotimus 359, 29.
 Irenaeus 221, 24. Philoxenus 262, 21.
 Judaeus 174, 8. 180, 4. Plistonicus 4, 18.
 Lysias 167, 29. Podalirius 1, 12.
 Machaon 1, 13. Polyarchus 168, 23. 343, 24.
 Medius 168, 35. Polyides 177, 15. 192, 21.
 Meges 210, 26. 215, 10. 263, 4. Praxagoras 2, 17. 4, 18.
 264, 16. 276, 2. 290, 16. 310, Protarchus 169, 32. 219, 23. 220,
 20. 360, 31. 20, 35. 350, 33.
 Menemachus 247, 1. Ptolemaeus Rex 181, 18.
 Menophilus 241, 7. Ptolemaeus 241, 5.
 Metrodorus 106, 25. Pythagoras 2, 13.
 Mithridates 181, 27. Serapion 2, 27. 220, 20.
 Moschus 168, 30. Sosagoras 171, 18.
 Myron 220, 36. 221, 28. Sostratus 262, 23. 267, 28. 290,
 *Nicon 169, 12 (cf. *Adn. critt.*). 17.
 170, 37. Tharrias 104, 25. 109, 2.
 Nileus 168, 26. 230, 19. 231, 16, Themison 2, 38. 9, 31. 10, 33.
 27. 359, 30, 33. 79, 26. 81, 34. 148, 20. 240, 19.
 Numenius 172, 4. 178, 24. Theodotus 228, 21, 25.
 Nymphodorus 359, 33. Theoxenus 171, 38.
 Orestes 101, 34. Timaeus 180, 18.
 Panthemus 169, 1. Tryphon pater 225, 1. 263, 2.
 Petron 91, 5. Zenon 160, 9.
 *Philaethes 231, 28. 234, 13. Zopyrus 161 18.
-

INDEX VERBORUM

NOTATU DIGNORUM *).

A.

- Abdomen. IV 1 (122, 37). abdominis membrana *ibid.* et VII, 17. imum abdomen VII, 26, 2 (308, 23).
- Abellana seu avellana. III, 27, 4.
- Abortus. II, 1 (30, 2); II, 8 (51, 4).
- Abrotonum (*Artemisia abrot.*). urinam movet III, 21 (107, 14). purgat V, 5. discutit V, 11.
- Abscedo. II, 7; V, 21; VII, 2, 1; VII, 7, 7; VII, 12, 5.
- Abscessus. II, 8 (49, 4); V, 28, 11.
- Absinthium (*Artemisia abs.*). stomacho aptum II, 24. urinam movet II, 31. incoctum IV, 16.
- Abstinencia. abstinentiae duo genera II, 16. saepe inutilis nimia abstinentia I, 2 (15, 14).
- Abstineo *absolute*. III, 4 (80, 2); III, 12; III, 13; III, 15.
- Acacia (*Mimosa arabica*). sanguinem supprimit V, 1. acaciae succus corpus exedit V, 7.
- Acanthinum gummi (*Gummi acaciae arabicae*). vulnera glutinat V, 2.
- Accessio. *accessio febris* II, 12, 2. *acc. morbi comittalis* II, 8 (46, 5).
- Accipio *intelligo*. VIII, 14.
- Acer. acria mali succi sunt II, 21. nimis austera etc. II, 22. abstinere ab acribus IV, 17. acrioribus utendum est IV, 5. manducare quae sunt acerrima IV, 4. acria medicamenta, et acres cibi VI, 6, 14. curatio acer VI, 6, 1 (226, 21).
- Acerbus. mali succi sunt acerba II, 21. acerbum oleum II, 33.
- Acesco. res in stomacho acescunt II, 19. cibus acescit cet. I, 8.
- Acetabulum. V, 24, 2; V, 18, 15.
- Acetum. in media materia est II, 18 (66, 14). acetum acre IV, 16. ac. ex scilla VI, 15. ac. scilliticum V, 19, 19. ac. acerrimum IV, 9.
- Acia. V, 26, 23.
- Acida. stomacho apta sunt II, 24. pituitam extenuant II, 23. acida adv. lienem IV, 16.
- Acies *oculorum*. VI, 6, 37.
- Acinus. r. *Σταφύλωμα*.
- Acopum. acopa utilia nervis V, 24. acopo articuli perfricentur IV, 31 (158, 21).
- Acorum (*Ac. calamus*). urinam movet III, 21 (107, 15).
- Actio naturalis. I, *prooem.* 4, 9.

*) Numeri romani libros indicant, arabici vero capita, vel si duo deinceps leguntur, caput et paragraphum. Quum vero interdum nimia capitum vel paragraphorum prolixitas faciliem cuiusvis loci Celsiani inventionem impediret, passim numeris uncia inclusis designavi paginam et lineam. — Quod ad nomina attinet quibus nostri aevi botanici plantas designant, duces secutus sum vel Fraas (*Synopsis plantarum florum classicarum*) vel Lenz (*Botanik der alten Griechen und Römer*).

- Aculeus. VIII, 10, 7 (350, 33).
 Acumen. VIII, 10, 7.
 Acus. VII, 7, 8; VII, 7, 14.
 Adeps. sensu caret IV, 1 (122, 16).
 concoquit et movet pus V, 3.
 purgat V, 5. mollit V, 15. recens adeps? III, 7, 2. vetustissima IV, 64 (128, 27). anserina V, 21 (178, 26). leonina *ibid.* recens suilla IV, 27, 1. ex fele II, 33.
 Adglutino. mentum pectori agglutinare VIII, 13. agglutinanda cucurbitula VII, 26, 5 (312, 21).
 Adjuvans. VI, 6, 8.
 Adolescens. famem facilius quam puer sustinet I, *prooem.* (12, 22).
 Adolescentia. labor longam adolescentiam reddit I, 1 (13, 14). acutis morbis adolescentia magis patet II, 1 (28, 23).
 Adolescentulus. articuli facile excidunt in pueris et adolescentulis VIII, 11 (352, 22).
 Adstringens. adstringentes cibi IV, 26 (151, 15).
 Adstringo. alvum adstringit labor cet. I, 3 (20, 22).
 Adversus medicus. III, 6 (86, 22); VIII, 10, 2.
 Adurens. medicamenta adurentia V, 28, 2; V, 28, 7.
 Aegyptius. *vid.* Alumen, Faba.
 Aegyptus. VII, *prooem.* (262, 21); III, 4 (79, 24).
 Aerugo. reprimat V, 2. purgat V, 5. rodit V, 6. exedit V, 7. crustas ulceribus inducit V, 9. aer. rasa V, 18, 2; V, 19, 8.
 Aes. combustum rodit V, 6. aeris flos exedit V, 7. sanguinem supprimit squama aeris; duae species V, 1. squama aeris purgat II, 12, 1; V, 5. exedit V, 7. adurit V, 8. lenissima ex adurentibus est V, 28, 2. squama aeris, quod *σρόμαμα* appellant VI, 6, 5.
 Aestas. periculosior est II, 1 (27, 22). pueri proximique his.. aestate prima tutissimi sunt II, 1 (30, 19). inimicior senibus hiems, aestas adolescentibus est II, 1 (30, 22). aestate et cibo et potione saepius corpus eget I, 3 (21, 16). aestate in totum, si fieri potest, *venere* abstinendum est *ibid.* (21, 34). si sicca aestas aquilones habuit cet. II, 1 (30, 10). aestas non quidem vacat plerisque his morbis, sed adjicit febres cet. II, 1 (28, 35).
 Aestuans. III, 19 (104, 5); I, 3 (17, 36).
 Aestus. I, 10; II, 17 (63, 24); II, 8 (47, 10); III, 5 (82, 19); V, 26, 31.
 Aetates. *in genere* I, 3 (20, 31).
 Agito. *exaspero*, *irrito*. V, 28, 2. *tracto*. VII, 26, 3 (311, 22); I, *prooem.* (2, 5).
 Agnus. II, 18 (65, 31).
 Agricola. I, *prooem.* (6, 5).
 Agricultura. I, *prooem.* (1, 1).
 Ala. humerus in alam excidit VIII, 15 (355, 25). avium alae, colla cet. II, 18 (65, 33).
 Alcyonium. V, 28, 19; rodit V, 6. exedit V, 7.
 Alexandria. III, 22 (111, 21).
 Alexandrinus. *v.* Calamus, Emplastrum.
 Alica. elota II, 18 (66, 8). alica boni succi est II, 20. crassiorem pituitam facit II, 23. danda est elota alica ex aqua mulsa IV, 14 (140, 8).
 Alienatio mentis. IV, 2 (123, 13).
 Alienatus. V, 26, 23 (191, 27).
 Alimentum. VIII, 10, 7 (349, 11); IV, 13 (139, 13); II, 18 (64, 18). II, 18 (64, 34); II, 18 (66,

- Allium** (*A. sativum*). II, 18 (65, 5).
allium mali succi II, 21. acre II, 22. inflat II, 26. calefacit II, 27. alvum movet II, 29. allium frictum IV, 8. spica allii IV, 10. allii semen V, 21, 1. contra lumbricos IV, 24.
- Allobrogicus**. v. Vinum.
- Aloe**. sanguinem supprimit V, 1. qui dejicere vult aloen sumat I, 3 (20, 5).
- Alumen**. sanguinem supprimit V, 1. aperit V, 4. exedit V, 7. alumen rotundum evocat et educit V, 12. alumen liquidum rodit, sed magis rotundum V, 6. alumen scissile adurit V, 8. alumen et scissile, quod *αλυστόν* vocatur, et liquidum reprimunt V, 2. alumen aridum; al. melinum rotundum VI, 19. alumen aegyptium V, 28, 12 (215, 6).
- Alvus**, pro ea capacitate qua ventriculus, intestina, jecur, lienis, renes, vesica, vulva continentur. I, prooem. (7, 16). uterus III, 21 (108, 31) et passim. — pro intestinis II, 12, 2 (56, 33); IV, 19. pro materia quam intestina infra emittunt IV, 26 (151, 4) et passim.
- Amaracus** (*Origanum majorana*). discutit V, 11.
- Amaritudo**. V, 27, 2.
- Amarus**. amara calefaciunt I, 3 (20, 10). mel quam amarissimum VI, 5.
- Ambrosia**. V, 23, 2.
- Ambubeja** (*Cichorium intybus*). alvum adstringit II, 30.
- Ambulatio**. I, 2 (14, 32); IV, 16; I, 3 (20, 16); III, 23; III, 27, 3; III, 27, 4; IV, 8; IV, 10; IV, 31; V, 26, 28; VII, 12, 1.
- Ammoniacum** (*Gummi ammon.*). purgat V, 5. discutit V, 11. ammoniac. thymiana V, 18, 7 et passim.
- Ammoniacus**. v. Sal.
- Amomum** (*Ossus vittiginea?*). urinam movet III, 21 (107, 11). somnum provocat III, 18 (100, 25).
- Amurca**. VI, 19; V, 28, 16.
- Amylum**. boni succi est II, 20. lene est II, 22. crassiorem pituitam facit II, 23. contrahere semen videtur IV, 28.
- Anethum** (*A. graveolens*). mali succi est II, 21. inflationes levat II, 26. alvum movet II, 29. urinam movet II, 31.
- Angina**. IV, 7; II, 10 (53, 18); II, 7 (42, 36).
- Anguis**. V, 27, 10.
- Angulus oculorum**. VII, 7, 8. anguli laborum VII, 9.
- Anhelatio**. v. *ἄσθμα*.
- Anima**. II, 1 (29, 24); VII, 3.
- Anisum** (*Pimpinella anisum*). mali succi est II, 31. urinam movet II, 21.
- Anser**. generis valentissimi est II, 18 (64, 20).
- Anserinus**. v. Adeps.
- Antidotum**. V, 25, initio; cf. § 1; V, 25, 2; V, 25, 3.
- Anus**. IV, 25; VI, 18, 7; VII, 30, 1.
- Aper**. generis valentissimi II, 18 (64, 20).
- Apium** (*A. graveolens*). urinam movet II, 31. reprimet et refrigerat II, 33. apii semen rodit V, 6.
- Aqua**. aqua omnium imbecillissima II, 18 (66, 16). levissima pluvialis II, 18 (66, 23). quam optima aqua VI, 11. aqua pluvialis II, 30. pluvialis VI, 6, 16. dulcis VI, 18, 9. marina II, 12, 2 (57, 26). salsa III, 24. tepida subsalsa III, 12. tenera II, 29. dura, id est quae tarde putrescit II, 30. tepida VI, 7, 4. calida VI, 18, 7. bene calida *ibid.* egelida I, 8. bene frigida

- IV, 22. gelida IV, 12 (135, 34).
 praefrigida II, 30. quam frigidissima IV, 26 (151, 29). decocta III, 23 (114, 34). aqua pura II, 12, 2. aqua mulsa IV, 7 *et passim*. aqua a ferrario fabro IV, 16 (142, 19). prodest interdum aquis frigidis uti I, 3 (13, 15). aquae calidae in morbis oculorum VI, 6, 37.
- Aqua inter cutem. III, 21 (105, 28); II, 8 (45, 26); II, 8 (48, 31); III, 8 (49, 3).
- Aquilo. II, 1 (29, 16); II, 1 (30, 13).
- Aranea. V, 2.
- Araneus. V, 27, 6
- Ardens. v. Febris.
- Area. VI, 4.
- Argemonia (*Papaver argemone*). V, 27, 10.
- Argentum. v. Spuma.
- Aristolochia (*A. pallida et boetica*?) corpori infixa educit V, 26, 35. cretica V, 18, 7
- Armoracia (*Raphanus rusticanus*?). IV, 16.
- Aroma. III, 21 (107, 18).
- Arquatus morbus. III, 24 II, 4 (34, 27); II, 8 (50, 5).
- Artatus fasciae artatae VI, 18, 8.
- Arteria. II, 10 (54, 27); I, *prooem.* (10, 26); IV, 1 (120, 10). arteria aspera IV, 11 (133, 35).
- Arteriace. v. Catapotium.
- Articulus. IV, 29 *et passim*. articulorum dolores vel morbi II, 7 (39, 30); II, 8 (45, 37); II, 8 (49, 6); IV, 31.
- Arundo (*Arundo donax*?). V, 26, 35. VI, 7, 1 (240, 3).
- Asia. III, 4 (79, 23).
- Aspalathus (*Mimosa*? seu *Genista acanthoclada*). V, 27, 1.
- Asparagus (*A. acutifolius* seu *aphyllus*?). mali succiest II, 21. acris est II, 22. alvum movet II, 29. urinam movet II, 31.
- Aspis. V, 27, 4.
- Asphodelus (*A. ramosus seu luteus*). V, 27, 7.
- Aspredo. V, 28, 2 (206, 27) *et passim*.
- Aspritudo. V, 28, 15; VII, 26, 2; VII, 23; VI, 6, 26.
- Assius. v. Lapis.
- Assus. II, 18 (66, 5); IV, 26 (151, 25).
- Asteriace. V, 25, 17.
- Athleta. I, 2 (15, 7).
- Atramentum *scriptor.* seu *autor.* V, 1; V, 6; V, 7. V, 8; V, 19, 15; VI, 8, 1; VIII, 4 (334, 10).
- Aucupium. II, 26.
- Avis. II, 18 (64, 20); II, 18 (64, 26); II, 18 (65, 11); II, 29; II, 30; II, 18 (65, 33); II, 28; IV, 16.
- Aura. I, 2 (14, 14).
- Aurata. v. Piscis.
- Auricula. auricularum dolores II, 1 (28, 36).
- Auripigmentum. reprimat V, 2. purgat V, 5. rodit V, 6. exedit V, 7. adurit V, 8. crustas ulceribus inducit V, 10.
- Auris. VIII, 1 (324, 24); VI, 7, 1; VII, 8. aures imae VII, 9; aurium morbi VI, 7, 1. II, 7 (42, 25); VI, 7, 8; II, 8 (47, 13); II, 6 (36, 6); VI, 10.
- Auster. II, 1 (29, 19); I, 5; I, 10.
- Austerus. res austerae corpus extenuant I, 3 (18, 20). austera alvum adstringunt II, 30.
- Autumnus. I, 3; II, 1.

B.

- Bacca. bacca VI, 9. lauri *ibid.*; III, 20. myrti IV, 26 (152, 15).
- Balanon myrepsicon (*Nux hyperantherae moringae*?) V, 18, 4; 17 (62, 12).
- Balneum. I, 1 (13, 15); II, 17

- 20); V, 27, 12; I, 3 (17, 3); III, 22 (111, 2); III, 22 (111, 12); IV, 11 (135, 17); IV, 12 (137, 2); V, 26, 28; III, 21 (109, 28); I, 6.
- Balsamum** (succus *Amirys Gileadensis*). concoquit et movet pus V, 3. aperit V, 4. purgat V, 5. rodit V, 6. mollit V, 15. balsami lacrimae V, 18, 3. balsami seminis *ibid.* et V, 23, 1.
- Barba**. v. *Ἀλωπεύλα*, *Σύνωσις*.
- Barbarus**. v. Emplastrum.
- Basis**. cerebri V, 26, 2. testiculi VII, 19 (298, 29); ima basis *umbilici* VII, 14 (291, 20). *venae* VII, 30, 3. cutis VII, 25, 2.
- Bdellium** (succus *Amirys Kataf?*). aperit V, 4. purgat V, 5. mollit V, 15.
- Bellua marina**. II, 18 (64, 21).
- Bes**. V, 19, 19.
- Beta** (*Beta vulgaris*). mali succi est II, 21. lenis est II, 22. refrigerat II, 27. alvum movet II, 29. beta alba (*Beta cicla*) III, 24.
- Biliosus**. vomitus *utilis biliosis* I, 3 (19, 3). vom. biliosus II, 7 (40, 33); V, 26, 10; V, 26, 26. biliosa in stomacho III, 12 (94, 2).
- Bilis**. IV, 18; VII, 18 (296, 19); VII, 23. bilis atra I, 1 (28, 30); II, 7 (41, 32); III, 18 (101, 14); II, 8 (46, 28).
- Bitumen**. concoquit et movet pus V, 3. discutit V, 11.
- Botrytis**. v. *Cadmia*.
- Brachium**. VIII, 10, 3; VIII, 1 (327, 11).
- Brassica** (*Br. oleracea*). inflat II, 21. magisque etiam cyma ejus mali succi est *ibid.* si subcruda est, alvum movet II, 29. bis decocta alvum adstringit II, 30. brassicae folia simul et reprimunt, et refrigerant II, 33. semen brassicae II, 24.
- Bubula**. II, 28; IV, 12 (137, 10); bubulus IV, 16 (142, 27).
- Bucca**. V, 26, 23.
- Bulbus** (in specie *Muscari comosum*). ex media materia II, 18 (64, 25). bulbi mali succi sunt II, 21. bulbi lenes sunt II, 22. bulbi crassiorem pituitam faciunt II, 23. inflant II, 26.
- Bullulae** in urina. II, 5.
- Butyrum**. carnem alit et ulcus implet V, 14. mollit V, 14; butyrum recens VIII, 4 (337, 4).

C.

- Cachrys** (*C. cretica?*). V, 18, 5.
- Cadmia**. exedit V, 7. cadmia curata VI, 6, 5. cadmia elota VI, 6, 21. cadmia botrytidis elota VI, 6, 6.
- Caesarianus**. v. Collyrium.
- Caesius**. v. *Ταλοειδής*.
- Calamus**. alexandrinus (*C. aromaticus?*) V, 24, 1. scriptorius V, 28, 12 (215, 24); VII, 11 et *passim*.
- Calceamentum**. VIII, 22.
- Calculosus**. II, 7 (41, 3).
- Calculus**. II, 7 (41, 8); VII, 26, 1 (307, 13); VII, 26, 2; VII, 26, 3.
- Calidarium**. I, 4 (22, 13).
- Caligare**. VI, 6, 32.
- Caligo**. I, 3 (19, 38); IV, 2 (123, 12).
- Callus**. V, 26, 31 (196, 17); V, 28, 12 (214, 38); V, 28, 12 (215, 33); VIII, 4 (335, 20); VIII, 10, 7.
- Calvaria**. VIII, 1 (323, 5).
- Calx**, os. VIII, 1 (328, 36).
- Calx**. rodit V, 6. exedit V, 7. adurit V, 8.
- Canaliculus**. VIII, 8 (342, 10); VIII, 19.
- Canalis**. I, 4 (22, 19); IV, 12 (137, 4); VIII, 10, 5.
- Cancer**. V, 26, 31; *ibid.* 24; VII, 9; VIII, 10, 1; VI, 15; VI, 18, 3; V, 22, 6; VII, 27.

- Canis. V, 27, 1; V, 27, 2.
 Canopita. v. Collyrium.
 Cantabrica herba (*Convolvulus cant.*?). V, 27, 10.
 Cantharides. adurunt V, 8. cantharides purgatae V, 28, 18. si cantharidas aliquis ebibit V, 27, 12.
 Capillus. capillis fluentibus VI, 1.
 Capitulum. capitula venarum VI, 18, 9.
 Capparis et cappari (*C. spinosa*). IV, 16. alvum movet II, 29. urinam movet II, 31. cortex IV, 29. radix IV, 8.
 Caprea. valentissimi generis est II, 18 (64, 19).
 Capreoli. reprimunt et refrigerant II, 33 (73, 9).
 Caprificus (*Ficus carica*). lac caprifici exedit V, 7. adurit V, 8.
 Caput. IV, 2 (123, 7).
 Carbunculus. V, 28, 1; VI, 6, 10; V, 18, 5.
 Carcinoma. V, 28, 2.
 Cardamomum (*Amomum c.*). urinam movet III, 21 (107, 13). glutinat vulnus V, 2. rodit V, 6. mollit V, 15.
 Cardiacus. III, 18 (101, 9).
 Cardio. VIII, 1 (325, 1).
 Caries. V, 28, 12; VIII, 2 (329, 24); VIII, 2 (330, 11).
 Cariocus. VIII, 2 (329, 11); VIII, 2 (330, 15).
 Carnosus. I, 3 (20, 10); II, 8 (45, 20); IV, 22.
 Caro. tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat II, 10 (52, 28).
 Carnes ad victum pertinentes II, 20; II, 21; II, 22; II, 24; II, 27; II, 29; II, 30; V, 28; c. elixa aut assa I, 2 (15, 17); III, 23.
 Cartilaginosis. IV, 1 (120, 20); VIII, 8, 2.
 Cartilago. VIII, 1 (326, 4).
 Caruncula. VII, 7, 4; VIII, 1 (324, 19); VI, 8, 2; VII, 7, 9; V, 26, 31; VII, 27 (314, 9).
 Caseus. generis valentissimi est II, 18 (64, 24). caseus mollis boni succi est II, 20. vetus mali succi est II, 21. alienus stomacho est II, 25. inflat II, 26. caseus et recens et vetus facile intus corrumpitur II, 28. caseus vetus II, 30.
 Casia (*Laurus c.*). urinam movet III, 21 (107, 13). potiones ex casia IV, 27, 1 (154, 13). discutit V, 11. cortex V, 18, 3. nigra (*C. nigricans*) V, 23, 1.
 Castoreum. III, 20 (105, 19); VI, 7, 8.
 Castratus. cf. VII, 22 (304, 4).
 Cataplasma. II, 33; IV, 8; III, 10; V, 28, 11; IV, 15; IV, 12 (136, 19); IV, 31 (157, 28).
 Catapotium. IV, 15; V, 25, 1—17 (*arteriace*).
 Caulis. II, 18 (64, 29); II, 27.
 Cauneae. V, 21, 1.
 Causa pro morbo III, 2; III, 3 (77, 5).
 Cedrus (?). discutit V, 11. c. oleum V, 18, 35.
 Centaurion (*Gentiana c.*). V, 27, 10.
 Cepa (*Allium cepa*). mali succi est II, 21. acris II, 22. inflat II, 26. alvum movet II, 29. urinam movet II, 31. sensus excitat II, 32.
 Cera. discutit V, 11. carnem alit et ulcus implet V, 14. mollit V, 15. cera cretica V, 18, 31. cera alba IV, 27, 1 (153, 27).
 Cerastes. V, 27, 7.
 Cerasum. stomacho aptum II, 24. alvum movet II, 29.
 Ceratum. VI, 9; V, 18, 1; IV, 6; VIII, 11; IV, 31 (158, 22); VIII, 9 (343, 22); VIII, 10, 2; VIII, 10, 7; V, 28, 2.

- Cerebellum.** II, 22.
Cerebrum. IV, 1 (122, 17); V, 26, 2; VIII, 1 (324, 22).
Cervical. IV, 2 (124, 14).
Cervinus. v. Medulla, Cornu.
Cervix. IV, 6; IV, 1 (120, 12); VII, 13. *cervix vesicae* IV, 1 (122, 21). *cervix vulvae* IV, 1 (122, 33).
Cerussa. rasa V, 19, 20. cocta V, 19, 27. combusta V, 22, 7. elota VI, 6, 12. si cerussam aliquis ebibit V, 27, 12.
Chalcitis. sanguinem supprimit V, 1. reprimat V, 6. purgat V, 5. rodit V, 6. exedit V, 7. adurit V, 8. chalcitis crustas ulceribus inducit, magisque si cocta est V, 9.
Chamaeleon (*Atractylis gummifera?*). V, 18, 33.
Chamaepitys (*Ajuga iva*). aperit V, 4.
Charta. combusta adurit V, 8.
Chelydrus. V, 27, 8.
Chiragra. II, 7 (39, 34); VII, 8 (45, 38).
Chironium ulcus. V, 28, 5.
Chirurgus. VII, *prooem*.
Chrysocolla. rodit V, 6. exedit V, 7. adurit V, 8.
Cicatricula. II, 10 (55, 12); VII, 7, 1 (273, 12).
Cicatrix. quae ad cicatricem perducat VIII, 4 (337, 30). *in oculis*, cicatrices VI, 6, 25.
Cicuta (*Conium maculatum*). semen rodit V, 6. mollit V, 15. si cicutam aliquis ebibit V, 27, 12.
Cinis. rodit V, 6. cinis cyprus exedit V, 7. cinis ex odoribus VI, 6, 22. ex sarmentis VII, 1.
Cinnamum, cinnamomum (*Laurus c.*). cinnamum urinam movet III, 21 (107, 11). potiones ex cinnamomo IV, 27, 1. cinnamomum aperit V, 4. rodit V, 6. discutit V, 11.
Circuitus febris. II, 17 (62, 29); III, 12; III, 3 (77, 9).
Circulator. V, 27, 3.
Circumcisis. VII, 25, 1.
Circumpurgo. V, 28, 14 (217, 33).
Clavus. V, 28, 14; VII, 7, 12.
Clibannus. II, 17 (62, 10); III, 21 (107, 1).
Clunis. VII, 29 (318, 26).
Clyster. VI, 7, 3; VI, 18, 2.
Coagulum leporinum purgat V, 5. si lac intus coit, coagulum bibendum est V, 27, 12.
Coccum gnidium (*Daphne gnidium*). purgat V, 5. adurit V, 8.
Cochleae imbecillissimae materiae sunt II, 18 (64, 31). boni succi sunt II, 20. stomacho aptae sunt II, 24. minime intus vitiantur II, 28. alvum movent II, 29. glutinant vulnus V, 2. cocta mollit V, 15. (*fascia*) VIII, 10, 1 (345, 31).
Cochlear. IV, 26 (152, 14).
Cohortalis. II, 18 (65, 28).
Coitus, concubitus II, 1 (31, 34).
Coles. VII, 27, 1; VII, 25, 1; VI, 18, 2 (254, 1 et 256, 3).
Colice Cassii. V, 25, 12.
Coliculus. mentae coliculus VI, 11 (249, 30).
Collapsa tempora II, 6 (36, 5); iter *urinae* collapsum VII, 26, 1 (306, 27).
Collum. VIII, 1.
Collyrium Philonis VI, 6, 3. Dionysii VI, 6, 4. Cleonis VI, 6, 5. aliud *ibid.* Theodoti VI, 6, 6. *cythium* seu *tephrion* VI, 6, 7. Euelpidis trygodes VI, 6, 8. Nilei VI, 6, 9. Philalethes VI, 6, 12 et 23. *διὰ λιβάνου* VI, 6, 13. Andreae VI, 6, 16. *διὰ κέφατος* *ibid.* Euelpidis *μειγμένον* VI, 6, 17. *σπύλιον* VI, 6, 18. Euelpidis *χειρῶνα* VI, 6, 20. eiusdem sphaerion VI, 6, 21. liqui-

- dum quoque medicamentum ad id componebat VI, 6, 22. Hermonis VI, 6, 24. asclepios VI, 6, 25. Canopitae *ibid.* et 28. Euelpidis pyxinum *ibid.* Caesarianum VI, 6, 26—27. Hieracis VI, 6, 28. rhinion VI, 6, 30. Euelpidis βασιλινόν VI, 6, 31. ex crocomagmate VI, 6, 32. διὰ κρόκον VI, 6, 33. *collyria in fistulas demittuntur* VII, 4, 4 (269, 4). Colubra. V, 27, 3. Colum. I, 7. Columba. sanguis purgat V, 5. ad oculos VI, 39. stercus adurit V, 8. Comitialis morbus. III, 23; II, 8 (46, 3). Commissura. IV, 3. Compago. IV, 14 (139, 24). Compositio nobilissima. V, 17, 1. compositio Apollopheanis V, 18, 6. Concha. III, 6 (87, 36). Conchula. alvum movet II, 29. Conchylia. imbecillissimae materiae est II, 18 (64, 31). infant II, 26. Concoctio. I, 9; I, 8; III, 22 (110, 29); III, 2 (76, 2); III, 4 (78, 28). Concoquo *de materia morbi*. V, 3; V, 18, 17. Concubitus. I, 1 (13, 26); VII, 28. Conditus. IV, 12 (137, 15); I, 2 (15, 18). Conferveo. VIII, 10, 1 (346, 31) et 7 (351, 21). Contundo. contunditur cum corticibus seminibusque suis punicum malum IV, 26 (152, 37). quae, *medicamenta*, ex leni vino contunduntur V, 18, 14. Contusus. II, 10 (53, 24); V, 28, 14 (217, 21). Cor. IV, 1 (121, 5). Coriandrum (*C. sativum*). refrigerat II, 27. urinam movet II, 31. folia reprimunt et refrigerant II, 33. semen V, 18, 1. Cornu. cervinum purgat V, 5. cervinum combustum et elotum VI, 6, 16. cornu cervini ramentum VI, 9 (246, 13). plagae lunatae cornua VII, 26, 2 (309, 13). Corpusculum. I, *proem.* (3, 27). Corvus. v. Ferramentum. Costa. VIII, 1 (325, 16; 326, 16; 326, 27); VIII, 7 (341, 2); VIII, 9 (342, 31); VIII, 9 (343, 15). Costum (*Costus speciosus*?). urinam movet III, 21 (107, 15). concoquit et movet pus V, 5. purgat V, 3. Cotoneum (*Pyrus cydonia*). v. Malum. Coxa. VIII, 1 (328, 4); IV, 29; II, 8 (46, 19); II, 8 (50, 25); II, 7 (42, 4); II, 6 (37, 1). Coxendix. VII, 30, 3. Cremor. III, 7, 2; VI, 6, 26; VI, 10; VI, 13. Creta. vel cimonia vel figularis V, 1; II, 33 (73, 16); VI, 5; I, 3 (20, 22). Crocomagma. V, 18, 9 et 16; VI, 6, 25. Crocus (*C. sativus*). urinam movet III, 21 (107, 11). purgat V, 5. discutit V, 11. crocum siculum VI, 6, 25. cilicium VI, 6, 33. Cruditus. I, 9; I, 10. Crudus. II, 10 (53, 21); V, 28, 11 (212, 21). Cruento. V, 28, 14 (217, 9). Cruor. IV, 22 (147, 29). Cruentus. II, 7 (41, 6). Crus. VIII, 1 (328, 20) et *passim*. Crusta. V, 9; V, 10; VI, 7, 7. Crustominus. II, 24. Cubile. I, 3 (17, 15); I, 3 (18, 18). Cubitus. VIII, 1 (327, 15); VIII, 10, 3; VIII, 16. Cucumis (*C. sativa*). c. agrestis (*Momordica elaterium*) imbecillissimae materiae est II, 18 (64,

- 30); II, 21; II, 22; II, 27; IV, 17; V, 21, 1; V, 26, 36; VI, 7, 7.
Cucurbita (C. pepo). II, 18 (64, 30); II, 20; II, 29; II, 24; II, 27.
Cucurbitula II, 11; VII, 2; III, 18 (101, 5); IV, 14 (139, 33); IV, 21; IV, 27, 1.
Cuminum (C. cyminum). mali succi est II, 21.
Cupressus (C. sempervirens). reprimat et refrigerat V, 11. discutit II, 33. c. semen urinam movet III, 21 (107, 13).
Curtus. V, 26, 1; VII, 9.
Cutillae. v. Fons.
Cutis. I, 9; V, 26, 31; VI, 4; V, 26, 27; VII, 2; II, 6 (36, 6); II, 3 (32, 30); II, 4 (34, 8).
Cyathus. IV, 12 (137, 27); V, 19, 3; V, 18, 18; VI, 7, 1.
Cyma. v. Brassica.
Cymbalum III, 18 (110, 10).
Cyprium. calefacit II, 33. IV, 6 (128, 37).
Cyprius. v. Cinis, Sampsuchus.
Cyprus (Lansonia alba?). pro oleo cyprino, acopum magis emollit, si pro rosa cyprus infunditur V, 24, 3.
Cytisus (Medicago arborea). urinam movet IV, 16 (142, 26).
- D**
- Daucus (Athamanta cretensis)*. dauci cretici semen V, 23, 3.
Dejectio. II, 12, 1.
Delirium. II, 7 (43, 7); III, 18 (102, 28); V, 26, 26; II, 8 (46, 38).
Dementia. II, 8 (51, 9); III, 18 (98, 20).
Denarius. V, 17, 1.
Dens. VIII, 1 (325, 3 sq.); VI, 9 (245, 32 sqq.) VII, 12, 1 (287, 4); VI, 12.
Desipio. III, 18 (89, 25; 101, 34).
Destillatio. IV, 5; II, 7 (39, 17; 43, 3).
Dictamnus creticum (Origanum d.). V, 25, 13.
Dies critici. III, 4.
Digestio. I, prooem. (7, 6); II, 14 (59, 14).
Digitus. VIII, 1 (327, 35); VIII, 10, 6; VIII, 19 et 24; VII, 19 (299, 28); VI, 19; VII, 32. mensura VII, 26, 1; VIII, 15 (356, 5); VI, 4.
Diphryges. exedit corpus V, 7; adurit V, 8.
Dipsas. V, 27, 7.
Ductio. alvi II, 12, 1; V, 28, 4; IV, 20.
Dulcis radix (Glicirrhiza glabra). V, 20, 6 et passim.
Durities. II, 24; VI, 18, 6.
- E**
- Ebrietas*. II, 6 (37, 16).
Ebur. v. Scobs.
Echinus. alvum movet II, 29.
Elaterium (succus momordicae e.). evocat et educit V, 12.
Elephantine. v. Emplastrum.
Elinguis. I, prooem. (7, 12)
Emacresco. II, 2 (31, 33); II, 4 (34, 13); II, 5; VIII, 11.
Emplastrum. quid V, 17, 2. emplastrorum varia genera V, 19, 1—28.
Ephelis. VI, 5.
Eruca (Eruca sativa). mali succi II, 21. acris II, 22. urinam movet II, 31. adurit V, 7. contrahere semen videtur IV, 28. eruca lienem extenuat IV, 16. semina erucae corpus erodunt II, 33.
Ervum (Ervum ervilia). purgat V, 5. cutem purgat V, 8. farina ervi II, 33.
Erysimum (Sisymbrium polyceratum). V, 25, 14.
Exercitatio. I, 2 (14, 29 et 15, 4);

- IV, 12 (136, 5); IV, 9; I, 3 (18, 19); III, 18 (101, 18); IV, 27, 2; I, 1 (12, 25).
- Experientia.** I, *prooem.* (8, 36).
- Experimentum.** I, *prooem.* (6, 13); IV, 11 (135, 5).
- Exulceratio.** II, 1 (30, 28); IV, 9; IV, 12 (136, 21); II, 7 (39, 37); V, 28, 4 (208, 35); V, 28, 15 (218, 24); V, 28, 16.
- F.**
- Faba** (*Vicia faba*). II, 18 (65, 3); II, 33; IV, 8; V, 18, 21.
- Faba aegyptia** (*Arum colacasia?*). VI, 7, 1; VI, 7, 2.
- Faex.** II, 33; III, 19 (103, 17).
- Far.** II, 33; III, 22 (112, 16).
- Fascia.** V, 26, 24; VII, 20 (300, 33); VIII, 10, 1; VIII, 10, 7 (349, 36); VIII, 15 (356, 10).
- Fauces.** IV, 7.
- Favus.** IV, 26 (152, 26); V, 28, 13.
- Febricula.** II, 17 (63, 3); V, 28, 11 (212, 24).
- Febris.** II, 3. i. *acutae febris* II, 1 (29, 28). *febres vel continuae, vel tertianae, vel ardentes* II, 1 (28, 35). f. *quartana* III, 3 (77, 10). *tertiana* III, 3 (77, 8); III, 14. *febres quae certum habent circuitum* III, 12 (93, 20). *febres incertae* II, 1 (29, 2). *febres vagae* III, 5 (83, 25). *febris interdiu levior* II, 7 (44, 6). *continua febris* III, 18 (99, 23). *febris intenta* III, 18 (99, 17). *magnae febres* IV, 14 (139, 30). *continentes febres* III, 5 (84, 12); *lentae febres* III, 9. *longae febres* II, 4 (34, 18). *nulla acuta febris leviter terrere nos debet* II, 4 (34, 29). *perniciosa quae levi vulnere supervenit* V, 26, 26. f. *varia genera* III, 13sqq.
- Fel.** exedit V, 7. *evocat et educit* V, 12. *purgat* V, 5. *fel taurinum rodit* V, 6. *fel caprinum* VI, 6, 28. *fel pro vesica fellis* IV, 1 (121, 16).
- Femen.** VIII, 1 (328, 11sqq.).
- Femur.** VIII, 1 (328, 25) *et passim*.
- Fermentum.** V, 28, 8; II, 24.
- Ferramentum.** VII, 10; VII, 26, 3. f. *quod corvum vocant* VII, 19 (299, 28).
- Ferula.** IV, 17; VIII, 10, 1 (346, 25) *et* 2 (348, 5).
- Fibra.** IV, 1 (121, 4, 15).
- Fibula.** V, 26, 23 (191, 23); VII, 25, 2 (306, 18).
- Ficedula.** v. *Avis*.
- Ficus** (*Ficus carica*). *arida calefacit* II, 27. *purgat* V, 5. *discutit* V, 11. *mollit* V, 15. *arida decocta evocat et educit* V, 12. *arida, sed magis viridis alvum movet* II, 29. *ficus aridae inflant* II, 26. *pinguissimae ficus* IV, 10. *piper cum ficu contusum* IV, 6 (128, 22).
- Filicula** (*Polypodium vulgare*). II, 12, 1 (56, 18).
- Filix** (*Pteris aquilina?*). V, 26, 35.
- Fissura.** VII, 12, 1 (287, 35). *ad ani fissam* V, 20, 5.
- Fistula.** VII, 11; VII, 15. *tenues* VII, 26, 1. *urinae iter* II, 8 (47, 17). *fistula ex ulceribus* V, 28, 12; VII, 4, 2; 3, 4.
- Foeniculum** (*Anethum f.*). *malisucci* II, 21. *inflationes levat* II, 26. *urinam movet* II, 31. *foeniculi semen reprimit et refrigerat* II, 33.
- Foenum graecum** (*Trigonella f. g.*). II, 33.
- Fomentum.** II, 17 (63, 26). *fomenta humida* IV, 7 (129, 31). *fomenta sicca* IV, 8 (131, 10).
- Fontes medicati quales** *Cutillarum Simbruinarumque* sunt IV, 12 (137, 7).

Forceps. VIII, 4 (336, 20).
 Forfex. VII, 16 (293, 26).
 Fractura *in genere* VIII, 10, 1; *ib.* 7.
 Frictio. II, 14 (58, 31); III, 21 (108, 12) *et passim*.
 Frigus. quibus inimicum et quibus prodest I, 9.
 Frons. VIII, 4 (337, 31).
 Frumentum. II, 18 (66, 8 *et* 17).
 Fungus. V, 27, 12.
 Furfur. II, 33 (73, 6).
 Furor. III, 18 (99, 13)
 Furunculus. V, 28, 8.

G.

Galbanum (succus *Ferulae ferulag.*) urina movet III, 21 (107, 12). concoquit et movet pus V, 3. aperit V, 4. rodit V, 6. molit V, 15. galbanum sine surculis V, 18, 28.
 Galli. V, 27, 3.
 Gauglion. VII, 6.
 Gargarizatio. V, 22, 9.
 Gargarizo. VI, 6, 26; *ibid.* 2; VI, 10.
 Garum. mali succi est II, 21. alvum movet II, 29.
 Gentiana (*G. lutea*). V, 23, 3.
 Genu. VIII, 21; IV, 30; II, 2 (32, 6).
 Gestatio. II, 15; II, 18 (101, 2).
 Gingiva. VII, 12, 1; VI, 15 (252, 33).
 Git (*Nigella sativa*). calefacit II, 33 (73, 29).
 Gladiator. I, *proem.* (8, 2); III, 23.
 Glandula. IV, 1 (120, 12).
 Glans. glandis cortex II, 1 (30, 32); V, 18, 4. *glans colis* VII, 25, 1. *summa glans* VI, 18, 4.
 Gluten. glutinat vulnus V, 2. gluten taurinum purgat V, 5
 Glutinantia medicamenta. VII, 4, 1.
 Glutinatio. vulneris VII, 27 (315, 23).
 Gravedo. IV, 5 (126, 17).
 Grus. II, 18 (64, 21). alvum adstringit II, 30.
 Gummi. V, 2; V, 13; VI, 6, 3.
 Gypsum. II, 33 (73, 16).

H.

Habenula. VII, 4, 4.
 Halicaccabus (*Physalis somnifera?*) cortex V, 20, 3.
 Hapsus. IV, 13 (138, 21); VII, 26, 5.
 Hebenus (*Diospyros eben.*?). urina movet II, 31. exedit corpus V, 7. evocat et educit V, 12. laevat id quod exasperatum est V, 13.
 Hedera (*H. helix*). reprimit et refrigerat II, 33. hedera nigra V, 28, 4 (209, 26). bacca hederæ VI, 9 (247, 8).
 Helenium (*Inula h.*). discutit V, 11.
 Hemina. IV, 5 (127, 21); IV, 26 (152, 32).
 Hernia. VII, 18 (296, 1).
 Hibiscus (*Althaea officinalis*). IV, 31 (157, 28).
 Hirundo. VI, 6, 39; V, 8.
 Histrio. V, 26, 1.
 Hoedus. II, 18 (65, 31).
 Hordeum. mali succi est II, 21. firmitus est milium, quam hordeum II, 18 (64, 35).
 Horror. III, 12.
 Humerus. VIII, 1 (326, 37).
 Humor, qui esse inter saniam et pus videri potest. V, 28, 4 (208, 32).
 Hydropicus. VII, 15.
 Hyoscyamum (*H. album et nigrum*). reprimit et refrigerat II, 33. cortex V, 18, 29. folia VI, 6, 9. radix VI, 9 (246, 8). succus VI, 7, 2. si hyoscyamum aliquis ebibit, fervens mulsum bibendum est V, 27, 12.
 Hypericum (*H. perforatum*). V, 20, 6.
 Hypocistis (*Cytisus h.*). exedit corpus V, 7. hypocistidis succus V, 23, 1.

Hyssopum et Hyssopus (*Origanum smyrnaeum*?). mali succi est II, 21. stomacho alienum II, 25. urinam movet II, 31. ante vomitum I, 3 (19, 22). potio hyssopi IV, 12 (136, 2). cum mulsa aqua IV, 8.

I

Jactatio. IV, 20 (147, 6); III, 9 (90, 29).

Ichthyocolla. glutinat vulnus V, 2. Jecur. IV, 1 (121, 12). jecinoris portae V, 26, 2. jecinoris crasum V, 26, 3. omne jecur boni succi II, 20. alvum adstringit II, 30. j. morbus IV, 15.

Ignis sacer. V, 28, 4.

Ilia. IV, 1 (122, 33).

Impetigo. V, 28, 17.

Inflammati. I, *prooem.* (3, 24); VI, 6, 1 (226, 11); V, 28, 6; V, 26, 27; V, 26, 31; VII, 19 (300, 15); VI, 13; VII, 26, 3; VI, 14.

Inflatio. II, 3 (33, 20); II, 26; IV, 12 (135, 26); IV, 23; IV, 21.

Inguen. III, 5 (82, 18), IV, 28.

Insania. III, 18; II, 1 (30, 6); II, 7 (41, 25; 42, 13).

Intestinum. IV, 1 (121, 24 sqq.). morbus majoris intestini II, 12, 2. tenuius intestinum VII, 16 (293, 6). int. rectum IV, 1 (122, 34).

Intubus (*Cichorium intybus*). acris II, 22. stomacho aptus II, 24. refrigerat II, 27. alvum adstringit II, 30. reprimat et refrigerat II, 33; IV, 16 (142, 16).

Iris. purgat V, 5. discutit V, 11. iris arida III, 10. iris fricta VI, 15. iris illyrica (*I. germanica*) V, 18, 3. iris macedonica (*I. florentina*) V, 18, 27.

Jugale. VIII, 1 (324, 29).

Juglans (*J. regia*). II, 25; V, 27, 12.

CELSUS.

Jugulo. II, 10 (53, 36); III, 20 (104, 19).

Jugulum. VIII, 8, 1 (326, 32).

Juncus quadratus (?). aperit V, 4. discutit V, 11. junci quadrati et rotundi (*Cyperus longus*?) semen III, 21 (107, 16).

Jurulentus. II, 25; II, 26; II, 28; I, 6.

L

Labra. VII, 12, 6. labrum pelvis IV, 31 (157, 26).

Lac valentissimi generis II, 18 (66, 12). lac boni succi II, 20. lenis est II, 22. crassiorem pituitam facit II, 23. alienum stomacho est II, 25. inflat II, 26. facile intus corrumpitur II, 28. alvum movet II, 29. laevat id quod exasperatum est V, 13. omnibus longis febriculis recte dari potest III, 22 (112, 5 sqq.).

Laceratio mortuorum. I, *prooem.* (8, 8).

Lacero. II, 10 (54, 31).

Lacertus (*musculus*). VIII, 16 (357, 25). *serpens*, lacertistercus purgat V, 5. adurit V, 8.

Laconicum. II, 17 (62, 9).

Lactuca (*L. sativa*). boni succi II, 20. acris II, 22. stomacho apta II, 24. refrigerat II, 27. alvum movet II, 29. somno apta II, 32. Lactuca marina (*Euforbia paralias*?) corpus exedit V, 7. adurit V, 8. semen III, 21 (108, 27).

Ladanum (succus *Cisti creticae*). urinam movet III, 21 (107, 12). evocat et educit V, 12; *medic. ex lad.* VI, 1; VI, 2.

Laevitas intestinorum. IV, 23.

Laganum. II, 22.

Lanula. VI, 9 (247, 14).

Lapathum (*Rumex* seu *Polygonum*). mali succi est II, 21. alienum

- stomacho est II, 25. alvum movet II, 29.
- Lapillus. VII, 6.
- Lapis. lapis haematites, et phrygius, et assius, et scissilis exedunt V, 7. lapis haematites purgat V, 5. l. assius IV, 31 (158, 18). lapis haematites elotus VI, 6, 21. pyrites lapis, aut molaris discutit V, 11. lapis qui carnem exedit IV, 31 (158 15).
- Lapsana (*Sinapis alba*). aliena stomacho II, 25. urinam movet II, 31.
- Laser (succus *Tapsiae sylphii*) IV, 6 (128, 16); IV, 10.
- Latus. latus et pectus II, 1 (29, 18); II, 1 (30, 6); IV, 13 (138, 5).
- Laurus (*L. nobilis*). reprimet et refrigerat II, 33; IV, 2 (124, 20); III, 20 (106, 8).
- Lego. venas legere VII, 7, 15 (282, 36).
- Legumen. I, 18 (64, 16); II, 25 et 26.
- Lenticula reprimet, et refrigerat II, 33. purgat V, 5. exedit V, 7. crustas resolvit V, 10. cutem purgat V, 16. calefacit II, 33. farina V, 27, 12. alvum adstringit II, 30. lent. cremor VI, 18, 2 (255, 7); VI, 13. mensura VI, 6, 1 (227, 4). vitium cutis VI, 5.
- Lentiscus (*Pistacia l.*). reprimet et refrigerat II, 33. rodit V, 6. in omnibus vesicæ doloribus prae-stat IV, 27, 1 (154, 13). folia VI, 18, 2 (255, 8).
- Lepus. urinam movet II, 31.
- Lethargicus. III, 23 (113, 24).
- Lienis. IV, 1 (121, 16); IV, 16.
- Lienosus. II, 8 (46, 37).
- Lignustrum (*L. vulgare*). reprimet et refrigerat II, 33. succus VI, 13 (251, 4).
- Lilium (*L. candidum*). discutit V, 11. radix VI, 18, 6.
- Linamentum. II, 11; IV, 27, 1; VII, 30, 1; VI, 8, 1; V, 28, 12 (216, 1); VIII, 5 (338, 10); VII, 25; V, 26, 21; V, 26, 29; V, 26, 36.
- Lingua. VII, 12, 4. exigua in aspera arteria sub ipsis faucibus est lingua IV, 1 (120, 17).
- Lingua canina (*Cynogloss. officin.*). V, 27, 13.
- Linteolum. VIII, 7 (340, 21).
- Linteum, linteus. VIII, 10, 1 (345, 37); V, 26, 24.
- Linum (*L. usitatiss.*). II, 33; V, 2; V, 11; V, 12; VII, 4, 4.
- Lippiens. VI, 6, 1 (226, 25).
- Lippitudo. VI, 6, 1 (225, 12); VI, 6, 26-27.
- Lolium (*L. temulentum*). calefacit II, 33; evocat V, 12.
- Lumbricus. IV, 24; II, 3 (33, 18).
- Lupinus (*L. hirsutus*). II, 33.
- Luxatum. VII, 1.
- Lycium (succus *Rhamni infectorii*). sanguinem supprimit V, 1. cicatricem inducit VI, 26, 30.

M.

- Magisterium. V, 27, 2 (201, 6).
- Malabathrum (*Laurus cassia*). V, 23, 1 et 3.
- Malae. VIII, 1 (424, 8).
- Malagma. malagmata mollescent V, 17, 2. malagmata calefaciendi causa reperta V, 18, 1. mal. varia V, 18, 2 sqq.
- Malicorium (cortex *Punicae granati*). II, 33; VI, 9 (246, 20).
- Malva (*M. silvestris*). boni succi est II, 20; alvum movet II, 29.
- Malum. pomum II, 24. mala cotonea et punica II, 30. mala austera II, 27.
- Mamma. IV, 1 (121, 6).
- Mandragora (*Atropa m.?*). III, 18 (100, 25); VI, 9 (246, 10); VI, 6, 1 (227, 6).

- Manipulus.** V, 25, 4.
Manubriolum scalpelli. VII, 6 (272, 24).
Manus. VIII, 1 (327, 27).
Marrubium (*M. vulgare?*). exedit V, 7. *M. succus* III, 22 (113, 1).
Mas. VII, 28.
Materia. ciborum et potionum II, 18 (64, 16sq.). infirmissima III, 18 (101, 20). tenuissima III, 6 (86, 38). quam levissima *ibid.* (86, 37). *materia medicamentum* V, 17, 1. *materia quae in corpore est* II, 10 (52, 35).
Maxilla. VIII, 1 (324, 31). *maxillae fractura* VIII, 7. *M. luxata* VIII, 12.
Medicamentum. I, 4; III, 4 (79, 20). omnia fere medicamenta stomachum laedunt, malique succi sunt V, *prooem.*
Medicina. I, *prooem.* (1, 4); I, *prooem.* (2, 20); I, *prooem.* (3, 3); V, *prooem.* ars conjecturalis II, 6 (38, 18); I, *prooem.* (8, 33).
Medicus. I, *prooem.* (11, 5) *et passim.*
Medulla. sensu caret IV, 1 (122, 17). calefacit II, 33. medulla vel cervina, vel vitulina, vel bubula V, 19, 10. medulla, quae in spina est V, 26, 17.
Mel. valentissimi generis est II, 18 (64, 22). acre II, 22. alienum stomacho II, 25. facile intus corrumpitur II, 28. alvum movet II, 29. alvum adstringit II, 30. mel exedit V, 7. discutit V, 11. crudum purgat V, 5. despumatum III, 6 (87, 1). acerrimum VI, 6, 34. amarissimum VI, 5.
Melampsithium. V, 25, 16.
Melinum (*Holcus cernuus*). reprimit et refrigerat II, 33.
Membrana. VII, 28; VIII, 4 (337, 17).
Membranula. IV, 1 (121, 29); VII, 18 (295, 21); VII, 7, 4.
Menstrua. IV, 12 (134, 21) *et passim.*
Menta. urinam movet II, 31; IV, 10; VI, 11. mentae succus VI, 18.
Mentastrum (*Mentha silvestris*). VI, 9 (247, 17).
Merula. alvum adstringit II, 30.
Micula. II, 5.
Milium (*Panicum miliaceum*). II, 18 (64, 35); II, 21; II, 33.
Minister medici. VII, 7, 4 (274, 8); VIII, 15 (355, 34).
Minium. purgat V, 5. minium sinopicum rodit V, 6.
Misy. sanguinem supprimit V, 1. purgat V, 5. rodit V, 6. exedit V, 7. adurit V, 8. crustas inducit V, 9. crudum VI, 18, 2 (254, 31). combustum VI, 6, 22.
Mitella. VIII, 10, 3.
Modiolus. VIII, 3 (330, 26).
Momentum. IV, 26 (152, 24); IV, 18 (144, 2); VII, 7, 15 (281, 19).
Morbus. III, 1 *et passim.*
Morsus. V, 27, 1; *ibid.* 3.
Mortarium. V, 24, 2.
Morum. somno aptum est II, 32. stomacho aptum est II, 24. alvum movet II, 29. medicamentum ex moris VI, 11 (249, 31).
Morus (*M. alba*; *m. nigra*). III, 18 (100, 26).
Macosus. II, 8 (50, 28); IV, 22 (147, 30).
Mucus. IV, 25.
Mulsum. valentissimi generis II, 18 (66, 30); alienum stomacho est II, 25. facile intus corrumpitur II, 28. alvum movet II, 29. alvum adstringit mulsum quod inferbuit II, 30. tepidum IV, 20. fervens V, 27, 12.
Muralis. herba (*Matricaria parthenion*; *parietaria diffusa?*) II, 3.

Murex. stomacho aptus II, 24.
minime intus vitiatur II, 28. al-
vum adstringit II, 30.
Muria. IV, 16; IV, 22.
Murteus. oleum murteum VI, 8.
absolute, murteum simul et re-
primit, et refrigerat II, 33.
Musculosus. V, 20, 1.
Musculus. VIII, 25; V, 26, 22 *et*
passim.
Muscus. reprimat et refrigerat
II, 33.
Mustum. valentissimi generis est
II, 18 (66, 13).
Myrapia. IV, 26 (152, 6).
Myrmecium. V, 28, 14 (217, 24).
Myrobalanum. VI, 2.
Myrrha. glutinat vulnus V, 2. con-
coquit et movet pus V, 3. rodit
V, 6. adurit V, 8. pinguis VI,
7, 3. myrrha, quam *σταυρήν*
cognominant VI, 7, 2.
Myrta. alvum adstringunt II, 30.
Myrtus (*M. communis*). reprimat et
refrigerat II, 33. baccae IV, 26
(152, 15). folia VI, 6, 9. succus
myrti VI, 6, 16.

N.

Napi (cf. *sinapi*). II, 18 (65, 4); II,
21.
Narcissus (*N. orientalis*). discutit V,
11. semen *ibid.* radix V, 6. mol-
lit V, 15.
Nardus et nardum. urinam movet
III, 21 (107, 11). concoquit et
movet V, 3. discutit V, 11. spica
nardi etc. IV, 27, 1 (154, 12).
nardum gallicum (*Valeriana cel-
tica*) V, 23, 1. indicum (*Patrinia*
salamansi) *ibid.* 2. syriacum (*Pa-
trinia scabiosaefolia*) VI, 7, 2; V,
23, 2.
Nares. VIII, 1 (324, 15). nares cur-
tae VII, 9.
Nasturtium (*Erucaria aleptica*).

mali succi II, 21. acris II, 22.
stomacho alienum II, 25. al-
vum movet II, 29. lienem co-
ercet IV, 16. corpus erodit II,
33.
Nasus. VIII, 5.
Natatio. IV, 28; III, 24; III, 27.
Navigatio. IV, 12 (136, 29. 35);
III, 22 (111, 26).
Nausea. I, 3 (17, 29).
Nepeta (*Cruc. generis incerti*). mali
succu II, 21. aliena stomacho
II, 25. urinam movet II, 31.
sensus excitat II, 32.
Nervosus. V, 28, 12 (214, 12); VII,
5, 1.
Nervus. VIII, 22; VIII, 25; VIII,
10, 1 (345, 21); I, *prooem.* (9, 22);
VIII, 15 (355, 33); II, 17 (62, 15);
VIII, 14; III, 27, 1; *ib.* 2; *ib.* 3.
Nitrum. calefacit II, 33. rodit V,
6. exedit V, 7. evocat et educit
V, 12. molit V, 15. coctum VI,
18, 6. frictum (?) IV, 8. rubrum
V, 28, 18; V, 22, 4. ignem non
expertum V, 19, 19.
Nuces. infant II, 26. reprimunt
II, 33. discutunt II, 11. mol-
liunt II, 15. rodunt II, 6.
Nucleus. nuclei pinei (*Pinus pi-
nea*) lenes II, 22. stomacho apti
II, 24. urinam movent II, 31.
nuclei pinei ex melle IV, 14.
nuclei ex pinu silvestri (*P. sil-
vestris*) IV, 17. nuclei palmarum
(*Phoenix dactylifera*) combusti
VI, 6, 5. humor ex nucleo mali
persici (*Amygdalus persica*) VI,
7, 1.
Nutrio, curo, foveo. IV, 18 (144,
30); VI, 6, 16.
Nux graecamora (*Amygdalus com-
munis*). III, 27, 4.
Nux avellana (*Corylus avellana*).
III, 27, 4.

O.

Obcalesco. IV, 31 (157, 22) *et passim*.
 Occipitium. VIII, 1 (323, 8).
 Ochra. exedit V, 7. attica carnem alit, et ulcus implet V, 14.
 Ocimum (*O. basilicum* et *o. minimum*). acre II, 22. alvum movet II, 29. urinam movet II, 31. simul et reprimat, et refrigerat II, 33.
 Oculus. VII, 7, 13; VII, 7, 14. lip-pientes oculi VII, 7, 1. oculi sicci VII, 7, 15. oculi graves, et aut persicci, aut subhumidi III, 6 (86, 18). scabri VI, 6, 31. facti tumidiores II, 6 (36, 17). oculorum caligo, et rubor II, 8 (47, 7). imbecillitas oculorum est VI, 6, 38. resolutio oculorum *ibid.* 36. oculi minores *ibid.* 14.
 Oenanthe (*flores Vitis vinif. var. silvestris?*). purgat V, 5. adurit V, 8.
 Oesypum recens. VI, 18, 7 et 8.
 Olea. reprimat et refrigerat II, 33.
 Oleae. boni succi sunt II, 20. stomacho aptae II, 24. alvum astringunt II, 30.
 Oleum. mali succi est II, 21. alie-num stomacho est II, 25. concoquit et movet pus V, 3. mol-lit V, 15. acerbum reprimat et refrigerat II, 33. vetus calefacit *ibid.* calidum VI, 7, 7. ci-cinum V, 24, 3. irinum VI, 7, 8. oleum ex amaris nucibus rodit V, 6. melinum II, 33. murteum II, 33; VI, 8, 1 (244, 23) *et pas-sim*. syriacum IV, 6 (128, 27). acerbum II, 33 (73, 17).
 Onager. valentissimi generis II, 18 (64, 20).
 Opobalsamum (succus *Amyris o.*). V, 23, 3.

Opopanax (succus *Ferulae o.*). V, 23, 3.
 Oryza (*O. sativa*). boni succi est II, 20. crassiorem pituitam facit II, 23. stomacho apta est II, 24.
 Os. *de positu et figura ossium totius humani corporis* VIII, 1. os me-dium VIII, 1 (324, 3).
 Ostreae. stomacho aptae II, 24. facile intus corrumpuntur II, 28. alvum movent II, 29.
 Ovum durum valentissimae ma-teriae est; molle vel sorbile imbecillissimae II, 18 (66, 6). ovum sorbile II, 20. molle ovum stomacho aptum II, 24. ova dura alvum astringunt II, 30. ovi et album et vitellus VI, 6, 1 (227, 14). columbina ova cet. VI, 18, 7.

P.

Palatum. IV, 7.
 Palma. VIII, 18.
 Palmula (*Phoenix dactylifera*). boni succi II, 20. stomacho apta II, 24. contrita II, 33; I, 2 (15, 22).
 Palpebra. VII, 7 *et passim*.
 Palumbus. alvum adstringit II, 30. sanguis *palumbi* VI, 6, 39. stercus V, 8.
 Panaces (cf. *opopanax*). aperit V, 4. mollit V, 15. radix V, 25, 3.
 Panicum (*P. italicum*). mali succi II, 21. calefacit II, 33.
 Panificium. II, 18 (66, 8).
 Panis. II, 18 (64, 34). panis sine fermento stomacho aptus II, 24. panis fermentatus stomacho alienus II, 25. panis tostus III, 6 (88, 18). panis ex siligine, vel ex simila alvum adstringit II, 30. bis coctus *ibid.* panis he-sternus I, 3 (19, 31). panis ex lacte VI, 6, 1 (226, 29). panis ex posca frigida IV, 12 (137, 25).

- Panniculus.** VII, 29 (318, 19).
Pannus. VIII, 9 (343, 24).
Panus. V, 18, 19; V, 28, 10; VII, 2 (265, 10).
Papaver (*P. rhoeas*). somno aptum II, 32. papaveris succus IV, 31 (158, 10). papaveris cortices fricti VI, 7, 1. papaveris folia reprimunt et refrigerant II, 33. papaveris lacrimae frictae et combustae VI, 6, 5. album papaver IV, 17. nigrum papaver IV, 27, 1 (154, 9). silvestre papaver V, 25, 4.
Papula. V, 28, 18.
Papyrus (*P. nilotica*). V, 28, 12 (215, 16).
Parotis. VI, 16.
Passum. valentissimi generis II, 18 (66, 12); II, 18 (66, 22). boni succi est II, 20. lene est II, 22. alienum stomacho est II, 25. facile intus corrumpitur II, 28. alvum adstringit II, 30. passum dulcissimum VI, 12.
Pastillus. V, 17, 2; V, 20, 1 sqq.
Pastinaca (*P. sativa*). II, 18 (65, 5). stomacho apta est II, 24; II, 26. urinam movet, magisque agrestis II, 31.
Pastinaca. *piscis* VI, 9 (247, 10).
Patella. VIII, 1 (328, 21).
Pavo. generis valentissimi est II, 18 (64, 21).
Pecten. VIII, 1 (328, 8).
Pecten (animal). II, 24.
Pectorale os. VIII, 1 (326, 34).
Pectus. vomitu pectus purgare III, 7 (88, 29); I, 3 (17). pectus, os pectoris VIII, 7 (341, 2) et VIII, 8, 2.
Penicillum. II, 10 (55, 6) et *passim*.
Percolo. (IV, 20) VI, 9 (246, 16).
Personata (*Arctium lappa*). V, 27, 10.
Pes. VIII, 20, 1 (329, 2); VIII, 22.
Pestilentia. I, 2 (14, 19).
Petiolus. II, 22.
Petroselinum (*Apium p.*). V, 23, 3.
Peucedanum (*P. officinale*). V, 18, 29.
Phalangium. V, 27, 9.
Phoenicopterus. valentissimi generis est II, 18 (64, 26).
Phreneticus. III, 18 (98, 24).
Phthisis. II, 22 (111, 16).
Pila. I, 2 (14, 32).
Pinna. VII, 8; VII, 5 (338, 10).
Piper. calefacit II, 27; II, 33. piper et rotundum et longum urinam movet II, 31. aperit V, 4. rodit V, 6. adurit V, 8. p. album V, 23, 1. piperis semen cortice liberatum cet. VI, 9 (247, 8). pollen piperis IV, 7 (130, 5). piperis grana VI, 6, 22.
Piperatum. *medicamentum* IV, 26 (152, 24).
Pirum. II, 24; IV, 26 (152, 4).
Piri surculus. V, 27, 12.
Piscis. II, 18 (65, 19 sqq.) et *passim*.
Pisum (*P. sativum*). II, 18 (65, 3).
Pittacium. III, 10.
Pituuta. IV, 5; II, 23; II, 8 (48, 7); IV, 10; VI, 6, 1 (225, 14) et *passim*.
Pix. concoquit et movet pus V, 3. mollit V, 15. pix cruda purgat V, 5. pix arida V, 19, 1. pix liquida V, 22, 2.
Plaga ad similitudinem murtei folii VII, 2 (265, 25). *resima* plaga VII, 26, 2 (309, 14).
Plantago (*P. maior*). reprimet et refrigerat II, 33. corpus tueri videtur III, 25. succus III, 22 (112, 38).
Plumbum combustum sanguinem suppressit V, 1. album V, 26, 36. elotum *ibid.* elotum et combustum VI, 6, 5. plumbi recrementum V, 15.
Podagra. IV, 24 et *passim*.
Podagricus. IV, 24.

- Polenta. III, 19 (103, 28); IV, 18.
 Polium (*Teucrium p.*). V, 27, 7.
 Polypus (*morbis*). VI, 8, 2.
 Pomum. II, 18 (65, 9); II, 20; II, 24; I, 3 (21, 27).
 Pontica. radix (*Centaurea rha-
 nctica*) V, 23, 3.
 Poples. VII, 26, 2 (308, 7); IV, 27, 1.
 Populus. *arbor* VI, 9.
 Porrum (*Allium p.*). mali succi II, 21. somno aptum est II, 32. sanguinem supprimit V, 1. purgat V, 5. jus in quo porrus incoctus sit IV, 13 (138, 35).
 Porta jecinatoris. V, 26, 2 *et passim*.
 Portulaca (*P. oleracea*). boni succi II, 20. alvum movet II, 29. reprimat et refrigerat II, 33. cocta IV, 22. semen VI, 6, 38.
 Posca. IV, 12 (137, 25); III, 20 (105, 6).
 Potio. I, 3 (16, 37) *et passim*.
 Praecordia. II, 3 (32, 31) *et passim*.
 Professor. I, *prooem.* (2, 12); VII, *prooem.* (262, 20).
 Pruna. III, 27, 2.
 Prurigo. II, 7 (42, 7) V, 28, 3.
 Psoricum. VI, 6, 31.
 Psylli. V, 27, 3.
 Psyllium (*Plantago p.*). glutinat V, 2.
 Ptisana. boni succi II, 20. lenis II, 22. crassiorem pituitam facit II, 23. stomacho apta est II, 24. ptisanæ cremor IV, 20.
 Pubes. IV, 1 (122, 37).
 Pulegium (*Menthap.*). sensus excitat II, 32. reprimat et refrigerat II, 33. aperit V, 4. pulegium ex aceto IV, 18 (144, 14).
 Pulex. VI, 7, 9.
 Pullus. cohortalis II, 18 (65, 28). gallinaceus V, 27, 3. hirundinis IV, 7 (130, 19).
 Pulmo. IV, 1 (121, 2).
 Pulsus. III, 19 (103, 5).
 Pulticula. II, 18 (66, 9); II, 30; IV, 26 (152, 26); VII, 6.
 Pulvinus scorteus. VIII, 12.
 Pumex. purgat V, 5. evocat et educit V, 12.
 Punctio. VIII, 10, 7 (251, 22); V, 28, 11 (212, 2); VIII, 10, 1 (345, 6).
 Pupilla. VI, 6, 1 (225, 30); VI, 6, 37.
 Purgatio. I, *prooem.* (12, 12); I, 3 *passim*. de ulcere VII, 2 (265, 30). *pro menstrua* IV, 27, 1.
 Purpura. stomacho apta II, 24. alvum adstringit II, 29. minime intus vitiatum II, 28.
 Pus. V, 26, 20 *et passim*.
 Pusula. II, 1 (28, 29); V, 28, 15; V, 28, 16; V, 26, 31; III, 22 (110, 15).
 Pyrethrum (*Anthemis p.*). aperit V, 4. adurit V, 8.
 Pythagoricus. III, 4 (81, 22).
 Pyxidicula. VI, 6, 5.
 Quinquefolium (*Potentillareptans*). calefacit II, 33.
 Radicula (*Raphanus r.*). I, 3 (19, 23). ex oleribus valentior II, 18 (65, 5). mali succi est II, 21. acris II, 22. alvum movet II, 29. urinam movet II, 32.
 Radix ea quam dulcem (*Glycyrriza glabra*) appellant VI, 10. infant omnes radices II, 26.
 Radius. VIII, 1 (327, 12).
 Ramex. VII, 22.
 Rapa (*Brassica r.*). II, 18 (65, 4); V, 28, 6.
 Refectio. III, 22 (110, 10); III, 15; IV, 13 (139, 15).
 Remedium. III, 2 (75, 29) *et passim*.
 Remissio febris. III, 6 (85, 26) *et passim*.
 Renes. IV, 1 (121, 20). renum morbi II, 1 (31, 12); II, 7 (40, 27); IV, 17.
 Resina. concoquit et move^t

- V, 3. aperiunt .. resina terebinthina et pinea V, 4. purgant.. resina, et pinea et terebinthina liquida V, 5. resina terebinthina humida rodit V, 6. resina arida V, 18, 2. resina pinea arida V, 19, 20. resina colophoniaca V, 19, 11. resina ex lentisco liquida V, 18, 24. resina quam glutinosissima, maximeque terebinthina VI, 7, 9.
- Rhus, quem syriacum (*R. coriaria*?) vocant VI, 11 (249, 28).
- Rigor. VIII, 4 (337, 22) *et passim*.
- Rima. *rima calvariae* VIII, 4 (333, 23); VIII, 4 (334, 9); VIII, 4 (336, 7). *rima a scalpro* VIII, 4 (336, 14).
- Rosa. discutit V, 11. reprimit V, 22, 9. folia rosae VI, 6, 9; VI, 18, 2 (255, 17). rosae succus VI, 6, 5. rosae pulvis IV, 27, 1. rosa, *pro oleo rosaceo*, sudorem prohibet III, 19 (103, 10); IV, 25. ungere rosa et aceto IV, 2 (124, 9). butyrum cum rosa IV, 25. ceratum ex rosa V, 28, 2 (207, 17); IV, 27, 1.
- Rosio. V, 28, 17; VII, 23.
- Rubus (*R. idaeus*, seu potius *r. tomentosus*). reprimit et refrigerat II, 33; V, 22, 9. rubi cacumina decocta IV, 26 (152, 27).
- Ruta (*R. graveolens*). mali succi II, 21. acris II, 22. urinam movet II, 31. sensus excitat II, 32. purgat V, 5. mollit V, 15. portio rutae IV, 12 (136, 2). ex aceto ruta IV, 28. ruta silvatica V, 27, 5. rutae semen aperit V, 4. rutae silvestris semen V, 25, 3.
- S.
- Sagapenum (*Heracleum sphondylium*). V, 23, 3.
- Sal. calefacit II, 33. exedit V, 6. adurit V, 8. evocat et educit V, 12. sal ex aceto coctus VI, 15. frictus *ibid.* fomenta ex sale II, 17 (63, 36). sal fossilis VI, 13. sal ammoniacus VI, 6, 39.
- Salamandra. exedit V, 7. adurit V, 8.
- Salix (*S. alba*). folia salicis VI, 18, 10.
- Salsamentum. mali succi II, 21. calefacit II, 27. alvum movet II, 29. minime intus vitatur II, 28. cibus a salsamentis melius incipit I, 2 (15, 15). edenda sunt salsamenta IV, 16. salsamenta semper aliena sunt VII, 27 (315, 9).
- Sampsuchus cyprius (*Origanum majorana*). discutit V, 11.
- Sandaracha. rodit V, 6. exedit V, 7. adurit V, 8.
- Sanguis. V, 26, 20. II, 10 (54, 35). sanguis liquidus et mali odoris VI, 4.
- Sanies. V, 26, 20 *et passim*.
- Satureia (*S. hortensis*?). mali succi II, 21. aliena stomacho II, 25. urinam movet II, 31. sensus excitat II, 32.
- Scabies. V, 28, 16.
- Scabo. II, 7 (41, 13).
- Scalpellus. II, 11; II, 10 (54, 25 et 30).
- Scalper. VIII, 3 (331, 18); VIII, 4 (336, 5).
- Scammonia (*Convolvulus s.*). rodit V, 6.
- Scamnum. VIII, 20.
- Scapulae. VIII, 1 (326, 30).
- Scilla (*S. maritima*). cocta V, 28, 12. contrita III, 27, 1.
- Scobs eboris. V, 5; VIII, 2.
- Scorpio. V, 27, 6.
- Scripulum. V, 17, 1.
- Serotum. VII, 19 (298, 4 *et passim*); VII, 21, 2; *ib.* 22 et 23.
- Scutulum. VIII, 1 (326, 21).

- Semen. IV, 28; VIII, 13.
 Sepiarum atramentum. II, 29.
 Septenarius dies. III, 4 (81, 5).
 Septum. IV, 1 (121, 8); VIII, 4 (336, 16).
 Serpens. V, 27, 10.
 Serpentina ulcera oris. II, 1 (30, 25).
 Serpyllum (*Thymus s.*). reprimet et refrigerat II, 33. urinam movet IV, 16.
 Serrula. VII, 33.
 Sertula campana (*Melilotus neapolitana?*). discutit V, 11. mollit V, 15. sertulae campanae semen VI, 5.
 Serum. II, 12, 1.
 Sesamum (*S. orientale*). mollit V, 15. sesami fricti acetabulum V, 18, 27.
 Sescuncia. V, 18, 28.
 Sesquicyathus. VI, 7, 2.
 Sevum. concoquit et movet pus V, 3. purgat V, 5. mollit V, 15. sevum bubulum V, 18, 12. caprinum III, 22 (112, 19). hircinum IV, 16. vitulinum aut caprinum V, 18. taurinum — vitulinum V, 19, 11.
 Sextans. V, 17, 1.
 Sextarius. V, 28, 18 et passim.
 Signa bona et mala II, proem.; 1—6; VII, 3.
 Silis secundo casu V, 23, 1.
 Sinapi (*S. alba et nigra*). mali succi est II, 22. urinam movet II, 31. erodit II, 33 (73, 3).
 Siser (*Stium sisarum*). mali succi est II, 21. stomacho aptum est II, 24. urinam movet II, 31. reprimet et refrigerat II, 33.
 Solanum (*S. nigrum*). reprimet et refrigerat II, 33; V, 26, 33. solani folia *ibid.*
 Solaris herba (*Heliotropium villosum*). V, 27, 5.
 Somnus. II, 32; I, 3 (18, 17); II, 4 (34, 31) et passim.
 Sorbitio lenis est II, 22. stomacho aliena II, 25.
 Sorbum. stomacho aptum est II, 24. alvum adstringit II, 30.
 Sory. VI, 9.
 Spatha. VIII, 15 (356, 10).
 Specillum. VIII, 2 (329, 32); VIII, 4 (333, 24). aversum VII, 7, 6.
 Spina. constat vertebrae quatuor et viginti VIII, 1 (325, 15). ima spina in coxarum osse desidit VIII, 1 (328, 4).
 Spiritus. in venas I, proem. (3, 22); III, 27, 1; II, 11. spiritus facilis II, 3 (32, 29). aequalis III, 20 (105, 2). frigidus II, 6 (36, 33). gravis II, 2 (32, 11). rarus V, 26, 18. spiritus difficultas IV, 14 (139, 29). spiritus alvi II, 7 (40, 36); II, 8 (46, 11).
 Spodium. exedit V, 7. elotum VI, 6, 12.
 Spuma. ex ore spuma III, 23. spuma argenti purgat V, 5. exedit V, 7. discutit V, 11. cocta et elota VI, 6, 16. spuma lycii VI, 7, 1 (240, 1). spuma nitri rodit V, 6.
 Sputum. II, 8 (44, 26 sqq.); II, 8 (47, 25); *ibid.* (45, 11); *ibid.* (48, 10).
 Squama et ferri et aeris sanguinem suppressit V, 1. squama aeris purgat V, 5. rodit V, 6. exedit V, 7. adurit V, 8. *squama ossis* VII, 7, 7. *ibid.* 15.
 Squamula. V, 28, 17.
 Stercus. II, 12, 2; IV, 20; IV, 22; V, 27, 8; V, 5; V, 8; V, 12; VI, 18, 5.
 Sternumentum. II, 3; II, 8 (47, 33); V, 22, 8.
 Stibi. mollit V, 15. stibis cocti VI, 6, 12. stibis combusti et eloti VI, 6, 13.
 Stoechas (*Lavandula s.*). VIII, 9, 1 (343, 19).

- Stomachus.** IV, 1 (120, 14); *ibid.* (121, 24); IV, 12 (135, 25); *ibid.* (136, 36, 37); I, 8; IV, 12 (136, 15); *ibid.* (137, 19); IV, 13.
Strigilis. VI, 7, 1 (239, 35).
Strigmentum. VI, 6, 39.
Struma. V, 28, 7.
Struthium (*Saponaria officinalis*?).
 struthium album VI, 5.
Styrax (succus *S. officin.*). concoquit et movet pus V, 3. purgat V, 5. rodit V, 6. discutit V, 11. mollit V, 15.
Sudatio. III, 21 (107, 2); III, 27, 3.
Sudo. I, 3 (16, 26); II, 4 (34, 18).
Sudor. II, 17 *et passim*.
Suffusio. VI, 6, 35 et 39; VII, 7, 13; VII, 7, 14.
Sulphur. concoquit et movet pus V, 3. aperit V, 4. purgat V, 5. exedit V, 6. mollit V, 15. sulphur *ἀπυρον* V, 18, 13.
Sura. VIII, 1 (328, 28).
Surditas. II, 8 (47, 16); VI, 7, 7.
Suspensidium. II, 8 (51, 14).
Sutura. V, 26, 23 *et passim*. *suturae calvariae*, v. *Calvaria* VIII, 1 (323, 15).
Sycaminum (*Ficus sycomorus*). III, 18 (100, 26).

T.

Tabes. III, 22 (109, 34) *et passim*.
Talus. VIII, 1 (328, 30, 35); VIII, 22; VIII, 23.
Tamarix (*T. gallica, germanica, africana*). II, 33 (73, 20).
Tempestas. II, 1 (28, 1 sqq. et 29, 16 sqq.).
Tempora. *pars capitis* VIII, 1 (324, 2); VI, 6, 1; VI, 6, 16; VII, 7, 15.
Tepidarium. I, 3 (16, 26).
Terebra. VIII, 3 (330, 30); VII, 5, 4.
Terram edere II, 7 (39, 13). *terra eretria* mollit V, 15.
Testa. III, 12; VI, 13; VII, 12, 1. **Testiculus.** VII, 18.
Thapsia (*T. germanica*). VI, 4.
Thlapsi (*Capsella bursa pastoris*). V, 23, 3.
Thorax. IV, 5 (127, 6); III, 19 (103, 6).
Thymum (*Satureia capitata*). mali succi II, 21. alienum stomacho II, 25. urinam movet II, 31. sensus excitat II, 32.
Tibia. (328, 31.)
Tonsillae. VI, 10; VII, 12, 2.
Tormina. IV, 22 *et passim*.
Torpor. III, 20 (105, 18).
Torus. VII, 18 (297, 20).
Tragacantha, *et* **tragacanthum** (*Astragalus aristatus*). glutinat vulnus V, 2. laevat id quod exasperatum est V, 13. nuces graecae cum tragacantho contritae IV, 9.
Tragoriganus (*Thymus graveolens*) *et* **tragoriganum**. discutit V, 11. urinam movet II, 31.
Tragum. boni succi est II, 20.
Transfusio. I, *prooem.* (10, 31).
Transfusio. transfuso in arterias sanguine I, *prooem.* (10, 27).
Trifolium (*Psoralea bituminosa*?). tr. semen IV, 16.
Triticum. firmitus quam milium II, 18 (64, 35). boni succi II, 20.
Trixago (*Teucrium flavum*). IV, 13 (138, 30).
Tuber. V, 18, 17.
Tuberculum. V, 18, 16; VI, 18, 2 (256, 6); IV, 11 (133, 32); VIII, 1 (325, 35).
Tunica. VII, 2 (264, 24); VII, 6.
Tus. sanguinem supprimit V, 1. glutinat vulnus V, 2. purgat V, 5. adurit V, 8. turis et fuligo et cortex concoquunt et movent pus V, 3. rodit V, 6. tus masculum V, 18, 7.
Tussicula. IV, 5; III, 22 (112, 2).
Tussis. IV, 10 *et passim*.

V.

- Varicula. V, 26, 32.
 Varix. II, 8 (46, 25); VII, 31.
 Vatus. VIII, 20.
 Varus. VI, 5.
 Vena. VII, 7, 15 (282, 29); II, 10 (53, 2); I, *prooem.* (4, 13); II, 2 (32, 11); III, 6 (85, 29); II, 10 (54, 29); VII, 18 (295, 16); V, 26, 2.
 Venenum. V, 27, 3.
 Venter. summus venter IV, 20. venter imus VII, 26, 5 (313, 19). II, 8 (45, 30); II, 1 (31, 17); II, 8 (47, 14).
 Ventriculus. V, 28, 8.
 Venus. I, 3 (21, 12, 16); III, 27, 3; III, 23 *et passim*.
 Ver saluberrimum est II, 1 (27, 21) *et passim*.
 Veratrum (*V. nigrum* = *helleborus orientalis*; *v. album* = *v. album*). II, 12, 1; III, 18 (101, 36); IV, 15.
 Verbena (*V. officinalis*). reprimat et refrigerat II, 33.
 Vermis. *in auribus* VI, 7, 5.
 Verruca. II, 1 (30, 34); V, 28, 14.
 Vertebra. VIII, 1 (325, 15 sqq.); VIII, 14.
 Vertex. VII, 7, 15 (282, 16); VIII, 1 (324, 36).
 Vesica. IV, 1 (122, 20); V, 26, 19; VII, 7, 1; II, 7 (40, 27).
 Vettonica (*Bet. officinalis*), *v. Bettonica*.
 Vinum. II, 18 (66, 12); *ibid.* (66, 18); II, 26. modice vetus VI, 6, 8. non pervetus V, 26, 30. dilutum, lene I, 4. integrum, austerum III, 24. firmius II, 17 (62, 22). austerum I, 6; III, 19 (103, 26); IV, 17, 2. vinum calidum *et vini varia genera* IV, 12 (137, 13 sqq.). resinatum III, 24. meracum IV, 26 (151, 34). dulce, vel lene II, 20. leve, austerum III, 22 (112, 21). leve, subausterum VI, 6, 8 (229, 21). tenue, odoratum IV, 18 (144, 18). austerum, sed quam tenuissimum III, 21 (107, 21). purum — dilutum VI, 11. merum IV, 11. mixtum VI, 9 (246, 8); IV, 26 (151, 26). salsum I, 6 (134, 27); III, 24. graecum salsum III, 24. amineum austerum IV, 5 (126, 32). dulce, cett. IV, 12 (136, 25). rhetoricum, vel allobrogicum IV, 12 (137, 13). resina conditum *ibid.* l. 15.
 Viola. alba viola (*Matthiola incana*) discutit V, 11. flos aperit V, 4. viola purpurea (*v. odorata*?) discutit V, 11.
 Virus. V, 27, 1; *ibid.* 2.
 Viscum (*Viscum album*). V, 28, 11 (212, 13).
 Viscus. I, *prooem.* (5, 7); II, 8 (45, 28); II, 10 (53, 3).
 Vitellus. V, 5; VI, 6, 9; V, 22, 6.
 Vitis (*V. vinifera*). folia vitis III, 7, 2. vitis alba (*Bryonia alba; dioica?*) glutinat vulnus V, 2.
 Ulcus. VI, 7, 2; VI, 11; VI, 12; VI, 13; V, 25, 11; V, 28, 6; V, 28, 2; VII, 4, 1; V, 26, 33; V, 26, 28; V, 26, 32; VI, 18, 2 (255, 25); VI, 6, 18; II, 6 (36, 30); II, 2 (32, 1).
 Uleusculum. V, 28, 15 (218, 16).
 Umbilicus. II, 1 (30, 26); II, 3 (32, 30); II, 4 (34, 8); VI, 17; VII, 14; VII, 29 (318, 32).
 Unctio. I, 2 (15, 8); I, 3 (20, 9); I, 3 (20, 19); IV, 15; II, 14 (59, 16) *et passim*.
 Uncus. VII, 26, 2 (309, 27).
 Unguentum. III, 18 (100, 22); 21, 1.
 Unguis. VIII, 1 (327, 38); VI, 7 (44, 9). *morbus oculi* VII, 7, 4.

- Vomica. III, 27, 4; IV, 15; II, 7 (43, 38 sqq.); II, 8 (44, 33).
 Vomitus. I, 3 (18, 38 sqq.) *et passim*.
 Urina. non concocta II, 7 (39, 10).
 arenosa II, 7 (41, 5). destillat
 ibid. (41, 4). cruenta V, 26, 11.
 biliosa IV, 5 (126, 12). purulenta
 II, 8 (44, 24). turbida IV, 5 (126,
 15). viridis II, 7 (40, 24). urina
 varians II, 5 (35, 28). in urina
 subsidentia II, 3 (33, 9). mala
 et pessima urina II, 4 (34, 37
 et 38); II, 6 (37, 32 sqq.); IV,
 27, 2.
 Urtica (*U. dioica*; *urens*). boni
 succus II, 20. alvum movet II,
 29. urticae contrita semina III,
 27, 2.
 Uterus. IV, 1 (121, 8); III, 21 (106,
 2); VII, 21 et 32; VII, 28; VII,
 17; II, 10 (52, 5).
 Uva. II, 18 (65, 8); II, 24; II, 29;
 VI, 7, 7. Uva taminia (*Delphinium staphysa-*
 gria). urinam movet III, 21 (107,
 13). aperit V, 4. purgat V, 5.
 rodit V, 6. adurit V, 8. discutit
 V, 11. uva taminia sine semi-
 nibus VI, 9 (246, 23).
 Uva. *oculi* VII, 14.
 Uva. *palati* VI, 8, 2; VI, 14; VII,
 12, 3.
 Vulnus. V, 26 *et passim*.
 Vulsella VI, 18, 3; VIII, 5 (339, 2).
 Vulva. IV, 1 (122, 29); VII, 29
 (317, 4); IV, 27, 1; II, 7 (40,
 21); V, 21, 2; V, 21, 4; V, 25,
 5; II, 24.
- X.**
- Xylobalsamum. V, 18, 7.
- Z.**
- Zingiber (*Anomum z.*). V, 23, 3.

INDEX VOCABULORUM GRAECORUM

IN MEA EDITIONE LITERIS GRAECIS EXARATORVM *).

- ἀγκτήρ* p. 191, 24.
ἀγκύλη 171, 12.
ἀγκυλοβλέφαρον *275, 24.
ἀγρία 219, 15; 220, 27.
ἀδερῶματα *271, 33.
αἰγίλῳ 276, 7.
αἰμορροΐδες 31, 10; 259, 10.
ἀκροχορδῶν 30, 34; *216, 35.
ἀλφός 221, 5.
ἀλωπεκία 223, 32.
ἀναστόμωσις 130, 7.
ἀναστομωτικά 170, 29.
ἀνθηρά 249, 4; 250, 22; *252, 6; *255, 12.
ἀντιάδες 288, 16.
ἀνώδυνα 183, 4; 227, 27.
ἀποπληξία 117, 6, 15.
ἀπόστημα 28, 29.
ἀπυρρος 169, 11.
ἀραχνοειδής 279, 34.
ἀρσενικόν 162, 7.
ἀσθμα 130, 33.
ἀσκλητής 106, 5.
Ἀσκληπιός *234, 28; *237, 4.
ἀστήρ 231, 30.
ἀτροφία 110, 3.
αὐτόπυρρος 65, 1.
ἄφθαι 30, 25; 249, 14.
ἀχάριστον 228, 25.
βάλανος μυρεψική 167, 22.
βασιλικόν 172, 36; 236, 23.
βουβονοκήλη 297, 30.
βρογχονήλη 289, 27.
γαγγλίον 271, 32.
γάγγραινα 196, 35.
δαρτόν 295, 20.
διάβρωσις 134, 7.
διά δαφνίδων 174, 18.
διαιτητική 2, 22.
διὰ λιβάνου 231, 38.
διὰ κέρματος 233, 12.
διὰ κρόκον 237, 6.
διάφραγμα 7, 34.
Διοκλείος κυαθίσκος *270, 25.
δυσεντερία 147, 28.
δύσπνοια 130, 32.
ἐγκανθίς 275, 12.
ἐγγχρίστα 182, 22.
εἰλεός 29, 5; 146, 7, 8.
εἰλικρινές 33, 7.
ἐκτρόπιον 278, 30.
ἐλαιώδης 189, 17, 22; 190, 9.
ἐλτροειδής *295, 18.
ἐμπειρικοί *2, 22; *5, 18; 160, 5.
ἐμπροσθότονος 128, 3.
ἐναιμα 172, 17.
ἐννεαφάρμακον 173, 32.
ἐντεροκήλη 295, 37.
ἐξάνθημα 218, 6.
ἐπινυκτίς 218, 20.
ἐπιπλοκήλη 295, 37.
ἐπισπαστικά 167, 2; 174, 17.
ἐρυσίπελας 196, 28; 197, 23.
εὐχνυμος 67, 4.
εὐώδης 182, 17.
ζύγωμα 324, 30.
ηπατικός 40, 32.
ηλιοτρόπιον 203, 10.
θηρίωμα 207, 24; 208, 8.
θυμίον 217, 5.
ἰχώρ 189, 16, 18, 35.
κακόχνυμος 67, 4.
καρδιακός 102, 35.
καρυνώδη 169, 28; *170, 18; 245, 24.

*) Asterisco notavi vocabula quae in tribus antiquioribus codd., vel saepe in Med. I et Vat. VIII, literis latinis exarata sunt. — Vide in praefatione quae de re scripsi.

- παρωτίδες 120, 11.
 κατασταγμός 126, 18.
 κανασάδης 47, 12.
 καχεξία 31, 14; 110, 7.
 κερατοειδής 279, 24.
 κερκίς 327, 12.
 κεφαλαία 123, 11; 173, 15.
 κηρόν 216, 9.
 κίρσοκῆλη 297, 9.
 κοιλική 145, 6.
 κολικός 147, 8.
 κόλον 57, 4.
 κονδόλωμα 206, 27; 319, 25.
 κορῶα 126, 16.
 κρεμαστήρες 295, 15.
 κριθῆ 273, 18.
 κρῖσμοι 80, 26.
 κρυσταλλοειδής 280, 3.
 κυνάγχη 129, 24.
 κυνικός σπασμός 125, 4.
 κύπειρος 107, 16.
 κωκόν 172, 28.
 λαγώφθαλμος 278, 14.
 λειεντερία 29, 6.
 λεπίς χαλκοῦ 56, 19.
 λεύκη 221, 10.
 λευκοφλεγματία 106, 4; 108, 9.
 λήθαργος 104, 18.
 λημνίσκος 316, 20.
 λιθοτόμος 311, 27.
 λιπαρά 176, 18.
 μέθος 10, 7.
 μελαγχολία 28, 30.
 μέλας 221, 18.
 μελίκηρα (μελιτηρά) 189, 16.
 μελικηρίδες 169, 33; 271, 32.
 μεμυγμένοι 233, 14, 26, 27.
 μηνιγογούλαξ 332, 9.
 μυδρίασις 238, 1.
 μυρμήκιον 217, 14.
 νόθαι 326, 16.
 ξηροφθαλμία 235, 38.
 ὀβολός 166, 4.
 ὄζαινα 244, 26; 286, 19.
 ὄξη 93, 14.
 ὀπισθοτόνος 128, 2.
 ὀρθόπνοια 130, 35.
 ὄσχεον 295, 26.
 οὐρητήρες 122, 19.
 ὀφίσις *224, 2.
 παράλυσις 29, 32; 117, 15, 16; 237, 30.
 παρασυνάγχη 129, 27.
 παροῦλς *250, 15; *251, 15.
 παρωτίδες 169, 32.
 πεπλυμένος 166, 36.
 περιδίκιον 73, 7.
 περιπνευμονικός 139, 26.
 περιτόναιον 123, 1.
 πεσός 178, 11.
 πλευριτικός 138, 10.
 πρόπτωσις 230, 13.
 πολύγονον 73, 9.
 πτερύγιον 260, 21; 273, 35.
 πυλωρός 121, 34.
 δαγάδια 257, 38.
 δάπτουσα 173, 11; 192, 23.
 ῥῆξις 134, 7.
 ῥιζαγρα *288, 14.
 ῥινίον *236, 11, *18.
 ῥυάς 274, 24; 309, 17.
 ῥυνώδης 174, 34; 192, 31.
 σαρκοκῆλη 297, 25.
 σαρκοφάγος 158, 15.
 σηπτά 175, 14.
 σκωρία μολύβδου 165, 8.
 σμιλλον *233, 28; *234, 32; 235, 34.
 σπασμός 29, 26.
 σταντή 181, 23; 240, 32.
 σταφίς ἄγρια 107, 14.
 σταφύλωμα 279, 3.
 στεατώματα 271, 34.
 στόμωμα 228, 14.
 στραγγουρία 29, 4.
 στρόφοι 39, 29.
 στρύχρον 83, 11.
 σύκωσις 223, 13.
 συνάγχη 129, 22.
 σφαγίτιδες 120, 10.
 σφαιρίον 233, 37; *234, 13, 14, 27; *235, 10, 35.
 σφραγίς 177, 15.
 σχιστός 161, 22.
 σχοῖνος 107, 16.
 τεινεσμός 150, 19.
 τένοντες 325, 33.
 τέτανος 29, 27; 128, 3.
 τετρασφάρακον *150, 28; 173, 29; 255, 30.
 τεφρίον 228, 34.
 τιθύμαλλος 163, 8.
 τομεῖς *325, 5.
 τροχίσκος 166, 7.
 τρυγών 247, 11.
 τυμπανίτης 106, 3.
 ὑαλοειδής 279, 35.
 ὑδροκέφαλος 123, 25.
 ὑδροκῆλη 296, 27.
 ὑδροφοβος (ὑδροφοβία) 201, 15.
 ὕδρωψ 105, 29.
 ὑπό σάρκα 106, 4.
 ὑπόχυσις 237, 23.
 χαλάζια 273, 28.
 χάλκανθος 161, 7.
 χειρουργική 2, 23.
 Χείρων 233, 32.
 χοινικός 330, 26.
 χολέρα 143, 32.
 χορδαφος 146, 7.
 χοριοειδής 279, 28.
 φαιέδαινα 207, 32
 208, 7; 256, 35.

- φαρμακευτική 2, 23. φλεγμονή 3, 25. φύγεθλον 170, 1; 211,
 φθίσις 29, 3; 110, 18. φλυζάκιον 218, 13. 22.
 φθειρίσις 232, 15. φλύκταινα 218, 11. πύμα 256, 6.
 φιλαλήθης 234, 13. φρενίτις 30, 6; 98, ἀμοπλάται 112, 27;
 • φίμωσις 306, 1. 13. 326, 21.

INDEX

LOCORUM HIPPOCRATIS ET CELSI

INTER SE COMPARATORUM*).

- Aer, aq. et loc. 1 = p. 71, l. 14. Aph. II. 24 = * p. 81, l. 7 (post
 3 = p. 218, l. 21. undecimo); p. 81, l.
 9 = p. 41, l. 15. 11.
 De Affect. 23, 24 = p. 149, l. 26. — — 25 = p. 46, l. 35; p. 51,
 Aph. I. 3 = p. 31, l. 32. l. 8.
 — — 6 = p. 56, l. 13. — — 26 = p. 194, l. 1.
 — — 7 = p. 87, l. 22. — — 28 = p. 35, l. 28.
 — — 9 = * p. 80, l. 7 (post — — 32 = * p. 33, l. 4 (post
 subveniet); p. 84, l. 8. orta).
 — — 11 = p. 84, l. 8. — — 35 = p. 32, l. 30; p. 34,
 — — 13 = p. 12, l. 22; p. 20, l. 8.
 — — l. 33. — — 36—37 = p. 58, l. 20.
 — — 14 = p. 20, l. 35. — — 42 = p. 51, l. 2; p. 117,
 — — 15 = p. 21, l. 6. l. 21.
 — — 16 = p. 86, l. 36. — — 43 = p. 51, l. 15; * p. 93,
 — — 22 = p. 78, l. 30. l. 22 (post admit-
 Aph. II. 1 = p. 37, l. 19. tuit).
 — — 3 = p. 34, l. 1. — — 44 = p. 31, l. 21.
 — — 4 = p. 16, l. 6. — — 45 = p. 46, l. 16.
 — — 6 = p. 42, l. 2. — — 49 = p. 16, l. 13.
 — — 11 = p. 15, l. 15. — — 50 = p. 16, l. 11.
 — — 13 = p. 83, l. 9. — — 52 = * p. 33, l. 4 (post
 — — 16 = p. 15, l. 31. orta).
 — — 19 = p. 38, l. 31. — — 53 = p. 21, l. 4.
 — — 20 = p. 21, l. 2. — — 54 = p. 28, l. 36.
 — — 23 = p. 80, l. 31. Aph. III. 1 et 8 = p. 28, l. 2.

*) Loca asterisco notata ea sunt quae iterata me docuit Celsi recensio, textu jam typis exarato, peracta.

- Aph. III. 4 = p. 21, l. 23.
 — — 5 = p. 29, l. 21.
 — — 6 = p. 30, l. 9.
 — — 7 = p. 29, l. 29.
 — — 8 = p. 28, l. 18.
 — — 9 = p. 28, l. 3.
 — — 10 = p. 48, l. 18.
 — — 11 = p. 29, l. 37.
 — — 12 = p. 30, l. 4.
 — — 13 = p. 30, l. 12.
 — — 14 = p. 30, l. 18.
 — — 15 = * p. 28, l. 9 (post
dies).
 — — 16 = p. 29, l. 30.
 — — 17 = p. 29, l. 21.
 — — 18 = p. 30, l. 23.
 — — 19 = p. 27, l. 16.
 — — 20 = p. 28, l. 34.
 — — 21 = p. 29, l. 1.
 — — 22 = p. 29, l. 7.
 — — 22—23 = p. 37, l. 22.
 — — 23 = p. 29, l. 14.
 — — 24 = p. 30, l. 27.
 — — 25 = p. 30, l. 31.
 — — 26 = p. 30, l. 35.
 — — 27 = p. 30, l. 37.
 — — 28 = p. 31, l. 4.
 — — 29 = p. 31, l. 8.
 — — 30 = p. 31, l. 17.
 Aph. IV. 4 = p. 18, l. 38.
 — — 11 = * p. 39, l. 30 (post
solvuntur).
 — — 13 = p. 58, l. 18.
 — — 16 = p. 37, l. 14.
 — — 17 = p. 19, l. 9.
 — — 21 = p. 51, l. 17.
 — — 24 = p. 49, l. 27.
 — — 26 = p. 147, l. 32.
 — — 28 = p. 47, l. 16.
 — — 29 = p. 34, l. 4.
 — — 31 = p. 43, l. 28.
 — — 34 = p. 37, l. 5.
 — — 35 = p. 37, l. 8.
 — — 40 = p. 35, l. 25.
 — — 43 = * p. 33, l. 7 (post
quævit); p. 34, l. 23.
 — — 44 = p. 42, l. 34.
 Aph. IV. 48 = p. 37, l. 11; p. 60,
 l. 20.
 — — 49 = p. 36, l. 24.
 — — 50 = p. 37, l. 12.
 — — 51 = p. 35, l. 26.
 — — 52 = p. 34, l. 6.
 — — 53 = p. 34, l. 7.
 — — 54 = p. 90, l. 2.
 — — 55 = p. 82, l. 18.
 — — 56 = p. 35, l. 23.
 — — 59 = p. 47, l. 4.
 — — 58 = p. 47, l. 12.
 — — 60 = p. 47, l. 15.
 — — 61 = p. 80, l. 27.
 — — 62 = p. 115, l. 13.
 — — 64 = p. 115, l. 14.
 — — 67 = * p. 34, l. 32 (post
morbi est).
 — — 68 = p. 42, l. 35.
 — — 72 = p. 35, l. 3.
 — — 73 = p. 33, l. 23.
 — — 75—76 = p. 40, l. 27.
 — — 79 = * p. 40, l. 28; p. 41,
 l. 5.
 — — 80—81 = p. 40, l. 28.
 — — 82 = p. 47, l. 19.
 Aph. V. 1 = p. 37, l. 14.
 — — 3 = p. 51, l. 10.
 — — 4 = p. 51, l. 12.
 — — 5 = p. 37, l. 17.
 — — 6 = p. 128, l. 6.
 — — 7 = p. 46, l. 4; p. 113,
 l. 21.
 — — 9 = p. 111, l. 24.
 — — 10 = p. 42, l. 38.
 — — 11 = p. 110, l. 23.
 — — 12 = p. 48, l. 13.
 — — 13 = p. 41, l. 17.
 — — 14 = p. 113, l. 5.
 — — 15 = p. 41, l. 31; p. 44,
 l. 33.
 — — 16 = p. 26, l. 2.
 — — 17 = p. 29, l. 28.
 — — 18 et 20 = p. 25, l. 22.
 — — 22 = p. 25, l. 30.
 — — 25 = p. 25, l. 28.
 — — 26 = p. 67, l. 30.

- Aph. V. 30 = p. 37, l. 18; p. 52, l. 10.
 — — 32 = p. 46, l. 32.
 — — 34 = p. 41, l. 18; p. 49, l. 6.
 — — 37 = p. 51, l. 5.
 — — 39 = p. 51, l. 6.
 — — 40 = p. 42, l. 32; p. 239, l. 16.
 — — 50 = p. 154, l. 5.
 — — 52 = p. 41, l. 20.
 — — 55 = p. 50, l. 12.
 — — 57 = p. 40, l. 3.
 — — 64 = p. 112, l. 9.
 — — 65 = p. 41, l. 26.
 — — 66 = p. 193, l. 31.
 Aph. VI. 8 = p. 106, l. 7.
 — — 12 = p. 41, l. 29.
 — — 13 = p. 46, l. 30.
 — — 15 = p. 46, l. 31.
 — — 16 = p. 47, l. 34.
 — — 17 = p. 46, l. 24.
 — — 18 = p. 186, l. 31.
 — — 19 = p. 186, l. 35.
 — — 20 = p. 42, l. 3.
 — — 21 = p. 46, l. 26.
 — — 23 = p. 186, l. 21.
 — — 27 = p. 49, l. 6.
 — — 28, 29, 30 = p. 157, l. 2.
 — — 31 = p. 226, l. 8.
 — — 35 = p. 48, l. 33.
 — — 37 = p. 130, l. 15.
 — — 40 = p. 47, l. 2.
 — — 42 = p. 50, l. 5.
 — — 43 = p. 50, l. 8.
 — — 42 = p. 47, l. 6; p. 50, l. 10.
 — — 48 = p. 46, l. 47.
 — — 50 = p. 188, l. 18; * p. 333, l. 6 (post *vo-muerit*).
 — — 51 = p. 48, l. 27.
 — — 52 = p. 36, l. 20.
 — — 55 = p. 157, l. 13.
 Aph. VII. 1 = p. 34, l. 15.
 — — 3 = p. 34, l. 17.
 — — 4 = p. 34, l. 17.
 Aph. VII. 9 = p. 51, l. 10.
 — — 10 = ³ p. 50, l. 4 (post *mala sunt*).
 — — 11 = p. 43, l. 4.
 — — 12 = p. 43, l. 5.
 — — 13 = p. 43, l. 6.
 — — 14 = p. 43, l. 7.
 — — 15 = p. 134, l. 9.
 — — 16 = p. 48, l. 20.
 — — 17 = p. 41, l. 22.
 — — 18 = p. 43, l. 8.
 — — 21 = p. 43, l. 9.
 — — 23 = p. 43, l. 1.
 — — 26 = p. 51, l. 13.
 — — 34 = p. 40, l. 28.
 — — 42 = p. 47, l. 2.
 — — 44 = p. 266, l. 8.
 — — 45 = p. 44, l. 35.
 — — 47 = p. 48, l. 34; p. 130, l. 15.
 — — 70 = p. 102, l. 7.
 — — 80—81 = p. 43, l. 2.
 — — 82 = p. 134, l. 10.
 De Arte 13 = p. 186, l. 7.
 — Articuli. 6—7 = p. 356, l. 22.
 — — 14 = p. 356, l. 32; p. 341, l. 17; p. 348, l. 3.
 — — 15 = p. 341, l. 15.
 — — 17 = p. 357, l. 8.
 — — 26 = p. 358, l. 3.
 — — 29—30 = p. 358, l. 29.
 — — 30 = p. 353, l. 25.
 — — 32 = p. 340, l. 21.
 — — 33 = p. 340, l. 33.
 — — 36 = p. 338, l. 14.
 — — 38 = p. 338, l. 20.
 — — 39 = p. 339, l. 10.
 — — 40 = p. 339, l. 15.
 — — 47 = p. 355, l. 3.
 — — 49 = p. 343, l. 5.
 — — 50 = p. 344, l. 19.
 — — 67 = p. 81, l. 14.
 — — 67 (cf. 63—66) = p. 362, l. 11.
 Coac. 13 = p. 37, l. 11.
 — 51 = p. 42, l. 15.

CELSUS.

- Coac. 72 = p. 36, l. 24.
 — 113 = p. 60, l. 20.
 — 115 = p. 42, l. 34.
 — 118 = p. 115, l. 14.
 — 129 = p. 46, l. 36.
 — 132 = p. 57, l. 13.
 — 142 = p. 80, l. 27.
 — 207 = p. 47, l. 15.
 — 220 = p. 46, l. 25.
 — 271 = p. 37, l. 6.
 — 272 = p. 37, l. 8.
 — 285 = p. 33, l. 23.
 — 332 = p. 51, l. 10.
 — 350 = p. 194, l. 1.
 — 361 = p. 42, l. 38.
 — 391 = p. 43, l. 4.
 — 396 = p. 43, l. 38.
 — 398 = p. 41, l. 31; p. 44, l. 33.
 — 426 = p. 110, l. 23.
 — 428 = p. 48, l. 14.
 — 431 = p. 111, l. 24.
 — 442 = p. 47, l. 37.
 — 446 = p. 47, l. 4.
 — 457 = p. 50, l. 9.
 — 463 = p. 47, l. 19.
 — 465 = p. 47, l. 6; p. 50, l. 10.
 — 490 = p. 188, l. 18.
 — 494 = p. 186, l. 36.
 — 495 = p. 41, l. 17.
 — 497 = p. 33, l. 34.
 — 499 = p. 186, l. 21.
 — 502 = p. 35, l. 23.
 — 568 = p. 35, l. 3.
 — 596 = p. 51, l. 47.
 — 617 = p. 47, l. 16.
 De Corde = p. 128, l. 13.
 — Diaeta salubri 1 = p. 21, l. 8.
 — — 4 = p. 18, l. 18.
 — — 5 = p. 19, l. 35.
 — — 6 = *p. 20, l. 37 (post *moment*).
 Epid. I, 3, 10 = p. 11, l. 18.
 — 12 = p. 80, l. 32.
 — II, 1, 5 = p. 28, l. 18.
 Epid. II, 6, 11 = p. 81, l. 14.
 — III, 4 = p. 44, l. 19.
 — V, 27 = p. 333, l. 28.
 De Fistulis 4 = p. 268, l. 25.
 De Flatibus 1 = p. 51, l. 27.
 De Humor. 4, 5, 6 = p. 80, l. 32.
 De Fracturis 4 = p. 345, l. 32; p. 348, l. 15.
 — — 7 = *p. 341, l. 4 (post *brachiaque*).
 — — 8 = *p. 341, l. 5 (post *humert*); p. 348, l. 2.
 — — 31 = p. 81, l. 14.
 Intern. affect. 31 = p. 143, l. 7.
 De Morbis II, 8 et 25 = p. 117, l. 7.
 De Officina 17 = p. 59, l. 2.
 Progn. 2 = 36, l. 11, 17, 20; p. 48, l. 29.
 — 3 = 33, l. 27; p. 36, l. 31; p. 42, l. 23.
 — 4 = p. 36, l. 36.
 — 5 = p. 33, l. 2; p. 34, l. 23; p. 35, l. 23.
 — 7 = p. 32, l. 32; p. 34, l. 11—12; p. 43, l. 22 et 26; p. 45, l. 2, 5, 7.
 — 8 = p. 39, l. 23 et l. 27.
 — 9 = p. 32, l. 27; p. 44, l. 19.
 — 10 = p. 32, l. 28; p. 33, l. 32 et 33.
 — 11 = p. 33, l. 18, 19 et 23; p. 35, l. 11; p. 38, l. 6.
 — 12 = p. 35, l. 3 et 31; p. 37, l. 38; p. 43, l. 31.
 — 12—13 = p. 33, l. 11.
 — 14 = p. 44, l. 31; p. 47, l. 31.
 — 15 = p. 37, l. 27; p. 43, l. 33 et 36; p. 44, l. 28; p. 47, l. 27; p. 48, l. 10.
 — 16 = p. 43, l. 38.
 — 17 = p. 44, l. 12 et 16; p. 45, l. 9 et 16.
 — 18 = p. 42, l. 25; p. 45, l. 7.
 — 19 = p. 37, l. 3; p. 42, l. 1.

	6; p. 44, l. 25; p. 47, l. 25.		<i>fnitur</i>); p. 50; l. 35.
Progn. 20	= p. 81, l. 13.	Prorrh. II, 40	= p. 46, l. 29; *p. 50, l. 37 (post <i>le-</i> <i>vatur</i>); *p. 51, l. 1 (post <i>aestate</i>).
— 21	= p. 40, l. 10 et 13.	— — 41	= *p. 50, l. 30 (post <i>aestate</i>).
— 22	= p. 42, l. 30.	— — 42	= *p. 39, l. 38 (post <i>debilitentur</i>); *p. 40, l. 6 (post <i>in-</i> <i>sudant</i>).
— 23	= p. 42, l. 38.		
— 24	= p. 40, l. 15; p. 43, l. 14.		
Prorrh. II, 4	= *p. 39, l. 20 (post <i>instare</i>); p. 40, l. 24 et 26.		
— — 5	= p. 45, l. 37.		
— — 7	= p. 45, l. 16, 20, 25; p. 48, l. 24.	Vet. medic. 18	= p. 126, l. 16.
— — 8	= p. 46, l. 3.	Vict. rat. II, 38	= *p. 28, l. 14 (post <i>mutentur</i>).
— — 9	= p. 46, l. 7; p. 49, l. 14.	— — — 60	= p. 13, l. 13.
— — 14	= *p. 34, l. 34 (post <i>resolutum</i>).	Vict. rat. in acut. 5	= p. 117, l. 6.
— — 17	= p. 40, l. 19.	— — — — 7	= p. 129, l. 35; p. 140, l. 21; p. 63, l. 34 (post <i>collo-</i> <i>catur</i>).
— — 18	= p. 225, l. 21.		
— — 22	= p. 46, l. 15.		
— — 23	= *p. 50, l. 3 (post <i>senili est</i>).	— — — — 9	= p. 16, l. 8.
— — 24	= p. 40, l. 21.	— — — — 12	= p. 17, l. 17.
— — 30	= p. 47, l. 11; *p. 50, l. 25 (post <i>subsequentur</i>).	Vuln. capit. 8	= p. 334, l. 13.
— — 31	= p. 39, l. 13.	— — — 12	= p. 333, l. 28.
— — 35	= p. 41, l. 35.	— — — 13	= p. 335, l. 4.
— — 36	= p. 42, l. 1.	— — — 14	= p. 334, l. 10, *29 (post <i>in conspe-</i> <i>ctu sit</i>).
— — 39	= *p. 46, l. 24 (post		

INDEX

AUCTORUM ANTIQUORUM A ME IN TEXTU ALLATORUM.

Aëtius: p. 108, l. 30; p. 116, l. 5; *p. 118, l. 3 (post <i>bubulis</i>); p. 174, l. 9; p. 190, l. 31.	p. 125, l. 4; p. 135, l. 4; p. 141, l. 18; p. 144, l. 23; p. 146, l. 21; p. 105 et 108 (<i>in notis</i>).
Arætaeus: p. 114, l. 37.	Columella: p. 24, l. 2; p. 152, l. 6.
Coel. Aurelianus: p. 101, l. 2;	

- Dioscorides:** p. 118, l. 34; p. 141, l. 19.
- Galenus:** p. 167, l. 11; p. 168, l. 2, 19, 33; p. 169, l. 14; p. 170, l. 30; p. 171, l. 28; p. 172, l. 22, 26, 36; p. 173, l. 6, 16, 27, 30, 36; p. 174, l. 4, 17, 34; p. 176, l. 8; p. 177, l. 19, 32, 36; p. 179, l. 5; p. 181, l. 26, 27; p. 184, l. 35; p. 324, l. 3; p. 359, l. 28.
- Horatius:** p. 62, l. 2.
- Oribasius:** p. 52 (*tit.*); p. 61, l. 12; p. 62, l. 10; p. 66, l. 25; *p. 69, l. 17 (post *absinthium*); p. 113, l. 9; p. 126, l. 32; p. 284, l. 31; p. 324, l. 3.
- Paulus Aegineta:** p. 190, l. 31; p. 219, l. 9; p. 267, l. 5; p. 268, l. 8; p. 270, l. 20; p. 273, l. 9, 29, 35; p. 275, l. 13, 25; p. 276, l. 7, 30; p. 277, l. 7; p. 278, l. 14, 31; p. 279, l. 4; p. 282, l. 13; p. 284, l. 30; p. 286, l. 5; p. 287, l. 26; p. 288, l. 20, 21, 36; p. 289, l. 27; p. 290, l. 15; p. 292, l. 6 (et *not.*); p. 293, l. 4; p. 297, l. 10; p. 303, l. 6; p. 305, l. 4; p. 306, l. 2, 30; p. 297, l. 10; p. 303, l. 6; p. 305, l. 4; p. 306, l. 2, 30; p. 306, l. 23; p. 308 (*not.*); p. 316, l. 9; p. 317, l. 1; p. 319, l. 25; p. 322, l. 1; p. 342, l. 6.
- Plinius:** p. 69, l. 10; p. 91 (*in not.*); p. 111 (*id.*); p. 114, l. 37; p. 130, l. 19, 23; p. 152, l. 6; p. 157, l. 29; p. 164, l. 5; p. 168, l. 26; p. 200, l. 22; p. 238, l. 33; p. 284, l. 4.
- Suetonius:** p. 91 (*in notis*).
- Varro:** p. 164, l. 27.

Subjungere libuit indiculum locorum Celsi ad quae ipse in opere suo remittit lectorem quaeque in ipso textu indicare neglexi.

- p. 14, l. 19: corpus integrum (cf. p. 33, l. 7; p. 83, l. 2).
- p. 17, l. 21: foveat (cf. VI, 6, 15).
- p. 25, l. 9: consuevit (cf. II, 7, p. 39, l. 30; II, 8, p. 45, l. 37; III, 27, 2; IV, 31, *init.*).
- p. 29, l. 5: ελλείπον (cf. p. 146, l. 6).
- p. 30, l. 15: proposui (p. 29, l. 36—37).
- p. 47, l. 11: febrem ardentem (cf. p. 28, l. 35; p. 89, l. 12).
- p. 60, l. 20: supra posui (cf. II, 6, p. 37, l. 10; Aph. IV, 48 cet.).
- p. 62, l. 19: tenentur (cf. II, 8; III, 2).
- p. 98, l. 4: potest (cf. II, 1; III, 20, 21; IV, 15).
- p. 98, l. 13: φρεσίν (cf. II, 1, p. 30, l. 6).
- p. 108, l. 30: inflatis vesicis (III, 27, 2, p. 118, l. 31).
- p. 115, l. 8: comprehensi sunt (cf. p. 113, l. 33; p. 114, l. 21 sqq.).
- p. 121, l. 31: supra posui (l. 7—8).
- p. 123, l. 29: deberent (cf. I, 2 et 4).
- p. 127, l. 4: supra retuli (cf. p. 126, l. 20 sqq.).
- p. 135, l. 9: adstringunt (cf. II, 30).
- p. 136, l. 22: praecepta sunt (IV, 9).
- p. 145, l. 5: ventriculi porta (cf. p. 121, l. 34).

- p. 156, l. 7: utendum est (cf. II, 17).
 p. 176, l. 18—19: *λιπαράς* (cf. V, 26, 35; V, 27, 13).
 p. 192, l. 19: proposui (cf. V, 19, 1).
 p. 197, l. 19—20: proposita est (cf. V, 19, 18?).
 p. 211, l. 35: proposui (cf. § 9).
 p. 212, l. 6—7: refrigerant (cf. II, 23, p. 73, 6).
 p. 212, l. 7: proposui (V, 26, 33; cf. V, 28, 4).
 p. 216, l. 25: posui (cf. V, 18, 18).
 p. 221, l. 29: dixi (l. 5) — l. 33 dixi (l. 8).
 p. 250, l. 22—23: dixi (p. 249, l. 4, cf. p. 51, l. 13; p. 255, l. 12).
 p. 264, l. 8—9: exsequutus sum (cf. V, 28, 11 sqq.).
 p. 289, l. 20: oris fiunt (cf. VI, 11).
 p. 289, l. 23: exposita sunt (cf. VII, 8).
 p. 290, l. 35: exposui (V, 28, 2).
 p. 293, l. 7: retuli (V, 26, 2 et 3).
 p. 294, l. 23—24: positum est (VII, 7, 11; VII, 14, p. 291, l. 14).
 p. 294, l. 26: posui (VII, 2, p. 265, l. 25—26).
 p. 300, l. 28: praecipimus (V, 26, 21 sqq.).
 p. 302, l. 26: excidenda est (cf. p. 299, l. 31).
 p. 303, l. 12: posui (VII, 4, 4, cf. 3, 3).
 p. 304, l. 31: docui (cf. capp. 20 et 22).
 p. 325, l. 21: deducuntur cf. p. 355, l. 1).
 p. 337, l. 13: praecepi (V, 26, 25?).
 p. 360, l. 18: brachio sit (VIII, 15).
-

1

CORRIGENDA.

- p. 23, l. 30, lege: id ipsum
p. 41, l. 9, lege: extendendo dolorem levant
p. 55, tit., lege: De cucurbitulis
p. 56, l. 11, lege: cum eo
p. 62, l. 13, lege (cf. III, 21).
p. 62, l. 32: vide *Adn. criticam*
p. 104, l. 35, lege: multo corpus tribus
p. 109, l. 4—5, lege: superponere; si
p. 112, l. 38, lege: plantaginem
p. 125, l. 15, lege: calida marina,
p. 132, l. 3, lege: ejus est, supervacua
p. 153, in nota, lege: desunt.
p. 184, l. 32, lege: z s, loco Ξ
p. 200, l. 22, lege: Plin. XXII, 73, 1; XXVIII, 8, 1.
p. 220, l. 35, lege: (18, 18)
p. 228, l. 9, lege: gummis
p. 233, l. 11, lege: cornum
p. 256, l. 28, lege: purae, loco crustae
p. 260, l. 33, lege: p.)-(II, loco p.)-(XII
p. 278, l. 31, lege: nominant
p. 287, l. 17, lege: (*id est: ὀδοντάγρα*). Haec enim explicandi causa
addidi.
p. 297, l. 10, lege: (Paul. Aeg. VI, 64, cet.
p. 308, l. 9, dele: *qui curatur*
p. 318, l. 7, lege: facile hebeti corpusculo *cum codd.*
p. 331, l. 23—24: vide *Adn. criticam*
p. 339, l. 1, lege: *διακάνση*
p. 349, l. 33, lege: adjectum sit, deliganda

Ceteris typothetarum *σφάλμασι* quae aciem oculorum fugerunt,
lector benevolens ignoscat et ipse ea corrigat.



0

Censorinus.

CENSORINI
DE DIE NATALI LIBER

RECENSUIT

FRIDERICUS HULTSCH.



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.
MDCCCLXVII.

LEPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNERI.


CAROLO HALM
AUGUSTO WILMANNS

D · D · D ·



PRAEFATIO.

Censorini recognoscendi ut consilium caperem factum est CAROLI HALMII beneficio, qui ante hos quattuor annos, cum Misniam convenissent Germaniae viri philologi, obtulit mihi suum Censorini exemplum, in quo variam codicis Darmstadiensis scripturam diligentissime adnotaverat. Namque, ut fere fit, postquam Ottonis Iahni cura Censorini liber, vulgo pessime editus, mirum quanto emendatior prodiiit ex codicibus Darmstadiensi et Vaticano, tamen satis ampla variae scripturae copia omissa erat, cuius si ratio haberetur, multos locos adhuc minus recte editos corrigi posse viderat Halmius. Itaque ego summi viri auctoritati libenter obtemperans Censorini librum ita recensere institui, ut, quantum fieri posset, ipsam antiquam codicis Darmstadiensis scripturam, non recentiore illam quam alia manus in eundem librum passim intulit, tamquam certissimam ducem sequerer. Quam rationem ita facillime omnibus probatum iri existimabam, si et antiquae



nam incurrentibus antea scriptum sit, non potuit quasi maius quiddam subiungere Censorinus *atque ad decies septenos annos (vitam) posse — proferri*. Immo verba *quae duo* initium fecerunt sententiae alicuius nunc truncatae, qua scriptor primum Staseae et Etruscorum placita de duodecim hebdomadam spatio breviter comprehendit et de his nescio quid adiecit, tum aliam quandam opinionem protulit, ex qua brevius etiam spatium concederetur vitae humanae; tamen *homines aetatem suam* (haec enim fere extrema in lacuna exciderunt) *ad decies septenos annos posse — proferre*. Praeterea obiter commemoro in Livii loco quem Censorinus cap. XVII affert, si sub finem (p. 33, 8) post *saeculi* addideris *modum* (coll. p. 32, 19. 32, 1), hanc orationem obliquam non alienam videri a reliquis quae interciderint. Cuius loci similitudine paulo post (p. 35, 2) nescio an scribendum sit *si quis credit ludis saecularibus saecula terminari*.

Contrariam hiatibus scripturae labem, glossata dico ab interpolatoribus inculcata, vix minus saepe notare debui, ac saepissime quidem in fragmento. Ut p. 57, 10 verba *et poploe anafora dicuntur* non tam propterea seclusi, quod intellegi nequirent, sed quia illum qui ea scripsit voluisse putarem *et populo canaphora dicuntur*, eiusmodi autem mira sententia non tribuenda esse videretur ipsi compilatori fragmenti. Sed notanda est et appellatio quae hoc loco signis zodiaci imponitur et

forma κρυπόρα adhuc non cognita nisi ex Hesychio. Aliud Graecum vocabulum nondum receptum in nostra lexica latet in glossa quae paulo ante (p. 57, 2) primum margini adscripta fuit, tum in contextum verborum illata. Ubi dubitari non potest quin recte *antistoechae* scripserit Iahnus Isaacum Vossium secutus; quod autem in codice sequitur *antiscepe*, id nec *antioeci*, ut suasit Carrio, nec Lachmannianum *antiscioe* fuisse videtur, sed id ipsum quod Nunnesius interpretatus est *qui aversi contrarios polos spectent*: at vero hoc non est barbarum *antiscepae*, ut ille voluit, sed *antiscopoe* sive Graecum ἀντίσκοποι. Denique etiam apud ipsum Censorinum insolitam formam Graecam Halmio monente e codice restitui, *enneaeteris* p. 37, 12, cui similia sunt ἐννεαῖα et ἐννεαῖης, de quibus vide Dindorfios in Stephani thesauro.

Monent me haec Graeca ut paucis significem, quam normam et in Graecis vocabulis et in numeris scribendis secutus sim. Nam cum ex utroque genere permulta pro brevitate libri reperiantur apud Censorinum, minime ea res neglegenda videtur. Primum autem hoc mihi persuasum esse profiteor, certam legem neque alios scriptores plerosque nec Censorinum sibi sanxisse, ex qua et numeros aut notis aut litteris et Graeca aut Graecis aut Latinis ductibus scriberent; sed regulas quidem fuisse aliquas, nequaquam tamen immutabiles. Tum negari non potest veteres librarios in describendis codici-

bus multa suo arbitrio variavisse, at certe eo pauciora quo vetustiores sunt libri manu scripti. Ita cum hac etiam in re secundum antiquissima vestigia Censorini librum ediderim, minime equidem affirmem in omnibus me ipsius scriptoris manum repraesentasse; hoc tamen facile concessum iri arbitror, nullam aliam rationem inveniri potuisse, qua propius ad verum accederetur. Nonnullis autem locis ipsa codicis menda indicio fuerunt alia olim scripta fuisse. Velut p. 44, 27 recte in codice exstare videtur *annos*, quod suspensum fuit ex *computarunt* vel simili quodam verbo nunc in maiore lacuna omisso; iam cum huic accusativo bis in codice appositum sit *quadrigenti*, dubitari vix potest, quin utroque loco cccc invenerit librarius easque notas imperite in litteras transcripserit. Eadem de causa p. 37, 7, ubi *primum* est in codice, emendatae vulgo scripturae *unum* praetuli notam I, quae nisi olim locum obtinuisset, qua tandem ratione illud mendosum *primum* oriri potuit? Quamquam non me fugit relinqui ut hoc statuatur, ab ipso scriptore positum esse *unum*, idque postea in notam mutatum, denique e nota *primum* factum esse. Sed ne in minutias aberrem, nihil nisi in re dubitationis plena probabiliorem rationem amplecti volui, cum ipsam veram invenire non liceret. De Graecis vocabulis unum hoc addo, Censorinum multo plura Latine quam Graece scripsisse videri, siquidem recte Iahnus dimidio fere rarius quam prius

editores Graeca admisit, ego porro codicis vestigia persecutus ex his Graecae scripturae reliquiis plus dimidiam partem in Latinas litterarum formas reduxi.

Ad ea quae imis paginis ad singulos quosque locos adnotavi perpauca hic sunt addenda. Cum Ulrichsius in annalium quibus titulus est Eos vol. II (p. 456 ss.) nonnullas varias scripturas e codice Darmstadiensi protulisset, postea rogatus ab Halmio eosdem locos denuo inspexit eaque quae discrepant ab Halmii collatione cum hoc per litteras communicavit. Ex his subsidiis ea quae pertinerent ad extremas fragmenti paginas in corrigendis plagulis adhibere potui; ex priore autem parte, qua Iahnianae editionis paginae primae sex collatae erant, haec tantummodo ad nostram adnotationem addenda sunt: p. 3, 1. celato *D*, p. 4, 3. comparatum *D*, 5. beate] unci notam sub extrema *e* addidisse videtur manus secunda, p. 5, 6. institutique, 17. ut *D* (at idem *genamur* habet, ut editum est, non *genemur*), 21. inquis *D*, inquit *d*, p. 6, 1. preter|** dei *D*, preterea | dei *d*. — Ut reliqua persequar, iterum grata memoria repetenda est Caroli Halmii, qui cum etiam eam operam in se suscepisset ut plagulas typis expressas perlegeret, multos locos sua coniectura correxerit. Ex quibus cum pleraque suis locis adscribi potuerint, hic restat ut commemoretur p. 8, 6 *conformat* et p. 35, 21 *id cor* (omisso *que*) coniici ab Halmio, tum p. 40, 1 eidem

non tam *T.* omissum videri, quam id ipsum ex *et* corrupto eliciendum. Idem suasit ut p. 8, 14 *cal-*
facto e codice ederem coll. Quintil. 1, 6, 21, et
fragmenti locum adhuc desperatum qui est p. 66,
20 s. recepta e Vaticano scriptura *numerorum* ita,
ut nunc editum est, distinxit. Meminerat etiam
Censorini sui Otto Iahnus, et quaerenti mihi ami-
cissime, ut solet, rescripsit p. 66, 7 *Parnasiae* sibi
legendum videri; praeterea p. 6, 9 Lachmanni con-
iecturam *ad cereos* commendari similibus Plutarchi
(an seni cet. cap. 9) et Senecae (de brev. vit. 20
extr.) locis. Consulto omisi ad p. 23, 12 afferre
coniecturam H. Wittichii *Persicum* pro *Pythicum*
suadentis in Philol. vol. XX p. 431, quoniam non
credibile videbatur unum Censorinum Persici ne-
scio cuius stadii notitiam habuisse a totius anti-
quitatis memoria plane alienam. P. 38 versum
tertium cum relegerem, in mentem mihi veniebat
proxima est hanc (octaeterida) magnitudine cet.; sed
obloqui videtur ipse scriptor, qui paulo post *haec*
annorum magnitudo dederit. At locus qui est p. 51, 3
dubito num satis sanatus sit Lachmanni medela
egregia illa quidem ad sensum, sed paulo remo-
tiore a litterarum ductibus. Servata igitur libro-
rum scriptura paucisque litteris, quae facillime
intercidere potuerunt, additis legendum videtur *id-*
que similitudo testatur usus militaris. Denique in
fragmenti p. 60, 7 quidni codicis ductus uariae et
olim fuerint *variat*, quod verbum eodem

p. 59, 24 legimus? — Ludovici de Ian coniecturas, quas passim in adnotatione citavi, repetivi e censura Iahnianae editionis quam scripsit in commentariis qui supra p. VI laudati sunt.

Descripsit etiam Halmius mihiq̄ue misit codicis Bernensis 87 anno MIII exarati eam partem quae fragmenti cap. V—VIII continet. Usus erat eodem libro Otto Iahnus (v. praef. p. XXI, unde corrigas p. 74 *sec. XI* pro *sec. XV*); sed non alienum videbatur Halmii apographum cum nostra editione conferre, a qua quae differant haec sunt: p. 60, 17. Ex libro Censorini de geometrica. Geometrica est *cet.* 19. suis] sui, *ut V* 20. et *habet ut d V*

21. Deformis continuo versu 22. nota] nata *m. 1, ut DV, natura super versum* 23. Lineae ac finis, *ut DV* p. 61, 1. posita et summissa est. Quod longitudinem tantum, *ut DV* 3. finis lineae sup plana, *ut DV* 4. sup 8. hae, *ut V* sint, *ut DV* his, *ut D* 9. supra om., super *super vs. add. m. 1* 11. tum] tantum, *ut DV* 12. ea linea] aliaena, *similiter ac DV* grece

13. angelus 17. comprehensa 20. immissa 21. Emicyclum, *ut DV* Entigrāmae *m. 1, y ex i fecit eadem manus, similiter atque in V*

22. tetragonum qđ ·III· p. 62, 2. duo] ·ī·

3. Ortogonium, *ut V*¹ 4. Ampigonium. quod habet idem, *ut V* 5. oxigonium, *rectius quam DV*

6. Quadrilaterum, *ut DV* 7. omnia ·III· latera habet, *similiter ac DV* 8. Eteromeces, *ut*

- DV* rectos *om. cum DV* 9. rûbos, *ut DV*
 10. similes, *ut DV* 12. aequaliter aut omne quae
 rectis, *similiter ac V* Rapedia, *ut D et V corr.*
 13. Parelle lineae, *partim rectius quam DV*
 16. geometriarum, *ut dV* quinque] .v. 17. ad
 omnem, *ut DV* 18. medio] nodo *et superscr. mo*
 20. lineam, *omisso rectas, ut DV* p. 63, 1.
 immissa duos rectis pares fecerit, *ut DV*
 4. adempta 5. paria sunt: *haec extrema sunt in*
codice.

Litterarum formas quae sunt in codice Darmstadiensi, quatenus fieri potuit, similibus typis exprimendas curavi, quo et accuratior vetusti illius libri imago effingeretur et nonnullorum mendorum origo facilius cognosceretur. Non licuit tamen in litteris F et L reddere illud codicis proprium, quod altera infra longius deduci, altera supra emergere solet, et x quoque plerumque infra descendit. Rescripsit mihi de his rebus ambigenti singulari comitate CAROLUS BOSSLER atque etiam codicis fere dimidiam paginam accuratissime depictam addidit, pro qua opera ad propositum meum utilissima debitas hic refero gratias.

D est codex Darmstadiensis 166 saec. VII.

d in eodem manus correctoris.

V codex Vaticanus 4929 saec. X.

*V*² manus correctoris eiusdem aetatis.

m. rec. tertia, passim etiam quarta quaedam manus
recentior.

* spatium litterae erasae.

| finis versus in codice.

C O R R I G E N D A .

p. 46, 16 Antonino *pro* Antonio
„ 50, 19 M'. *pro* M. *propagata e* *codicibus scriptura*.

CENSORINI
DE DIE NATALI LIBER
AD Q. CAERELLIVM.

11

Munera ex auro vel quae ex argento nitent, caelato 1
 opere quam materia cariora, ceteraque hoc genus blandi-
 menta fortunae inhiat *ille* qui vulgo dives vocatur: te au-
 tem, Quinte Caerelli, virtutis non minus quam pecuniarum
 5 divitem, id est vere divitem, ista non capiunt; non quod 2
 eorum possessionem vel etiam usum a te omnino abiece-
 ris, sed quod sapientium disciplina formatus satis liquido
 conperisti huius modi sita in lubrico bona malave per se
 non esse, sed τῶν μέγων, hoc est bonorum malorumque
 10 media censi. haec, ut comicus ait Terentius, per- 3
 inde sunt ut illius est animus qui ea possidet;
 qui uti scit ei bona, illi qui non utitur recte
 mala. igitur quoniam quisque non quanto plura possi- 4
 det, sed quanto pauciora optat, tanto est locupletior, opes
 15 tibi in animo maximae, et eae quidem quae non modo
 bona generis humani praecedant, sed quae ad deorum
 immortalium aeternitatem penitus accedant. quod enim
 Xenophon Socraticus dicit, nihil egere est deorum, quam
 minime autem proximum a diis. quare cum dona pretiosa 5

INCIPIT LIBER ALIUD D, INCIPIT LIBER | CENSORINI AD · Q · |
 CERELLIVM V 2. opere | quam D, non post opere in marg.
 adscr. d, OPERE | nonnunquam V cetera quae D 3. in-
 hiant hi (ant hi d in ras.) D, inhiant hi V, inhiat is Carrio
 diuites d V uocantur V 4. quante (erasa i) V 6.
 abiceris D, corr. d 8. *ita (erasa s) D, ita V 9. esse
 ***των D, τ super primam litteram erasant add. d, esse sed
 των V 10. Ter. Heaut. I, 2, 21 s. 11. illius DV, tul-
 lius d 12. ei DV, unde ductu transverso addito et fecit d
 15. maxime DV ea V m. 2 17. immortalium V
 paenitus D 18. *egere D, aegere d 19. diis D, diis V.
 deis vulgo praetiosa D

- neque tibi per animi virtutem desint nec mihi per rei tenuitatem supersint, quodcumque hoc libri est meis opibus comparatum natalicii titulo tibi misi. in quo non, ut plerisque mos est, aut ex ethica parte philosophiae praecepta ad beate vivendum, quae tibi scriberem, mutuatus sum, aut ex artibus rhetorum locos laudibus tuis celebrandis persecutus (ad id enim virtutum omnium fastigium ascendisti, ut cuncta ista, quae vel sapienter monentur vel facunde praedicantur, vita moribusque superaveris), sed ex philologis commentariis quasdam quaestiunculas delegi, quae congestae possint aliquantum volumen efficere. idque a me docendi studio vel ostentandi voto fieri non praedico, ne in me, ut vetus adagium est, iure dicatur sus Minervam. iam vero cum tuo collatu scirem me plura didicisse, ne beneficiis tuis viderer ingratus, nostrorum veterum sanctissimorum hominum exempla sum secutus. illi enim quod alimenta, patriam, lucem, se denique ipsos dono deorum habebant, ex omnibus aliquid deis sacrabant, magis adeo ut sese gratos adprobarent quam quod deos hoc arbitrarentur indigere. itaque cum perceperant fruges, ante quam vrescerentur deis libare instituerunt, et cum agros adque urbes deorum munere possiderent, partem quandam templis sacellisque, ubi eos colerent, dicaverunt: quidam etiam pro cetera corporis bona valetudine crinem deo sacrum pascebant. ita ego, a quo plura in litteris percepi, tibi haec exigua reddo libamina.
- 2 Nunc quoniam liber de die natali inscribitur, a votis auspiciâ sumantur. itaque hunc diem, quod ait Persius, numerâ meliore lapillo, idque quam saepis-

4. ex ethica *Manutius*, ex hica *D*, hic a *V* 5. beate *D* 6. locus *D* 9. monetur *D* facundae *D* 11. congeste *V* 13. non fieri *V* adagium (*prior q ex c facta esse videtur*) *D*, elogium *V* 14. iam vero] uero *D*, docere *V*, verum *Iahnus* 15. beneficiis *V* 18. habebam *V*, corr. *m.* 2 19. sese gratos *Halmius*, se gregatos *D*, se gratos *V* 20. d**** *D*, diis *d* arbitraretur indigere *D* 22. a]que *D*, atque *V* 29. sumatur *D* *Pers.* 2, 1 30. sepiissime *V*

sime facias exopto, et, quod idem subiungit, funde merum genio.

Hic forsitan quis quaerat, quid causae sit ut merum 2
fundendum genio, non hostia faciendum putaverit. quod
5 scilicet, ut Varro testatur in eo libro cui titulus est Atti-
cus et est de numeris, id moris institutique maiores nostri
tenuerunt, ut, cum die natali munus annale genio solve-
rent, manum a caede ac sanguine abstinere, ne die
qua ipsi lucem accepissent alii demerent. denique Deli 3
10 ad Apollinis genitoris aram, ut Timaeus auctor est, nemo
hostiam caedit. illud etiam in hoc die observandum, quod
genio factum neminem oportet ante gustare quam eum
qui fecerit.

Sed et hoc a quibusdam saepe quaesitum solvendum
15 videtur, qui sit genius, curve eum potissimum suo quis-
que natali veneremur. genius est deus, cuius in tutela ut 3
quisque natus est vivit. hic sive quod ut genamur curat,
sive quod una genitur nobiscum, sive etiam quod nos
genitos suscipit ac tutatur, certe a genendo genius appel-
20 latur. eundem esse genium et larem multi veteres me-
morae prodiderunt, in quis etiam Granius Flaccus in
libro quem ad Caesarem de indigitamentis scriptum reli-
quit. hunc in nos maximam, quin immo omnem habere
potestatem creditum est. nonnulli binos genios in his 3
25 dumtaxat domibus quae essent maritae colendos putave-
runt: Euclides autem Socraticus duplicem omnibus omnino
nobis genium dicit adpositum, quam rem apud Lucilium
in libro satirarum XVI licet cognoscere. genio igitur
potissimum per omnem aetatem quotannis sacrificamus;

5. est extra versum (incertum an a m. 2) D 6. et est]
et intus coni. Ritschellius in Indice schol. hibern. a. 1845/6 p. 4
(an vero Censorinus scripsit cui titulus Atticus est de cet.?)
numeris] muneribus Manutius, probat Ritschellius l. c. p. 5
10. timeus DV 11. illeut D 17. quod ut D 19. sus-
cepit DV, corr. Carrio tueatur DV, corr. Iahnus 21.
quis DV, quid d granius DV 22. reliquid D 25. po-
tauerunt D 27. qua* re* (quam rem ante rasuram) D
28. satyrarum DV 29. quot annis D

- 4 quamquam non solum hic, sed et alii sunt praeterea dei
conplures hominum vitam pro sua quisque portione ad-
ministrantes, quos volentem cognoscere indigitamentorum
libri satis edocebunt. sed omnes hi semel in uno quoque
homine numinum suorum effectum repraesentant, quo- 5
circa non per omne vitae spatium novis religionibus ar-
cessuntur: genius autem ita nobis adsiduus observator
adpositus est, ut ne puncto quidem temporis longius abs-
cedat, sed ab utero matris acceptos ad extremum vitae
diem comitetur. sed cum singuli homines suos tantum- 10
modo proprios colant natales, ego tamen duplici quot-
annis officio huiusce religionis adstringor: nam cum ex
te tuaque amicitia honorem dignitatem decus adque prae-
sidium, cuncta denique vitae praemia recipiam, nefas ar-
bitror, si diem tuum, qui te mihi in hanc lucem edidit, 15
meo illo proprio neclegentius celebravero: ille enim mihi
vitam, hic vitae fructum adque ornamentum pepererunt.
- 4 Quoniam aetas a die natali initium sumit suntque ante
hunc diem multa quae ad hominum pertinent originem,
non alienum videtur de iis prius dicere quae sunt natura 20
priora. igitur quae veteribus de origine humana fuerint
opinionum, ex his quaedam breviter exponam.
- 2 Prima et generalis quaestio inter antiquos sapientiae
studiosos versata est, quod, cum constet homines singu-
los ex parentum seminibus procreatos successione prolis 25
multa saecula propagare, alii semper homines fuisse nec
umquam nisi ex hominibus natos adque eorum generi
caput exordiumque nullum extitisse arbitrati sunt, alii
vero fuisse tempus cum homines non essent, et his ortum
3 aliquem principiumque natura tributum. sed prior illa 30

4. libris *d* satis edocebunt *D* hii *D* 5. quo circa
D 6. nobis *D* arces**ntur *D*, mu in marg. adscr. *d*
9. aceptos *D*, adceptos *d V*, ad cereos et extr. *Lachmannus*
10. tantum modo *D* 11. quot annis *D* 12. religionis *D*
astringor *V* 13. atque *V*, item vs. 17 et 27 16. nec gle-
gentius *V* caelebrauero *D* 18. sunt quae *D* 20. his
d in ras. *V*, corr. *Halmius* 21. 22. fuerunt — quasdam
Iahnus 28. capud *D*

sententia, qua semper humanum genus fuisse creditur,
auctores habet Pythagoran Samium et Ocellum Lucanum
et Archytan Tarentinum omnesque adeo Pythagoricos.
sed et Plato Atheniensis et Xenocrates et Dicaearchus
5 Messenius itemque antiquae academiae philosophi non
aliud videntur opinati, Aristoteles quoque Stagiritis et
Theophrastus multique praeterea non ignobiles peripate-
tici idem scripserunt. eiusque rei exemplo [dicunt quod]
negant omnino posse reperiri, avesne ante an ova gene-
10 rata sint, cum et ovum sine ave et avis sine ovo gigni non
possit. itaque et omnium, quae in sempiterno isto mundo 4
semper fuerunt futuraque sunt, aiunt principium fuisse
nullum, sed orbem esse quendam generantium nascenti-
umque, in quo unius cuiusque gentis initium simul et
15 finis esse videatur. qui autem homines aliquos primi-
genios divinitus naturave factos crederent multi fuerunt,
sed aliter adque aliter haec existimatione versata. nam ut 6
mittam, quod fabulares poetarum historiae ferunt, homi-
nes primos aut Promethei molli luto esse formatos aut
20 Deucalionis Pyrrhaeque duris lapidibus enatos, quidam
ex ipsis sapientiae professoribus nescio an magis mon-
struosas, certe non minus incredibiles rationum suarum
proferunt opiniones. Anaximander Milesius videri sibi ex 7
aqua terraque calefactis exortos esse sive pisces seu pisci-

1. quae D 2. phythagoran V ocellum D, occellum V
3. adrenytan D, architam V phythagoricos V 4. athe-
nienses D, corr. d *et xenocrates (erasa s) V dicae-
archus (icae d in ras.) D *5. que om. V 6. aristotele-
lis D, aristotelis V stagiritis DV 7. theophrastus DV
peripatetici D V¹, corr. V² 8. scripserunt D eius
quaeri exemplo Iahnus ex cont. Lachmanni exempla DV
9. repperit DV genera D, corr. d 10. et aves D
13. quendam D 14. unusquisque D geniti V vulgo
17. alter — alter D atque V hac V versati DV,
unde in hac existimatione versati vulgo 19. furmatos D
20. enatos Halmius (conf. cap. 6, 1 extr.), *natos D, ee na-
tos d, unde esse natos V vulgo post enatos manus X saeculi
in D, m. prima in V add. uerg. (uirg. V) hinc lapides pyrrhae
(pyrre V) iactos saturnia regna et alibi quo tempore primum
deucalion vacuum lapides iactavit in orbem

bus simillima animalia, in his homines concrevisse, fetus-
 que ad pubertatem intus retentos tunc demum ruptis illis
 viros mulieresque qui iam se alere possent processisse.
 Empedocles autem egregio suo carmine, quod eiusmodi
 esse praedicat Lucretius, ut vix humana videatur 5
 8 stirpe creatus, tale quiddam confirmat. primo mem-
 bra singula ex terra quasi praegnate passim edita, deinde
 coisse et effecisse solidi hominis materiam igni simul et
 umori permixtam. cetera quid necesse est persequi, quae
 non capiant similitudinem veritatis? haec eadem opinio 10
 etiam in Parmenide Veliate fuit pauculis exceptis ab Em-
 9 pedocle dissensis. Democrito vero Abderitae ex aqua
 limoque primum visum esse homines procreatos. nec
 longe secus Epicurus: is enim credidit limo calfacto
 uteros nescio quos radicibus terrae cohaerentes primum 15
 increvisse et infantibus ex se editis ingenitum lactis umo-
 rem natura ministrante praeuisse, quos ita educatos et
 10 adultos genus hominum propagasse. Zenon Citieus, stoi-
 cae sectae conditor, principium humano generi ex novo
 mundo constitutum putavit, primosque homines ex solo 20
 adminiculo divini ignis, id est dei providentia, genitos.
 11 denique etiam vulgo creditum est, ut plerique genealogoe
 auctores sunt, quarundam gentium, quae ex adventicia
 stirpe non sint, principes terrigenas esse, ut in Attica et
 Arcadia Thessaliaque, eosque autochthonas vocitarunt. 25
 in Italia [poeta cecinit] Nymphas indigenasque Faunos
 nemora quaedam tenuisse non difficile rudis antiquorum

1. foetusque *dV* 2. puertatem *D* 3. viro *D*, corr. *d*
 5. *Lucret*, I 733 7. praegnate *D*, pregnant *V* 11. Ve-
 liate *Rutgersius*, uel in *sterte* *D*, uel in *sterte* *V*, *Veliensi* **
Jahnus enpedocle *DV* 12. dissensisse *dV* 14. LONGI
 (i in *ras*.) *D* calefacto *dV* 16. ingenium *DV* umore *DV*
 18. Citieus *Jahnus*, tici eius *D*, ticietius *d*, tieteiuss (eraso
s) *V*; scribendum videtur Citieus 19. nonono *D* 20. ex
 solo *dV*, exolo *D* 21. dei] di *V* 22. genealogoe *Lach-*
mannus, genealogiae *DV* 24. terrigenas *V* 25. autochtho-
nas *D*, aut hoc tonas *V* vocitarunt *Lachmannus*, uocitari-ut
DV 26. symphas *D*

credulitas recepit. nunc vero eo licentiae poetica pro- 12
cessit libido, ut vix auditu ferenda confingant, post ho-
minum memoriam progeneratis iam gentibus et urbibus
conditis homines e terra diversis modis editos, ut in At- 5
tica fertur regione Erichthonius ex Vulcani semine humo
exortus, et in Colchide vel Boeotia consitis anguis denti-
bus armati spartoeve, e quibus mutua caede inter se ne-
catis pauci superasse traduntur, qui in conditu Thebarum
Cadmo fuerint adiumento, nec non in agro Tarquiniensi 13
10 puer dicitur divinus exaratus nomine Tages, qui discipli-
nam cecinerit extispicii, quam lucumones tum Etruriae
potentes exscripserunt.

Hactenus de prima hominum origine: ceterum quod 5
ad praesentes nostros pertinet natales eorumque initia,
15 quam potero compendio dicam.

Igitur semen unde exeat inter sapientiae professores 2
non constat. Parmenides enim tum ex dextris tum e lae-
vis partibus oriri putavit. Hipponi vero Metapontino sive,
ut Aristoxenus auctor est, Samio ex medullis profluere
20 semen videtur, idque eo probari, quod post admissionem
pecudum si quis mares interimat, medullas utpote exha-
ustas non reperiat. sed hanc opinionem nonnulli refellunt,
ut Anaxagoras Democritus et Alcmaeon Crotoniates: hi 3
enim post gregum contentionem non medullis modo ve-

1. poetica *Manutius*, poeticae *DV* 2. CONFUNGANT *D*
ante ras., corr. *d* 4. e *d* (*in ras.*) *V*, ex *cont. Halmius*
5. erichthonius *D*, erichthionius *V* homo *V* 6. chol-
chide *DV* 7. armatis spartoeve *DV*, armati spartoeve *Iahnus*
10. divinus *Lachmannus*, divinitus *DV* exaratus *Guilielmus*,
exoratus *D V¹*, exortus *V² in marg.* 11. lucum hone-
stum *V* 12. exscripserunt *D* 14. pertinent *DV*
15. dicam (*i d in ras.*) *D* 17. dextris (*tris d in ras.*) *D*
e laevis (*uis d in ras.*) *D*, levis *V* 18. oriri *ed. Rostoch.*,
adiri *D* (*i a pr. m., ut videtur*), adiri *V*, forsitan olim fuerit
tum ex dextera tum e laeva parte suboriri hipponi *DV*
uero et *D* 20. probare *V¹*, corr. *m. 2* 21. pecudum *D*
maresint | perimat *D*, ad in *d superscr. s* (*omnino igitur mares*
sint cet.), mares perimat *V*, corr. *Iahnus* 22. repperiat *V*
23. algemeon *D*, alcmeon *V* 24. gregum *Guilielmus*, grae-
cam *D*, grecam *V*

- rum et adipe multaque carne mares exhauriri respondent.
 4 illud quoque ambiguum facit inter auctores opinionem, utrumne ex patris tantummodo semine partus nascatur, ut Diogenes et Hippon stoicique scripserunt, an etiam ex matris, quod Anaxagorae et Alcmaeoni nec non Parme- 5 nidi Empedoclicque et Epicuro visum est.
- 5 De conformatione autem partus nihilo minus definite se scire Alcmaeon confessus est, ratus neminem posse
 6 perspicere quid primum in infante formetur. Empedocles, quem in hoc Aristoteles secutus est, ante omnia cor 10 iudicavit increscere, quod hominis vitam maxime contineat; Hippon vero caput, in quo est animi principale; Democritus alvum cum capite, quae plurimum habent ex inani; Anaxagoras cerebrum, unde omnes sunt sensus. Diogenes Apolloniates ex umore primum carnem fieri 15 existimavit, tum ex carne ossa nervosque et ceteras partes enasci. at stoici una totum infantem figurari dixerunt, ut una nascitur aliturque. sunt qui id opinentur ipsa fieri natura, ut Aristoteles adque Epicurus; sunt qui potentia spiritus semen comitantis, ut stoici ferme uni- 20 versi: sunt qui aetherium calorem inesse arbitrentur, qui membra disponat, Anaxagoran secuti.
- 3 Utcumque tamen formatus infans quemadmodum in matris utero alatur, duplex opinio est. Anaxagorae enim ceterisque conpluribus per umbilicum cibus administrari 25 videtur. at Diogenes et Hippon existimarunt esse in alvo prominens quiddam, quod infans ore adprehendat et ex

1. adipem D 4. diogenis D hyppon sthoicq. DV
 scribserunt D 5. matrib; V ante ras., matris corr. 1 m.
 6. empedoclicque DV epicoro D 7. de conformatione (sic
 pro conformatione) — minus DV habent extremo cap. 6 et pro
 his hoc loco ponunt quae dissensio ex cap. 17, 10; corr. Lach-
 mannus et Iahnus 12. hyppon V 13. plurimum D
 14. om̃s V (nota compendii a m. 2) 15. apolliniates DV
 humore V 17. sthoici V 18. ut om. D 19. atque V
 epicorus D 20. sthoici V, sed h del. 1 m. uniuersi DV
 21. aetherium (a d in ras.) D, etherium V arbitrentur
 D ante ras., ut videtur, arbitrantur dV 26. hyppon V
 27. adprehendat D et om. DV

eo alimentum ita trahat ut, cum editus est, ex matris uberibus.

Ceterum ut mares feminaeve nascantur quid causae 4
esset, varie ab isdem philosophis proditum est. nam ex
5 quo parente seminis amplius fuit, eius sexum repraesentari dixit Alcmaeon. ex seminibus autem tenuioribus feminas, ex densioribus mares fieri Hippon adfirmat. utrius' 5
vero parentis principium sedem prius occupaverit, eius reddi naturam Democritus rettulit: at inter se certare
10 feminae et maris, et penes utrum victoria sit, eius habitum referri auctor est Parmenides. ex dextris partibus 6
profuso semine mares gigni, at e laevis feminas, Anaxagoras Empedoclesque consentiunt; quorum opiniones, ut de hac specie congruae, ita de similitudine liberorum
15 dispariles. super qua re Empedocles disputata ratione talia profatur. si par calor in parentum seminibus fuit, pa- 7
tri similem marem procreari; si frigus, feminam matri similem. quod si patris calidius erit et frigidius matris, puerum fore qui matris vultus repraesentet: at si calidius
20 matris, patris autem fuerit frigidius, puellam futuram quae patris reddat similitudinem. Anaxagoras autem eius 8
parentis faciem referre liberos iudicavit, qui seminis amplius contulisset. ceterum Parmenidis sententia est, cum dexteræ partes semina dederint, tunc filios esse patri
25 consimiles, cum laevæ, tunc matri.

Sequitur de geminis, qui ut aliquando nascantur modo 9
seminis fieri Hippon ratus est: id enim cum amplius est
quam uni satis fuit, bifariam deduci. id ipsum ferme 10

4. uariae ab hisdem D 6. alcmaeon DV 7. hyp-
pon V 9. rettulit V ad D 10. feminae DV¹, feminas
m. rec. in V mares et paenes DV 11. ex et DV
13. empedoclesque DV 15. dispariles sunt Iahnus empe-
docles DV talia profatur Lachmannus, talis profertur
DV 17. procreari D frigus Carrio, frigidus DV
18—20. calidus — frigidus (frigidus V) — calidus — frigi-
dus DV, corr. Iahnus 19. uultus D, uultus dV 23. sen-
tentia dV, sentia D 24. semina om. V 26. nascatu
D, corr. d 27. hyppon V est add. Carrio 28. diduci vul

Empedocles videtur sensisse: nam causas quidem cur divideretur non posuit, partiri tantummodo ait, et si utrumque sedes aequae calidas occupaverit, utrumque marem nasci, si frigidas aequae, utramque feminam, si vero alterum calidiorem, alterum frigidiorum, dispari sexu partum 5 futurum.

- 7 Superest dicere de temporibus quibus partus soleant esse ad nascendum maturi; qui locus eo mihi cura maiore tractandus est, quod quaedam necesse est de astrologia musicaque et arithmetica attingere. 10
- 2 Iam primum quoto post conceptionem mense infantes edi soleant, frequenter agitatam inter veteres nondum convenit. Hippon Metapontinus a septimo ad decimum mensem nasci posse aestimavit. nam septimo partum iam esse maturum eo quod in omnibus numerus septenarius 15 plurimum possit, siquidem septem formemur mensibus, additisque alteris recti consistere incipiamus, et post septimum mensem dentes nobis innascantur, idemque post septimum cadant annum, quarto decimo autem pubescere soleamus. sed hanc a septem mensibus incipientem 20 maturitatem usque ad decem perductam ideo quod in aliis omnibus haec eadem natura est, ut septem mensibus annisve tres aut menses aut anni ad consummationem 25 accedant: nam dentes septem mensum infanti nasci et maxime decimo perfici mense, septimo anno primos eorum excidere, decimo ultimos, post quartum decimum annum nonnullos, sed omnes intra septimum decimum annum pubescere. huic opinioni in parte aliqua repugnant alii, in parte consentiunt. nam septimo mense

1. empedocles *V* 2. partiri *Iahnus*, partim *DV*, partū *V*² in marg. 6. post futurum *DV* add. de CONFIRMATIONE autem PARTUS NIHIL^{ominus} (*d V*), quae pertinent ad cap. 5, 5; tum sequuntur ex cap. 14, 7 in prima hebdomade usque ad eap. 17, 9 nocte frequentes; denique redit scriptura ad cap. 7 init. superest dicere cet. 10. attingere *V* 11. conceptione *D* 13. hyppon *V* 20. hunc *D* 24. mensuum 2. mensium *V* 25. primus *D* 26. ultimus *D*

parere mulierem posse plurimi adfirmant, ut Theano Pythagorica, Aristoteles peripateticus, Diocles, Euenor, Straton, Empedocles, Epigenes multique praeterea, quorum omnium consensus Euryphonem Cnidium non deterret id
 5 ipsum intrepide pernegantem. contra eum ferme omnes 6 Epicharmum secuti octavo mense nasci negaverunt: Diocles tamen Carystius et Aristoteles Stagiritis aliter senserunt. nono autem et decimo mense cum Chaldaei plurimi et idem supra mihi nominatus Aristoteles edi posse
 10 partum putaverint, neque Epigenes Byzantius nono fieri posse contendit, nec Hippocrates Cous decimo. ceterum 7 undecimum mensem Aristoteles solus recipit, ceteri universi improbarunt.

Sed nunc Chaldaeorum ratio breviter tractanda est, 8
 15 explicandumque cur septimo mense et nono et decimo tantummodo posse homines nasci arbitrentur. ante omnia 2 igitur dicunt actum vitamque nostram stellis tam vagis quam statis esse subiectam, earumque vario multiplicique cursu genus humanum gubernari, sed ipsarum motus
 20 schemataque et effectus a sole crebro inmutari. nam ut aliae occasum, nonnullae stationem faciant nosque omnis hac sua disparili temperatura adficient, solis fieri potentia. itaque eum, qui stellas ipsas quibus movemur permovet, 3 animam nobis dare qua regamur potentissimumque in nos
 25 esse moderarique, quando post conceptionem veniamus in lucem; sed hoc per tres facere conspectus. quid autem sit conspectus et quot eius genera, ut liquido perspicui possit, pauca praedicam. circulus est, ut ferunt, 4

1. pythagoricus *DV* 2. aristotelis *D* euenor *V*
 starton *DV* 4. euryphonem *DV* 5. omne *D*, corr. *d*
 8. chaldei *DV* 9. mihi *om. V* 10. ephigenes *D*, ephy-
 genes *V* 11. hippocratis *D*, hypocrates *V*
 12. aristotelis *DV* 14. chaldaeorum *DV*
 15. quor *V* 18. statis *D*, stantibus *d V* 19. motu *V*
 20. shematasque *DV* 22. disparilitatemperitura *D*, disparilitate pariter *V*
 24. et ante animam *add. V vulgo*
 25 conceptione *D* 27. quod eius *D* liquido *V¹*, corr. *m.*

signifer, quem Graeci vocant zodiacon, in quo sol et luna ceteraeque stellae vagae feruntur. hic in duodecim partes totidem signis redditas aequabiliter divisus est. eum sol annuo spatio metitur: ita in uno quoque signo ferme unum mensem moratur. sed signum quodlibet cum ceteris singulis habet mutuū conspectum, non tamen uniformem cum omnibus: nam validiores alii, infirmiores alii habentur. igitur quo tempore partus concipitur, sol in aliquo signo sit necesse est *et* in aliqua eius particula, 5 quem locum conceptionis proprie appellant. sunt autem 10 hae particulae in uno quoque signo tricenae, totius vero zodiaci numero CCCLX. has Graeci moeras cognominant, eo videlicet quod deas fatales nuncupant Moeras et eae particulae nobis velut fata sunt: nam qua potissimum 6 oriente nascamur plurimum refert. sol ergo cum in proximum signum transcendit, locum illum conceptionis aut inbecillo videt conspectu aut etiam nec conspicit: nam plures proximantia sibimet zodia invicem se videre omnino negaverunt. at cum in tertio est signo, hoc est uno medio interposito, tunc primum illum locum unde profectus 20 est videre dicitur, sed valde obliquo et invalido lumine; qui conspectus vocatur κατὰ ἑξάγωνον, quia sextam partem circuli subtendit. nam si, ut a primo zodio ad tertium, sic a tertio ad quintum, inde porro ad septimum ac deinceps alternae lineae emittantur, hexagoni aequilateris 25 ralis forma in eodem circulo scribetur. hunc quidam conspectum non usquequaque receperunt, quod minimum 8 ad maturitatem partus videbatur conferre. cum vero in

1. greci *V* 9. et add. *Cauchius* 10. propriae *D*
 12. numeri *D* greci *V* cognominantur — moeras om. *V*
 13. quod eas *D* 14. hae *V* uel[ut] facta *D* ante ras.,
 uelut[ut] facta *d* qua *DV*, quia *d* 15. nascantur *DV*,
 corr. *Cauchius* 19. est in uno *V* 22. vocatur] dicitur *V*
 κατὰ ἑξάγωνον *D*, κατὰ ἑξάγωνον *V* (ε add. m. rec.) 23. si
 ut *Carrio*, ius *D*, cuius *d V Iahnus* 25. lunae *DV* (ortum
 ex lineae) aemittantur *D* exagoni aequilateralis *D*,
 exagoniae qui lateratis *V* 26. scriberetur *DV*, corr. *Iahnus*

- quartum signum pervenit et media duo sunt, videt κατὰ τετράγωνον, quoniam linea illa, qua visus pertendit, quartam partem orbis abscidit. cum in quinto autem est 9 tribus interiacentibus mediis, κατὰ τρίγωνον aspicit:
- 5 nam tertiam signiferi partem visus ille metitur. quae duae visiones tetragoni et trigoni perquam efficaces incrementum partus multum adminiculant. ceterum a loco 10 sexto conspectus omni caret efficientia: eius enim linea nullius polygoni efficit latus. at a septimo zodio, quod 10 est contrarium, plenissimus potentissimusque conspectus quosdam iam maturos infantes educit, qui septemlestres appellantur, quia septimo mense nascuntur. at si intra 11 hoc spatium maturescere uterus non potuerit, octavo mense non editur (ab octavo enim signo ut a sexto in-
- 15 efficax visus), sed vel nono mense vel decimo. sol enim 12 a nono zodio particulam conceptionis rursum conspicit κατὰ τρίγωνον et a decimo κατὰ τετράγωνον; qui conspectus, ut supra iam dictum est, perquam sunt efficaces. ceterum undecimo non putant nasci, quia languido iam 13
- 20 radio infirmum lumen κατὰ ἑξάγωνον mittatur; multo minus duodecimo, unde conspectus pro nullo habetur. itaque secundum hanc rationem ἑπτάμηνοι nascuntur κατὰ διάμετρον, ἑννέαμηνοι autem κατὰ τρίγωνον, δεκάμηνοι vero κατὰ τετράγωνον.
- 25 Hac Chaldaeorum sententia explicata transeo ad opinionem Pythagoricam Varroni tractatam in libro qui vocatur Tubero et intus subscribitur de origine humana; quae quidem ratio praecipue recipienda ad veritatem pro-

2. quoniam] \overline{qm} D 6. τετράγωνοι et τρίγωνοι *vulgo*

9. effecit DV ^slatu* latasatisseptimo D et d 11. septem menstres V 14. octavo dV, octavo D 17. τρίτωνον D ΤΕΤΡΑΤΩΝΟΝ D 20. κατὰ ἑξάτωνον (*super e centissima m. add. ')* D, κατὰ ἑξαγωνον V (*e add. 1 m.*) 22. ἑπτάμηνοι DV 23. κατὰ διάμετρον V ἑννεαμήνηνοι D ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΙ νερο D 25. chaldaeorum DV 27. scribitur V 28. proximae D

xime videtur accedere. alii enim plerique, cum omnes partus non uno tempore fiant maturi, una tamen eademque tempora omnibus conformandis dederunt; ut Diogenes Apolloniates, qui masculis corpus ait quattuor mensibus formari et feminis quinque, vel Hippon, qui diebus 5 LX infantem scribit formari, et quarto mense carnem fieri concretam, quinto unguis capillumve nasci, septimo 3 iam hominem esse perfectum: Pythagoras autem, quod erat credibilis, dixit partus esse genera duo, alterum septem mensum, alterum decem, sed priorem aliis dierum 10 numeris conformari, aliis posteriorem. eos vero numeros qui in uno quoque partu aliquid adferunt mutationis, dum aut semen in sanguinem aut sanguis in carnem aut caro in hominis figuram convertitur, inter se conlatos rationem habere eam quam voces habent quae in musice 15 κύμωνοι vocantur.

- 10 Sed haec quo sint intellectu apertiora, prius aliqua de musicae regulis huic loco necessaria dicentur, eo quidem magis, quod ea dicam quae ipsis musicis ignota sunt. 2 nam sonos scienter tractavere et congruenti ordine reddidere illorum *, ipsis autem sonis motuum modum men- 3 suramque invenerunt geometrae magis quam musici. igitur musica est scientia bene modulandi: haec autem est in voce: sed vox alias gravior mittitur, alias acutior. singulae tamen voces simplices et utcumque emissae φθόγγοι 25 vocantur: discrimen vero, quo alter φθόγγος acutior est, 4 alter gravior, appellatur διάστημα. inter infimam summamque vocem multa esse possunt in ordine posita [quae] diastemata alia aliis maiora minorave, ut est illud quod

1. omnis ex omnes, incertum an a 1 m., D 4. appolli-
nates V 5. hypon V 7. capillumque vulgo 11. con-
firmari D 12. aliquid D ferunt V 17. quos intel-
lectu D 21. illorū DV, illorum ἀρμονίαν coni. Lachmannus,
illos vulgo motum D 22. geometrae D, unde geometriae
fecit m. recentissima 25. φθονγοι D et V corr. m. rec.,
πφθονγοι V¹ 26. φθονγοι D et V corr. m. rec., πφθον-
γοι V¹ 28. quae seclutit Iahnus 29. illut D

tonon appellant, vel hoc minus hemitonion, vel duorum triumve ac deinceps aliquot tonorum intervallum. sed non promisce voces omnes cum aliis ut libet iunctae concordabiles in cantu reddunt effectus. ut litterae nostrae, 5
 5 si inter se passim iungantur et non congruenter, saepe nec verbis nec syllabis copulandis concordabunt, sic in musica quaedam certa sunt intervalla quae symphonias possint efficere. est autem symphonia duarum vocum 6
 10 disparium inter se iunctarum dulcis concentus. symphoniae simplices ac primae sunt tres, quibus reliquae constant; una duum tonorum et hemitonii habens διάστημα, quae vocatur διά τεσσάρων, alia trium et hemitonii, quam vocant διά πέντε: tertia est διά πασών, cuius διάστημα continet duas priores. est enim vel sex tonorum, 7
 15 ut Aristoxenus musicique adseverant, vel quinque et duorum hemitoniorum, ut Pythagoras geometraeque, qui demonstrant III hemitonia tonum complere non posse. quare etiam huius modi intervallum Plato abusive hemitonion, proprie autem διάλειμμα appellat. nunc vero ut 8
 20 liquido appareat quemadmodum voces nec sub oculos nec sub tactum cadentes habere possint mensuras, admirabile Pythagorae referam commentum, qui secreta naturae servando repperit phthongos musicorum convenire ad rationem numerorum. nam chordas aequae crassas pari-
 25 que longitudine diversis ponderibus tetendit, quibus saepe pulsus nec phthongis ad ullam symphoniam concor-

1. τόνον *vulgo* semitonion (s in ras., ex h facta, ut videtur; *conf. ad vs. 11. 17. 18 cet.*) D, semitonion V 2. aliquod D 3. promiscuae DV 9. symphoniae V 11. duo D, duorum V *vulgo* hemitonu D, semitonii dV 12. dia tesson V alia dV, ala D eremitonu DV, et semitonii d 13. diapente V dia pason D, diapason V diastema V 15. aristoxenus D 16. emitoniorum V qui add. Carrio 17. III semitonia (s in ras.) D, idem sine ras. V, II semitonia Iahnus ex edit. Rostoch. 18. semitonion (s in ras.) D, idem sine ras. V 19. propriae D διάλειμμα Iahnus, deallamma DV 21. cadentis D possit D 23. servando] immo reserando phthongos DV 24. cordas DV 25. ponderibus D 26. thongis D, pthongis V

dantibus pondera mutabat, et identidem frequenter expertus postremo deprehendit tunc duas chordas concinere id quod est διὰ τεσσάρων, cum earum pondera inter se collata rationem haberent quam tria ad quattuor, quem phthongon arithmetici Graeci epitriton vocant, Latini 5
 9 supertertium. at eam symphonian quae διὰ πέντε dicitur ibi invenit ubi ponderum discrimen in sesquialtera portione, quam duo faciunt ad tria conlata, quod hemilolon appellant. cum autem altera chorda duplo maiore pondere quam altera tenderetur et esset diplasion logus, 10
 10 διὰ πασσών sonabat. hoc et in tibiis si conveniret temptavit, nec aliud invenit. nam quattuor tibias pari cavo paravit, in pares longitudine, primam verbi causa longam digitos sex, secundam tertia parte addita id est digitorum VIII, tertiam digitorum VIII sescuplo longiorem 15
 quam primam, quartam vero XII digitorum, quae primam
 11 longitudine duplicaret. his itaque inflatis et binarum facta conlocatione omnium musicorum auribus adprobavit primam et secundam reddere eam convenientiam quam reddit dia tessaron symphonia, ibique esse portionem supertertiam; inter primam vero ac tertiam tibiam, ubi sescupla portio est, resonare dia pente; primae autem quartaque intervallum, quod habet duplam portionem,
 12 diastema facere dia pason. sed inter tiliarum chordarumque naturam hoc interest, quod tibiae incremento 25

2. depraehendit *D* dephendit *V* cordas *V* 3. diatessaron *V* 5. pthongon *D*, pthongon *V* greci *V*, corr. *m. rec.* ἐπίτριτον *vulgo* 6. ad *DV* symphoniam *V* diapente *V* 7. ubi *D*, *bi *d*, bi *V* addita u a *m. rec.* sesquialtera *Scaliger*, sesquipletra *D*, sesquipetra *V* 8. portione *vulgo hic et infra* hemilolon *D*, emilolon *V*, ἡμιόλιον *vulgo* 10. diplasion locus *DV*, διπλασίων λόγος *Iahnus secundum Scaligerum* 11. dia pason *V* 13. uerbi* (uerbis ante ras.) *D* 18. conlatione *V vulgo* adprobavit *D*, corr. *d* 19. prima *D* 20. diatessaron *DV*, διὰ τεσσάρων *vulgo* symphoniam *D* 22. proportio *V* diapente *DV*, διὰ πέντε *vulgo* 24. διάστημα facere διὰ πασσών *vulgo* cordarūq; *V*

longitudinis fiunt graviores, chordae autem augmento additi ponderis acutiores: utrobique tamen eadem portio est.

His expositis forsitan quidem obscure, sed quam potui
 lucidissime, redeo ad propositum, ut doceam quid Pytha-
 goras de numero dierum ad partus pertinentium senserit.
 primum, ut supra memoravi generaliter, duos esse partus
 omnino dixit, alterum minorem, quem vocant septem-
 mestrem, qui decimetducesimo die post conceptionem
 exeat ab utero, alterum maiorem decemestrem,
 qui edatur die ducentesimo septuagensimo quarto. quo-
 rum prior ac minor senario maxime continetur numero.
 nam quod ex semine conceptum est, sex, ut ait, primis
 diebus humor est lacteus, deinde proximis octo sangui-
 neus: qui octo cum ad primos sex accesserunt, faciunt
 primam symphoniam dia tessarōn. tertio gradu novem dies
 accedunt iam carnem facientes: hi cum sex illis primis
 collati sescuplam faciunt rationem et secundam sympho-
 nian dia pente. tum deinceps sequentibus duodecim die-
 bus fit corpus iam formatum: horum quoque ad eosdem
 sex collatio tertiam dia pason reddit symphoniam duplici
 rationi subiectam. hi quattuor numeri VI VIII VIII XII 4
 coniuncti faciunt dies XXXV. nec inmerito senarius fun-
 damentum gignendi est: nam eum telion Graeci, nos
 autem perfectum vocamus, quod eius partes tres, sexta
 et tertia et dimidia, id est unus et duo et tres, eundem
 ipsum perficiunt. sed ut initia seminis et lacteum illud 5
 conceptionis fundamentum primitus hoc numero absolvi-
 tur, sic hoc initium formati hominis et velut alterum
 maturascendi fundamentum, quod est quinque et triginta

1. cordę V 4. lucidisse me V, corr. m. rec. 6. duos
 in V add. m. rec. 7. septemestrem D, septem mestrem V
 8. decimo et ducentesimo V vulgo 9. decem mestrem V
 10. septuagesimo V 14. accesserint V 15. διά τεσσαράων
 vulgo 16. sex V m. rec. in ras. 17. sescuplam (sese in
 ras.) D secundum D symphoniam V (item mox vs. 20)
 18. διά πέντε vulgo 20. διά παύων vulgo 21. ratione D
 hu D numerii V vi] sex V xii] xi D 22. dies
 οὐ D 23. τέλειον V, τέλειον vulgo greci V 26. ul-
 lum D 29. maturascendi V triginta D

dierum, sexies ductum, cum ad diem ducentensimum decimum pervenit, maturum procreatur. alter autem ille partus, qui maior est, maiori numero continetur, septenario scilicet, quo tota vita humana finitur, ut et Solon scribit et Iudaei in dierum omnium numeris secuntur et Etruscorum libri rituales videntur indicare. Hippocrates quoque aliique medici in corporum valitudinibus non aliud ostendunt: nam septimum quemque diem crisonem observant. itaque ut alterius partus origo in sex est diebus, post quos semen in sanguinem vertitur, ita huius in septem; et ut ibi quinque et triginta diebus infans membratur, ita hic pro portione diebus fere quadraginta. quare in Graecia dies habent quadragensimos insignes. namque praegnans ante diem quadragensimum non prodit in fanum, et post partum quadraginta diebus pleraeque fetae graviores sunt nec sanguinem interdum continent, et parvoli ferme per hos [fere] morbidum sine risu nec sine periculo sunt. ob quam causam, cum is dies praeteriit, diem festum solent agitare, quod tempus appellant τεσσαροκостаίον. hi igitur dies quadraginta per septem illos initiales multiplicati fiunt dies ducenti octoginta, id est hebdomadae quadraginta: sed quoniam ultimae illius hebdomadis primo die editur partus, sex dies decedunt et ducentensimus septuagensimus quartus observatur. qui numerus dierum ad tetragonum illum 25
9 Chaldaeorum conspectum subtiliter congruit: nam cum

3. maiore *V* 4. uita in *V* add. m. rec. 5. iudei *D* sequuntur *V* et om. *D* 6. hippocratis *D*, hyppocrates *V*
10. ita et *V* 11. ubi *V* triginta *D* 12. portitione *D*
13. quadragensimos *D*, quadragimos *V* insignes *V*, corr. 1 m.
14. praegnans **** ante (litteris quattuor quinqueve erasis) *D*, praegnans ante *V* quadragensimum *V* procedit *d V* 17. parvuli *V* fere] infirmi *Lachmannus*
19. praeterit *DV* agitare, sed alterum ne erasum, *D*
20. τεσσαροκστenu *D*, τεσσαροκστenu *V*, corr. *Lachmannus* hu *D* 21. ducenti octoginta (octoginta *d*) *D* 22. ebdomadae *V* 23. ebdomadis *V* die* (dies ante ras.) *D*
24. ducentensimus septuagensimus quartus (non partus) *V*
26. chaldaeorum *DV*

signiferum orbem diebus CCCLXV et aliquot horis sol circumeat, quarta necesse est parte dempta, id est diebus LXXXXI aliquotque horis, tres quadras reliquis diebus CCLXXIII non plenis percurrat, usque dum perveniat ad
 5 id loci unde conceptionis initium quadratus aspiciat, unde autem mens humana dies istos commutationis speculari et arcana naturae rimari potuerit, nemo miretur. haec enim frequens medicorum experientia pervidit, qui cum multas animadverterent semen non retinere conceptum, conpertum habuerunt id quod intra sex dies
 10 septemve eiciebatur esse lacteum, et vocaverunt ἐκρυειν, quod postea autem sanguineum, idque ἐκτρῶσις appellatur. quod vero ambo partus videntur paribus dierum 11 numeris contineri, Pythagoras inparem laudat, tamen a 15 secta non discrepat. duo enim inpaes CCVIII et CCLXXIII dicit expleri, ad quorum consummationem aliquid ex sequentibus accedere, quod tamen diem solidum non adferat. cuius exemplum videmus tam in anni quam mensis 12 spatio servasse naturam, cum et anni inparem dierum 20 trecentorum sexaginta quinque numerum aliquanto cumulaverit et mense lunari ad dies undetriginta aliquid addiderit.

Nec vero incredibile est ad nostros natales musicam 12 pertinere. haec enim sive in voce tantummodo est, ut 25 Socrates ait, sive, ut Aristoxenus, in voce et corporis motu, sive in his et praeterea in animi motu, ut putat Theophrastus, certe multum obtinet divinitatis et animis permovendis plurimum valet. nam nisi grata esset deis 2 in mortalibus, qui ex anima constant divina, profecto ludi 30 scenici placandorum deorum causa instituti non essent,

1. dies DV aliquod D 3. LXII DV aliquodque D
 quadrans V¹, corr. m. 2 7. mirari DV 8. pervidit DV
 10. habuerint id in quod D 11. eiciebatur V ἐκκρυειν
 DV, corr. m. rec. in V 12. sanguinē V ἐκτρῶσις V
 (m sic fere ductum τ-τ) 14. in partem V laudet D
 16. exsequentibus D 18. videmus (e ex i facta) D 21. undetrigenta D 24. ut socrates dV, utcrates D 26. ami V
 27. theophrastus DV

- nec tibicen omnibus supplicationibus in sacris aedibus
 adhiberetur, non cum tibicine Marti triumphus ageretur,
 non Apollini cithara, non Musis tibiae ceteraque id genus
 essent adtributa, non tibicinibus, per quos numina pla-
 cantur, esset permissum aut ludos publice facere ac vesi 5
 in Capitolio, aut Quinquatribus minusculis, id est idibus
 Iunîis, urbem vestitu quo vellent personatis temulentisque
 3 pervagari. hominum quoque mentes et ipsae, quamvis
 Epicuro reclamante, divinae suam naturam per cantus
 agnoscunt. denique quo facilius sufferant laborem, vel 10
 in navis meatu a rectore symphonia adhibetur: legionibus
 quoque in acie dimicantibus etiam metus mortis classico
 4 depellitur. ob quam rem Pythagoras, ut animum sua
 semper divinitate imbueret, prius quam se somno daret et
 cum esset expergitus, cithara ut ferunt cantare consueve- 15
 rat, et Asclepiades medicus phreneticorum mentes morbo
 turbatas saepe per symphoniam suae naturae reddidit.
 Herophilus autem, artis eiusdem professor, venarum pul-
 5 sus rhythmis musicis ait moveri. itaque si et in corporis
 et in animi motu est harmonia, procul dubio a natalibus 20
 nostris musica non est aliena.
- 13 Ad haec accedit quod Pythagoras prodidit hunc totum
 mundum musica factum ratione, septemque stellas inter
 caelum et terram vagas, quae mortalium geneses mode-
 rantur, motum habere enrythmon et intervalla musicis 25
 diastematis congrua, sonitusque varios reddere pro sua

2. cum *om. V* Marti] aut *D, om. V*, aut tubicine *Iah-*
nus, avitus *Prellerus Röm. Mythol. p. 316; mihi in aut latere*
utrum Marti, quod in DV additum post ageretur, sed in D
super verum 3. appollini *V* cithara *D* 4. tibicinibus
 (cinibus *d in ras.*) *D* quos *DV*, quod *d* 6. capitulo *D*
 quod patribus minus oculis *DV* 7. urbes *DV* uestito *D*
 9. epicuro *D* 10. facilius *V*, corr. *m. rec.* 11. meatu uel
 metatu uel motu *Pontanus ad Macrob. in somn. Scip. II, 3,*
metu DV uectore *DV* 13. pythagoras *V* 15. sythara *D,*
cythara V 16. asclepiadis (*i in ras. pro e, ut videtur*) *D*
 freneticorum *DV* 18. herophilus *DV* autem mortis *D*
 19. rhythmis *DV* 20. in *om. V* vulgo animi (*mi d in ras.*)
D armonia *V* 22. accedit *D*, accidit *d V*

quaque altitudine ita concordēs, ut dulcissimam quidem
 concinant melodian, sed nobis inaudibilem propter vocis
 magnitudinem, quam capere aurium nostrarum angustiae
 non possint. nam ut Eratosthenes geometrica ratione col-
 5 legit maximum terrae circuitum esse stadiorum ducentum
 quinquaginta duum milium, ita Pythagoras quot stadia
 inter terram et singulas stellas essent indicavit. stadium
 autem in hac mundi mensura id potissimum intellegen-
 10 quinque: nam sunt praeterea et alia longitudine discre-
 pantia, ut Olympicum, quod est pedum sescentum, item
 Pythicum pedum M. igitur ab terra ad lunam Pythagoras 3
 putavit esse stadiorum circiter centum viginti sex milia,
 idque esse toni intervallum; a luna autem ad Mercuri
 15 stellam, quae stilbon vocatur, dimidium eius, velut hemi-
 tonion; hinc ad phosphoron, quae est Veneris stella, fere
 tantundem, hoc est aliud hemitonion; inde porro ad so-
 lem ter tantum, quasi tonum et dimidium. itaque solis 4
 astrum abesse a terra tonos tres et dimidium, quod vo-
 20 catur dia pente, a luna autem duos et dimidium, quod
 est dia tessaron. a sole vero ad stellam Martis, cui no-
 men est pyrois, tantundem intervalli esse quantum a terra
 ad lunam, idque facere tonon; hinc ad Iovis stellam, quae
 phaethon appellatur, dimidium eius, quod faciat hemito-
 25 nion; tantundem a Iove ad Saturni stellam, cui phaenon
 nomen est, id est aliud hemitonion; inde ad summum
 caelum, ubi signa sunt, perinde hemitonion. itaque a 5

1. quaeque *DV*, corr. *Halmius coll. Madvigio ad Cic. de fin.*
p. 699 3. carpere *D* 4. erastosthenes geometrica *D*
 colligit *V* 6. quot (*t d in ras.*) *D* 7. interrā *V* 9. u-
 genti *D* 12. pedū.m. *V* 13. ugenti *D* 14. mercuri
D, mercurii *d*, Mercurii *V* 15. stilon *D* semitonion *DV*
 17. emitonion *D*, semitonion *dV* (hemitonion *D ante ras. illo*
loco qui a nobis adscriptus est ad p. 25, 2) 19. astrum
 (austrum *ante ras.*) *D* 20. diapente *DV*, διά πέντε *vulgo*
 21. diatessaron *DV*, διά τεσσάρων *vulgo* 24. pheton *D*,
 phoeton *V* 25. phenon *DV* 26. 27. hemitonion *D ante*
ras., semitonion *dV*

- caelo summo ad solem diastema esse dia tessonon, id est duorum tonorum et dimidi, ad terrae autem summitatem ab eodem caelo tonos esse sex, in quibus sit dia pason symphonia. praeterea multa quae musici tractant ad alias rettulit stellas et hunc omnem mundum enarmonion esse ostendit. quare Dorylaus scripsit esse mundum organum dei: alii addiderunt esse id ἐπτάχορδον, quia septem sint vagae stellae, quae plurimum moveantur. sed his omnibus subtiliter tractandis hic locus non est; quae si vellem in unum librum separatim congerere, tamen in angustiis versarer: quin potius, quoniam me longius dulcedo musicae abduxit, ad propositum revertor.
- 14 Igitur expositis iis quae ante diem natalem sunt, nunc ut climactericoe anni noscantur, quid de gradibus aetatis humanae sensum sit dicam. Varro quinque gradus aetatis aequabiliter putat esse divisos, unum quemque scilicet praeter extremum in annos XV. itaque primo gradu usque annum XV pueros dictos, quod sint puri, id est impubes. secundo ad tricensimum annum adulescentes, ab alescendo sic nominatos. in tertio gradu qui erant usque quinque et quadraginta annos, iuvenis appellatos eo quod rem publicam in re militari possent iuvare. in quarto autem adusque sexagensimum annum seniores vocitatos, quod tunc primum senescere corpus inciperet. inde usque finem vitae unius cuiusque quintum gradum factum, 25

1. diatessonon DV, διὰ τεσσάρων vulgo 2. dimidiaterra-
rae D, dimidiaterra d, dimidii terrae V summitatem
D, summitate dV 3. ad eodem D diapason D, diapa-
san V (corr. m. 2), διὰ πασῶν vulgo 4. multa q, D ad
alias om. V 5. rettulit DV, corr. d enarmonion (enar-
moni d in ras.) D 6. dorylaus V 7. id ἐπτάχορδον Sca-
tiger, idest ταχοραον D, id est taxopaon V quia] qui V
12. musica** D 13. his V q D 14. climacterica D,
climacterici d V vulgo 17. usque ad vulgo 19. secundus
D, secundus V tricesimum V 20. allescendo DV
erat DV 21. iuvenes V appellatus D 23. adus-
que ** (erasis ad) D, usque ad V sexagensimum D, sexa-
gesimū V 24. incipiat (at d in ras.) D, incipiat V vulgo

in quo qui essent, senes appellatos, quod ea aetate corpus
iam senio laboraret. Hippocrates medicus in septem gra-
3 dus aetates distribuit. finem primae putavit esse septi-
mum annum, secundae quartum decimum, tertiae duode-
5 tricensimum, quartae tricensimum quintum, quintae duo
et quadragensimum, sextae quinquagensimum sextum,
septimae novissimum annum vitae humanae. Solon autem 4
decem partes fecit, et Hippocratis gradum tertium et sex-
tum et septimum singulos bifariam divisit, ut una quae-
10 que aetas annos haberet septenos. Staseas peripateticus 5
ad has Solonis decem hebdomadas addidit duas, et spa-
tium plenae vitae quattuor et octoginta annorum esse
dixit; quem terminum si quis praeterit, facere idem quod
stadiodromoe ac quadrigae faciunt, cum extra finem pro-
15 duodecim hebdomadibus describi Varro commemorat.
quae duo** ad decies septenos annos posse fatalia depre-
cando rebus divinis proferre, ab anno autem LXX nec
postulari debere nec posse ab deis impetrari. ceterum
20 post annos LXXXIII a mente sua homines abire, neque
his fieri prodigia. sed ex eis omnibus proxime videntur 7
adaccessisse naturam qui hebdomadibus humanam vitam
emensi sunt. fere enim post septimum quemque annum
articulos quosdam et in his aliquid novi natura ostendit,
25 ut et in elegia Solonis cognoscere datur. ait enim in
prima hebdomade dentes homini cadere, in secunda pu-

2. post laboraret in *D* add. hinc ad phosphoron quae est
ueneris stella fere tantumdem hoc est aliud hemitonion
(semitonion *d*): vide p. 23, 16 hippocratis *D*, hypocrates *V*
3. aetatū *V* 4. duodetricesimum *DV* 5. tricesimum *V*
6. quadagesimū *V* quinquagesimum *V* 8. hippocra-
tis *V* 11. ebdomades *V* 13. preterit *V* 15. etrusus *D*
16. ebdomadibus *DV* describi *D* 17. que dum ad *V*
depraecando *V*, corr. m. 2 21. proximae *D* 22. ebdo-
madibus *DV* 25. et in elegia *V* atenim *V* in prima heb-
domade *cet.* in *DV* supra inveniuntur (vide ad p. 12, 6); hoc
autem loco leguntur temporum si veterum *cet.* (vide cap. 17, 10)
26. ebdomadae *D*, ebdomade *V*

- bem apparere, in tertia barbam nasci, in quarta vires, in quinta maturitatem ad stirpem relinquendam, in sexta cupiditatis temperari, in septima prudentiam linguamque consummari, in octava eadem manere (in qua alii dixerunt oculos albescere), in nona omnia fieri languidiora, in decima hominem morti fieri maturum. ** tamen in secunda hebdomade vel incipiente tertia vocem crassiorum et inaequabilem fieri, quod Aristoteles appellat tragizin, antiqui nostri irquitallire, et inde ipsos putant irquitillos appellari, quod tum corpus ircum olere incipiat. de tertia autem aetate adolescentulorum tres gradus esse factos in Graecia prius quam ad viros perveniatur, quod vocent annorum XIII παῖδα, μελλέφηρον autem XV, dein sedecim ἔφηρον, tunc septemdecim ἐξέφηρον. 9 praeterea multa sunt de his hebdomadibus quae medici ac philosophi libris mandaverunt, unde apparet, ut in morbis dies septimi suspecti sunt et crisimoe dicuntur, ita per omnem vitam septimum quemque annum periculosum et velut crisimon esse et climactericum vocitari. sed ex his genethliaci alios aliis difficiliorese esse dixerunt, et nonnulli eos potissimum quos ternae hebdomades conficiunt putant observandos, hoc est unum et vicesimum, et quadragesimum secundum, dein tertium et sexagesimum, postremum octogensimum et quartum, in quo Staseas terminum vitae defixit. alii autem non pauci unum omnium difficillimum climactera prodiderunt, anno scilicet

1. tertia *D* ueres *D*, vires *d V* 3. temptari *V*
 4. octava *D* in qua — languidiora *om. V* 7. hebdomade *D V* 8. aristotelis *D* τραγίζειν *vulgo* 9. irquitallire (*r d in ras.*) *D* 10. ***quitillos *D*, irquitillos *d V* elere *D* 13. παῖδα *D*, παῖδ *V*, παῖδα *corr. rec. m. in V* μελλέφηρον *D V* 14. aeophebon *D*, eophebon *V* ἐξέφοισον *D*, ἐξέφισον *V* 15. hebdomadibus *D V* 17. crisimie *D*, crisimiae *V* 19. climactericum] *add. V m. 1 in marg.* CLIMACI, *m. 2 super uersum incertū* 20. alias alius *D V* DIFFICILLIORES *D* 21. ternas (*s d in ras.*) *D* ebdomades *D V* 22. oc *V* uicesimum *V* 23. quadragesimum *D*, quadragesimum *V* sexagisimum *D*, sexagesimum *V* 24. LXXX *D V* quo* *D*

cet undequinquagesimo, quem conplect anni septies
 septeni; ad quam opinionem plurimorum consensus in-
 clinat: nam quadrati numeri potentissimi ducuntur. de- 12
 nique Plato ille veniat veteris philosophiae sanctissimus,
 5 qui quadrato numero annorum vitam humanam consum-
 mari putavit, sed novenario, qui conplect annos octoginta
 et unum. fuerunt etiam qui utrumque reciperent nu-
 merum, undequinquagesimum et octogensimum unum,
 et minorem nocturnis genesibus, maiorem diurnis scri-
 10 berent *. plerique [aliter moti] duos istos numeros sub- 13
 tiliter dicreverunt, dicentes septenarium ad corpus, no-
 venarium ad animum pertinere; hunc medicinae corporis
 et Apollini adtributum, illum Musis, quia morbos animi,
 quos appellant pathe, musice lenire ac sanare consueve-
 15 rit. itaque primum climactera annum quadragensimum 14
 et nonum esse prodiderunt, ultimum autem octogensimum
 et unum; medium vero ex utroque permixtum anno ter-
 tio et sexagesimo, vel quem hebdomades novem vel
 septem enneades conficiunt. hunc licet quidam periculo- 15
 20 sissimum dicant, quod ad corpus et ad animum pertineat,
 ego tamen ceteris duco infirmiore. nam utrumque qui-
 dem supra dictum continet numerum, sed neutrum qua-
 dratum, et ut est ab utroque non alienus, ita in neutro
 potens. nec multos sane, quos vetustas claro nomine
 25. celebrat, hic annus absumpsit. Aristotelen Stagiriten re- 16

1. unde quinquagesimo *D*, unode qu. *d*, uno de quin-
 quagesimo *V* 2. opotionem *D* 4. veniat veteris *Iahnus*,
 ueniat (t in ras. trium litterarum) ceteris *D*, ueniat ceteris *V*
 6. LXXX *DV* 7. fuerunt — 8. unum om. *V* 8. unde .r. et
 LXXX unum *D* 9. ascriberent vulgo sine nota lacunae; scri-
 berent fieri. quali termino duos cet. ego proposui in *Eos, süd-
 deutsche Zeitschr. für Philol. II 1866 p. 625* 10. istos *dV*,
 isto *D* 11. decreuerunt *D*, decreverē (in marg. dis m. rec.)
V, discreverunt vulgo 14. πάθη vulgo 15. clamaetera *D*,
 clamaetera *d*, climactera *V* XL et unum esse *DV*
 16. LXXX *DV* 18. sexagēsimo *D*, sexagesimo *V* hebdo-
 mades *V* 19. henneades *D* 25. aristotelēs (s a m. 2, ut
 videtur) *D*, aristoteles *V* reperit (t in ras.) *D*, reperit
 corr. *Guilielmus*

perio: sed hunc ferunt naturalem stomachi infirmitatem crebrasque morbi corporis offensiones adeo virtute animi diu sustentasse, ut magis mirum sit ad annos LXIII eum vitam pertulisse quam ultra non protulisse.

- 15 Quare, sanctissime Caerelli, cum istum annum qui 5 maxime fuerat corpori formidolosus sine ullo incommodo transieris, ceteros, qui leviores sunt, climacteras minus tibi extimesco, praesertim cum in te animi potius quam corporis naturam sciam dominari, eosque viros qui tales fuerunt non prius vita excessisse quam ad annum illum 10 octogesimum et unum pervenerint, in quo Plato finem vitae et legitimum esse existimavit et habuit legitimum.
- 2 hoc anno et Dionysius Heracleotes, ut vita abiret, cibo abstinuit et contra Diogenes cynicus cibi cruditate in cholera solutus est. Eratosthenes quoque ille orbis terra- 15 rum mensor et Xenocrates Platonici veteris academiae
- 3 princeps ad eundem annum vixerunt. non pauci etiam per animi spiritum molestiis corporis superatis limitem istum transgressi sunt, ut Carneades, a quo tertia academia est, quae dicitur nova, qui ad annum nonagesimum*, 20 vel Cleanthes, qui uno minus centum explevit. at Xenophanes Colophonius maior annorum centum fuit. Democritum quoque Abderiten et Isocraten rhetorem ferunt prope ad id aetatis pervenisse quo Gorgian Leontinum, quem omnium veterum maxime senem fuisse et octo su- 25
- 4 pra centum annos habuisse constat. quod si cultoribus sapientiae sive per animi virtutem seu lege fati diutina obtigit vita, non despero quin te quoque diu corpore ad-

1. stomachi. D 4. ptulisse V non pertulisse DV
 5. cerelli V ex stl. cum d in ras. 7. laeviores D
 11. octogesimum V 12. extimavit D 13. dionysius DV
 15. solutum D 16. xenocratis D, *xenocrates (erasa e) V
 achademiae DV 19. achademia V 20. nova vel cle-
 anthes (cleantes V) qui ad annum nonagesimum (nonagesi-
 mum V) uno minus centum DV, transposuit Iahnus; idem ac-
 cessit (Halmius vixit) post nonagesimum intercidisse coniecit
 21. xenephanes DV 28. atque V

que animo valentem longior maneat senectus. quem enim veterum nunc memoria suspicimus prudentia vel temperantia vel iustitia vel fortitudine tibi antestare [dicimus]? quis eorum, si adesset, non in te omnium virtutum praedicationem conferret? quis tuis laudibus se postponi erubesceret? illud certe, ut arbitror, dignum est praedicatione, quod, cum illis ferme omnibus quamvis prudentissimis et procul a republica amotis non contigerit sine offensione et odio plerumque capitali vitam degere, tu tamen officiis municipalibus functus, honore sacerdotii in principibus tuae civitatis conspicuus, ordinis etiam equestris dignitate gradum provincialium supergressus, non modo sine reprehensione et invidia semper fuisti, verum etiam omnium omnino amorem cum maxima gloria consecutus es. quis a te nosci aut ex amplissimo senatus ordine non expetiit aut ex humiliore plebis non optavit? quis mortalium vel te vidit vel de tuo nomine accepit, quin et loco fratris germani diligat et vice parentis veneretur? quis ignorat probitatem primam, fidem summam, benignitatem incredibilem, modestiam verecundiamque singularem ceteraque humanitatis officia penes te unum esse, et quidem maiora quam possint digne a quoquam referri? quare et ego his nunc commemorandis super sededo. de eloquentia quoque sileo, quam omnia provincialium nostrarum tribunalia, omnes praesides noverunt, quam denique urbs Roma et auditoria sacra mirata sunt. haec se et ad praesens et in futura saecula satis ipsa nobilitat.

Nunc vero quatenus de die natali scribo, meum munus implere conabor, tempusque hodiernum, quo maxime

1. quem enim veterum, quorum memoriam suspicimus, prudentia — antestare dicimus *Iahnus secundum Lachmannum*
 2. suscepimus *V* 3. fortitudinem *D* 5. postponit erubesceret *D*, corr. *d* 8. motis *DV*; remotis *Cauchius*
 9. uira *DV* 10. sacerdoti *V* 13. reprehensione *D*
 15. qui *d* (s littera expuncta) 16. expetit *D* 27. praesens *V* 30. implere *V*

- flores, quam potero lucidissimis notis signabo; ex quo
 2 etiam primus ille tuus natalis liquido noscetur. tempus
 autem non diem tantummodo vel mensem vel annum
 ventem appello, sed et quod quidam lustrum aut annum
 3 magnum vocant, et quod saeculum nominant. ceterum 5
 de aevo, quod est tempus unum et maximum, non multum
 est quod in praesentia dicatur. est enim immensum, sine
 origine, sine fine, quod eodem modo semper fuit et sem-
 per futurum est, neque ad quemquam hominum magis
 4 quam ad alterum pertinet. hoc in tria dividitur tempora, 10
 praeteritum, praesens, futurum. *e* quibus praeteritum
 initio caret, exitu futurum, praesens autem, quod medium
 est, adeo exiguum et inconprehensibile est, ut nullam re-
 cipiat longitudinem neque aliud esse videatur quam trans-
 acti futurique coniunctio, adeo porro instabile, ut ibidem 15
 sit numquam, et quidquid transcurrit a futuro decerpit et
 5 adponit praeterito. haec inter se tempora, ante actum
 dico et venturum, neque paria sunt neque ita ut alterum
 altero longius breviusve videatur: quidquid enim non
 6 habet finem, conlationem mensurae non recipit. qua- 20
 propter aevum neque annorum nec saeculorum numero
 nec denique ullo finiti temporis modulo metiri conabor:
 haec enim ad aetatem infinitam non sunt brumalis unius
 instar horae.
- 7 Itaque ut saecula possim percurrere et hoc nostrum 25
 praesens designare, omissis aureis argenteisque et hoc
 genus poeticis, a conditu urbis Romae, patriae nostrae
 17 communis, exordiar, et quoniam saecula aut naturalia
 sunt aut civilia, prius de naturalibus dicam.
- 2 Saeculum est spatium vitae humanae longissimum 30

4. aut unum annū *V* 5. seculum *V* 7. presentia *V*
 10. quam adulterum *D*, quam ad adulterum *d*. 11. *e om.*
DV 12. INI**TIO (INIUNTIO ante *ras*.) *D* exitum *D*
 13. inconpraehensibile *D*, inconprehensibile *V* 16. quic-
 quid *V* et adponit praeterito *om. V* 18. paria] pro-
 pria *V* 19. quicquid *V* 26. designare (de *ex di*) *D*
 28. exordiar** | et qm (et initio versus adscr. m. 2) *D*, exor-
 diar | DE SAECVLIS *V* omissis et quoniam — dicam

- partu et morte definitum. quare qui annos triginta saeculum putarunt multum videntur errasse. hoc enim tempus genean vocari Heraclitus auctor est, quia orbis aetatis in eo sit spatium. orbem autem vocat aetatis, dum natura
 5 ab sementi humana ad sementim revertitur. hoc quidem geneas tempus alii aliter definierunt. Herodicus annos quinque et viginti scribit dici genean, Zenon triginta. saeculum autem *quid* sit, usque adhuc arbitror ad subtile
 10 examinatum non esse. poetae quidem multa incredibilia scripserunt, nec minus historici Graeci, quamvis eos a vero par non fuit decedere; ut Herodotus, apud quem legimus Arganthonion Tartessorum regem centum et quinquaginta annorum fuisse, aut Ephorus, qui tradit Arcadas dicere apud se reges antiquos aliquot ad trecentos
 15 vixisse annos. verum haec ut fabulosa praetereo: sed 4 inter ipsos astrologos, qui in stellarum signorumque ratione verum scrutantur, nequaquam etiam convenit. Epigenes in centum duodecim annis longissimam vitam constituit, Berosos autem centum sedecim: alii ad centum
 20 viginti annos produci posse, quidam etiam ultra crediderunt. fuerunt qui non idem putarent ubique observandum, sed varie per diversas regiones, pro ut in singulis sit caeli ad circulum finitorem inclinatio, quod vocatur clima.
- 25 Sed licet veritas in obscuro lateat, tamen in una quaque civitate quae sint naturalia saecula, rituales Etruscorum libri videntur docere, in quibus scriptum esse fertur initia sic poni saeculorum. quo die urbes adque civitates constituerentur, de his qui eo die nati essent eum qui

3. γεγεῖν *vulgo, item posthac γεγεῖν et γεγεῖν* 4. vocant
DV corr. Lachmannus 5. ab sementi *Halmius*, ad sementi *D*,
om. V sementem *V* 7. TRIGENTA *D* 8. quid *om. D*
 9. exanimatū *V* 10. SCRIBSERUNT *D* eos] eo *D*, *om. V*
 12. arganthonion *V* tarcessiorum (*tar in ras.*) *D*, tarcessiorū *V* 13. quinta *V*, *corr. m. rec.* fuisse antephorus *V*
 archadas *DV* 14. apud *D* aliquod *D* tricentos *V*
 17. epigenesis *D*, epygenes in *V* 20. uigenti *D* 22. u
 riae *D* 26. secula *V* 28. atque *V*

- diutissime vixisset die mortis suae primi saeculi modulum finire, eoque die qui essent reliqui in civitate, de his rursum eius mortem, qui longissimam egisset aetatem, finem esse saeculi secundi. sic deinceps tempus reliquorum terminari. sed ea quod ignorarent homines, portenta mitti 5 divinitus, quibus admonerentur unum quodque saeculum esse finitum. haec portenta Etrusci pro haruspicii disciplinaeque suae peritia diligenter observata in libros rettulerunt. quare in Tuscis historiis, quae octavo eorum saeculo scriptae sunt, ut Varro testatur, et quot numero 10 saecula ei genti data sint et transactorum singula quanta fuerint quibusve ostentis eorum exitus designati sint continetur. itaque scriptum est quattuor prima saecula annorum fuisse centenum, quintum centum viginti trium, sextum undeviginti et centum, septimum totidem, octa- 15 vum tum demum agi, nonum et decimum superesse, quibus transactis finem fore nominis Etrusci.
- 7 Romanorum autem saecula quidam ludis saecularibus putant distingui: cui rei fides si certa est, modus Romani saeculi est incertus. temporum enim intervalla, 20 quibus ludi isti debeant referri, non modo quanta fuerint retro ignoratur, sed ne quanta quidem esse debeant scitur. nam ita institutum esse, ut centesimo quoque anno fierent, id cum Antias alique historici auctores sunt, tum Varro de scaenicis originibus libro primo ita scriptum 25 reliquit: cum multa portenta fierent, et murus ac turris, quae sunt inter portam Collinam et Esquilinam, de caelo tacta essent, et ideo

7. aruspicii *V* disciplinae quae *D* 9. RETTULERUNT *D*, retulerunt *V* 10. ut *d* in *ras.* et quod *D* 11. transactorum *V*, corr. *m.* 2 12. **ONTINETUR *D*, continetur *d*, item *V*, in quo ntinet 1 *m.* in *ras.* 14. centenū fuit in *D*, nunc post cent est rasura trium litterarum et um superscr., tertio autem loco comparet etiam nunc ductus transversus qui fuit super u; centū *V* quintum (in in *ras.*) *D* 15. unumdeviginti *dV* 22. debeat *V*¹, corr. *m.* 2 25. scenicis *V* 26. muros *V* 28. tracta *V*

libros Sibyllinos x viri adissent, renuntiarent
 uti Diti patri et Proserpinae ludi Tarentini
 in campo Martio fierent tribus noctibus, et ho-
 stiae furvae immolarentur, utique ludi cente-
 5 simo quoque anno fierent. item Titus Livius libro 9
 CXXXVI: eodem anno ludos saeculares Caesar
 ingenti apparatu fecit, quos centesimo quo-
 que anno (his enim terminari saeculi *) fieri
 mos * ut *. contra ut decimo centesimoque anno re-
 10 petantur tam commentarii xv virorum quam Divi Augusti
 edicta testari videntur, adeo ut Horatius Flaccus in car-
 mine quod saecularibus ludis cantatum est id tempus hoc
 modo designaverit: Certus undenos decies per an-
 nos Orbis ut cantus referatque ludos Ter die
 15 clara totiensque grata Nocte frequentes. quae 10
 dissensio temporum, si veterum revolvantur annales,
 longe magis in incerto invenietur. primos enim ludos
 saeculares exactis regibus post Romam conditam annis
 CCXLV a Valerio Publicola institutos esse ** ad xv viro-
 20 rum commentarios, anno CCXCVIII M. Valerio Spurio Ver-
 ginio cons. * * anno post urbem conditam † octavo et
 quadringentesimo, ut vero in commentariis xv virorum
 scriptum est anno CCCC et † decimo M. Valerio Corvino II

1. SYBILLINOS DV x viri Mommsenus Chronol. Rom. p. 181,
 .xu. uiri D, xii uiri V, xv viri vulgo renuntiarent V¹,
 corr. m. 2 8. is (immo hic) enim terminus saeculi vulgo
 9. sed moris esse ut contra con. Lachmannus ut contra,
 omisso altero ut, V, at contra ut vulgo ante Iahnum 11. Hor.
 carm. saec. 21 ss. 13. certos DV 14. orbes DV¹, or-
 bis V² 15. claro DV post frequentes DV habent cap. 7
 Superest — cap. 14, 7 ait enim; tum quae dissensio repetivit
 Lachmannus ex eo loco qui indicatus est ad p. 10, 7; denique
 temporum et cet. supra leguntur: vide ad p. 25, 25 16. re-
 uoluantur dV 19. xl uirorum DV 20. CCXCVIII DV
 21. cons. DV post cons. lacunam sic explevit Lachmannus:
 secundos ludos, ut Antias vult, M. Popilio Laenate IIII M.
 Valerio Corvino cos.; idem pro octavo correxit sexto, et vs. 23
 octavo pro decimo (conf. C. L. Roth in Mus. Rhen. VIII
 p. 371 s.) 22. quadraginsimo D, quadagesimo V XII
 uirorum V 23. curmino DV, legendum Corvo cum Man

- C. Poetilio cons. tertii ludi fuerunt Antiatae Livioque auctoribus P. Claudio Pulchro L. Iunio Pullo cons. * * anno quingentesimo duodevicensimo P. Cornelio Lentulo C. Licinio Varo cons. de quartorum ludorum anno triplex opinio est. Antias enim et Varro et Livius relat⁵os esse prodiderunt L. Marcio Censorino M. Manilio cons. post Romam conditam anno DCV. at Piso Censorius et Gn. Gellius, sed et Cassius Hemina, qui illo tempore vivebat, post annum factos tertium adfirmant Gn. Cornelio Lentulo Lucio Mummio Achaico cons., id est anno DCVIII. 10 in XV virorum autem commentariis notantur sub anno DCXXVIII M. Aemilio Lepido L. Aurelio Oreste cons. quintos ludos C. Furnio C. Iunio Silano cons. anno DCCXXXVII Caesar Augustus et Agrippa fecerunt. sextos autem fecit Ti. Claudius Caesar se IIII et L. Vitellio III 15 cons. anno DCCC, septimos Domitianus se XIII et L. Minucio Rufo cons. anno DCCCXLI, octavos imperatores Septimius et M. Aurelius Antoninus Cilone et Libone 12 cons. anno DCCCCLVII. hinc animadvertere licet neque post centum annos ut hi referrentur ludi statum esse, 20 neque post centum decem. quorum etiamsi alterutrum retro fuisset observatum, non tamen satis id argumenti esset quo quis his ludis saecula discerni constanter adfirmet, praesertim cum ab urbis primordio ad reges exactos, annos CCXLIIII, factos esse auctor sit nemo, 25

1. poetaelio $\overline{\text{cs}}$ D, poetelio cons. V antiatae D
 2. pulloi. $\overline{\text{cos}}$ D, pulloi cons V 3. quingentesimo duodevicensimo V 4. Iunio DV Varro D $\overline{\text{cos}}$. D, cons. V
 6. m. manlio DV $\overline{\text{cos}}$. D, cons. V 9. gn DV (at vs. 8 uterque habet gn) 10. mummo DV $\overline{\text{cos}}$. DV
 dcliii DV 11. sub annis DV 12. M. om. DV emilio DV $\overline{\text{cos}}$. D, co V. 13. C prius om. DV cons. DV
 14. aug. et agrippa V 15. t. claudius DV caesarsae. i. c. iii et l. vitellio D, caesar se. i. c. iii et l. vitellio V (l. vitellio ex sil.) 16. $\overline{\text{cos}}$ D, cons V (item uterque proximo versu) domitianus sex. iii. D minuci V 17. imp. sept. et m. aur. D, imper. sept. et m. aur. V 18. nibone V 19. $\overline{\text{cos}}$ D, cons. V dcccclvii DV 20. ut hi] uti V statutum V 25. anno ccxliiii D (conf. ad p. 35 vs. 7) ludos ut factos add. Iahnus

quod tempus procul dubio naturali maius est saeculo.
 quod si quis credit ludis saecularibus saecula *, sola no- 13
 minis origine inductus, sciat saeculares dici potuisse quod
 plerumque semel fiant hominis aetate, ut multa alia quae
 5 rara sunt post saeculum evenire loquentium consuetudo
 usurpat.

Sed nostri maiores, quod natura saeculum quantum
 esset exploratum non habebant, civile ad certum modu-
 lum annorum centum statuerunt. testis est Piso, in cuius
 10 annali septimo scriptum est sic: Roma condita anno
 DC septimum saeculum occipit his consulibus
 qui proximi sunt consules, M. Aemilius M.
 filius Lepidus, G. Popilius II absens. sed ut
 hunc annorum numerum constituerent nostri, non nihil
 15 causae fuit, primum quod multos suorum civium ad hunc
 aetatem perducere videbant, dein quod Etruscos, quorum
 prima saecula centenum fuerunt annorum, etiam hic ut
 in aliis plerumque imitari voluerunt. praeterea fieri potest 14
 quod refert Varro, quod Dioscorides astrologus scribit,
 20 Alexandriae inter eos qui mortuos sallunt constare homi-
 nem plus centum annos vivere non posse, idque cor ho-
 minum declarare eorum qui integri perierunt sine cor-
 poris tabe; ideo quod multis annis pendendo cor omnis
 aetatis incrementa et deminutiones conseruere: et anni-
 25 culi pendere duas dragmas, bimi quattuor, et sic in an-
 nos singulos usque ad quinquaginta accedere binas; ab

2. cludi ante ludis add. *Lachmannus*, discerni post saecula
Carrio 7. naturale vulgo post saeculum *DV* ex p. 34
 vs. 25 add. cccxlvi, hic igitur recte vii, non iii 8. ciuilem
D, ciuile *V* 11. .d. septimo *DV*, corr. *Lachmannus* ac-
 cipit *DV*, corr. *Scaliger* (coipit coni. *Mommsenus Chronol. Rom.*
 p. 191) 12. emilius *D* m. f. laepidus *V* (m. f. ex sil.)
 sedut *V*, sedit mutavit 1 m. 15. hanc *DV* 16. producere
 vulgo 17. ut] et *V* 18. imitare *V* praeterea adferri
 coni. *Lachmannus* 19. quodque Dioscorides vulgo scripsit *V*
 20. eos quae *V* sallunt *Lachmannus*, solent *DV* 21
 que cor hominum *Lachmannus*, idcirco humanum *DV*
 pependo *V* 24. conserue^{NT} (NT fortasse a pr. m) *D*
 seruent *V*, obseruent vulgo 26. quinquaginta *V* in

iis centum dragmis abusque anno quinquagesimo item decedere in uno quoque binas; ex quo perspicuum sit centesimo anno redire ad anni primi pondus nec longius vitam posse producere.

- 15 Quoniam igitur civile Romanorum saeculum centum 5 annis transigitur, scire licet in decimo saeculo et primum natalem tuum fuisse et hodiernum esse. quot autem saecula urbi Romae debeantur, dicere meum non est: sed quid apud Varronem legerim non tacebo, qui libro antiquitatum duodevicesimo ait fuisse Vettium Romae in 10 augurio non ignobilem, ingenio magno, cuius docto in disceptando parem: eum se audisse dicentem, si ita esset ut traderent historici de Romuli urbis condendae auguriis ac XII vulturis, quoniam CXX annos incolumis praeterisset populus Romanus, ad mille et ducentos perven- 15 turum.

- 18 Hactenus dictum de saeculo: nunc de annis maiori-
bus dicam, quorum magnitudo adeo diversa tam gentibus
observata quam auctoribus tradita est, ut alii annum
magnum esse in annis vertentibus duobus, alii in multis 20
milibus annorum arbitrati sint. quod quale sit, iam hinc
2 conabor absolvere. veteres in Graecia civitates cum anim-
adverterent, dum sol annuo cursu orbem suum circumit,
lunam novam interdum tridecies exoriri idque saepe
alternis fieri, arbitrati sunt lunares duodecim menses et 25
dimidiatum ad annum naturalem convenire. itaque annos
civiles sic statuerunt, ut intercalando facerent alternos
duodecim mensum, alternos tredecim, utrumque annum
separatim vertentem, iunctos ambo annum magnum vo-
cantes. idque tempus trieterida appellabant, quod tertio 30
quoque anno intercalabatur, quamvis biennii circuitus et

1. his *V* abusque *Lachmannus*, adq. *D*, atq; *V*
quinquagesimo *V* 3. centesimo *V* 7. quod *D* 8. ur-
bis *D* 10. duodevicesimo *V* 11. augurio *D* ignora-
bilem *V* cuius *DV*, eius *m. rec. in V in marg.* docto
D, doctiori *V et m. recentior in D*, doctiori *Lachmannus*
12. essent *D* 13. tradebant *V* 14. cxx] ex x *DV*
18. tam] etiam *DV* 24. terdecies *vulgo*

re vera dieteris esset; unde mysteria, quae Libero alter-
 nis fiunt annis, trieterica a poetis dicuntur. postea 3
 cognito errore hoc tempus duplicarunt et tetraeterida
 fecerunt: sed eam, quod quinto quoque anno redibat,
 5 pentaeterida nominabant. qui annus magnus ex qua-
 driennio commodior visus est * * solis annum constare ex
 diebus CCCLXV et diei parte circiter quarta, quae I in
 quadriennium diem conficeret. quare agon et in Elide 4
 Iovi Olympio et Romae Capitolino quinto quoque anno
 10 redeunte celebratur. hoc quoque tempus, quod ad solis
 modo cursum nec ad lunae congruere videbatur, duplica-
 tum est et octaeteris facta, quae tunc enneaeteris vocitata,
 quia primus eius annus nono quoque anno redibat. hunc 5
 circuitum vere annum magnum esse pleraque Graecia
 15 existimavit, quod ex annis vertentibus solidis constaret,
 ut proprie in anno magno fieri par est. nam dies sunt
 solidi *II DCCCCXXII*, menses solidi uno minus centum,
 annique vertentes solidi octo. hanc octaeterida vulgo cre-
 ditum est ab Eudoxo Cnidio institutam, sed alii Cleostrat-
 20 um Tenedium primum ferunt composuisse et postea alios
 aliter, qui mensibus varie intercalandis suas octaeteridas
 protulerunt, ut fecit Harpalus, Nauteles, Menestratus, item
 alii, in quis Dositheus, cuius maxime octaeteris Eudoxi
 inscribitur. ob hoc in Graecia multae religiones hoc in 6

1. dieteres *D*, diesteres *d V* mysteria *V* post Li-
 bero vulgo add. patri 3. tetraeterida *DV* 4. sed eam
D, sed ad eam *dV* 5. penteterida *V* 7. quae primum
DV, quae unum vulgo 8. elide *D*, aelide *V* 9. olim-
 pio *V* capitolio *V* 10. a solis *D* 12. octeteris *D*,
 octo teris *V* aenneaeteris *V*, enneaeteris *lahnus* 13. re-
 diebat *d* huc *D* 14. graetia *V*, corr. *m. rec.* 16. pro-
 priae *D* 17. soli *D*; dierum numerum et menses solidi add.
Scaliger minis *V* (scilicet soli diu nominis *V*¹, unde solidi
 uno minis fecit *m. rec.*) 18. hanc om. *V* octoaeteridam
DV 19. alii *lahnus*, an *D*, hanc et tum leostratum *V*
 20. alius *V* 21. variae *D* octoeteridas *DV* 22. an-
 palus *D*, corr. *d* nauteles *DV* 23. octoaeteris *i*
 ocaeteris *V*, corr. *d* 24. religiones *m. rec. in V*, regiones *D*

tervallo temporis summa caerimonia coluntur, Delphis quoque ludi qui vocantur Pythia post annum octavum olim conficiebantur. proxima est hanc magnitudinem quae vocatur dodecaeteris ex annis vertentibus duodecim.

7 huic anno Chaldaico nomen est, quem genethliaci non ad 5 solis lunaeque cursus sed ad observationes alias habent adcommodatam, quod in eo dicunt tempestates frugumque proventus ac sterilitates, item morbos salubritatesque

8 circumire. praeterea sunt anni magni complures, ut Metonicus, quem Meton Atheniensis ex annis undeviginti 10 constituit, eoque enneadecaeteris appellatur et intercalatur septies, inque eo anno sunt dierum VI milia et DCCCCXL. est et Philolai Pythagorici annus ex annis quinquaginta novem, in quo sunt menses intercalares viginti et unus; item Callippi Cyziceni ex annis septuaginta 15 sex, ita ut menses duodetriginta intercalentur; et Democriti ex annis LXXXII cum intercalariis perinde viginti

9 octo; sed et Hipparchi ex annis CCCIII, in quo intercaletur centies decies bis. haec annorum magnitudo eo discrepat, quod inter astrologos non convenit quanto vel 20 sol plus quam CCCLXV dies in anno conficiat vel luna

10 minus quam triginta in mense. ad Aegyptiorum vero annum magnum luna non pertinet, quem Graece κυνικόν, Latine canicularem vocamus, propterea quod initium illius sumitur, cum primo die eius mensis, quem vocant Aegyptii 25 Θωυθοί, caniculae sidus exoritur. nam eorum annus civilis solum habet dies CCCLXV sine ullo intercalari: ita-

1. cerimonia *V* 3. proxime *V* 4. de deceteris *V*
 5. geneethliaci *V* 7. adcommodatas (as *d* in *ras.*) *D*
 8. morbosque, *omisso* salubritates, *V* 9. metonicus *DV*
 10. undeviginti *D* 11. enneacae ceteris *D*, m. 2 *delevit*
ceteris et post enneacae in marg. adscr. teris; ennea ceteris V 12. inq. *D* vi milia et acccxl *D*, vi et acccxl *V* 13. philolaus *DV* pythagori *V* 14. intercalaris *D*, intercalarii *coni. Halmius* 15. callippi *DV* ciziceni *V* 16. duodetriginta *D* 17. intercalares *DV*
 19. centies *V* 22. egyptiorum *V* 25. quam *D* aegypti *D* 26. Θωυθοί *DV*, Θωυθί *Iahnus secundum Plin.* 27, 12, 105
 27. solum *Halmius*, solus *DV*, solos *vulgo*

que quadriennium apud eos uno circiter die minus est
 quam naturale quadriennium, eoque fit ut anno MCCCCLXI
 ad idem revolvatur principium. hic annus etiam heliacos
 a quibusdam dicitur, et ab aliis $\theta\epsilon\omicron\upsilon \epsilon\nu\iota\alpha\upsilon\tau\omicron\varsigma$. est prae- 11
 5 terea annus quem Aristoteles maximum potius quam
 magnum appellat, quem solis et lunae vagarumque quin-
 que stellarum orbes conficiunt, cum ad idem signum, ubi
 quondam simul fuerunt, una referuntur; cuius anni
 hiemps summa est cataclysmos, quam nostri diluvionem
 10 vocant, aestas autem ecpyrosis, quod est mundi incendium.
 nam his alternis temporibus mundus tum exignescere
 tum exaquescere videtur. hunc Aristarchus putavit an-
 norum vertentium IICCCCLXXXIII, Aretes Dyrrachinus
VDLII, Heraclitus et Linus XDCCC, Dion XDCCCLXXXIII,
 15 Orpheus CXX, Cassandrus tricies sexies centum milium:
 alii vero infinitum esse nec umquam in se reverti exi-
 stimarunt. sed horum omnium pentaeteridas maxime 12
 notandis temporibus Graeci observant, id est quaternum
 annorum circuitus, quas vocant olympiadas: et nunc apud
 20 eos ducentesima quinquagensima quarta olympias nume-
 ratur, eiusque annus hic secundus. idem tempus anni 13
 magni Romanis fuit, quod lustrum appellabant, ita qui-
 dem a Servio Tullio institutum, ut quinto quoque anno
 censu civium habito lustrum conderetur, sed non ita a
 25 posteris servatum. nam cum inter primum a Servio rege 14
 conditum lustrum et id quod ab imperatore Vespasiano v

1. apud *V* 2. IICCCCLXI *D*, IICCCCLXI *V* 3. ad diem
D, addit *V* revolvitur *D* $\eta\lambda\iota\alpha\kappa\omicron\varsigma$ vulgo 4. a om. *V*
 5. aristotelis *D* 9. hiemps *V* catadysmos *V*¹, corr. m.
 rec. 11. 12. dum — dum *D* 12. aristarchus *D*, aristar-
 chus *V* putavit esse (auit *d* in *ras*. et esse *sup. vers.*) *D*, pu-
 tauit esse *V* vulgo 13. IICCCCLXXXIII *V* aretis *DV*
 dyrracinus *D*, dirracinus *V* 14. VDLII *V* heraclytus *V*
XDCCC *V* dion** *D* XDCCCLXXXIII *V* 15. orpheus CXX
V tricies *DV* 17. pantaeteridas *D*, pata-haeteri-
 das *V* 19. olympiadas *V* 20. quinquagesima *V* olim-
 pias *V* 23. seruo *V*¹, corr. m. 2 ut] et *D* 24. censu
 25. seruo *V*

- et T. Caesare III cons. factum est anni interfuerunt paulo minus DCL, lustra tamen per ea tempora non plura quam LXXII sunt facta et postea plane fieri desierunt.
- 15 rursus tamen annus idem magnus per Capitolinos agonas coeptus est diligentius servari, quorum agonum primus a 5 Domitiano institutus fuit duodecimo eius et Servi Corneli Dolabellae consulatu. itaque hoc nunc anno qui celebratus est agon undequadragesimus numeratur. quod ad annos pertinet magnos in praesentia satis dictum: nunc de annis vertentibus dicendi locus. 10
- 19 Annus vertens est natura, dum sol percurrens XII 2 signa eodem unde profectus est redit. hoc tempus quot dierum esset ad certum nondum astrologi reperire potuerunt. Philolaus annum naturalem dies habere prodidit CCCLXIII et dimidiatum, Aphrodisius CCCLXV et partem diei octavam, Callippus autem CCCLXV et Aristarchus Samius tantundem et praeterea diei partem MDCXXIII, Meton vero CCCLXV et dierum quinque undevicensimam partem, Oenopides CCCLXV et dierum duum et viginti partem undesexagesimam, Harpalus autem CCCLXV et 20 horas aequinoctiales XIII, at noster Ennius CCCLXVI.
- 3 plerique praeterea inconprehensibile quiddam et inenuntiabile esse existimarunt, sed pro vero quod proximum putabant amplexi sunt, dies scilicet CCCLXV.
- 4 Igitur cum tanta inter viros doctissimos fuerit dissensio, 25 quid mirum si anni civiles, quos diversae civitates

1. T. om. DV caesar ter cos. D, caesare ter cons. V interfuerint vulgo 3. LXXII DV, corr. *Borghesius Oeuvres epigr. II p. 78 ss. (conf. Mommsen. Chronol. Rom. p. 169)*
 6. domitiano D die ante duodecimo add. DV sergi DV
 8. undequadragesimus V 12 sig: D, sig V quod D, corr. d 13. reperire D 14. philolaus DV 16. aristarchus DV m. rec., aristarcus V¹ 17. tantundem et in marg. dū V mille dclxxiii D, mille dclxxii V; post hunc numerum d super vs. add. sup, V in vs. sup 18. undevicensimam V 19. oenopides DV 20. undesexagesima V
 21. xii conl. *Scaliger* ad D 22. inconprehensibile D quidem et enuntiabile DV; olim fuisse videtur quid nec (neq. *Halmitus*) enuntiabile 23. proximam D

- rudes etiam tum sibi quæque statuebant, tam inter se discrepent quam cum illo naturali non congruant? et in Aegypto quidem antiquissimum ferunt annum menstruum fuisse, post deinde ab Ison rege quadrimenstrem factum, novissime Arminon ad XIII menses et dies quinque perduxisse. item in Achaia Arcades trimestrem annum primo habuisse dicuntur, et ob id proselenoe appellati, non, ut quidam putant, quod ante sint nati quam lunae astrum caelo esset, sed quod prius habuerint annum *quam* is in Graecia ad lunae cursum constitueretur. sunt qui tradunt hunc annum trimestrem Horon instituisse, eoque ver aestatem autumnum hiemem horas et annum *horon* dici, et Graecos annales horus, eorumque scriptores horographos. itaque quattuor annorum circuitum in modum pentaeteridis annum magnum dicebant. Cares autem et Acarnanes semenstres habuerunt annos et inter se dissimiles, quibus alternis dies augescerent aut senescerent, eosque coniunctos velut trieterida annum magnum.
- 20 Sed ut hos annos omittam caligine iam profundae vetustatis obductos, in his quoque, qui sunt recentioris memoriae et ad cursum lunae vel solis instituti, quanta sit varietas facile est cognoscere, si quis vel in unius Italiae gentibus, ne dicam peregrinis, velit inquirere. nam

1. iam *D* 2. congregant *V*, corr. m. 2 in marg.
 3. menstruum *cont. Iahnus*, menstruem (em in ras. trium litt.)
D, bimenstrem *V*, bimestrem *vulgo* 5. nouissimae *D*
 XIII * *D*, XIII. *V* 6. in adiaia *V* trimenstrem *V*
 7. proselenam *D*, prose lenam *V* appellati ut *D*, appellat id ut *d*, appellant. Id ut *V* 9. coelo *V* 10. quam om. *DV* his *V* constituarentur *D*, constituerentur *dV*
 11. trimenstrem *V* 12. horus *DV*, ὥρα *vulgo* 13. horon om. *DV*, ὥρον *vulgo* grecos *V*, corr. m. rec. horus *DV*, ὥρος *vulgo* eorum, omisso que, *V* 14. scriptores *D* ὡρογράφους *vulgo* circuitu *DV* 15. pentaeteridis *DV* 16. semenstres *D* 17. et erasum in *D*, habet *V*
 18. triheterida *D* 20. omitam *V* caliginem *D* 21. vetustatos *D*, corr. *d* recentiores *D*

ut alium Ferentini alium Lavinii itemque Albani vel Romani habuerunt annum, ita et aliae gentes. omnibus tamen fuit propositum suos civiles annos varie intercalandis mensibus ad unum illum verum naturalemque corrigere.
 2 de quibus omnibus disserere quoniam longum est, ad 5 Romanorum annum transibimus.

Annum vertentem Romae Licinius quidem Macer et postea Fenestella statim ab initio duodecim mensum fuisse scripserunt: sed magis Iunio Gracchano et Fulvio et Varroni et Suetonio aliisque credendum, qui decem mensum putarunt fuisse, ut tunc Albanis erat, unde orti Ro-
 3 mani. hi decem menses dies CCCIII hoc modo habebant: Martius XXXI, Aprilis XXX, Maius XXXI, Iunius XXX, Quintilis XXXI, Sextilis et September tricenos, October XXXI, November et December XXX; quorum quattuor 15
 4 maiores pleni, ceteri sex cavi vocabantur. postea sive a Numa, ut ait Fulvius, sive, ut Iunius, a Tarquinio XII facti sunt menses et dies CCCLV, quamvis luna XII suis mensibus CCCLIII dies videbatur explere. sed ut dies
 5 unus abundaret, aut per imprudentiam accidit, aut, quod 20 magis credo, ea superstitione qua impar numerus plenus et magis faustus habebatur. certe ad annum priorem unus et quinquaginta dies accesserunt: qui quia menses
 6 duo non exlerent, sex illis cavis mensibus dies sunt singuli detracti et ad eos additi, factique dies LVII, et ex 25 his duo menses, Ianuarius undetriginta dierum, Februarius duodetriginta. adque ita omnes menses pleni et impari dierum numero esse coeperunt, excepto Februario, qui solus cavus et ob hoc ceteris infaustior est habitus.
 6 denique cum intercalarium mensem viginti duum vel vi- 30

1. FERENTINI (ni in ras.) D 3. UARIAE DV 8. mensium V
 9. GRACCHANO D *perspicue ante ras.*, GRACCHANO d, GRACCHO V
 12. CCCIII DV 14. OCTUBER D 15. tricenos Iahnus
 16. a Numa] ANNUM D 18. facti — luna XII V¹ in ras.
 24. illis] his V dies om. V 25. factique (ac in ras. trium litt.) D LXII DV 26. februiarius V
 27. atque V mense D, corr. d 30. mensum (u in ras.) D, mensum d, mensiū V

ginti trium dierum alternis annis addi placuisset, ut civilis annus ad naturalem exaequaretur, in mense potissimum Februario inter terminalia et regifugium intercalatum est, idque diu factum prius quam sentiretur annos civiles aliquanto naturalibus esse maiores. quod delictum ut corrigetur, pontificibus datum negotium eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa. sed horum plerique ob odium 7 vel gratiam, quo quis magistratu citius abiret diutiusve fungeretur aut publici redemptor ex anni magnitudine in 10 lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro quod depravarunt, adeo aberratum est ut G. Caesar pontifex maximus 8 suo III et M. Aemilii Lepidi consulatu, quo retro delictum corrigeret, duos menses intercalarios dierum LXVII in 15 mensem Novembrem et Decembrem interponeret, cum iam mense Februario dies III et XX intercalasset, faceretque eum annum dierum CCCCLV, simul providens in futurum ne iterum erraretur: nam intercalario mense sublato annum civilem ad solis cursum formavit. itaque 9 20 diebus CCCLV addidit decem, quos per septem menses, qui dies undetriceos habebant, ita describeret, ut Ianuario et Sextili et Decembri bini accederent, ceteris singuli; eosque dies extremis partibus mensium adposuit, ne scilicet regiones sui cuiusque mensis a loco summo verentur. 25 quapropter nunc cum in septem mensibus dies singuli et triceni sint, quattuor tamen illi ita primitus instituti eo dinoscuntur quod nonas habent septimanas, ceteri tres [omnes alii reliqui] quintanas. praeterea pro quadrante

3. interterminalia *V* 5. dilectum *D* 8. post abiret *V*
 add. diutius abiret diutiusque *DV* 9. redeptor *d*
 10. minusvel *D* libidine *DV* intercalando *D*, intercalandi *V* 11. ultro quod *Halmitus* (quia *Lachmannus*), utroque *D*, ultroque *V*, utroque *m. rec. in V in marg.* 13. aemilio *D*, emili *V* 14. LXIII *DV* 18. intercalario *D*
 21. describeret *Halmitus*, describe^t *** *D*, distribuit *V* vulgo
 22. post Decembri *D* add. ne 23. mensum *D* ante ras. *V*, mensum *d* 24. regiones *V* 28. omnes alii reliqui eiecit *Modius*, omnesque reliqui *coni. Lachmannus*

diei, qui annum verum suppleturus videbatur, instituit ut peracto quadrienni circuitu dies unus, ubi mensis quondam solebat, post terminalia intercalaretur, quod nunc his-
 11 sextum vocatur. ex hoc anno ita a Iulio Caesare ordinato
 ceteri ad nostram memoriam Iuliani appellantur, eique 5
 consurgunt ex quarto Caesaris consulatu. qui etiam si
 optimo * *, non soli tamen ad annum naturae aptati sunt:
 nam et priores anni, etiam si qui decemmenstres fuerunt,
 nec Romae modo vel per Italiam, sed et apud gentes
 12 omnes, quantum poterat, idem fuerunt correcti. itaque 10
 cum de aliquo annorum numero hic dicetur, non alios
 par erit quam naturales accipere.

Et si origo mundi in hominum notitiam venisset, inde
 21 exordium sumeremus: nunc vero id intervallum temporis
 tractabo quod historicon Varro appellat. hic enim tria 15
 discrimina temporum esse tradit, primum ab hominum
 principio ad cataclysmum priorem, quod propter ignoran-
 tiam vocatur adelon, secundum a cataclysmo priore ad
 olympiadem primam, quod, quia multa in eo fabulosa
 referuntur, mythicon nominatur, tertium a prima olym- 20
 piade ad nos, quod dicitur historicon, quia res in eo ge-
 2 stae veris historiis continentur. primum tempus, sive
 habuit initium seu semper fuit, certe quot annorum sit
 non potest comprehendere. secundum non plane quidem
 scitur, sed tamen ad mille circiter et sescentos annos esse 25
 creditur. a priore scilicet cataclysmo, quem dicunt et
 Ogygii, ad Inachi regnum annos circiter CCCC * *, hinc

2. peracto* *D* quadriennii *V* menses *D* 7. ob-
 timo *V*, optime *Iahnus sine lacunae nota* 8. anni *Lach-*
mannus, alii *DV* 9. apud *V* 10. poterat idem *Carrio*,
 pote*** *dē D*, postea *idē d*, postea idem *V* 11. diceretur
 non alius *D* 15. historicon (con *in ras.*) *D*, ἱστορικὸν *vulgo*
 17. quod — adelon *om. V* 18. *adelon *D*, ἀδελον *vulgo*
 a cataclysmo priore *om. V* priorem *D* 20. μυθικὸν *vulgo*
 21. ἱστορικὸν *vulgo* 22. tempus *D*, *corr. d* 23. quod *D*
 24. comprehendere *D*, comprehendere *V* 26. et Ogygii *L. de Ian*,
 ἐρογίου *D*, erogicii *V*, et *vulgo om.* 27. iachi *V* annis *V*,
 anni sunt *Iahnus* quadrigenti *D*, quadringenti *V vulgo; in*

ad olympiadem primam paulo plus CCCC. quos solos,
 quamvis mythici temporis postremos, tamen quia a me-
 moria scriptorum proximos quidam certius definire
 voluerunt. et quidem Sosibius scripsit esse CCCXCV, 3
 5 Eratosthenes autem septem et quadringentos, Timaeus
 CCCCXVII, Aretes DXIII, et praeterea multi diverse, quo-
 rum etiam ipsa dissensio incertum esse declarat. de ter- 4
 tio autem tempore fuit quidem aliqua inter auctores dis-
 sensio in sex septemve tantummodo annis versata: sed 5
 10 hoc quoddumque caliginis Varro discussit, et pro cetera
 sua sagacitate nunc diversarum civitatum conferens tem-
 pora, nunc defectus eorumque intervalla retro dinume-
 rans eruit verum lucemque ostendit, per quam numerus
 certus non annorum modo sed et dierum perspicui possit.
 15 secundum quam rationem nisi fallor hic annus, cuius 6
 velut index et titulus quidam est V. C. Pii et Pontiani con-
 sulatus, ab olympiade prima millensimus est et quartus
 decimus, ex diebus dumtaxat aestivis, quibus agon Olym-
 picus celebratur; a Roma autem condita nongentensimus
 20 nonagensimus primus, et quidem ex Parilibus, unde urbis
 anni numerantur; eorum vero annorum quibus Iulianis 7
 nomen est ducentesimus octogentus tertius, sed ex
 die Kal. Ianuariarum, unde Iulius Caesar anni a se con-
 stituti fecit principium; at eorum qui vocantur anni Au- 8
 25 gustorum ducentesimus sexagensimus quintus, perinde

*lacuna haec fere exciderunt computarunt, hinc ad excidium
 Troiae annos DCCC (conf. Iahni adnotationem et H. Kettnerum,
 Varronische Studien p. 46 s.)*

1. olimpiadem V quadri-
 genti DV, quadringenti vulgo 2. mythici V 3. scripto-
 rum D 5. eratosthenes DV quadringentos D timaeus D,
 itimeus V 6. eretes DV, Crates con. Iahnus δεικνυσι V¹,
 corr. m. 2 8. actores D, corr. d 11. conterens DV
 12. dinumerans (din in ras.) D 15. anus D 16. quidam
 om. Iahnus V. C. (i. e. virorum clarissimorum) Pii Borghesius
 in Ann. inst. archaeol. a. 1856 p. 48, utru DV, Ulpii vulgo
 pontiam V 17. milensimus D, millesimus V 19. non-
 gentesimus nonagesimus V 20. urbs D, urbes d 22.
 octogentus V 23. κτ D, k et l perscripta V (item vs. 6)
 iuniarum DV 24. ad D 25. sexagensimus V

ex Kal. Ianuariis, quamvis ex ante diem XVI Kal. Febr. imperator Caesar, Divi filius, sententia L. Munati Planci a senatu ceterisque civibus Augustus appellatus est se VII
 9 et M. Vipsanio Agrippa III cons. sed Aegyptii, quod bien-
 nio ante in potestatem dicionemque populi Romani vene- 5
 runt, hunc Augustorum annum ducentesimum sexagen-
 simum septimum *numerant*. nam ut a nostris ita ab
 Aegyptiis quidam anni in litteras relati sunt, ut quos Na-
 bonnazaru nominant, quod a primo imperii eius anno
 consurgunt, quorum hic nongentesimus octogensimus sex- 10
 tus est; item Philippi, qui ab excessu Alexandri Magni
 numerantur et ad hunc usque perducti annos DLXII con-
 10 summant. sed horum initia semper a primo die mensis
 eius sumuntur cui apud Aegyptios nomen est Thouth,
 quique hoc anno fuit ante diem VII Kal. Iul., cum abhinc 15
 annos centum imperatore Antonio Pio II Bruttio Prae-
 sente Romae consulibus idem dies fuerit ante diem XIII
 Kal. Aug., quo tempore solet canicula in Aegypto facere
 11 exortum. quare scire etiam licet anni illius magni, qui,
 ut supra dictum est, solaris et canicularis et dei annus 20
 12 vocatur, nunc agi vertentem annum centensimum. initia
 autem istorum annorum propterea notavi, ne quis eos aut
 ex Kal. Ianuariis aut ex aliquo tempore simul putaret inci-
 pere, cum *in* his conditorum voluntates non minus diversae
 13 sint quam opiniones philosophorum. idcirco aliis a novo 25
 sole, id est a bruma, aliis ab aestivo solstitio, plerisque
 ab aequinoctio verno, partim ab autumnali aequinoctio,

1. ex prius om. V ianuarias D, ianuaf V ex] et V
 2. imp·caes D, imp·caes V 3. Augustus om. V si septies
 D, se septies V 4. agrippa cons., omisso III, V 7. nu-
 merant add. Iahnus 8. nabonnazarri V 10. octogesimus
 V 14. Thoyth Iahnus 16. imp. V II Halmius, et DV,
 II et vulgo 17. CONSULIB: D FUERUNT DV XII DV,
 corr. Scaliger 18. kl (1 deleta) augs. V 20. est om. V
 COLARIS DV 21. centesimum V 23. aliquo] immo alio
 quo 24. in his Nagelius, his DV, hic Lachmannus 25. phy-
 losophorum V alius D ante ras., alii dV 26. abru|altas
 D, a brumali·ab V plerisque DV

quibusdam ab ortu vergiliarum, nonnullis ab earum occasu, multis a canis exortu incipere annus naturalis videtur.

Mensium genera duo: nam alii sunt naturales, alii 22
 5 civiles. naturalium species duae, quod partim solis par- 2
 tim lunae esse dicuntur. secundum solem fit mensis, dum
 sol unum quodque in zodiaco orbe signum percurrit; lun-
 aris est autem temporis quoddam spatium a nova luna.
 civiles menses sunt numeri quidam dierum quos una 3
 10 quaque civitas suo instituto observat, ut nunc Romani a
 kalendis in kalendas. naturales et antiquiores et omnium
 gentium communes sunt, civiles et posterius instituti et
 ad unam quamque pertinent civitatem. qui sunt caelestes, 4
 sive solis seu lunae, neque peraeque inter se pares sunt
 15 nec dies habent totos. quippe sol in aquario moratur
 circiter undetriginta, in pisce fere triginta, in ariete
 unum et triginta, in geminis prope triginta et duos, et
 sic in ceteris inaequaliter, sed usque adeo non totos
 dies in singulis, ut annum suum, id est dies CCCLXV et
 20 portionem nescio quam adhuc astrologis inexploratam, in
 XII suos dividat menses. luna autem singulos suos men- 5
 ses conficit diebus undetriginta circiter et dimidiato, sed
 et hos inter se dispares, alias longiores, alias breviores.
 at civitatum menses vel magis numero dierum inter se
 25 discrepant, sed dies ubique habent totos. apud Albanos 6
 Martius est sex et triginta, Maius viginti duum, Sextilis
 duodeviginti, September sedecim: Tusculanorum Quinti-
 lis dies habet XXXVI, October XXXII, idem October apud
 Aricinos XXXVIII. minime videntur errasse qui ad lu- 7
 30 nae cursum menses civiles adcommodarunt, ut in Graecia
 plerique, apud quos alterni menses ad tricenos dies sunt

2. multi* *D*, corr. *d* 4. mensium *D* ante ras. *V*, men-
 sum *d* 14. partes *DV* 16. undexxx *DV* pisce (e in
 ras.) *D* 16. xxx — unum et xxx — xxx et duos *DV* (*super*
ultimum xxx *V*² add. ta) 22. undetriginta *D* 24. nu-
 meros *D* 26. uiginti iduum *D*, uiginti et duum *vulgo*
 27. quintiles *D*

- 8 facti. maiores quoque nostri idem sunt aemulati, cum annum dierum CCCLV haberent. sed Divus Iulius cum videret hac ratione neque ad lunam menses, ut oportebat, neque annos ad solem convenire, maluit annum corrigere, ut sic etiam menses civiles cum veris illis solaribus, etsi non singuli, tamen universi ad anni finem necessario concurrerent.
- 9 Nomina decem mensibus antiquis Romulum fecisse Fulvius et Iunius auctores sunt. et quidem duos primos a parentibus suis nominasse, Martium a Marte patre, 10 Aprilem ab Aphrodite, id est Venere, unde maiores eius oriundi dicebantur. proximos duos a populo, Maium a maioribus natu, Iunium a iunioribus. ceteros ab ordine quo singuli erant, Quintilem usque Decembrem perinde 10 a numero. Varro autem Romanos a Latinis nomina mensum accepisse arbitratus auctores eorum antiquiores quam 11 urbem fuisse satis argute docet. itaque Martium mensem a Marte quidem nominatum credit, non quia Romuli fuerit pater, sed quod gens Latina bellicosa. Aprilem autem non ab Aphrodite, sed ab aperiendo, quod tunc ferme 20 cuncta gignantur et nascendi claustra aperiat natura.
- 12 Maium vero non a maioribus, sed a Maia nomen accepisse, quod eo mense tam Romae quam antea in Latio res divina Maiae fit et Mercurio. Iunium quoque a Iunone potius quam iunioribus, quod illo mense maxime 25
- 13 Iunoni honores habentur. Quintilem, quod loco iam apud Latinos fuerit quinto, item Sextilem ac deinceps ad Decembrem a numeris appellatos. ceterum Ianuarium et

2. habent *DV* 3. ratione quae ad *DV* 4. annos
Halmius, anno *DV*, annum *vulgo* maluit] aliud *D* 5. ci-
 viles *Lachmannus*, uel *DV* 7. concurrent *D* 12. a post
 Maium om. *V* 13. ceteris *DV* 16. arbitrantur *D*, ar-
 bitratur *dV*, corr. *Iahnus* actores *D*, auctores *d* 17. ar-
 gute *Carrio*, arkti *D*, arkiti *d*, arkyti *V* 20. aphrodite *DV*
 ferre *D*, fere *V* *vulgo* 25. maximae *D* 26. loco iam *D*,
 ioiam *V* 27. quinto *m. rec. in D in ras.* sextile *D*
 28. numis appellatus *D*

Februarium postea quidem additos, sed nominibus iam ex Latio sumptis; et Ianuarius ab Iano, cui attributus est, nomen traxisse, Februarium a februo. est februum 14 quidquid piat purgatque, et februaementa purgamenta, 5 item februlare purgare et purum facere. februum autem non idem usquequaque dicitur: nam aliter in aliis sacris februat, hoc est purgatur. in hoc autem mense Lu- 15 percalibus, cum Roma lustratur, salem calidum ferunt, quod februum appellant, unde dies Lupercalium proprie 10 februat et ab eo porro mensis Februarius vocitatur. ex his duodecim mensibus duorum tantum nomina inmu- 16 tata. nam Quintilis Iulius cognominatus est C. Caesare v et M. Antonio cons. anno Iuliano secundo: qui autem Sextilis fuerat, ex SC. Marcio Censorino C. Asinio Gallo 15 cons. in Augusti honorem dictus est Augustus anno Augusti vicensimo. quae nomina etiam nunc ad hanc permanent memoriam. postea vero multi principes nomina 17 quaedam mensium inmutaverunt suis nuncupando nominibus; quod aut ipsi postmodum mutaverunt, aut post 20 obitum eorum illa nomina pristina suis reddita mensibus.

Superest pauca de die dicere, qui, ut mensis aut an- 23 nus, partim naturalis partim civilis est. naturaliter dies 2 est tempus ab exoriente sole ad solis occasum, cuius contrarium tempus est nox ab occasu solis ad exortum. civi- 25 liter autem dies vocatur tempus quod fit uno caeli circumactu, quo dies verus et nox continetur, ut cum dicimus aliquem dies XXX tantum vixisse: relinquitur enim etiam noctes intellegere. huius modi dies ab astrologis et civi- 3

3. februm DV 4. quicquid V piat D, ex initio superscr. d, expiat V vulgo 5. februm DV, item uterque vs. 9 12. nam qui iulius DV 13. et manturio DV cōs. D, cōs. V, item uterque vs. 15 14. ex c. marco DV C. Asinio] casinio DV 15. augustio uicesimo V 20. post mensibus vulgo add. sunt 22. natura**** (rasura quattuor quinqueve litt.) D, naturales d, naturalis V vulgo 23. a solis D 24. est tempus V civilis vulgo 25. circum- actum quod D 27. xxx] ta superscr. m. 2 in V

tatibus quattuor modis definitur. Babylonii quidem a solis exortu ad exortum eiusdem astri diem statuerunt, at in Umbria plerique a meridie ad meridiem, Athenienses autem ab occasu solis ad occasum. ceterum Romani a media nocte ad mediam noctem diem esse existimarunt. 5
 4 indicio sunt sacra publica et auspicia etiam magistratuum, quorum si quid ante medium noctis est actum, diei qui praeteriit adscribitur, si quid autem post mediam noctem et ante lucem factum est, eo die gestum dicitur qui eam 10
 5 sequitur noctem. idem significat quod qui a media nocte 10 ad proximam mediam noctem in his horis quattuor et 6 viginti nascuntur eundem diem habent natalem. in horas XII diem divisum esse noctemque in totidem vulgo notum est: sed hoc credo Romae post reperta solaria observatum. quorum antiquissimum quod fuerit inventu 15
 difficile est: alii enim apud aedem Quirini primum statutum dicunt, alii in Capitolio, nonnulli ad aedem Dianae 7 in Aventino. illud satis constat, nullum in foro prius fuisse quam id quod M. Valerius ex Sicilia advectum ad rostra in columna posuit. quod quoniam ad clima Sici- 20
 liae descriptum ad horas Romae non conveniret, L. Philippus censor aliud iuxta constituit. deinde aliquanto post P. Cornelius Nasica censor ex aqua fecit horarium, quod et ipsum ex consuetudine noscendi a sole horas solarium 8 coeptum vocari. horarum nomen non minus annos tre- 25
 centos Romae ignoratum esse credibile est: nam XII tabulis nusquam nominatas horas invenies, ut in aliis postea legibus, sed ante meridiem, eo videlicet quod partes

1. BABYLLONI D, babilonii V quidam DV 3. athe-
 niensis D 8. praeteriit D, preteriit V 9. dicitur DV
 quiaeam D 12. oras D 15. inuentum D 17. capi-
 toli/no D (no d adscr. extremo versu, proximi autem versus
 initio una littera erasa est), capitulino V 18. illos D
 20. qm D, cum V vulgo aclimma D, aclimmate d, a cli-
 mate V 21. oras DV (in V h add. in marg. m. rec.) 23. p.
 corii V namsicaensor D 24. horarum D 25. trae-
 centos D 26. duodecim V

diei bifariam tum divisi meridies discernebat. alii diem 9
quadripertito, sed et noctem similiter dividebant. idque
consuetudo testatur militaris, ubi dicitur vigilia prima,
item secunda et tertia et quarta.

- 5 Sunt etiam plura noctis et diei tempora aliis subno- 24
tata propriisque discreta nominibus, quae apud veteres
poetas passim scripta inveniuntur. ea omnia ordine suo
exponam. incipiam a nocte media, quod tempus princi-
pium et postremum est diei Romani. tempus quod huic
10 proximum est vocatur de media nocte: sequitur gal- 2
licinium, cum galli canere incipiunt; dein contici-
nium, cum conticuerunt; tunc ante lucem, et sic
diluculum, cum sole nondum orto iam lucet. secun- 3
dum diluculum vocatur mane, cum lux videtur sole orto;
15 post hoc ad meridiem; tunc meridies, quod est
medii diei nomen; inde de meridie; hinc suprema.
quamvis plurimi supremam post occasum solis esse existi-
mant, quia est in XII tabulis scriptum sic, solis occa-
sus suprema tempestas esto: sed postea M. Plae-
20 torius tribunus plebiscitum tulit, in quo scriptum est
Praetor urbanus qui nunc est quique posthac
fuit duo lictores apud se habeto iusque
supremam [ad solem occasum iusque] inter cives
dicito. post supremam sequitur vespera, ante ortum 4
25 scilicet eius stellae quam Plautus vesperuginem, Ennius

1. alius *D* ante *ras.*, corr. *d* die *DV* 3. consuetudo
Lachmannus, similitudo *DV* 5. temporalis subnotata *D*,
tempora subnotata *V* 7. scripta *D* 11. conticium *DV*,
conticium coni. *L. de Ian* 13. deluculum *D*, diculum *V*,
corr. *m. rec. in V* 14. orto coniectura addidi 16. medi *DV*
19. esto *D*, sed o erasa pletorius *DV* 20. scriptum *D*
21. pretor *V* 22. fuit *Modius*, fiat *DV* licores *V*
iusque ad *R. Schoellius legis XII tabul. rel. p. 3 s.*, usque *DV*,
usque *Lachmannus* 23. ad solem occasum ab ipso *Censorino*
explicandi gratia addita esse suspicatur Schoellius 24. dicito
(dicito ante *ras.*) *D* uesperanteorum *D*, uesperanteo-
rum *d*, uesp. antetorum *V* 25. plautus *D*, corr. *d* *Plaut.*
Amphitr. I 1, 119

5 *vesperum*, Vergilius *hesperon* appellat. inde porro crepusculum, sic fortasse appellatum quod res incertae
 6 *creperae* dicuntur idque tempus noctis sit an diei incertum est. post id sequitur tempus quod dicimus luminibus accensis: antiqui prima face dicebant; deinde 5 concubium, cum itum est cubitum; exinde intempesta, id est multa n^ox, qua nihil agi tempestivum. tunc [cum] ad mediam noctem dicitur, et sic media nox * * *

1. uirgilius *V* *Verg. ecl. 8, 30. 10, 77* appellant *V*
 3. incerte crepere *D* 6. comitum est comitum *D*
 7. quia *d V* 8. ad media *D*

FRAGMENTUM

CENSORINO ADSCRIPTUM.



Initia rerum eadem elementa et principia dicuntur.
 ea stoici credunt tenere adque materiam. tenere, qui
 rarecente materia a medio tendat ad summum, eadem
 5 concrescente rursus a summo referatur ad medium. Tha-
 les Milesius aquam principium omnium dixit, et alias opi-
 niones supra rettuli. Stoicorum opinio probanda, qui cum 2
 arte compositum mundi opus considerarent, introduce-
 runt naturam providam ac sapientiam, quam ordo imper-
 10 mutabilis ostenderet, *et* industria factum pronuntiaverunt.
 sive perpetuus sive longaevus est mundus et in flammam 3
 abit et vicissim ex flammis renovatur ac restituitur, du-
 rantibus tamen principiis, nec recidere ad nihilum videri
 potest, quod in se deficit *et* in se regignitur. et constat 4
 15 quidem quattuor elementis, terra, aqua, igne, aere.
 cuius principalem sortem quidam putant, ut Cleanthes; et
 Chrysippus aethera, cuius motu perenni subiecta tenen-
 tur et administrantur, et ipse quidem aether nihil pati-
 tur; aer aethera supra, infra aquam; aqua supra aqua,
 20 infra terram. terra omnia ex se omnium permixtione 5

DE NATURALI INSTITUTIONE *cet. nullo spatio inter-*
posito ultima Censorini sequuntur in DV 3. atque *V*
 5. assummo *D* TALES *D* 7. RETTULLI *D* 8. opus mundi *V*
 10. et om. *DV* 12. *ABUT (HABUT ante ras.) *D* et vicis-
 sim *d* in ras. 14. deficit *D*, tum et om. *DV* 16. CLEAN-
 TES ET CHRYSIPPUS *DV* et] at Iahnus secundum Manutium,
 set con. Halmius 18. aether *D* 19. aera aethera — su-
 pra aquam *DV*, corr. *L. de Ian et L. Urtichsius in Mus. Rhen.*
XI p. 159 20. omni ex *D*, omni sex, omisso se, *V*
 permixtio *D*

progignit, et temperantia fovetur, intemperantia laeditur. invicem porro elementa succedere et interitu singulorum universa fieri sempiterna manifestum est.

2

DE CAELI POSITIONE.

Caelum circulis quinque distinguitur. quorum duo 5 extremi maxime frigidi, australis humillimus et aequilonius excelsissimus. his utrimque proximi duo parallelae vocantur, ut ita dixerim, aequae distantes, idem tropici, idem solstitiales; alter hibernus, per quem sol transmittens octava parte capricorni solstitium hibernum facit; alter 10 aestivus, per quem sol octava parte cancri solstitium aestivum facit. medius est aequinoctialis, qui octava parte arietis aequinoctium vernum, octava librae autumnale constituit.

Ut circuli *in* caelo, ita *in* terra: zonae vocantur. in- 15 habitabilis infra frigidus circulus ob rigorem * * quod ab his longissime sol abest, item intra calidus aequinoctialis, 3 quod sub vertice solis est. sub quo quidam habitare dicunt * ⁺cydropiae et Aethiopiae maximam partem, item plurimas insulas maris rubri aliosque vertices eminen- 20 tiasque terrarum nostris ampliores. sub tropicis habitare nihil dubium est. noster solstitialis aestivus est excelsus 4 adque arduus. divisi a nobis circulo aequinoctiali antichthones nominantur. videntur humiles adque depressi [qui-

2. succubere *D* 7. parallelae *D*, parallele *V*
 9. solstitiales *V* transmittens octavam partem *DV*,
 transiens et tenens octavam partem *Iahnus ex schol. Germanici* 10. 11. solstitium *V* 15. in *om. DV* 16. post
 rigorem adde item supra vel item is qui supra est quo
 ab *V* 17. item in radios aequinoctiales *DV* (*sed extre-*
mam s in D add. m. 2), item medius aequinoctialis *cod. Manutii*
 18. dicunt] putant *V* 19. cydropⁱae *d in ras.*, cydropiae *V*,
 Gedrosiae *Urlichsius* ethiopiae *DV* 22. solstitialis *V*
 23. atque *V* antichthones] actiones *DV* (*correxerit vetus ille*
grammaticus qui glossema, quod nunc infra legitur post terrarum,
adscripsit), antistones *m. rec. in V in marg.* 24. atque *V*

busque antipodes infra sunt], quod ut posse videatur, efficiunt flexus obliquitatesque terrarum. [antictones idem et antistoche et antiscepe nominantur.]

Incipit signifer non ab extremo circulo nec ad extremum pertenditur, sed ab infimo tropico australi brumalique eodem per aequinoctialem ad summum solistitialem eundemque aestivalem per medium longitudinis latitudinisque porrectus *in* obliquum. circuli signiferi 5 partes CCCLX, signa duodecim, partium singula tricenarum, quorum quaedam minora, quaedam ampliora [et †poploe anafora dicuntur]: sed compensatio *in* quinque partes creditur adplicari, ut sint omnes signiferi partes CCCLXV. horum incipientia ab ariete altera sunt [masculinis femininis] masculorum natalibus, alia 6 feminarum convenientia. item quartum quodque eorum aut tropicum aut solidum aut biforme. incipiet dinumeratio ab ariete, quod signum tropicum est. tropicorum duo sunt aequinoctialia, *aries* et *libra*, duo solstitialia, *capricornus* et *cancer*, tropicis proxima solida, anteposita his biformia.

20

DE STELLIS FIXIS ET †STANTIBUS.

3

Stellarum aliae cum caelo feruntur, ideoque quod non excedunt suos locos fixae nominantur, aliae contra

2. *voluit glossator* antichthones idem et antistochoe et antiscopoe nominantur antictones *D*, antistones *V*
3. antistoche (q. m. rec.) et antiscepe (q. m. rec.) *V* 5. sed ***tmo *D*, sed ab intimo *dV*, sed ab imo *vulgo* brumalique (brum *d in ras.*) *D* 6. solstitialem *V* 7. LONGITUDO IN HIS LATITUDINISQ. *D* 8. *in addidi* obliquae *schol. German., unde Urlichsius* oblique cuculi *V¹ corr. m. 2* 11. poploe anafora *D*, poploe anafora *V*, polon anaphora *coni. Urlichsius* dicunt; *D*, dicunt *V* *in addidi* 12. adplicare *V* *vulgo* 13. arieti (eti *d in ras.*) *D* et masculinis feminis *V*, eiecit *Urlichsius* 14. natalibus *schol. Germ., naturalibus DV* 15. partū (*in marg. m. rec. quartū*) eorum quoque; *V* 16. ut deforme *D*, aut deforme *dV*, *corr. Cauchius* 18. aequinoctialia *V* *aries om. DV* *librae* duo solstitialia *V* 19. maxima *DV* deformia *DV* 20. stillis *D* errantibus *Iahnus; ego malim* vagantibus *coll. p. 59, 1*

caelum et in ortus caeli eunt, sed mundi celeritate victae
occidere videntur cum eo, quamvis cursum suum per-
2 agant. sol maximum sidus aetheris medii limite ignescit,
singulis diebus et noctibus peragit singulas partes, signi-
ferum pervadit anno. luna de sole flammatur, ambit 5
circuitu brevissimo terram triginta diebus, adeo vicina
vertici terrae iunctaque, ut in umbram eius incidere soleat
et videri deficere. eadem cum subiit solem et substituit
radiis, facit obscurationem, quae defectio solis videtur.
interim tamen cava paucioribus quam triginta diebus cir- 10
3 culum suum transit. Saturni stella per maximum ambi-
tum fertur, ideoque tricenis mensibus singulis signis re-
sistit, per triginta annos signiferum pertransit, frigida et
sterilis, infecunda terris, nascentibus non salutaris, facit
adversa diuturna nec subita. Iovis stella in singulis signis 15
anno manet, signiferum duodecim annis evadit, salutaris
4 et temperata et universis euntibus prospera. Martis stella
non eodem spatio signis singulis haeret, sed signiferum
novem fere annis pervagatur, ignea intemperans et in ad-
versis et in mortalibus subita, vel ferit repentinis morbis 20
vel ferro perimit. stellae Mercuri et Veneris solem se-
5 quuntur eademque spatia custodiunt. Mercuri stella fit
similis illi quam videt, Veneris genitalis et roscida et pro-
spera et salutaris. luna globum suum creditur habere,
sed ignem a sole concipere et quantum percutitur ar- 25
descere. quantum igitur a sole discedit, augetur: cum
vero contra stetit, toto feritur adverso et velut speculum
non vim, sed imaginem reddit. hac universa gignentia
6 crescente pubescunt, tenuescere tenuantur. umor etiam
et spiritus omnis augescit, tumescit oceanus, deinde cum 30

5. annum *DV*, corr. *Cauchius* 6. TERRAE (e in ras.) *D*,
terrae *V* 13. anos (corr. m. rec.) *V* 14. STERELIS *D*
15. diurna *DV*, corr. *Iahnus* Iovis *D*, corr. *d* 17. even-
tibus coni. *Cauchius* 19. ferre *V* 20. ferit *Carrio*, perit
DV 21. STELLA *DV*, quod forsitan scripserit ipse epitoma-
tor mercuri *D*, mercurii *V* sequuntur *D*, corr. *d*
22. mercurii *V* 24. lunā m 2 in *V* ex luna creditu et
- 2 m. creditū *V* 29. pubescent *D*

ipsius fulgore consedit. diversi ergo caeli et vagantium stellarum concursu quod [temperatur] utrinque deteritur et infra fluit, id excipit luna et soli tradit, quo et animalia vigescunt et humus quodam modo animatur genitali calore [ut ita dixerim vivo].

Plurimum in originibus valent quae in ortu sunt, languent in occasu. ortum facit stella quam sol praeterit, 7 deinde stationem matutinam, cum a quinto loco solis stetit. in eodem manet signo, donec ab eodem sole moveatur. quae contraria est soli, mane occidit, oritur simul nocte et vocatur acronychos, deinde rursus altero latere a quinto signo deprehensa postmeridianam stationem facit, donec ingresso sole idem signum sub radiis eius delitescat et in totum occidat.

Aspiciunt inter se stellae ex quinto signo, quod dicitur trigonum, et habent maximam consensionem. item a quarto, quod dicitur tetragonum [et centron vocatur], et in alterutrum maximum praestat effectum. item ex contrario, quod est septimum signum et diametron vocatur estque maxime adversum. cetera dissident vel leviter aspiciunt, ut tertium quodque, quod dicitur hexagonon.

Signa tropica peregrinationibus praesunt et omnino 9 mobilibus, et in consiliis subinde variant adque permulant. biformia geminatione rerum omnium repetitionem significant et interim dilationem. solida vehementer et instanter efficiunt et ad exitum vel prospera vel adversa perducunt, sicut aspiciuntur a stellis vel faventibus vel repugnantibus.

1. diversi *V* vagantia *DV* 2. temperatur *elecit* *Urlichsius* 3. exceptit *D* 5. ante ut *vulgo* et *add.* vivit *cont. Urlichsius* 9. steti* *D*, steterit *dV* 10. quae] quod *V* 11. acronicos *acronicus D*, acronicos *aronicus V*, *corr. Salmasius exerc. Plin. p. 507 a F* 13. delitescat (*cat d in ras.*) *D* 17. centroni *V* 19. septum *D*, *corr. d* 20. biscedent *D* 21. exagonon *DV* 24. mouilibus *DV* atque *V* 26. dilatione *DV*

Multum tamen refert, cuius quaeque stellae domus,
 10 alienae an ipsius sit. domus solis leo, lunae cancer, Mer-
 curi virgo et gemini, Veneris libra et taurus, Martis
 scorpio et aries, Iovis sagittarius et piscis, Saturni ca-
 pricornus et aquarius. nocturnis originibus favent luna 5
 Mars Venus, plus die possunt sol Saturnus Iuppiter, Mer-
 curius varie et quomodo consensit aut visus est.

4

DE TERRA.

Terra media omnium rerum est, forma globosa. aquis
 cingitur, in aera prominet, excipit caelum. aquae omni 10
 vel *aeris* temperie quantum adficitur, ita quaecumque
 sustinet afficit et movet.

2 Poterat finem liber plenus omnibus necessariis iam
 videri consecutus: sed cum et mundi dimensiones et plu-
 rima praeterea in universis rebus ratio geometrica inple- 15
 verit, pauca de numeris mensurisque dicemus.

5

DE GEOMETRICA.

Geometrica est scientia digerendi figuras [* numeros
 emetiendi cum suis resolutionibus. numerus est congre-
 gatio singulorum finita semper *et infinita natura*]. 20

6

DE FORMIS.

Nota est cuius pars nulla est, linea longitudo sine
 latitudine, lineae fines notae. recta linea est quae su-

1. stelle DV, stella vulgo 2. aliena V mercuri
 DV¹, mercurii V m. rec. 4. 10+u* D, ioui d pisces V
 6. iupiter V 7. uariae D 10. in aere V 11. aeris
 add. Iahnus temperiae V¹, corr. m. 2 itaq. cumq. D
 14. uideri (i in ras.) D 16. dicimus V 17. geometrica
 D, geometria V 18. dirigendi vulgo et numeros vulgo,
 arithmetica num. con. Iahnus 19. sui V 20. et om. D,
 add. d natura de formis nata continuo versu V 22. nota
 (o in ras.) D, nata V 23. lineae ac finis DV, corr. Cauchius
 et Iahnus recte V

per se positis notis aequaliter posita est. summitas est
 quod longitudinem *et latitudinem* tantum habet. sum- 2
 mitatis fines lineae sunt. plana, quae dicitur epipedos,
 summitas est quae super se positis rectis lineis aequali-
 5 ter posita est, vel quae suis finibus aequaliter posita est.
 planus angulus est in planitie duarum linearum non e
 regione positarum ad unum signum contingens curvatio.
 haec lineae quae angulum continent cum rectae sunt, is
 angulus rectis lineis contineri dicitur. si recta linea su- 3
 10 pra rectam lineam stans continuos angulos inter se pares
 facit, tum uterque ex paribus angulis rectus dicitur, et
 ea linea Graece cathetos, Latine normalis dicitur. rectus
 angulus est modicus et sibi congruens, hebes maior recto,
 acutus minor recto.

15

DE FIGURIS.

7

Figura est quae aliquo fine aut aliquibus finibus con-
 tinetur. circulus est figura plana una linea comprehensa,
 †in quem mediae omnes lineae inter se pares sunt. cen-
 tron est nota circuli medii. diametron est recta linea per 2
 20 centron inmissa et in utramque partem secans circulum.
 hemicyclium circuli dimidium. euthygrammoe formae sunt
 quae rectis lineis continentur. trigonum trilaterum, *te-*
tragonum quod quattuor, multilaterum quod pluribus.

1. noctis *V* posita et summissa est *DV*, corr. *Cauchius*
 2. et latitudinem add. *Iahnus ex Balbo p. 99, 12 (Lachm.)*
 3. FINIS LINEAE SUPER PLANA *DV*, corr. *Cauchius* 8. hae *V*
vulgo recte D SINT *DV*, corr. *Manutius* his *D*
 11. fecit *V* tum] TANTUM *DV* 12. et aliena *D*, et
 aliena *V* LATINAE ac postea vocabulum erasum *D* 15. de
 figuris *versu continuo V* 17. una (u in ras.) *D* 18. media
 OMNIS *DV* CETRON *D*, sed s prima m., ut videtur, super *ver-*
sum add. 19. nota (o in ras.) *D* 20. ceⁿTRON *D*
emissa vulgo 21. emICYCLUM *DV* ENTIGRAMMAE *D* (sed
 en non perspicuae; possunt etiam legi eu), entigrammē *V*¹, en-
 tygrammē *V*² 22. quae superscr. in *D* antiqua manus
 tetragonum om. *D*

triangulum aequilaterum *quod* paribus trinis lateribus.
 3 isosceles quod duo tantum latera paria habet. scalenon
 quod tria latera inaequalia habet. orthogonium quod
 habet rectum angulum. amblygonium quod habet *unum*
 angulum hebetem. oxygonium quod omnes tres acutos 5
 angulos habet. quadrilaterarum formarum quadratum
 est quod omnia quattuor latera *paria* habet et angulos
 rectos. heteromeces quod angulos *rectos* nec latera *pa-*
 4 *ria* habet. scutula, id est rhombos, quod latera *paria*
 habet nec angulos rectos: simile scutulae, cuius contraria 10
 latera et contrarii anguli inter se pares sunt, sed neque
 aequilaterum neque rectis angulis est. trapezia cetera
 nominantur. paralleloae lineae sunt quae in eadem planitie
 positae numquam inter se contingunt.

Postulata geometrarum sunt quinque. ut liceat ab
 omni signo ad omne rectam lineam ducere, et omnem
 finitam rectam lineam e regione eicere, et omni medio
 et intervallo circulum scribere, et omnes rectos angulos
 inter se pares esse, et si in lineas *rectas* recta linea 20

1. aequilaterum *q̄d* (um *q̄d* in rasura quinque sexve *litterarum*) *D*; olim fuisse videtur aequilaterum est post lateribus vulgo add. concurrit 2. ipsosceles quod tuo *V* scadaenon *D*, scadenon *V* 3. orthogoniū *V*¹, corr. m. rec. 4. amphrygonium *D*, ampigonium *V* unum *Nunnesius*, ide *d* in ras., idem *V* 5. haberem *D*, habentem *dV* ocho- gonium *DV* 6. quadrilaterum *DV*, corr. *Nunnesius* 7. paria add. *Cauchius* 8. eteromeces *DV* rectos add. *Nunnesius* 9. rumbos *DV* 10. similes *DV* 12. aequaliter aut omneq¹ *rectis D* (*v* add. *d*), aequaliter aut omneq¹ rectis *V*, corr. *Cauchius*; mihi tamen aequilateratum olim fuisse videtur 13. *paralely**** D*, *paralelynae d*, *paralle line V* eade- dem *D*, corr. *d* planicie *V* 14. contingunt *D* 16. geometriarum *dV* 17. ad omnem *DV* 18. lineam *D* medio *Nunnesius*, modo *DV*, κέντρον *Euclides*, centro *interpres Euclidis* in *Gromat. Lachm.* p. 379, 11 20. inter se| minores duos rectis *V* lineas rectas *Nunnesius*, lineam *DV*

inmissa interiores angulos minores duobus rectis fecerit,
iectas lineas concurrere.

Si paribus paria adiecta fuerint, omnia paria erunt; 2
et si paribus paria dempta. et quae isdem paria sunt, et
5 inter se paria sunt.

DE MUSICA.

9

Prior est musica inventione metrica. cum sint enim
10 antiquissimi poetarum Homerus Hesiodus Pisander, hos
secuti elegiarii Callinus Mimnermus Euenus, mox Archi-
lochus et Simonides trimetrum iambicum, chorium ca-
talecticum tetrametron composuerint, Archilochus etiam 2
commata versibus adplicando variavit epodis per pluri-
15 mas species, secuit Alcman numeros[†] etiam minuit in
carmen. hinc poetice melice. at Telesilla etiam Argiva
minutiores edidit numeros. quae species cum iam displi-
ceret et integra brevior videretur, magnitudine Pindari
adserta est, qui liberos etiam numeros modis edidit. hos
20 secuti musici Timotheus et Polyidos et Hyperides et Phyl-
lis et clarissimus cum peritia tum eloquentia Aristoxenus.
modulati protinus cantus. nec tamen[†] an non putes anti- 3
quiores cantus esse numeros, sed rusticos et inconditos,

1. duos rectis pares fecerit *DV*, corr. *Nunnesius*; conf. *tamen Gromat. p. 379, 13* 4. que *V* eisdem *vulgo*, eidem *coni. Iahnus* 10. Terpander *coni. Cauchius* 11. gallinus mixeruus eunectus *DV* archiloglius *V* 12. iambicum *D* 13. composueſ *V* archilocum *DV* 14. commota *DV* epodis *G. Hermannus*, ea potius (ea in ras.) *D*, ea potius *V* 15. alconan *DV* numerus *D*, corr. *d*, numertis *V* et imminuit carmen *coni. Lachmannus auctore Hermanno* 16. poeticae *DV* melicae атаи: illa *D*, melice. атаи: illa *V*, corr. *Carrio* argina *V* 18. diceretur *V* 19. LIB**** *D*, libros *dV*, corr. *Lachmannus* indidit *coni. Lachmannus* omnino de vs. 13—19 conf. *G. Hermann. epit. doct. metr. § 571* 20. Polyidos *Scaliger*, pondos *DV* Phyllis *Manutius*, follis *DV*; alias virorum doctorum coniecturas de his musicorum nominibus vide apud *Iahnus* 21. peritia *V* in ras. 22. protenus *V* an non *V*, anno *D*, annon *d*, non *codex Manutii*, quod probat *Urtichsius* 23. rusticis *DV* inconditis *V*¹, corr. *m. r*

postque hos poetica valuit veluti legitima [musica licentior] magisque modulata.

Rhythmus creditur dictus a Rythmonio Orphei filio et Idomenae nymphae Ismaricae, ut tradit Nicocrates 5 libro quem composuit de † Musio. † fratre Rythmoni tradit Hymene, Varrionis autem et Coloridis Tirisiae filiae Periclemenum et Peridemem †, qui primus cecinerit res gestas heroum musicis cantibus.

Musica est peritia faciendorum et canendorum modorum. eius partes harmonica, organica, rhythmica, crumatica. crumata pulsus decori sine carmine vocantur; harmonia est consonantia; organica * * rhythmos 2 Graece, modus dicitur Latine * * nominatus versus ab eo 15 quod fluat seque ipse circumeat. modus autem est lex quaedam et ordo vocalium intervallorum et differentia, vel, ut Aristoxenus finit, non utcumque compositum vocalium 3 temporum intervallum. carmen est modus vocibus iunctus, cuius discrimina cantus, modus, motus. * * tem- 20 pus est syllabae spatium, huius elementum brevis syl-

1. postq. *D*, postquam *V* 3. RYTHMI *D*, ritmi *V*¹, rithmi *V m. rec.* 4. RYTHMUS *DV* RYTHMONIO *DV*
5. idnomen*|ae nymphae marice *D*, idnomeae nymfē marice *V*, corr. *Lobeckius*, Idmoniae coni. *Urlichsius* NICOCRATES *DV*, *Nicostratus Stiehle Philol. X p. 170* 6—8. composuit de musice. fratrem Rhythmionii tradit Hymenaeum, Rhythmionii autem et Chloridis, Tiresiae filiae, Periclemenum et Peridemem. *Iahnus* 6. musico *V* rithmoni *V* 7. himene uarri-Tonis *V* tirisiē *V* 8. cecinerit tres *D* 10. ITEM DE MUSICA *V* 12. armonica *V* RYTHMICA *D*, rithmica *V* 13. decore *D*, corr. *d* 14. armonica *DV* organi carytmos *D*, organi caritmos *V*¹, organica rithmos *V m. rec.* 15. motus dicitur Latine, nominatur vero ab eo *cet. Iahnus partim secundum Lachmannum* LATINAE *D* 21. post est in *V repetuntur ex vs. 19 ss.* modus vocibus — tempus est

laba. † divisio brevis alia longum a longo ut neutrius ratione est†.

DE MODULATIONE.

12

Modulatio est modorum prudens dispositio; eius tres
 5 species, διάτονος, χρῶμα, ἀρμυρία. species carminum
 tredecim ** ex quibus primi Dorius, Phrygius, Lydius.
 his accesserunt gravissimus hypodorius, mox duo hypo- 2
 phrygiū, gravior et acutior, deinde hypolydii totidem et
 perinde gravior et acutior, deinde Dorius medius, tum
 10 Phrygius gravis et alter excelsus, totidem Lydii, gravis et
 acutus, tum mixolydii pari diversitate, postremus hyper-
 mixolydii acutissimus.

Organum quondam habuit tres intentiones, gravem, 3
 mediam et acutam: inde Musae quoque tres olim existi-
 matae, Hypate, Mese, Nete. nunc in ampliore numero
 soni considerantur, ut sit proslambanomenos, hypate hy-
 paton, deinde parypate hypaton, deinde lichanos hypaton,
 deinde hypate meson, deinde parypate meson, deinde li-
 chanos meson, deinde trite synemmenon, nete synemme-
 20 non, paramese, trite diezeugmenon, paranete diezeugme-
 non, trite hyperbolaeon.

5. διάτονος D, diazonoc V 6. primus D, primi s V
 dori* frigio lydio D, doriū frygiū lydiū d, dorium fri-
 gium lydium V 7. graussimum hypodorum DV hypo-
 phrygi DV 8. deinde — acutior om. V hypolydi D
 9. deinde oriū DV 10. phrygius V lydi V 11. mix-
 tolydi D, mixto lipi V hyperamixolydii D (medium y
 ex i ut videtur), hypera mixtolidii V 14. extimatae D
 15. hypate +ese nete D, hypaten mesen neten dV 17. pa-
 rypate DV hipaton V lycanos D, licanos V 18. deinde
 hypate bis habet V (item D teste Urlichsio) hypate meson (son
 in ras.) D parypate V lycanos D, licanos V 19. sy-
 nemmeno (synemmenon d) nete synen|menon D, sinenmenon
 netesinenmenon V 20. parmese D, corr. d diezeugmenon
 (e et u in ras.) D, diezeugmenon V paranete D, corr. d
 diezeugmenon DV 21. hyperboleon DV

4. Animadvertisse chordae sonantis suavitatem in arcu [sororis] Apollinem tradunt et intendissem profinus citharam, tum notasse quod adstrictiora fila nervorum in acumen excitarentur, gravibus responderent remissa, inde fecisse tres primos de quibus supra dictum est: hanc excepisse intensionem Lycorem, quem quidam Apollinis filium tradunt et nymphae Paramesae, * Chrysothemidi reliquisse: ab eo adiunctum modum qui synemmenos dicitur: hunc numerum auxisse Terpandrum adiectione diezeugmenu, qui primus a gravibus in acumen avertitur. deinde Timotheus addidit duos, paramesen et hyperboleon.
5. Initium modi dicitur diesis, dimidium semitonium, totum tonos. toni duo et dimidius diatessaron nominantur, tres et dimidius diapente, sex diapason.
- Haec musicae summa sunt.

13

DE METRIS ID EST NUMERIS.

- Metra Graece, Latine numeri vocantur. numerus est aequalium pedum legitima ordinatio. huius pars integra pes; partes sunt pedum syllabae, elementa numerorum; 2 modorum elementa spatia syllabarum ac tempora. pedes componuntur ex syllabis minimum binis, plurimum ternis; incipiunt temporibus binis, ad sena perveniunt; bisyllabi quattuor, trisyllabi octo. plures quam duodecim esse non possunt.

25

1. animadvertisse chordae *Lachmannus*, anim aduertis secunde *DV*, animadvertisse secundae *Urtichsius* (*Eos II 1866 p. 460*) suavitatis *V* arcu sororis *V vulgo*, arcus[oro (oro in marg. adscr.) *D*, arcus sono *Urtichsius* 2. citharam tum *Cauchius*, clytarantium *DV* 3. adstrictor a filia *D* 4. gravibus sonis coni. *Iahnus* 5. fecissent *D* 6. excepisse** *D* lycorem *D*, liquorem *V*, corr. *Iahnus* (*Ber. d. Sächs. Ges. I 417*) 7. paramese (ame in ras.) *D*, paramese *V*, Parnasiae et coni. *Iahnus* chrysothemidi *DV* 8. ab ea *DV* synhenmenos *D*, sinenmenos *V* 10. diezeugmenu *D*, die zeumeno *V* 11. hyperboleon *DV* 14. tonidium et *DV* diatessaron (ss in ras.) *D* 20. per partes *DV* syllaba *D*, syllaba *V* numerum *D* 23. ad se *DV*

Pyrriechius ex duabus brevibus, cuius exemplum Cato; iambus ex brevi et longa, cuius exemplum salus; chorius ex longa et brevi, *cuius exemplum* Roma; spondius ex duabus longis, cuius exemplum vates. duo igitur quantitate contrarii, spondius et pyrriechius, duorum alter, alter quattuor temporum; duo ordine, quorum uterque trinorum temporum, iambus et chorius. ita non plures quam quattuor pedes sunt nec esse possunt.

Trinarum syllabarum primus est dactylus, qui constat ex longa et duabus brevibus, cuius exemplum Annibal; anapaestus contra *ex duabus brevibus et longa*, cuius exemplum Capaneus; amphibrachys ex brevi et longa et brevi, *cuius exemplum* avarus; brachysyllabus ex tribus brevibus, cuius exemplum Cicero; ei contrarius molossus [in tribus longis], cuius exemplum Maecenas. item tres quinum temporum, bacchius ex duabus longis et brevi, cuius exemplum Latona; huic ordine adversus palinbacchius ex brevi et duabus longis, ut Aquinas; creticus [et amphimacrus] ex longa et brevi et longa, ut sanitas. duos habes quantitate contrarios, brachysyllabon et molosson, quorum alter trium temporum est, alter sex; ordine tres in quaternis, tres in quinis temporibus.

1. duobus *V* 2. Cato — exemplum *om. V* 3. cuius exemplum *om. D*, addidi ego, ut *d super versum*, quod propagatum in *V* 6. ante ordine *d sup. vs. add. in*, quod propagatum in *V* 9. dactylus *V* 10. Annibal — exemplum (ante Capaneus) *om. V* 11. anapaestus *D* ex duabus brevibus et longa *om. D*, add. *vulgo* 12. amphibrachys *D*, amphibrachys *d* 13. cuius *om. D*, add. *dV* brachysyllabus *V* 14. et contrarius *DV* 15. molossus *V* in *DV*, ex *vulgo* mecaenas *V* 16. brachius *D*, bachius *V* 17. et breui cuius *V in ras.* ordini (*i in ras.*) *D*, ordini *V* 18. ex duabus *D*, et ex duabus *dV* ut *D sup. vers. fort. i m.* 19. et amphimacrus *DV*, qui et amphimacrus *vulgo* 20. duos habet *D*, duobus ab *V*, duo pedes habes *Iahnus* contrarii *V* 21. brachysyllabo *D*, brachii syllabo *V* molosso *DV* 22. sex] ex *D* ordinem *V*

14

DE LEGITIMIS NUMERIS.

Primus est et legitimus maxime numerus hexameter heroicus. huius pedes aut dactyli sunt aut spondii: raro et in extremo versu reperietur trochaeus. eius exemplum

Avia Pieridum peragro loca nullius ante. 5
totus iste dactylicus fuit et habuit summum trochaicum.
sed mixtus ex spondiis hic erit,

2 Italiam fato profugus Laviniaque venit;
totus ex spondeis

Cives Romani tunc facti sunt Campani. 10
hoc genus numeri paucissimarum duodecim syllabarum, plurimarum decem et octo. tempora recipit viginti quatuor, interim viginti [tres pedibus] tribus tantum conficitur. formas excipit triginta duas, quas enumerare festinantibus longum est. 15

3 Pentameter elegiacus habet exemplum

Dum meus adsiduo luceat igne focus.
recipit dactylum, spondium, anapaestos duos, in fine versus aliquando brachysyllabum. fit syllabarum paucissimarum duodecim, plurimarum quattuordecim. tertium pedem 20
spondium semper habet, quartum et *quintum anapaestos*, quintum aliquando brachysyllabum.

4 Trimetros iambicos Latine senarius dicitur, cuius exemplum

Phaselus iste, quem videtis hospites. 25

2. examerter DV 3. dactili V 4. reperietur D
trocheus DV 5. *Lucret. I, 926. IV, 1* peragra (a in
ras.) D, peragra V 6. dactilicus V troc^{he}um (troc in
ras.) D, trocheum V 8. *Verg. Aen. I, 2* facto D ante ras.
laviniaque V 10. ex *Ennii annalibus*, ut videtur (*apud*
Vahlen. vs. 174) 12. xvii *conf. Iahnus*, sed videtur ipse *epi-*
tomator erravisse (conf. init. huius capitis) 14. recipit *conf.*
Iahnus triginta D 17. *Tibull. I, 1, 6* adsiduus DV
18. spondeum anapaestos V 19. brachysyllabus DV
21. quintum anapaestos *add. Cauchius* 22. brachysyllabū V
23. iambicus V 25. *Catull. 4, 1* fatalis D

duodecim syllabarum est. recipit aliquando praeter ceteros iambos in extremo pyrrichion. trimetrus tragicus

Pro veste pinnis membra textis contegit,

et

5 Aquilonis stridor gelidas molitur nives.

recipit in parte prima gressionis spondium, et eius loco dactylon et anapaestum, et pro iambo chorium et tribrachym. fit syllabarum paucissimarum XII, plurimarum XVII. recipit tempora plurima quattuordecim, paucissima
10 decem et octo. comicos trimetros solet magis in breves 6 minui. trimetros Hipponactius pedem novissimum adsumens spondium vel chorium talis est,

Calentibusque lympa fontibus semper.

eosdem pedes quos reliqui trimetri, praeter novissimum,

15 recipit, et **

Tetrametros, qui Latine quadratus vocatur, choriacus 6 talis est,

Tela famuli, tela *tela* propere: sequitur me Thoas.

recipit eosdem pedes, pervenit ad septem et semipedem.

20 summum pedem patitur aut creticum aut dactylum. octonarius iambus

Proin demet abs te regimen Argos, dum est potestas consili.

Septenarius

25 Haec, bellicosus cui pater, mater cluet Minerva.

7

2. iambus extremo *V* trimetros *V* 3. Attius Philocteta vs. 540 Ribbeck. 5. idem ibid. vs. 567 6. gressionis] scansionis *V* eius Halmius, om. D, alio *dV* 7. anapaestum *DV* *ΤΡΙΒΡΑΧΥΝ* D, tribrachin *V*¹, tribrachyn *V*² 8. plurimū *DV* 9. xviii ante quattuordecim *add. V* 10. xiiii ante decem et octo *add. V* 11. hyponactius *DV* 14. reliquit D trimetri *V* 15. 'post et excidit temporum computatio' Iahnus 18. versus incerti poetae tragici; *conf. Ribbeck. p. 217* tela ante propere *add. Bothius* toas *V* 20. petitur *V* 22. versus incerti poetae tragici; *conf. Ribbeck. p. 203* proin demet Lachmannus, proinde et *DV* 23. consulendi *DV*, *corr. Lachmannus* 24. septenarius D 25. *conf. Ribbeck. trag. rel. p. 204* bellicosus cui mater pater *DV* *corr. Carrio*

constat ex pedibus isdem.

8 Ionicus septenarius

Ibant malaci viere Veneriam coronam.

Ionicus α maiore

Ille ictus retro reccidit in natem supinus. 5

habet vitium in tertia syllaba. α minore

Metuentis patruae verbera linguae.

recipiunt pedes maxime pyrrichium et spondios, et solum
lent divisis syllabis longis plurium syllabarum pedes ad-
mittere. 10

9 Aristophanious anapaestus

Axena Ponti per freta Colchos denique delatus adhaesi.
recipit pedes quaternorum temporum omnis, inplet pe-
des VII et semipedem. anapaestus octonarius

Orte beato lumine, volitans qui per caelum candidus 15
equitas.

recipit eosdem pedes praeter semipedem. Aristobolius

Quae tam terribilis tua pectora turbat, terrifico sonitu
inpulit?

is circuitus magis quam versus est. dactylum crebrum 20
habet, rarum spondium.

10 Paeon duodenarius

Quis meum nominans nomen aede exciet? quis tumultu
invocans incolarum fidem?

3. Ennius Sota fr. 1 mala cluere DV 4. a addidi
maiore D, maior es V, maior est vulgo 5. retro recidit D,
retrocedit V, corr. Lachmannus 6. a addidi minorem.
et uentis V 7. Hor. carm. III, 12, 2 patriae DV
8. percipiunt DV, corr. Iahnus pedes] linguae V spon-
dion coni. Iahnus 9. diuisi DV plurimum DV 11. ari-
stophanious anapestus DV 12. conf. Ribbeck. trag. rel. p. 224
ponti per DV cholcos V adhesi D 13. imple V
14. anapestus D, anapesto V 15. conf. Ribbeck. l. c.
ore DV, corr. Lachmannus 18. 23. conf. Ribbeck. p. 212
18. Quae tam Bothius, quaedam DV turbans Iahnus, turba
et et antea terribilis ego 19. intulit V 20. his D dacti-
lum V 22. peon (o in ras. ex a ut videtur) D, peon V
duodenarius D 23. aede add. Lachmannus tumultum DV,
corr. Scaliger

et hic circuitus magis quam versus est. huic suberunt **
denarius

† Qui repens semipulsus onere gravi fores crepitu terrent.
recipiunt pedes creticos, chorios, spondios, iambos, bra-
5 chysyllabos, anapaestos.

Undecim syllabarum Phalaecius

11

Passer deliciae meae puellae.

recipit pedes spondium, dactylum, creticum, palinbacchium.

Angelicus † numeratus syllabam coartat hexametro, ut

12

10 Hectoris Andromachen? Pyrrin conubia servas?

Anacreontius

13

Miseri invidi vivimus scientes.

recipit pyrrichium, chorium, spondium, brachysyllabum,
anapaestum. primus est semper pyrrichius.

15 Numerus Saturnius

14

Magnum numerum triumphat hostibus devictis.

sunt qui hunc Aristobolion vocant. recipit pedem spon-
dium, iambum, pyrrichium, chorium, dactylum, brachy-
syllabum, anapaestum.

20 Priapeum

15

Hunc lucum tibi dedico consecroque Priape.

tertium pedem pro dactylo creticum habet, alioqui hexa-
metros esset.

3. Ribbeckius l. c. *versum sic emendat*: Qui repens semi-
somnum, onere pulsans gravi | Has fores, strepitu terret?
honore V 4. braci syllabos V 5. anapestos DV
6. falecius D, faleucius d, faleutius V 7. Catull. 2, 1
8. dactilū V palinbacium D, corr. d, palinbacchium V
9. aggelicus D, acgelicus V numerus Iahnus auctore Naekio;
immo minuatur syllaba: coartatur hexametros (vel in hexa-
metron) coartat (t in ras.) D exámetro DV 10. Verg.
Aen. III, 319 haec toris V conu[bia serva]s D (lit-
terae inclusae plane evanuerunt) 12. vivimus delendum iudi-
cat Iahnus 13. pyrru[chium chorium] D (v. ad vs. 10)
brachysyllabum DV 14. anapestum DV est semper V
15. numeros V 16. devicti D 17. aristobolion DV,
Archebolion Carrio, Archilochium coni. Vinetus atque
spondeum V 18. dactilū brachysyllabum V 19. anape-
stum DV 20. priapium V 21. Catull. fr. 2 locum DV
22. dactilo V alioquin d exámetros DV

15

DE NUMERIS SIMPLICIBUS.

Pyrrichius

Rapite, agite, ruite celeripedes.

Contrarius est huic et duodecasyllabus spondiazon,

Olli crateris ex auratis hauserunt.

5

Dactylus

Pulverulenta putrem sonitu quatit ungula campum.

Amphibrachys non facit numerum.

Anapaestus

Agilis sonipes rapitur celeri sonitu trepidans.

10

Creticus

Horridi transeunt ad pedes ex equis.

Palinbaccchius

Amicos ad hanc rem, si voles, advoca.

Bacchius non facit numerum.

15

Molossus idem est qui spondiazon.

Nunc quemadmodum a principali heroico plures numeri transfigurantur ostendam. ac primus trimetrus sit heroicus spondiazon.

Cives Romani tunc facti sunt Campani:

20

syllabam unam, quae est ante extremam, ex longa contraho, ut sit

Cives Romani tunc facti sunt Apuli,

et esse coepit trimetros. ** elegiacum transibit,

Bella per Emathios.

25

2. pyrrichius D 3. conf. Ribbeck, trag. rel. p. 228
 4. pondiagon (agon in ras.) D, spondiacon V 5. Ennius
 annal. 604 craterib; (aterib; in ras.) D, craterib; V au-
 serunt V 6. dactilus V 7. conf. Verg. Aen. VIII, 596
 8. amphibrachius V 9. anapestus V 10. 12. 14. conf.
 Ribbeck, trag. rel. p. 231 12. et equis DV 13. palin-
 baccchius D, palimbaccchius V 14. ut soles advocato coni.
 Iahnus 15. bacchius V 16. molossus V 18. TRANSFIGU-
 RANT D fit V (ex sil.) vulgo 20. vide supra p. 68, 10
 21. contra hoc ut sit V 23. apulu D 24. TRIMETRON
 DV 25. Lucan. I, 1

Rursus a pentametro ut componam heroicis, sumo partem posteriorem,

Dum meus adsiduo luceat igne focus,
et conpono,

5 Luceat igne focus Troiae qui primus ab oris.

Phalaecium numerum, qui est

Altis flumina vallibus tumescunt,

insertis verbis facio heroicum,

Altis flumina prodita vallibus inde tumescunt.

10 Ionicus est

Metuentis patruae verbera linguae:

adiciam trinis verbis singulas syllabas,

Nunc metuentis nunc patruae nunc verbera linguae.

retro

15 Italiam fato profugus Laviniaque venit,

cui est simile

Patriam tum profugus Laviniaque cepit.

Aristophanius fit heroico:

Arma virumque cano Troiae qui primus ab oris,

20 Nunc arma virumque cano *nunc* Troiae qui primus
ab oris nunc.

Angelicum syllaba breviata heroicum esse monstravi; item
Priapeum, si syllabam subripias, fieri heroicum.

1. ad pentametros *DV* 3. *Tibull. I, 1, 6* adsiduous
DV 5. troiae (oi in ras.) *D* 6. phalaecium *D*, faleu-
tium *V* 7. altissima flumina *DV* (recte autem ulerque
vs. 9) 11. *Hor. carm. III, 12, 2* 12. post adiciam de-
sinit *D* fol. 262^b extr. (constat codex ex XXXIV quaternioni-
bus; sed huius ultimi quaternionis tria tantum folia servata sunt)
trinas *V* singulis *V* 13. metuentes *V* 15. *Verg.*
Aen. I, 2 lavinaque *V* (conf. p. 68, 8) 17. vinaque cont.
Iahnus, regnaque *Christius* coepit *DV*, corr. *Christius*
20. nunc post Troiae additum a *Iahno* et *Christio* ante Troiae
posuit *Halmius* 21. nunc debebat *Iahnus* 22. angelicum
syllaba *V* in ras. itam *V*, corr. 1 m.

INDEX IN CENSORINUM.

Asteriscus numero appositus designat adnotationem.

- Ab**hinc annos centum p. 46, 15.
abicere a se usum *rei* 3, 6.
abire a mente sua homines 25, 20.
abscidit linea quartam partem orbis 15, 3.
abstinere manum a caede ac sanguine 5, 8.
abusive 17, 18.
abusque 36, 1.
academiae antiquae philosophi 7, 5; vetus academia 28, 16. — *tertia academia*, quae dicitur nova, 28, 19.
Acar-nanes 41, 16.
Achaia 41, 6.
actum vitamque nostram stellis esse subiectam 13, 18.
acutior vox 16, 24, *φθόγγος* 16, 26, chorda 19, 2.
ad meridiem 51, 15; *ad mediam noctem* 52, 8.
vetus adagium est 4, 13.
adelon (tempus) 44, 18.
adficiunt (stellae) nos sua disparili temperatura 13, 22.
adipe exhauriri 10, 1.
adminiculantes (dei) hominum vitam 6, 2; (visiones) incrementum partus adminiculant 15, 7.
adminiculum divini ignis 8, 21.
administrare cibum 10, 25.
admissio pecudum 9, 20.
adpositus est genius nobis observator 5, 8.
adprobare sese gratum 4, 19.
adseverare 17, 15.
adstringor officio 6, 12.
adulescentes ab alescendo sic nominati 24, 19.
adusque *cum accus.* 24, 23; *conf.* usque.
adventicia stirps 8, 23.
Aegyptii 38, 22, 25. 46, 4, 8, 14.
Aegyptus 41, 3.
aequabiliter divisus 14, 13. 24, 16.
aequilaterale hexagonum 14, 25.
aequinoctium vernum, autumnale 46, 27.
aestas (anni maximi Aristotelici) 39, 10.
aestimare *c. accus. et infin.* 12, 14; *reliquis locis scriptor praetulit existimare.*
aetatis humanae gradus 24, 14 ss.
aeternitas deorum 3, 17.
aetherius calor 10, 21.
aevum *quid sit* 30, 6 ss.

- agere triumphum 22, 2.
 agitare diem festum 20, 19.
 agon Capitolinus 37, 8. 40, 4 ss., Olympicus 37, 8. 45, 18.
 Agrippa 34, 14.
 Albani 42, 1, 11. 47, 25.
 albescere oculos 26, 5.
 ALCMAEON Crotoniates 9, 23. 10, 5, 8. 11, 16.
 alescere 24, 20.
 ab excessu Alexandri Magni 46, 11.
 Alexandria 35, 20.
 alimentum trahere 11, 1.
 alternis 36, 25. 41, 17.
 alvus 10, 13; in alvo promi-
 nens quiddam 10, 26.
 amotus procul a republica
 29, 8.
 ANAXAGORAS 9, 23. 10, 5, 14, 22, 24. 11, 12, 20.
 ANAXIMANDER Milesius 7, 23.
 anguis dentibus consitis 9, 6.
 anima divina 21, 29. — ani-
 mam nobis dat sol 13, 24.
 animi principale in capite
 10, 12.
 annale munus 5, 7.
 annales veterum 33, 16.
 anniculus 35, 24.
 annus naturalis 36, 26. 40, 14. 41, 2. 44, 12. 47, 2, sive naturae 44, 7; solis annus 37, 6; annus civilis 36, 26, is ad naturalem ex-
 aequatus 43, 1 ss.; anni vertentes 36, 20, 29. 37, 14. 38, 4. 39, 12. 40, 10 ss. 46, 21. — annus magnus 30, 4. 36, 29. 37, 5, 14, 16. 38, 9; anni maiores 36, 17 ss. — anni decemmen-
 stres 42, 10 ss. 44, 8. — annus cccly dierum 42, 18. 43, 20. 48, 2. — annus ver-
 tens Romanorum 42, 6 ss.; urbis anni 45, 20; anni Iuliani 44, 5. 45, 21. 49, 13; anni Augustorum 45, 24. 46, 6; annus ma-
 gnus Romanorum, quod lu-
 strum appellatur 39, 21. 40, 4. — sequuntur anni
 aliarum gentium: annus in
 Aegypto antiquissimus
 menstruus, tum quadrimen-
 stris cet. 41, 3 ss.; annus
 civilis Aegyptiorum 38, 26;
 annus magnus Aegyptiorum,
 qui vocatur κυνικός 38, 22 ss.
 sive canicularis 38, 24. 46,
 20, vel heliacos 39, 3 sive
 solaris 46, 20, vel θεοῦ ἐπι-
 αὐτός 39, 4 sive dei annus
 45, 20. — annus trimestris
 Arcadum 41, 6 ss., eorun-
 dem magnus 41, 15. — an-
 nus magnus sive maximus
 Aristotelis 39, 5 ss. —
 annus Callippi 38, 15. —
 anni semenstres Carum et
 Acarnanum 41, 16, eorun-
 dem annus magnus 41, 18. —
 annus Chaldaicus 38, 5.
 — annus Democriti 38,
 16, Hipparchi 38, 18,
 Metonicus 38, 9; anni
 Nabonnazaru 46, 8, Phi-
 lippi 46, 11; annus Phi-
 lolai 38, 13.
 ante lucem 51, 12; ante me-
 ridiem 50, 28.
 antestare 29, 3.
 ANTIAS 32, 24. 33, 21*. 34,
 1, 5.
 antiqui nostri 26, 9; antiqui
 sapientiae studiosi 6, 23;
 rudis antiquorum credulitas
 8, 27.
 APHRODISIUS 40, 15. •
 Aphrodite 48, 11, 20.
 Apollo 22, 3. 27, 13; Apollinis
 genitoris ara 5, 10.

- Aprilis 42, 13. 48, 11, 19.
 aqua 7, 24. 8, 12.
 aquarius (signum zodiaci) 47, 15.
 Arcades 31, 13. 41, 6.
 Arcadia 8, 26.
 arcana naturae rimari 21, 7.
 arcessere deos novis religionibus 6, 6.
 ARCHYTAS Tarentinus 7, 3.
 ARETES Dyrrachinus 39, 13. 45, 6.
 Arganthonios Tartessorum rex 31, 12.
 argentea saecula 30, 26.
 argute docet 48, 17.
 Aricini 47, 29.
 aries (signum zodiaci) 47, 16.
 ARISTARCHUS Samius 39, 12. 40, 16.
 ARISTOTELES Stagiritis peripateticus 7, 6. 10, 10, 19. 13, 2, 7, 9, 12. 26, 8. 27, 25. 39, 6.
 ARISTOXENUS 9, 19. 17, 15. 21, 25.
 arithmetica 12, 10.
 arithmetici Graeci 18, 5.
 armati spartoeve 9, 7.
 Arminos (Aegyptius) 41, 5.
 artes rhetorum 4, 6.
 articuli (corporis humani) 25, 24.
 ascendere ad fastigium omnium virtutum 4, 8.
 ASCLEPIADES medicus 22, 16.
 aspicit sol (locum zodiaci) 21, 5, κατὰ τριῶν 15, 4.
 astrologi 31, 16. 38, 20. 40, 13. 47, 20. 49, 28.
 astrologia 12, 9.
 Athenienses 50, 3.
 Attica 8, 24, in Attica regione 9, 4.
 auditoria sacra 29, 26.
 augescere 41, 17.
 augurium 36, 11, 13.
 Augustorum anni 45, 24. 46, 6.
 Augustus 49, 15, Caesar 33, 6, Caesar Augustus 34, 14; imperator Caesar, Divi filius, *quo die Augustus appellatus sit* 46, 2; Divi Augusti edicta 33, 10.
 Augustus (mensis) 49, 15.
 aurea saecula 30, 26.
 M. Aurelius Antoninus 34, 18.
 auspicia magistratuum 50, 6, auspicia sumere 4, 29.
 autochthones 8, 25.
 Aventinus 50, 18.
 Babylonii 50, 1.
 barba *quando nascatur* 26, 1.
 Berosos 31, 19.
 bifariam deduci 11, 28, dividere 25, 9. 51, 1.
 bimus 35, 25.
 bissextum 44, 3.
 blandimenta fortunae 3, 2.
 Boeotia 9, 6.
 bruma 42, 26.
 brumalis hora 30, 23.
 cadere sub oculos, sub tactum 17, 21. — cadunt dentes homini 12, 19. 25, 26; *conf. dentes.*
 Cadmus 9, 9.
 caelatum opus 3, 1.
 caelestes menses 47, 13.
 Quinte Caerelli 3, 4, sanctissime Caerelli 38, 5.
 summa caerimonia columnatur (religiones) 38, 1.
 Caesar: *vide Iulius.*
 calefactus 7, 24, calfactus 8, 14.
 caligine profundae vetustatis obductus 41, 20; hoc quodcumque caliginis Varro discussit 45, 10.
 CALLIPPUS Cycizenus 38, 15. 40, 16.

- campus Martius 33, 3.
 caniculae sidus 38, 26. 46, 8.
 canicularis annus 38, 24.
 canis exortus 47, 2.
 capere similitudinem veritatis 8, 10; te ista non capiunt 3, 5.
 capillus 16, 7.
 capitale odium 29, 9.
 Capitolini agones 40, 4, *conf.* 37, 9. 40, 8.
 Capitulum 22, 6. 50, 17.
 caput exordiumque nullum exitisse (hominum generi) 6, 28.
 Cares 41, 16.
 Carneades 28, 19.
 caro in hominis figuram convertitur 16, 13; carnem fieri ex umore 10, 15, fieri concretam 16, 6; novem dies iam carnem facientes 19, 16.
 CASSANDRUS (*Salaminius, historicus*) 39, 15.
 CASSIUS HEMINA 34, 8.
 κατὰ διάμετρον 15, 23.
 κατὰ ἐξάγωνον 14, 22. 15, 20.
 κατὰ τετράγωνον 15, 2, 17, 24.
 κατὰ τρίγωνον 15, 4, 17, 23.
 cataclysmo: 39, 9, cat. prior 44, 17, 18, 26.
 cavi menses 42, 16, 24.
 celebrare diem (natalem) 6, 16.
 censeri τῶν μέγνων 3, 10.
 censu civium habito 39, 24.
 cerebrum 10, 14.
 Chaldaei 13, 8, 14. 15, 25. 20, 26.
 Chaldaicus annus 38, 5.
 in choleram solvi 23, 14.
 chorda 17, 24. 18, 2, 9, 24. 19, 1.
 circulus 14, 23, 26.
 circulus signifer, quem Graeci vocant zodiacon, 13, 28, *idem* circulus finitor 31, 23.
 circumactus caeli 49, 25.
 cithara 22, 3, 15.
 civilis annus: *vide* annus. — civiles menses 47, 5, 9, 12, 30. 48, 5. — civilis dies 49, 22.
 civiliter dies *quod tempus sit* 49, 24.
 classicum 22, 12.
 nascendi claustra aperit natura 48, 21.
 Cleanthes 28, 21.
 CLEOSTRATUS Tenedius 37, 19.
 clima, *i. e.* caeli ad circulum finitorem inclinatio, 31, 24; *sic* clima Siciliae 50, 20.
 climacter 26, 26. 27, 15. 28, 7.
 climactericoe anni 24, 14, climactericum (annum) 26, 19.
 cognominare 14, 12.
 coipit 35, 11*.
 coisse membra 8, 8.
 Colchis 9, 6.
 tuo collatu 4, 14.
 porta Collina 32, 27.
 commentarii xv virorum 33, 10, 20, 22. 34, 11. — comm. philologi 4, 10.
 concentus dulcis 17, 9.
 conceptio 12, 11. 13, 25. 19, 8; conceptionis fundamentum 19, 27, initium 21, 5, locus (in zodiaco) 14, 10, 16, particula 15, 16.
 concinere (chordas) 18, 2; dulcissimam concinant melodian 23, 2.
 concipitur partus 14, 8; conceptum semen 21, 9.
 concordabiles in cantu effectus 17, 4.
 concordant (litterae) 17, 7; concordantibus phthongis 17, 26.
 concordessonitus reddere 23, 1.
 concrevisse homines in piscibus 8, 1; concreta caro

- concubium 52, 6.
 conderetur, conditum lustrum 39, 24, 26.
 in conditu Thebarum 9, 8; a conditu urbis Romae 30, 27.
 conformandi partus 16, 3 (partum) conformari 16, 11; *conf.* formare.
 conformatio partus 10, 7.
 congerere quaestiunculas 4, 11.
 congruenter iunctae (litterae) 17, 6.
 congruenti ordine 16, 20.
 congruere *ad rem* 20, 26. 37, 11.
 congruus *c. dat.* 22, 26; congruae de hac specie opiniones 11, 14.
 conlocatione facta 18, 18; *reliquis locis Censorinus frequentat conferre et conlatio.*
 compendio dicere 9, 15.
 cons. 34, 1, 2, 4 *cet.*, cons. 33, 21; *conf.* consules.
 conserere omnis aetatis incrementa et deminutiones 35, 24.
 consimilis 11, 25.
 conspectus (signorum in zodiaco) 13, 26 *ss.*; consp. tetragonus 20, 25.
 conspicit (sol locum zodiaci) 14, 17, *idem* particulam conceptionis 15, 16.
 consuetudo loquentium 35, 5, militaris 51, 3 (*conf. tamen similitudo*).
 consules:
 M. Aemilius Lepidus, L. Aurelius Orestes 34, 12.
 M. Aemilius M. f. Lepidus, G. Popilius 11 35, 12.
 Antoninus Pius 11, Bruttius Praesens 46, 16 (*ubi corripit Antonino*).
 Augustus VII, M. Vipsanius Agrippa 111 46, 3:
 G. Caesar 111, M. Aemilius Lepidus 43, 12.
 ex quarto Caesaris consulatu 44, 6.
 C. Caesar v, M. Antonius 49, 12.
 Cilo, Libo 34, 18.
 P. Claudius Pulcher, L. Iunius Pullus 34, 2.
 Ti. Claudius Caesar 1111, L. Vitellius 111 34, 15.
 Gn. Cornelius Lentulus, L. Mummius Achaicus 34, 9.
 P. Cornelius Lentulus, C. Licinius Varus 34, 3.
 Domitianus XII, Ser. Cornelius Dolabella 40, 6.
 Domitianus XIII, L. Minucius Rufus 34, 16.
 C. Furnius, C. Iunius Silanus 34, 13.
 L. Marcius Censorinus, M. Manilius 34, 6.
 Marcius Censorinus, C. Asinius Gallus 49, 14.
 Pius, Pontianus 45, 16.
 M. Valerius Corvus 11, C. Poetilius 33, 23.
 M. Valerius, Spurius Verginius 33, 20.
 Vespasianus v, T. Caesar 111 39, 26.
 consummare 26, 4. 27, 5. 46, 12.
 consummatio 12, 23. 21, 16.
 contentio gregum 9, 24.
 conticinium 51, 11.
 conticium 51, 11*.
 convenientia (vocum) 18, 19.
 cor ante omnia in infante incrementum 10, 10; cor hominum declarare *gradus aetatis* 35, 20 *ss.*
 P. Cornelius Nasica 50, 23.
 crassior vox 26, 7.
 creperae res 52, 3.
 crepusculum 52, 1.

- crinem deo sacrum pascere 4, 25.
 crismoe (dies) 26, 17; crismom (diem) 20, 8, (annum) 26, 19.
 cultores sapientiae 28, 26.
 κυνικόν (annum) 38, 23.
- de media nocte 51, 10; de meridie 51, 16.
 δεκάμηνοι 15, 23.
 decedere a vero 31, 11.
 December 42, 15, 43, 15, 22, 48, 14, 27.
 decemestris partus 19, 9.
 x viri 33, 1.
 deduci bifariam (*vulgo* diduci) 11, 28.
 defectus (*solis et lunae*) 45, 12.
 defigere terminum vitae 26, 25.
 definite scire 10, 7.
 dei annus 46, 20.
 delictum (*in computando*) 43, 5, 13.
 Delphi 38, 1.
 Delus 5, 9.
 DEMOCRITUS Abderites 8, 12, 9, 23, 10, 13, 11, 9, 28, 22, 38, 16.
 dentes *quando* nobis innascentur 12, 18; dentes infanti nasci 12, 24, perfici 12, 25, homini cadere 12, 19, 26, 26, excidere 12, 26.
 Deucalionis Pyrrhaeque lapides 7, 20.
 διὰ πασῶν 17, 13, 18, 11, diapason 18, 24, 19, 20, 24, 3.
 διὰ πέντε 17, 13, 18, 6, diapente 18, 22, 19, 18, 23, 20.
 διὰ τεσσάρων 17, 12, 18, 3, dia tessaron 18, 20, 19, 15, 23, 21, 24, 1.
 διάλειμμα 17, 19.
 διάμετρος 15, 23.
 Dianae aedes in Aventino 50, 17.
- διδάκτημα 16, 27, 17, 11, 14, diastema 18, 24, 24, 1, diastemata 16, 29, diastematis (*dat.*) 22, 26.
 DICAERCHUS Messenius 7, 4.
 dicare templis sacellisque 4, 24.
 dicreverunt (*vulgo* discreverunt) 27, 11.
 diducere 11, 28*.
 dies naturalis et civilis 49, 21 ss., Romanus 51, 9; diei divisio 50, 12 ss. 51, 1, 5 ss. — dies insignes 20, 13. — diem tuum, *i. e. natalem*, 6, 15 (*conf. natalis*).
 dieteris 37, 1.
 digitus (*mensura*) 18, 14, 15, 16.
 diluculum 51, 13.
 diluvio 39, 9.
 dimidiatus 36, 26, 40, 15, 47, 22.
 dinoscere 43, 27.
 Diocles Carystius 13, 2, 6.
 Diogenes Apolloniates 10, 4, 15, 26, 16, 3.
 Diogenes cynicus 28, 14.
 DION (*Neapolites, mathematicus*) 39, 14.
 Dionysius Heracleotes 28, 13.
 Dioscorides astrologus 35, 19.
 diplasion logus 18, 10.
 Dis pater 33, 2.
 discerni 34, 23, discretus 51, 6; *conf. dicreverunt*.
 disciplina (Etruscorum) 32, 7, extispicii 9, 10, sapientium 3, 7.
 describere (dies per menses) 43, 21; aetatem hominis duodecim hebdomadibus describi 25, 16 (*ubi vulgatum describi tuetur D; sed verum esse describi docet Buechelerus in Mus. Rhén. XI^{er} 598 ss.*)

- designare 30, 26*.
 dispar 12, 5, 17, 9.
 disparilis 11, 15, 13, 22.
 disponere membra 10, 22.
 dissensio temporum 33, 16.
 dissensum *participium substantivi vice usurpatum (similiter ac factum, dictum)*: pauculis exceptis ab Empedocle dissensis 8, 11.
 dives virtutis non minus quam pecuniarum 8, 6.
 divinitate animum imbuere 22, 14.
 cuivis docto in disceptando par 36, 11; inter viros doctissimos dissensio 40, 26.
 dodecaeteris 38, 4.
 Domitianus 40, 6.
 dona pretiosa 3, 19; dono deorum 4, 18; *conf.* munus.
 DORYLAUS 24, 6.
 DOSITHEUS 37, 23.
 dragma 35, 25, 36, 1.
 ducere sexies 20, 1; *conf.* multiplicati.
 dulcedo musicae 24, 11.
 duo 18, 8, 19, 25, 25, 17; duorum 17, 1, 15, 24, 2, 49, 1; duum 17, 11 (*ex coniectura*). 23, 6, 40, 19, 42, 30, 47, 26; duarum 17, 8; duos 23, 20, 47, 17, 48, 12, duo *accus. in lege Plaetoria* 51, 22; duas 17, 14, 18, 2.
 XII tabulae 50, 26, 51, 18.
 duplicare 18, 17.
 duplo maior 18, 9; dupla portio 18, 23.
 eepyrosis 39, 10.
 ΕΚΡΥCIC 21, 11.
 ΕΚΡΥCIC 21, 12.
 editur partus 13, 9, 19, 10, 20, 23, infans 8, 16, 11, 1, 12, 12, 15, 14; edita membra
 ex terra 8, 7; homines e terra editos 9, 4.
 educit (conspectus) maturos infantes 15, 11.
 effectus stellarum 13, 20.
 efficaces visiones 15, 6, conspectus 15, 18.
 efficientia 15, 11.
 polygoni efficit latus (linea) 15, 12.
 elegia Solonis 25, 25.
 Elis 37, 8.
 emittantur lineae 14, 25; emissae voces 16, 25.
 EMPEDOCLES 8, 4, 11, 10, 6, 9, 11, 13, 15, 12, 1, 13, 3.
 enarmonion esse mundum 24, 5.
 enasci 10, 17; enati homines lapidibus 7, 20.
 ενιαυτὸς θεοῦ 39, 4.
 enneadecaeteris 38, 11.
 enneades 27, 19.
 enneaeeteris 37, 12.
 εννεαμηνιοι 15, 23.
 ENNIUS 40, 21, 51, 25.
 enrythmos motus 22, 25.
 εφηβοc 26, 14.
 EPHORUS 31, 13.
 EPICARMUS 13, 6.
 EPICURUS 8, 14, 10, 6, 19, 22, 9.
 EPIGENES Byzantius 13, 3, 10, 31, 17.
 epitritos phthongos 18, 5.
 ordinis equestris dignitas 29, 12.
 ERATOSTHENES 23, 4, 28, 15, 45, 5.
 Erichthonius 9, 5.
 erubescere *c. accus. et inf.* 29, 6.
 porta Esquilina 32, 28.
 ethica pars philosophiae 4, 4.
 Etruria 9, 11.
 Etrusci 32, 7, 35, 16; Etruscorum libri rituales 20, 6, 31, 26, libri fatales 25, 15; nomen Etruscum 32, 17.

EUCLIDES Socraticus 5, 26.
 EUDOXUS Cnidius 37, 19, 23.
 EUEBOR 13, 2.
 EURYPHON Cnidius 13, 4.
 exaequare civilem annum ad
 naturalem 43, 2.
 exauescere 39, 12.
 exaratus puer divinus 9, 10.
 exempla veterum 4, 17.
 ἐξέφρησεν 26, 14.
 exignescere 39, 11.
 exordium 6, 28.
 exoritur caniculae sidus 38,
 26; ab exoriente sole 49,
 23. — ex aqua terraque
 exortos esse pisces 7, 24;
 Erichthonius humo exortus
 9, 6.
 ad exortum (solis) 49, 24;
 a solis exortu ad exortum
 eiusdem astri 50, 2; solet
 canicula facere exortum 46,
 18; a canis exortu 47, 2.
 expergitus 22, 15.
 exscripserunt disciplinam ex-
 tispicii 9, 12.
 extispicii disciplina 9, 11.
 fabulares poetarum historiae
 7, 18.
 facere hostia 5, 4, genio fa-
 ctum 5, 12; occasum, sta-
 tionem faciant (stellae) 13,
 21.
 fata 14, 14.
 fatales libri (Etruscorum) 25,
 15; fatalia deprecando 25,
 17.
 Fauni indigenae 8, 26.
 fax. prima face 52, 5.
 februmenta 49, 4.
 februrare 49, 5, 7; februatus
 dies 49, 10.
 Februarius 42, 26, 28. 43, 3, 16.
 49, 1, 3, 10.
 februum 49, 3, 5, 9.
 femina 11, 3 ss. 12, 4. 16, 5.
 CENSORINUS.

FENESTELLA 42, 8.
 fere 23, 16. 25, 23; ferme 10,
 20. 11, 28. 14, 4. 20, 17.
 29, 7.
 Ferentini 42, 1.
 fetae 20, 16.
 fetus (procedit) 8, 1.
 figurari una totum infantem
 10, 17.
 finitor circulus 31, 23.
 finitur tota vita humana septe-
 nario numero 20, 4.
 forma hexagoni aequilatera-
 lis 14, 26.
 formare. quid primum in in-
 fante formetur 10, 9; ut-
 cumque formatus infans 10,
 23; diebus lx infantem for-
 mari 16, 6; corpus quattuor
 mensibus formari 16, 5; se-
 ptem formamur mensibus
 12, 16; fit corpus iam for-
 matum 19, 19; initium for-
 mati hominis 19, 28; homi-
 nes luto esse formatos 7,
 19. — annum ad solis cur-
 sum formavit 43, 19. — sa-
 pientium disciplina forma-
 tus 3, 7.
 formidulosus 23, 6.
 frugum proventus ac sterili-
 tates 38, 7.
 fuat 51, 22.
 FULVIUS (*fastorum scriptor*)
 42, 9, 17. 48, 9.
 functus officiis municipalibus
 29, 10.
 fundamentum gignendi 19, 22,
 conceptionis 19, 27, matu-
 rescendi 19, 24.
 fundere merum genio 5, 1, 4.
 hostiae furvae 33, 4.
 futurum tempus 30, 11, 12.
 gallicinium 51, 10.
 GN. GELLIIUS 34, 8. •
 gemini quomodo nascentur 11

- 26 ss. — (signum zodiaci) 47, 17.
 genamur 5, 17, genitur 5, 18, a genendo 5, 19.
 genea 31, 3, 6, 7.
 genealogoe 8, 22.
 generaliter 19, 6.
 generare 7, 9; orbem esse generantium nascentiumque 7, 13.
 geneses mortalium 22, 24, nocturnae et diurnae 27, 9.
 genethliaci 26, 20. 38, 5.
 genius 5, 2 ss. 6, 7.
 gens (in natura rerum) 7, 14. 8, 23; progeneratis gentibus 9, 3.
 geometrae 16, 22. 17, 16.
 geometrica ratione 23, 4.
 gignere 7, 10, genitos 8, 21, gignendi fundamentum 19, 23.
 Gorgias Leontinus 28, 24.
 gradus aetatis humanae 24, 14 ss. — gradum provincialium supergressus 29, 12.
 Graeci 14, 1, 12. 18, 5. 19, 23. 39, 18. — historici Graeci 31, 10; Graeci annales 41, 13.
 Graecia 20, 13. 26, 12. 36, 22. 37, 14, 24. 41, 10. 47, 30.
 GRANIUS FLACCUS in libro quem ad Caesarem (*dictatorem, ut videtur*) de indigamentis scriptum reliquit 5, 21.
 gravior vox 16, 24, φθόγγος 16, 27, tibia 19, 1.
 gubernari genus humanum stellarum cursu 13, 19.
 habitum referri (parentis) 11, 10.
 harmonia 22, 20, ἀρμονίαν 16, 21*.
 HARPALUS 37, 22. 40, 20.
 haruspicii peritia 32, 7.
 hebdomadis 20, 23, hebdomade 25, 26. 26, 7, hebdomades 26, 21. 27, 18, hebdomadae 20, 22, hebdomadas 25, 11, hebdomadibus 25, 16, 22. 26, 15.
 heliacos annus 39, 3.
 hemiolion 18, 8.
 hemitonion 17, 1, 18. 23, 15, 17, 24, 26, 27, hemitonii 17, 11, 12, hemitonia 17, 17, hemitoniorum 17, 16.
 ἐπτάχορδον 24, 7.
 ἐπτάμηνοι 15, 22.
 HERACLITUS 31, 3. 39, 14.
 HERODICUS 31, 6.
 HERODOTUS 31, 11.
 HEROPHILUS (medicus) 22, 18.
 hesperos 52, 1.
 ἑξάγωνον 14, 22. 15, 20; hexagoni aequilateralis forma 14, 25.
 hiemps (anni maximi Aristotelici) 39, 9.
 HIPPARCHUS 38, 18.
 HIPPOCRATES Cous, medicus, 13, 11. 20, 6. 25, 2, 8.
 HIPPO Metapontinus sive Samius 9, 18. 10, 4, 12, 26. 11, 7, 27. 16, 5.
 historiae fabulares 7, 18, verae 44, 22; in Tuscis historiis 32, 9.
 historici 32, 24. 36, 13; historici Graeci 31, 10.
 historicon (tempus) 44, 15, 21.
 hora, i. e. anni tempestas, 41, 12.
 horae xii diei et noctis 50, 12 ss.; horae aequinoctiales 40, 21; horarum nomen annos trecentos Romae ignoratum 50, 25.
 horarium ex aqua factum 50, 23.
 HORATIUS FLACCUS in carmine saeculari 33, 1.

horographi 41, 14.
 annum horon dici et Graecos annales horus (*i. e.* ὥρον) 41, 13.
 Horos 41, 11.
 hostiam caedere 5, 11; hostia facere 5, 4.
 humanitatis officia 29, 21.

Ianuaris 42, 26. 43, 21. 48, 28. 49, 2.
 Ianus 49, 2.
 idibus Iuniis 22, 6.
 ignis 8, 8; ignis divinus 8, 21.
 imbuere animum divinitate 22, 14.

Inachi regnum 44, 27.
 inaequabilis vox 26, 4.
 inaequabiliter 47, 18.
 inaudibilis 23, 2.
 inbecillus conspectus 14, 17.
 incomprehensibilis 30, 13. 40, 22.

incrementum partus 15, 6.
 indigitamentum 5, 22. 6, 3.
 inefficax visus 15, 4.
 inenuntiabilis 40, 22.

infans. quid primum in infante formetur 10, 9; una totum infantem figurari 10, 17; utcumque formatus infans quemadmodum in matris utero alatur 10, 23; diebus LX infantem formari 16, 6; quinque et triginta diebus infans membratur 20, 11; maturus infans educit 15, 11. — in alvo prominens quiddam, quod infans ore adprehendat 10, 27. — *conf.* editur.

infima vox 16, 27.
 infirmiores conspectus 14, 7;
 infirmum lumen 15, 20.
 inflare tibias 18, 17.
 ingenuus lactis umor 8, 16.
 ingratus beneficiis 4, 16.

inhiat munera ex auro — blandidimenta fortunae 3, 3.
 initia seminis 19, 26.
 initiales dies 20, 21.
 innascantur nobis dentes 12, 18; *conf.* dentes.
 inpar numerus plenus et magis faustus habebatur 42, 21.

insignes dies 20, 13.
 intempesta 52, 6.
 intercalare 36, 27, 31. 37, 21. 38, 11, 16, 18. 42, 3. 43, 3, 7, 10, 16. 44, 3.

intercalares menses 38, 14 (intercalarii *Halmsius*), sine ullo intercalari 38, 27; intercalarium mensem 42, 30, intercalario mense 43, 18, menses intercalarios 43, 14; cum intercalariis 38, 17.

intervallum tonorum 17, 2, 18, 18, 23. 23, 14; intervalla quae symphonias possint efficere 17, 7; intervalla musicis diastematis congrua 22, 25. — temporum intervalla 32, 20.

intrepide pernegare 13, 5.
 invalido lumine 14, 21.
 ircum olere 26, 10.
 irquitallire, irquitalli 26, 9, 10.
 Isocrates rhetor 28, 23.
 Ison rex (Aegypti) 41, 4.
 Italia 8, 26. 44, 9; Italiae gentes 41, 24.
 Italicum stadium 23, 9.
 Iudaei 20, 5.
 Iuliani anni 44, 5. 45, 21. 49, 13.

Iulius Caesar 44, 4. 45, 23; G. *sive* C. Caesar 43, 12. 49, 12; Divus Iulius 48, 2, Divus (Caesar) 46, 2; *conf.* Granus.

Iulius (mensis) 49, 14.

- IONIVS GRACCHANVS** 42, 9, 17.
 48, 9.
Iunius (mensis) 42, 13, 48, 12,
 24; idibus Iuniis 22, 7.
Iuno 48, 24, 26.
Iuppiter Capitolinus, Olym-
 pius 37, 9. — **Iovis stella**
 23, 23, a Iove 23, 25.
iuvenes unde appellati sint 24,
 21.
Kalendae. ex die Kal. Ianua-
 riarum 45, 23, ex Kal. Ia-
 nuariis 46, 1, 18, ex ante
 diem Kal. Febr. 46, 1, ante
 diem vii Kal. Iul. 46, 15,
 ante diem xiii Kal. Aug.
 46, 18; a kalendis in kalen-
 das 47, 10.
lacteus umor 19, 13; **lacteum**
conceptionis fundamentum
 19, 26; **lacteum semen** 21,
 11.
languido radio 15, 19.
lapidibus duris enatos homi-
nes 7, 20.
lar 5, 20.
Latini 18, 5, 48, 15, 27; **gens**
Latina 48, 19.
Latium 48, 23, 49, 1.
Lavinii 42, 1.
libamina reddere 4, 27.
libare deis 4, 22.
Liber 37, 1.
LICINIUS MACER 42, 7.
limus 8, 13, 14.
linea 14, 25, 15, 2, 11.
LINUS 39, 14.
liquido 3, 7, 13, 27, 17, 20,
 30, 2.
LIVIVS 34, 1, 5, libro cxxxvi
 33, 5.
locus conceptionis 14, 10, 16.
logus diplasion 18, 10.
in lubrico sita 3, 8.
LUCILIUS in libro satirarum
 xvi 5, 27.
LUCRETIVS 8, 5.
lucumones, Etruriae poten-
 tes, 9, 11.
ludi saeculares 32, 18 ss., sce-
 nici 21, 29, Pythia 38, 2.
luminibus accensis 52, 4.
luna 14, 1, 23, 12, 14, 20, 23,
quot diebus singulos suos men-
ses conficiat 47, 21 ss., lu-
 nae astrum 41, 9, orbis 39, 6
(conf. orbis), cursus 37, 11.
 38, 6. (38, 21). 41, 10, 22.
 (42, 18). 47, 29; **luna nova**
 36, 24, 47, 8.
lunaris mensis 21, 21, 36, 25.
 47, 7.
Lupercalia 49, 7, 9.
lustratur Roma 49, 8.
lustrum 30, 4, 39, 22 ss.
luto molli formatos esse ho-
mines 7, 19.
lux. lucem accipere, i. e. na-
 sci, 5, 9; in lucem venire
 13, 26; te in hanc lucem
 edidit (dies) 6, 15. — ante
 lucem 51, 12.
Maia 48, 22, 24.
maiores natu 48, 13, 22.
Maius (mensis) 42, 13, 47, 26.
 48, 12, 22.
mane 51, 14.
maritae domus 5, 25.
Mars 22, 2, 48, 10, 18. — **stella**
Martis 23, 21.
campus Martius 33, 3.
Martius (mensis) 42, 13, 47,
 26, 48, 10, 17.
mas 9, 21, 11, 3, 7, 10, 12, 17,
 12, 3.
masculi 16, 4.
materia hominis 8, 8.
maturescere uterus non po-
tuerit 15, 13; **maturescendi**
fundamentum 19, 29.

- maturitas partus 14, 28, a septem mensibus incipiens 12, 21. — maturitas ad stirpem relinquendam 26, 2.
- maturus ad nascendum (partus) 12, 8. 16, 2; maturos infantes (educit) 15, 11. — hominem morti fieri maturum 26, 6.
- meatus navis 22, 11.
- medici 26, 15, medicorum experientia 21, 8.
- medicina corporis 27, 12.
- medius bonorum malorumque 3, 10. — media nox: *vide* nox.
- ex medullis profluere semen 9, 19; medullae exhaustae 9, 21, *conf.* 9, 24.
- μελλέφθορ 26, 13.
- melodian concinere 23, 2.
- membratur infans 20, 11.
- MENESTRATIS 37, 22.
- menses naturales 47, 4 ss., caelestes 47, 13, secundum solem 47, 6, veri solares 48, 5, lunares 21, 21. 36, 25. 47, 7, civiles 47, 5, 9, 12, 30. 48, 5, antiqui a Romulo facti 48, 8 ss., pleni et cavi 42, 16 ss., intercalares (*sive* intercalarii) 38, 14 ss. — *genit. plur.* mensum 36, 27. 42, 8, 10. 48, 15, mensium 43, 23. 47, 4. 49, 18.
- mensurae vocum 17, 21; mundi mensura 23, 8; conlationem mensurae non recipit 30, 20.
- Mercurius 48, 24. — Mercuri stella 23, 14.
- meridies 51, 15; ante meridiem 50, 28, ad meridiem 51, 15, de meridie 51, 16.
- μέσα, hoc est bonorum malorumque media, 3, 9.
- metatus navis 22, 11*.
- Meton Atheniensis 38, 10. 40, 18; Metonicus annus 38, 9.
- militaris consuetudo 51, 3 (*conf. tamen similitudo*).
- sus Minervam 4, 14.
- ministrante natura 8, 17.
- mittitur lumen 15, 20, vox 16, 24; *conf.* emittantur.
- moderari mortalium geneses 22, 24.
- modulandi scientia 16, 23.
- modulo finiti temporis metiri 30, 22; saeculi modulum finire 32, 1.
- modus saeculi 32, 19. *prae*f. p. VII.
- moerae (zodiaci) 14, 12.
- Moerae, deae fatales, 14, 13.
- monstruosae opiniones 7, 21.
- morbi animi 27, 13.
- morbidos 20, 17. 28, 2.
- motus stellarum 13, 19; motuum modus mensuraeque 16, 21; motus navis 22, 11*.
- multiplicati (dies) per septem 20, 21.
- L. Munatius Plancus 46, 2.
- mundus sempiternus 7, 11, novus 8, 20; hunc totum mundum musica factum ratione 22, 22; hunc omnem mundum enarmonion esse 24, 5, et organum dei 24, 6; mundi mensura 23, 8, incendium 39, 10.
- municipalibus officiis functus 29, 10.
- munus annale 5, 7; munera ex auro vel quae ex argento nitent 3, 1; deorum munere 4, 23.
- Musae 22, 3. 27, 13.
- musica (*sive* musice) 12, 10. 16, 15 ss.; musicae regulae 16, 18; dulcedo musicae 24, 11; musice lenire ac sanare morbos animi 27, 14;

- musicam ad natales pertinere 21, 23.
 musica ratione 22, 23; rhythmis musicis 22, 19; musicis diastematis 22, 25.
 musici 16, 19, 22. 17, 15, 23. 18, 18. 24, 4.
 mutuari praecepta ex ethica parte philosophiae 4, 5.
 mysteria quae Libero sunt 37, 1.
 mythicon tempus 44, 20. 45, 2.
- Nabonnazaru anni 46, 8.
 nascendi claustra 48, 21; orbem esse generantium nascentiumque 7, 13; nati homines ex hominibus 6, 27.
 natalicii titulo 4, 3.
 dies natalis 4, 28. 5, 7. 6, 18. 24, 13. 29, 29. 50, 12.
 — tuus natalis 30, 2; suo natali 5, 16; suos natales colere 6, 11; ad nostros natales 21, 23; a natalibus nostris 22, 20; ad praesentes nostros natales 9, 14; et primum natalem tuum et hodiernum 36, 6.
 natura ministrante 8, 17, natura (*ablat.*) 6, 30. 7, 16, ipsa natura 10, 19; annus vertens natura 40, 11, annus naturae 44, 7. — secreta naturae 17, 22, arcana 21, 7. — nascendi claustra aperit natura 48, 21. — reddi naturam parentis 11, 9.
 naturalis annus: *vide* annus; naturales menses 47, 4, 11; naturalis dies 49, 22.
 naturaliter dies *quod tempus sit* 49, 22.
 NAUTELES 37, 22.
 nobilitare 29, 28.
 nonae septimanae *et* quintanae 43, 27 s.
- notis lucidissimis signare 30, 11.
 November 42, 15. 43, 15.
 nox *quomodo divisa sit* 50, 13. 51, 2, 5 ss.; media nox 52, 8, ad mediam noctem 52, 8, de media nocte 51, 10.
 Numa 42, 17.
 numinum suorum effectum (dei) repraesentant 6, 5.
 Nymphae 8, 26.
- obliquo lumine 14, 21.
 observator adsiduus 6, 7.
 occasus (stellarum) 13, 21.
 occipit 35, 11.
 OCELLUS Lucanus 7, 2.
 octaeteris 37, 12. 18, 21, 23.
 October 42, 14. 47, 28.
 OENOPIDES 40, 19.
 offensiones morbidi corporis 28, 2.
 Ogygii cataclysmus 44, 27.
 olympiades 39, 19 s. 44, 19 ss.
 Olympicus agone 45, 18; Olympicum stadium 23, 11.
 opes in animo maximae 3, 14.
 orbis generantium nascentiumque 7, 13; orbis aetatis 31, 4 s. — orbis, *i. e.* circulus, 15, 3; sol annuo cursu orbem suum circumit 36, 23; solis et lunae vagarumque quinque stellarum orbes 39, 7. — orbis signifer 21, 1; in zodiaco orbe 47, 7.
 ordo senatus, equester, plebis 29, 11, 16.
 organum dei esse mundum 24, 6.
 oriente qua particula zodiaci nascamur plurimum refert 14, 6.
 origo prima hominum 9, 13, mundi 44, 13.
 ORPHILUS 39, 15.

ortus principiumque 6, 29.
ostenta 52, 12.

παῖς 26, 13.

parere vitam, vitae fructum
6, 17. — septimo mense pa-
rere mulierem posse 13, 1.

Parilia 45, 20.

PARMENIDES Veliates 8, 11.
9, 17. 10, 5. 11, 11, 23.

partulae (zodiaci) 14, 9,
11 ss.; partula conceptio-
nis 15, 16.

partus unde nascatur 10, 13,
concipitur 14, 8, conforma-
tur 16, 3, 11; de conforma-
tione partus 10, 7; partus
ad nascendum maturi 12, 7,
conf. 12, 14; partus non
omni tempore fiunt maturi
16, 2; partus maturitas 14,
28, incrementum 15, 7; nono
et decimo mense edi posse
partum 13, 10; partus se-
ptemmemstris, decemmemstris
19, 6 ss.; partus dispari
sexu 12, 5.

parvoli 20, 17.

pascere crinem 4, 25.

pathe 27, 14.

pellere chordas 17, 26.

pentaeteris 37, 5. 39, 17. 41, 15.

percipere fruges 4, 20.

perducere aetatem 35, 16.

perfectus homo 16, 8.

perferre, proferre vitam 28, 4.

peripatetici 7, 7.

pernegare 13, 5.

persequi locos ex artibus rhe-
torum 4, 7.

PERSUS 4, 29.

personatus 22, 7.

pertendit visus 15, 2.

pervidere 21, 8.

phaenon 23, 25.

phaethon 23, 24.

Philippi anni 46, 11.

L. Philippus censor 50, 21.

PHILOLAUS Pythagoricus 38,
13. 40, 14.

philologi commentarii 4, 10.

philosophi 26, 16; opiniones
philosophorum 46, 25.

philosophiae pars ethica 4, 4;
vetus philosophia 27, 4.

phosphoros 23, 16.

phrenetici 22, 16.

φθόγγος 16, 26, φθόγγος 16, 25;

phthongon 18, 15, phthon-
gos (accus.) 17, 23, phthon-
gis 17, 26.

piare 49, 4.

piscis (signum zodiaci) 47, 16.

Piso Censorius 34, 7, in an-
nali septimo 35, 9.

M. Plaetorius 51, 19.

PLATO Atheniensis 7, 4. 17, 18.
28, 11, Plato ille veteris
Philosophiae sanctissimus
27, 4.

PLAUTUS 51, 25.

humilior plebis ordo 29, 16.
pleni menses 42, 16, 27; ple-
nissimus potentissimusque
conspectus 15, 13.

poetica libido 9, 1; poetica
saecula 30, 27.

poetae 31, 9; poetarum fabu-
lares historiae 7, 18.

polygoni latus 15, 12.

pontifices 43, 6.

portenta 32, 5, 7, 26.

portio 18, 8, 20, 22, 23. 19, 2.
20, 12. 47, 20; pro sua quis-
que portione 6, 2.

postmodum 49, 19.

potentissimus conspectus 15,
13.

praecepta ad beate vivendum
4, 4.

praedicare facunde 4, 9; id
fieri non praedico 4, 13.

praedicationem omnium vi-

- tutum in *aliquem* conferre 29, 4.
 praedicere pauca 13, 28.
 praegnans (*substant.*) 20, 14;
 praegnas terra 8, 7.
 praemia vitae 6, 14, *conf.* 6, 17.
 praesens tempus 30, 11, 12.
 praesides (in provinciis) 29, 25.
 praeteritum tempus 30, 11.
 praetor urbanus 51, 21.
 prima face 52, 5. — probitas prima 29, 19.
 primigenii homines 7, 15.
 principale animi 10, 12.
 principium 6, 30, 7, 12, 8, 19 *cet.*; principium parentis 11, 8.
 procreari seminibus parentum 6, 25.
 prodigia 25, 21.
 producere vitam 36, 4; *conf.* perducere et perferre.
 profari 11, 16.
 proferre vitam 28, 4; *obiectum* vitam *vel* aetatem *excidit* 25, 18.
 professores sapientiae 7, 21, 9, 16; artis professor 22, 18.
 progeneratis gentibus 9, 3.
 Promethei molle lutum 7, 19.
 promisce 17, 3.
 propagare genus hominum 8, 18, multa saecula 6, 26 (*conf.* *successione*).
 ad propositum revertor 24, 12.
 proselenoe (Arcades) 41, 7.
 Proserpina 33, 2.
 providentia dei 8, 21.
 provinciales 29, 12.
 proximantia sibimet zodia 14, 18.
 pubem apparere 25, 26.
 pubertas 8, 2.
 pubescere 12, 19, 28.
 publici redemptor 43, 9.
 pueri unde dicti sint 24, 18.
 ne puncto quidem temporis 6, 8.
 pyrois 23, 22.
 Pyrrha 7, 20.
 PYTHAGORAS Samius 7, 2, 16, 8, 17, 16, 22, 19, 4, 21, 14, 22, 13, 22, 23, 6, 12.
 Pythagorici 7, 3; Pythagorica opinio 15, 26.
 Pythia (Iudi) 38, 2.
 Pythicum stadium 23, 12.
 quadragensimos dies habent insignes 20, 13.
 quadrans diei 43, 28.
 tres quadras (partes) 21, 3.
 quadratus numerus 27, 5, 22.
 — quadratus (sol) aspicit 21, 5.
 quadrigae 25, 14.
 quadripertito 51, 2.
 quaesitum solvere 5, 14.
 quaestio prima et generalis 6, 23.
 quaestiuncula 4, 10.
 xv viri 33, 10, 19, 22, 34, 11.
 Quinquatribus minusculis 22, 6.
 Quintilis (mensis) 42, 14, 47, 27, 48, 14, 26, 49, 12.
 Quirini aedes 50, 16.
 radio languido 15, 20.
 ratio numerorum 17, 24, *vo-*
cum 16, 14, 18, 4, *sescupla*
 19, 17, *duplex* 19, 21; *mu-*
sica ratione 22, 23, *geome-*
trica 23, 4; in stellarum
 signorumque ratione 31, 16.
 — *disputata* ratione 11, 15;
rationum opiniones 7, 22;
 Chaldeorum ratio breviter
 tractanda est 13, 14; *inter-*
calandi ratio 43, 6.
 recipere honorem dignitatem
cet. 6, 14; credulitas recepit

- cum accus. et inf.* 9, 1. — nullam recipiat longitudinem 30, 13, conlationem mensurae non recipit 30, 20.
 reclamare 22, 9.
 rector (navis) 22, 11.
 reddere naturam parentis 11, 9, similitudinem patris 11, 21.
 redemptor publici 43, 9.
 referre habitum (parentis) 11, 11, faciem parentis 11, 22, ludos 34, 5, 20.
 regifugium 43, 3.
 regulae musicae 16, 18.
 religiones in Graecia celebratae 37, 24.
 repraesentant dei effectum numerum suorum 6, 5. — repraesentare sexum parentis 11, 5, vultus matris 11, 19.
 reserare secreta naturae 17, 23*; *conf.* rimari.
 retro observare 34, 22; retro delictum corrigere (*in computatione*) 43, 13, retro dinumerans 45, 12.
 rhetorum artes 4, 6.
 rhythmici musici 22, 19.
 rimari arcana naturae 21, 7.
 rituales Etruscorum libri 20, 6, 31, 26.
 Roma 49, 8, 50, 21; urbs Roma 29, 26, 30, 27, 36, 8; Romae 36, 10, 37, 9, 42, 7, 44, 9, 46, 17, 48, 23, 50, 14, 26; a Roma condita 45, 19.
 Romani 39, 22, 42, 1, 6, 11, 47, 10, 48, 15, 49, 4; populus Romanus 36, 15. — Romanorum saecula 32, 18, Romani saeculi modus 32, 19, civile Romanorum saeculum 36, 5.
 Romulus 48, 8, 18; Romuli urbis condendae auguria 36, 13.
 sacellum 4, 23.
 sacerdotii honore conspicuus 29, 10.
 sacra publica 50, 6.
 sacrare deis 4, 19.
 ludi saeculares 32, 18, 33, 6, 12, 18, 34, 1 ss. 35, 2, 3.
 saeculum 30, 5, 25; naturalia saecula 30, 28 ss. 31, 26 ss.; civilia saecula 30, 29, 35, 8 ss.; Romanorum saecula 32, 18 ss. 36, 5. — saecula multa propagare 6, 26.
 sal calidus fertur in lustratione 49, 8.
 sallunt mortuos 35, 20.
 sanctissimus (Plato) 27, 4; sanctissime Caerelli 28, 5.
 sanguineus umor 19, 13; sanguineum semen 21, 12.
 sanguis in carnem convertitur 16, 13; sanguinem non continere 20, 16, *conf.* semen.
 sapientiae studiosi 6, 23, professores 7, 21, 9, 16.
 sapientium disciplina 3, 7.
 Saturni stella 23, 25.
 SC. 49, 14.
 scenici ludi 21, 30; Varro de scaenicis originibus 32, 25.
 schemata stellarum 13, 20.
 scribetur forma hexagoni in circulo 14, 26.
 scrutari 31, 17.
 secreta naturae 17, 22.
 secta stoica 8, 19, Pythagorae 21, 15.
 sedem occupat (semen) 11, 8, 12, 3.
 semen unde exeat 9, 16; semen ex medullis profluere 9, 20; semina parentum 6, 25; utrumne ex patris tantummodo semine partus nascatur, an etiam ex matris 10, 3; calor, frigus in parentum seminibus 11, 16 ss.:

- semen in sanguinem convertitur 16, 13, vertitur 20, 10; quod ex semine conceptum est 19, 12; semen non retinere conceptum 21, 9; initia seminis 19, 26; semina tenuiora 11, 6, densiora 11, 7; profuso semine 11, 12, modo seminis fieri 11, 27.
- sementis humana 31, 5.
- semitonion 17, 1* *cet.*: vide hemitonion.
- senarius numerus 19, 11, 22.
- amplissimus senatus ordo 29, 15.
- senes et seniores unde dicti sint 25, 1. 24, 23.
- September 42, 14. 47, 27.
- septemestris partus 19, 7; septemestres infantes 15, 11.
- septenarius numerus 12, 15. 20, 3.
- Septimius 34, 18.
- servare secreta naturae 17, 23.
- Servius Tullius 39, 23, 25.
- sescupla portio 18, 22, ratio 19, 17; sescuplo longior 18, 15.
- sesquialtera portio 18, 7.
- Sextilis (mensis) 42, 14. 43, 22. 47, 26. 48, 27. 49, 14.
- sexus (procreatorum) 11, 5 ss. 12, 5.
- libri Sibyllini 33, 1.
- Sicilia 50, 19, 20.
- signa (in caelo) 23, 27. 31, 16; signa (zodiaci) 14, 3 ss. 39, 7. 40, 12. 47, 7.
- signifer circulus 14, 1, orbis 21, 1; signifer (*substant.*) 15, 5.
- similitudo liberorum 11, 14; similitudo testatur usus militaris *legendum videtur* 51, 3 (*conf. praef. p. xi*).
- simplices voces 16, 25, symphoniae 17, 10.
- sistere*. ut hi referrentur ludi statum esse 34, 20.
- SOCRATES 21, 25.
- sol annuo spatio metitur zodiacon 14, 4; *quot dies in uno quoque signo moretur* 47, 15 ss.; solis cursus 37, 10. 38, 6. (38, 21). 41, 22. 43, 19; solis orbis 39, 6 (*conf. orbis*): sol *quantum distet a terra* 23, 17; *quam vim exercat in stellas* 13, 20 ss. — solis annus 37, 6; secundum solem *quomodo mensis fiat* 47, 6. — a novo sole, id est a bruma, 46, 25.
- solares menses 48, 5.
- solaria Romae statuta 50, 14 ss.
- solidi hominis materia 8, 8; dies solidi 21, 17. 37, 17, menses 37, 17, anni vertentes 37, 15, 18.
- SOLON 20, 4. 25, 7, 11, 25.
- solstitium aestivum 46, 26.
- solvere munus genio 5, 7; hoc — quaesitum solvendum videtur 5, 4.
- soni (in musica) 16, 20 ss.
- SOSIBIUS 45, 4.
- spartoe 9, 7.
- opiniones de hac specie congruae 11, 14.
- speculari 21, 6.
- spiritus semen comitans 10, 20; per animi spiritum molestiis corporis superatis 28, 18.
- stadiodromoe 25, 14.
- stadium 23, 7, stadia 23, 6, stadiorum 23, 5, 13; stadium Italicum, Olympicum, Pythicum 23, 9, 11, 12.
- STASEAS peripateticus 25, 10. 26, 24.

- statae (*var. script. stantes*)
 stellae 13, 18.
 statio (stellarum) 13, 21.
 stellae tam vagae quam sta-
 tae 13, 17; *conf. vagae*.
 stilbon 23, 15.
 stoica secta 8, 18.
 stoici 10, 4, 17, 20.
 stomachi infirmitas 28, 1.
 STRATON 13, 2.
 subnotare 51, 5.
 suboriri 9, 18*.
 subtendit (conspectus) sextam
 partem circuli 14, 23.
 ad subtile examinare 31, 8.
 subtiliter tractare 24, 9, di-
 cernere 27, 10.
 successione prolis multa sae-
 cula propagare 6, 25, *ubi*
 successioni coni. L. de Ian
 (Münchener gel. Anz. XXIV
 n. 155) coll. Cic. Catil. II,
 5, 11: mihi ablativus non vi-
 detur temptandus esse.
 SUTTONIUS 42, 10.
 sufferre laborem 22, 10.
 summa vox 16, 27.
 summitas terrae 24, 2.
 supergredi gradum provincia-
 lium 29, 12.
 supertertius (phthongos) 18,
 8; portio supertertia 18, 20.
 supplicationes 22, 1.
 suprema (pars diei) 51, 16 ss.
 sus Minervam 4, 14.
 suscipere ac tutari 5, 19.
 suspicere memoria 29, 2.
 symphonia 17, 8, 18, 20, 22, 11.
 24, 4, symphoniae 17, 9,
 symphonian 17, 26, 18, 6,
 19, 17, 20, 22, 17, sympho-
 niam 19, 15, symphonias
 17, 7.
 κύμυνοι voces 16, 16.
 tabes corporis 35, 23.
 Tages 9, 10.
 Iudi Tarentini 33, 2.
 Tarquiniensis ager 9, 9.
 Tarquinius 42, 17.
 Tartessii 31, 12.
 telion (numerus) 19, 23.
 temperatura disparilis stella-
 rum 13, 22.
 tendere chordas 17, 25, 18, 10.
 TERENTIUS 3, 10.
 terminalia 43, 3, 44, 3.
 terra 7, 24; homines e terra
 editi 9, 4; terrae radices 8,
 15, circuitus 23, 5.
 terrigenae 8, 24.
 τετρεπαικταίων tempus 20, 20.
 tetraeteris 37, 3.
 τετραγώνων 15, 2, 17, 24; vi-
 sio tetragoni 15, 6.
 ad tetragonum conspectum
 20, 25.
 THEANO Pythagorica 13, 1.
 Thebae 9, 8.
 THEOPHRASTUS 7, 7, 21, 27.
 Thessalia 8, 25.
 θεοῦ ἐνιαυτός 39, 4, *sive dei*
 annus 46, 20.
 Θωυβοί (mensis) 38, 26, *sive*
 Thouth 46, 14.
 tibia 18, 11 ss. 22, 3.
 tibicen 22, 1, 2, 4.
 TIMAEUS 5, 10, 45, 5.
 tonus. toni 23, 14, tonon 17, 1.
 23, 23, tonum 17, 17, 23, 18,
 tonorum 17, 2, 11, 14, 24, 2,
 tonos 23, 19, 24, 3.
 tragizin (τραγίζειν) 26, 8.
 tribunalia provinciarum 29, 25.
 tridecies 36, 24.
 trieterica mysteria 37, 2.
 trieteris 36, 30, 41, 18.
 τρίγωνων 15, 4, 17, 23; visio
 trigoni 15, 6.
 triumphus 22, 2.
 Tuscae historiae 32, 9.
 Tusculani 47, 27.
 tutari 5, 19.
 tutela genii 5, 16.

- umbra matris 11, 2.
 umbilicus 10, 25.
 Umbria 50, 3.
 umor 8, 9, 16; ex umore carnem fieri 10, 15; umor lacteus, sanguineus 19, 13.
 unguis 16, 7.
 uniformis 14, 6.
 unus quisque 6, 4, 7, 14, 14, 4, 16, 12, 24, 16, 25, 25, 9, 31, 25, 32, 6, 47, 7, 9, 13.
 usque *c. accus.* 24, 17, 20, 24, 48, 14, *conf.* adusque; usque ad 12, 21, 35, 26, ad hunc usque (annum) 46, 12; usque adhuc 31, 8; usque adeo 47, 18; usque dum perveniat 21, 4.
 usquequaque 14, 27, 49, 6.
 usurpat loquentium consuetudo 35, 6.
 uteris 15, 13, 19, 9, ab utero matris 6, 9, in matris utero 10, 24; uteri nescio qui 8, 15.
 utrubique 19, 2.
 vagae stellae 13, 17, 14, 2, 22, 24, 24, 8, 39, 6.
 Valerius Publicola 33, 19.
 M'. Valerius (*Messalla, consul a. u. 491*) 50, 19.
 VALERIUS: *vide* Antias.
 bona valetudo corporis 4, 25; valitudines corporum 20, 7.
 validiores conspectus 14, 7.
 VARRO 24, 15, 25, 16, 32, 10, 34, 5, 35, 19, 42, 10, 44, 15, 45, 10, 48, 15; in eo libro cui titulus est Atticus *cet.* 5, 5; in libro qui vocatur Tubero *cet.* 15, 26; de scaenicis originibus libro primo 32, 25; libro antiquitatum duodevicensimo 36, 9.
 V. C. 45, 16.
 vector navis 22, 11*.
 venarum pulsus 22, 18.
 Venus 48, 11; Veneris stella 23, 16.
 verbi causa 18, 13.
 vergiliarum ortus *et* occasus 47, 1.
 VERGILIUS 7, 20*, 52, 1.
 veritas in obscuro latet 31, 25; veritatis similitudo 8, 10; ad veritatem accedere 15, 28.
 versata est quaestio 6, 24; haec existimatione versata (sunt) 7, 17; dissensio in sex septemve annis versata 45, 9.
 verum scrutari 31, 17; a vero decedere 31, 11.
 vesper (stella) 52, 1.
 vespera 51, 24.
 vesperugo 51, 25.
 Vettius (*augur*) 36, 10.
 vetus philosophia 27, 4; veteres poetae 51, 6. — veteres 5, 20, 6, 21, 12, 12, 28, 25, 29, 1; veterum annales 33, 16; nostrorum veterum sanctissimorum hominum exempla 4, 16; *conf.* antiqui.
 vetustas 27, 24.
 videre dicitur (sol locum zodiaci) 14, 21, 15, 1.
 vigilia prima, secunda *cet.* 51, 3.
 visiones tetragoni et trigoni 15, 6.
 visus inefficax 15, 15.
 vitae finis legitimus 28, 12, *conf.* 25, 11 ss.
 vocitare 8, 25, 24, 23, 26, 19, 37, 12, 49, 10, *praeterea admodum usitatum est* vocare.
 votum ostentandi 4, 12; a votis auspicia sumere 4, 28.
 vox. voces quae in musice κύμῳνοι vocantur 16, 15;

vocum concentus 17, 9; vox
 gravior, acutior 16, 24; in-
 ter infimam summamque vo-
 cem 16, 27; voces simplices
 et utcumque emissae 16, 25;
 promisce iunctae 17, 3, nec
 sub oculos nec sub tactum
 cadentes 17, 20. — vocem
 (humanam) crassiorem et
 inaequabilem fieri 26, 7.
 ex Vulcani semine exortus
 9, 5.
 vulturis (*ablat.*) 36, 14.
 vultus matris repraesentare
 11, 19.

XENOCRATES 7, 4; X. Pla-
 tonicus veteris academiae
 princeps *quem ad annum vi-*
xerit 28, 16.

Xenophanes Colophonius 28,
 21.

XENOPHON Socraticus 3, 18.

ZENON Citieus 8, 18. 31, 7.

zodio (*ablat.*) 14, 23. 16, 12,
 16, zodia 14, 18.

zodiaci 14, 12, zodiacon 14, 1,
 in zodiaco orbe 47, 7.

INDEX IN FRAGMENTUM.

- Acronychos 59, 11.
 acutus angulus 61, 14. 62, 5.
 aequilateratum (triangulum) 62, 1*.
 aequilaterum triangulum 62, 1, (tetragonum) 62, 12.
 aequinoctialis circulus 56, 12, 17, 23. 57, 6; aequinoctialia (signa) 57, 18.
 aequinoctium vernum, autumnale 56, 13.
 aer 55, 15, 19. 60, 10 s.
 aether 55, 17, 18. 58, 3.
 Aethiopia 56, 19.
 Aleman 63, 15.
 amblygonium (triangulum) 62, 4.
 amphi-brachys 67, 12. 72, 8.
 amphimacrus 67, 19.
 Anacreontius 71, 11.
 anapaestus 67, 11. 68, 18, 21. 69, 7 ss. 72, 9, Aristophanius 70, 11. 73, 18, octonarius 70, 14, Aristobolus 70, 17.
 angelicus 71, 9. 73, 22.
 angulus 61, 6 ss. 62, 4 ss.
 antichthones 56, 23. 57, 2*.
 antipodes 57, 1.
 antiscopoe 57, 2*. *praef. viii.*
 antistoechoe 57, 2*.
 Apollo 66, 2, 6.
 aqua 55, 6, 15, 19. 60, 9, 10.
 aquarius (signum) 60, 5.
 aquilonius circulus 56, 6.
 Archebolios 71, 17*.
 Archilochius 71, 17*.
 Archilochus 63, 11, 13.
 aries (signum) 56, 13. 57, 13, 17, 18. 60, 4.
 Aristobolus 70, 17. 71, 17.
 Aristodolios 71, 17*.
 Aristophanius anapaestus 70, 11. 73, 18.
 Aristoxenus (musicus) 63, 21. 64, 18.
 aspicunt inter se stellae 59, 15, 21, 28.
 (ATTIUS) 69, 3, 5.
 augescere 58, 30.
 australis circulus 56, 6, tropicus 57, 5.
 bacchius 67, 16. 72, 15.
 biforme (signum) 57, 16, 19. 59, 25.
 bisyllabi (pedes) 66, 23.
 brachysyllabus 67, 13, 21. 68, 19, 22. 71, 4 ss.
 brumalis tropicus 57, 5.
 caelum 56, 4 ss. 58, 1. 59, 1. 60, 10.
 Callinus 63, 11.

- calor genitalis 59, 4.
 cancer (signum) 56, 11. 57, 19.
 60, 2.
 cantus 63, 22 ss. 64, 9, 20.
 capricornus (signum) 56, 10.
 57, 18. 60, 4.
 carmen 63, 16. 64, 13, 19. 65,
 5 ss.
 cathetos 61, 12.
 (CATULLUS) 68, 25. 71, 7, 21.
 centron 59, 17. 61, 18, 20.
 Chloris 64, 7*.
 chorda 66, 1.
 chorius 67, 3, 7. 69, 7, 12. 71,
 4 ss., catalecticis tetrame-
 tros 63, 12.
 χρῶμα 65, 5.
 CHRYSIPPUS 55, 17.
 Chrysothemis 66, 7.
 circuitus 70, 20. 71, 1.
 circulus 61, 17 ss. 62, 19; cir-
 culi in caelo 56, 5 ss., in
 terra 56, 15 ss.; circulum
 suum transit (luna) 58, 10.
 cithara 66, 2.
 CLEANTHES 55, 16.
 commata 63, 14.
 creticus 67, 19. 69, 20. 71, 4,
 8, 22. 72, 11.
 crusmata 64, 13.
 crusmatica 61, 13.
 dactylicus (hexameter) 68, 6.
 dactylus 67, 9. 68, 3, 18. 69,
 7 ss. 72, 6.
 defectio solis 58, 9.
 deficere (videtur luna) 58, 8.
 delitescere 59, 13.
 diametron (circuli) 61, 19.
 diametron (signum) 59, 19.
 diapason 66, 15.
 diapente 66, 15.
 diatessaron 66, 14.
 διότρον 65, 5.
 diesis 66, 13.
 diezeugmenu adiectione 66,
 10; trite, paranete diezeug-
 menon 65, 20.
 digerere figuras 60, 18.
 domus stellarum 60, 1 ss.
 Dorius 65, 6, 9.
 duodecasyllabus spondiazon
 72, 4.
 duodenarius paeon 70, 10.
 eicere rectam lineam 62, 18;
 eiectae lineae 63, 2.
 elegiarii 63, 11.
 elementa 55, 2, 15. 56, 2; ele-
 menta *metrica* 64, 21. 66,
 20 s.
 eminentiae terrarum 56, 20.
 emittere (lineam) 61, 20*.
 (ENNIUS) 68, 10. 70, 3. 72, 5.
 epipedos summitas 61, 3.
 epodi 63, 14.
 errantes stellae 57, 20*.
 Euenus 63, 11.
 euthygrammoe formae 61, 21.
 facit ortum (stella) 59, 7, sta-
 tionem 59, 12.
 faventes stellae 59, 28.
 figura 60, 18. 61, 15 ss.
 fila nervorum 66, 3.
 finire, *i. e. definire*, 64, 18.
 fixae stellae 57, 20, 22.
 flammatur luna de sole 58, 5.
 formae 60, 21. 61, 21. 62, 6.
 Gedrosia 56, 19*.
 gemini (signum) 60, 3.
 genitalis calor 59, 4.
 geometrae 62, 16.
 geometrica 60, 17 s.
 geometrica ratio 60, 15.
 gressio 69, 6.
 ἁρμονία 65, 5, harmonia 64, 14.
 harmonica 64, 12.
 hebes angulus 61, 13. 62, 5.
 hemicyclium 61, 21.

- heroicus 72, 17. 73, 1, 8, 22,
 23 (*conf.* hexameter), spon-
 diazon 72, 19.
 Hesiodus 63, 10.
 heteromeces 62, 8.
 hexagonon (signum) 59, 21.
 hexameter heroicus 68, 2. 71,
 9, 22.
 Homerus 63, 10.
 (HORATIUS) 70, 7. 73, 11.
 Hymenaeus 64, 7*.
 hypate hypaton 65, 16, hypate
 meson 65, 18.
 Hypate (Musa) 65, 15.
 hyperbolaeos 66, 11; trite hy-
 perbolaeon 65, 22.
 Hyperides (musicus) 63, 20.
 hypermixolydius 65, 11.
 hypodorus 65, 7.
 hypolydius 65, 8.
 hypophrygius 65, 7.

 iambicos trimetros 68, 23.
 iambus 67, 2, 7. 69, 2 ss., octo-
 narius 69, 20, septenarius
 69, 26.
 Idmonia 64, 5*.
 Idomena 64, 5.
 ignescere 58, 3.
 ignis 55, 15. 58, 25.
 INCERTORUM POETARUM versus
 69, 13, 18, 22, 25. 70, 5, 12,
 15, 18, 23. 71, 3, 12, 16. 72,
 2, 10, 12, 14, 20. 73, 7.
 inmittere lineam 63, 1.
 intendere citharam 66, 2.
 intentiones (organi) 65, 13.
 Ionicus 73, 10, a maiore 70, 4,
 a minore 70, 6, septenarius
 70, 2.
 Iovis stella 58, 15. 60, 4, 6.
 Ismarica nympa 64, 5.
 isosceles (triangulum) 62, 2.

 leo (signum) 60, 2.
 libra (signum) 56, 13. 57, 18.
 60, 3.

 lichanos hypaton 65, 17, me-
 son 65, 18.
 linea 60, 22 ss.
 (LUCANUS) 72, 25.
 (LUCRETIVS) 68, 5.
 luna 58, 5, 24. 59, 3. 60, 2, 5.
 Lycorea 66, 6.
 Lydius 65, 6, 10.

 Martis stella 58, 17. 60, 3, 6.
 materia 55, 3, 4.
 matutina statio 59, 8.
 medium, *i. e. centron*, 62, 18.
 melice poetice 63, 16.
 Mercuri stella 58, 21 s. 60, 2, 6.
 Mese (Musa) 65, 15.
 metra 66, 17 ss.
 metrica 63, 9.
 Mimnermus 63, 11.
 mixolydii 65, 11.
 modulatio 65, 3 ss.
 modus (*in musica et metrica*)
 63, 19. 64, 11 ss. 65, 4. 66,
 8, 13, 21.
 molossus 67, 15, 21. 72, 16.
 motus 64, 20.
 multilaterum 61, 23.
 mundus 55, 8, 11. 58, 1. 60, 14.
 Musae 65, 14.
 musica 63, 6 ss. 64, 10 ss.
 musici cantus 64, 9.
 musici 63, 20.
 Musius 64, 6.

 natales 57, 14.
 natura provida (*stoicorum*)
 55, 9.
 naturalis institutio 55, 1.
 nete synemmenon 65, 19.
 Nete (Musa) 65, 15.
 NICOCRATES 64, 5.
 NICOSTRATUS 64, 5*.
 normalis 61, 12.
 nota 60, 22 s.
 numerus 60, 16, 19. — numeri
 (*in metrica*) 63, 15, 17, 19, 23.
 66, 17 ss. 68, 1 ss.

- occasus* (stellarum) 59, 7.
octonarius iambus 69, 20, *anapaestus* 70, 14.
organica 64, 12, 14.
organum 65, 13.
Orpheus 64, 4.
orthogonium (triangulum) 62, 3.
ortus (stellarum) 59, 6 s.
oxygonium (triangulum) 62, 5.
paeon duodenarius 70, 22, *denarius* (?) 71, 2.
palinbaccius 67, 18. 71, 8. 72, 13.
paralleloe lineae 62, 13, *circuli* 56, 7.
paramese 65, 20. 66, 11.
Paramese nympa 66, 7.
paranete diezeugmenon 65, 20.
Parnasia nympa 66, 7*.
parypate hypaton 65, 17, *meeson* 65, 18.
pedes 66, 19 ss.
pentameter elegiacus 68, 16. (72, 24). 73, 1.
Periclymenus 64, 7.
Perimedes 64, 8*.
pertransit 58, 13.
Phalaecius 71, 6. 73, 6.
Phrygius 65, 6, 10.
Phyllis 63, 20.
Pindarus 63, 18.
Pisander 63, 10.
pisicis (signum) 60, 4.
planities 61, 6. 62, 13.
poetica 64, 1; *poetice melice* 63, 16.
polon anaphora 57, 11*.
Polydos 63, 20.
postmeridiana statio 59, 12.
postulata geometrarum 62, 15 ss.
Priapeum 71, 20. 73, 23.
principia 55, 2, 6, 13.
proslambanomenos 65, 16.
pyrrichius 67, 1, 5. 69, 2. 70, 8 ss. 72, 2.
quadratum 62, 6.
quadratus (versus) 69, 16.
quadrilaterae formae 62, 6.
rarescere 55, 4.
reccidere 55, 13. 70, 5.
rectus angulus 61, 11, 12. 62, 4, 8 ss.
repugnantes stellae 59, 29.
rhombos 62, 9.
rhythmica 64, 12.
rhythmus 64, 3 ss.
rubrum mare 56, 20.
Rythmonius 64, 4, 6.
sagittarius (signum) 60, 4.
Saturni stella 58, 11. 60, 4, 6.
Saturnius numerus 71, 15.
scalennon (triangulum) 62, 2.
scorpio (signum) 60, 4.
scutula 62, 9, 10.
semitonium 66, 13.
senarius (versus) 68, 23.
septenarius (iambus) 69, 24, *Ionicus* 70, 2.
signa (zodiaci) 57, 9 ss. 58, 15 ss. 59, 9 ss. — *signum* (in geometria) 61, 7. 62, 17.
signifer circulus 57, 8; *signifer* 57, 4, 12. 58, 4 ss.
Simonides 63, 12.
sol 55, 16. 58, 5, 8, 21, 26. 59, 3, 7 ss. 60, 2, 6.
solidum (signum) 57, 16, 19. 59, 26.
solistitiales circuli 56, 9, 22. 57, 6; *solistititalia* (signa) 57, 18.
solstitium hibernum 56, 10, *aestivum* 56, 11.
soni 65, 16.
speculum 58, 27.

- spondiazon 72, 16, duodeca-
 syllabus 72, 4, heroicus 72,
 19.
 spondius 67, 3, 5. 68, 3 ss.
 statio matutina (stellae) 59, 8,
 postmeridiana 59, 12.
 stellae 57, 20 ss.
 stoici 55, 3, 7.
 summitas 61, 1, 2, 4.
 syllaba 64, 21. 66, 20 ss.
 synemmenos 66, 8; trite, nete
 synemmenon 65, 19.
 taurus (signum) 60, 3.
 Telesilla Argiva 63, 16.
 tempora 64, 19, 20. 66, 21, 23.
 68, 12 ss.
 tenor 55, 3.
 Terpander 63, 10*. 66, 9.
 terra 55, 15, 20. 60, 8 ss.
 tetragonum 61, 22.
 tetragonum (signum) 59, 17.
 tetrametros choriacus 69, 16.
 THALES Milesius 55, 5.
 (TIBULLUS) 68, 17. 73, 3.
 Timotheus 63, 20. 66, 11.
 Tiresias 64, 7.
 tonos 66, 14.
 trapezia 62, 12.
 triangulum 62, 1 ss.
 tribrachys 69, 7.
 trigonum trilaterum 61, 22.
 trigonum (signum) 59, 16.
 trilaterum 61, 22.
 trimetrus 72, 18, 24, comicus
 69, 10, Hipponactius 69, 11,
 iambicus 63, 12. 68, 23, tra-
 gicus 69, 2.
 trisyllabi (pedes) 66, 24.
 trite synemmenon 65, 19, die-
 zeugmenon 65, 20, hyper-
 bolaeon 65, 21.
 trochaeus 68, 4, 6.
 tropici circuli 56, 8, 21; tro-
 picus australis brumalisque
 57, 5; tropicum (signum)
 57, 15, 17, 19. 59, 23.
 vagantes stellae 57, 20*. 59, 1.
 Veneris stella 58, 21, 23. 60,
 3, 6.
 (VERGILIUS) 68, 8, 71, 10, 72, 7.
 73, 15, 19.
 versus 64, 15.
 vigescere 59, 4.
 virgo (signum) 60, 3.
 vocalia intervalla 64, 17, tem-
 pora 64, 18.
 zonae 56, 15.





878.9 .C34r C.1
Cassii Felicis De medic
Stanford University Libraries



3 6105 045 042 723

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

APR 19 1982

OCT 20 1986

